

1．新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について⑥

2．V－SYSISについて⑥

3．各ワクチンの取扱いについて②

武田／モデルナ社ワクチンの特性について 総括

ワクチンの種類

ウイルスベクターウクチン

DNAワクチン

mRNAワクチン

組換えタンパクワクチン

ワクチンの特性

特徴

- 抗原となるタンパク質を作り出すための設計図となるmRNAを直接体内に接種することで、抗原タンパク質を作り出すシンプルな機序です。

留意点

- 製品の取扱い手順書に基づき適切な温度管理・保管・解凍・接種が必要です。
- 有効期間が短い製品（製造日から6ヶ月、医療機関到着時には5~7週間の残存有効期限を想定）です。
- 英語包装/ラベル表示下での取扱いとなります。

ワクチンに関する最新情報の提供方法

- ✓ 医療従事者向けHP
- ✓ 患者さん向けHP
- ✓ 医療関係者向けコールセンター

ワクチンに関する情報掲載先 問合せ先

くすり相談室 COVID-19 ワクチンモデルナ専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120-793-056

9:00 ~ 17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト (日本)

URL <https://take-care-COVID-19.jp>

ワクチンの取扱いについて

- 本ワクチンは2回接種のワクチン（4週間隔）です。
- バイアル・用量は以下の通りです。
 - マルチドーズバイアル（10回接種分/1バイアル）であり、最小包装単位は10バイアル（100回接種分）です。
 - 接種用量は一回接種当たり0.5mlです。
- 適切な温度管理が必要な製品です。
 - 20°C ± 5°Cでの冷凍保存（有効期間： -20°C ± 5°C 保存で製造日から6か月）
 - バイアルに針を刺す前に、2-8°Cへ移行後、針を刺す前の状態で30日間保存が可能（製品の有効期間内にて）
 - バイアルに針を刺す前に、8-25°Cへ移行後、針を刺す前の状態で12時間保存が可能
- 使用前は解凍が必要な製品です。
 - 20°C ± 5°Cの保存状態から2-8°Cへ移行し2時間半の解凍、または15-25°Cへ移行し1時間の解凍
 - 解凍後の製品の再凍結は不可
- 希釈の必要はなく、溶解操作は不要です。
- 接種時の注意点
 - 接種直前は常温で15分放置する必要があります。
 - 一度針を刺したバイアルは6時間以内に使用（保存剤未使用）してください。
 - 製品吸引の際は1回接種分ごとに新しい注射針およびシリンジを使用し、吸引後速やかに接種してください。



COVID-19モデルナワクチン筋注の 取扱いについて



武田薬品工業株式会社

COVID-19モデルナワクチン筋注の取扱いについて

注意一特例承認医薬品

ウイルスワクチン類

生物学的製剤基準 割薬 処方箋医薬品^(注)

日本標準商品分類番号

876313

薬価基準:適用外

COVID-19ワクチンモデルナ筋注

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)

注) 処方箋医薬品: 医師等の処方箋により使用すること

本剤は、本邦で特例承認されたものであり、製造販売後も引き続き品質に係る情報を収集中である。

本剤の使用にあたっては、あらかじめ被接種者又は代諾者に、本剤に関する最新の有効性及び安全性について文書で説明した上で、予診票等で文書による同意を得た上で接種すること。また、有害事象が認められた際には、必要応じて予防接種法に基づく副反応疑い報告制度等に基づき報告すること。なお、本剤の製造販売後に収集された情報については、最新の情報を隨時参照すること。


Drug Information、有効性、安全性については最新の添付文書でご確認ください。

- 取り扱い上の注意
 - ・ 外箱開封前の保管時
 - ・ 解凍時
 - ・ 解凍後
 - ・ 接種時
- 接種時の手順
- 安全に接種いただくための情報提供体制について
- 副反応情報収集へのご協力のお願い
- 外箱および包装ラベルの記載事項に関する注意

取り扱い上の注意①（外箱開封前の保管時）



- 添付されているLot.No シールと外箱横面に記載されているLot.No が同じであることを確認してください。



-20±5°Cで凍結した状態で
遮光保管してください


- -40°C以下で保管しないでください
- ドライアイスの上に直接置かないでください

COVID-19 ワクチンモデルナ筋注の保管及び接種に関する注意(2021/05月)より

外箱等の大きさ




D : 24mm
H : 50mm



外箱(10バイアル入り)

L : 51mm
W : 126mm
H : 60mm



Shipping Case
(12外箱を梱包)

L : 267mm
W : 169mm
H : 135mm

温度管理（保管時、解凍時、解凍後の保存時）



遮光下で保管、解凍、保存をしてください

組箱開封前 保管時

凍結保存

-20±5°C

-40°C以下で保管しないで
ください

ドライアイスの上に直接
置かないでください

最終有効年月日は
「EXP」を参照してください

COVID-19 ワクチンモデルナ
筋注の保管及び接種に関する
注意(2021/05月)より

解凍時

解凍方法

いずれかを選択

解凍方法-①

2~8°C

解凍:2~8°C / 2時間30分

※使用する際は常温に戻
してから使用してください

解凍方法-②

15~
25°C

解凍:15~25°C / 1時間

解凍後保存時 (穿刺前)

保存方法

いずれかを選択

保存方法-①

2~8°C

保存期間
2~8°C / 最長30日間*

※使用する際は常温に戻
してから使用してください

保存方法-②

8~
25°C

保存期間
8~25°C / 最長12時間*

*: 有効期間内に使用して
ください

解凍後保存時 (穿刺後)

2~
25°C

初回使用後6時間以上経過
した薬液は廃棄してください

解凍後の薬液は再凍結しないでください

1) 必要数のバイアルを取り出し 使用前に遮光*下で解凍してください

COVID-19ワクチンモデルナ筋注には、保存剤を含まない薬液が1バイアルに10回接種分（1接種：0.5mL）充填された状態で凍結されています

解凍する際は以下のいずれかの方法で解凍してください



- **2~8°Cで2時間30分かけて解凍する**
※ 使用する際は常温に戻してから使用してください
 - **15~25°Cで1時間かけて解凍する**
 - ◆ 解凍後も遮光*して保存してください
 - ◆ 解凍後に再凍結しないでください
- *: 室内照明による曝露を最小限に抑えてください
直射日光および紫外線が当たらないようにしてください

2) 使用前*であれば、解凍後、以下の状態で保存が可能です

*:バイアルキャップを開けておらず穿刺していない状態



遮光して2~8°C：冷凍庫から取り出した日から**最長30日間**保存可能です

※ 使用する際は常温に戻してから使用してください

遮光して8~25°C：冷凍庫から取り出した時から**最長12時間**保存可能です


◆ いずれの場合も有効期間内に使用してください

- 解凍後のワクチンを**再凍結しないでください**
- 解凍後のワクチンも遮光して保存してください

3) 解凍確認後に薬液を目視で点検してください

- 解凍していることを確認した後、泡立たないよう穏やかにバイアルを振り動かし混和してください
 - 決して激しく振り混ぜないでください

混和方法の一例



- 混和後の薬液を目視で点検してください
 - COVID-19ワクチンモデルナ筋注は白色から微黄白色の懸濁液で白色もしくは半透明の微粒子を認めることができます
 - 目視で点検した際に変色していたり、異物の混入やその他の異常を認めた場合は、そのバイアルのワクチンは使用しないでください

バイアルの底を机から離さないようにしながら円を描くように回してください

4) 0.5mL（1接種分）を吸引してください

- 接種に使用する器具は、ガンマ線等により滅菌されたディスポーザブル品を用い、被接種者ごとに取り換えてください
- 吸引の際にはバイアル中の薬液が混和されていることを確認してから注射針をさし込み、所要量（0.5mL）を吸引してください
 - 混和されていない場合、泡立たないよう穏やかにバイアルを回しながら混和してください
 - この時、決して振り混ぜないでください
 - この操作にあたっては、雑菌が迷入しないように注意してください
 - 栓を取り外したり、あるいは他の容器に移して使用しないでください
 - 本剤は白色から微黄白色の懸濁液であり、白色又は半透明の微粒子を認めることができます
使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認し、異常を認めたものは使用しないでください

5) 初回使用から6時間以上経過したものは廃棄してください

- 一度針を刺したバイアルの薬液は、初回使用から6時間以上経過したものは廃棄してください
 - バイアルラベルの空欄（二次元コード横など）に初回の薬液吸引日時を記載してください
 - 遮光して2~25°Cで保存してください
 - 残液(薬液)を再凍結しないでください
- 外箱開封後は遮光して保存してください

取り扱い上の注意⑦（接種時①）




通常、上腕の三角筋に筋肉内接種をしてください

- お手元にLot.No シールを用意し、バイアルラベルに記載されているLot.Noと同じであることを確認してください
Lot.No シールが不足した場合は、医師が接種済証・予診票等に直筆でご記入ください



- 通常、上腕の三角筋に筋肉内接種をしてください。
静脈内、皮内、皮下への接種は行わないで
ください



- 使用したバイアルや注射針・シリンジ等は
各医療機関のルールに従って適切に廃棄してください

取り扱い上の注意⑧（接種時②）




本剤は筋注製剤です。静脈内、皮内、皮下に接種しないでください

■ 組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意してください

- 針長は、筋肉内注射に足る長さで、組織や血管あるいは骨に到達しないよう、被接種者ごとに適切な針長を決定してください
- 神経走行部位を避けてください
- 注射針を刺入したとき、激痛の訴え等がみられた場合は直ちに針を抜き、部位をかえて注射してください

COVID-19 ワクチンモデルナ筋注の保管及び接種に関する注意(2021/05月)より



三角筋部位に筋注する場合

- 注射部位は三角筋中央部、肩峰の約三横指下が目安です
- 年齢、体格等に応じて適切に筋肉内に注射できる注射針を選んでください。
- 注射針を皮膚に約90度の角度で素早く刺してください。

新型コロナウイルスワクチンを安全に接種する為の注意とポイント(2021/04月)より

接種時の手順（1）；接種可否の判断



- 2回目の接種時には接種済証の記録を確認し、1回目の接種が「COVID-19 モデルナワクチン筋注」であることを確認してください
- 予診票が適切に記入されていることを確認し、問診・診察により被接種者の健康状態について確認してください。
 - 接種不適当者に該当しないかなど、最新の添付文書を確認の上ご判断いただきますようお願いいたします
- 予診票の「医師記入欄」に接種可否の判断結果・署名などを記入してください

接種時の手順（2）；被接種者の同意取得



■ 被接種者の接種の意思を確認の上、予診票の「新型コロナワイルスワクチン接種希望書」に署名等をご記入いただいてください。

- 被接種者自著、自著できない場合には代筆者が署名の上代筆者氏名と被接種者との続柄の記載をしてください
- 接種の効果や副反応などに対して被接種者が理解した上で接種の判断ができるよう、接種に対して被接種者が疑問等を持っている場合には同意取得の前にご説明いただきますようお願ひいたします

接種前後の注意点等を記載した**被接種者用冊子**を用意しております。
説明等の際に是非ご活用ください。

医薬品リスク管理監査
(IMP)

COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種を受ける方へ

この冊子は、新型コロナワイルスワクチン「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」の接種を受けた方へ、接種を受けた方とのお問い合わせ窓口についてお伝えするための情報提供用冊子です。お住まいの自治体からご案内や情報をとおあせることを避難ください。

URL: <https://covid19.vaccine.merck.com/merck/covid19/>

接種前の注意点

以下に該当する方、該当すると想われる方は、必ず接種前に医師に申し出てください

以下に該当する方は「本ワクチン」を接種できない方です

- 50歳未満（通常37.5歳以上）でいる方
- 重複免疫歴にかかっている方
- 本ワクチンの回数の着者の既にシック、アナイワキシーがあらわれた方
- 過去に本ワクチンに接種している成分に重症の過敏症のあった方
- ＊アーチーク、アーチーク・エイム、アーチーク・エイム・リミテッド、アーチーク・リミテッド、アーチーク・リミテッド・ジャパン、アーチーク・リミテッド・ジャパン・ジャパン、アーチーク・リミテッド・ジャパン・ジャパン・ジャパン
- 上記以外に医師が子供の接種を行なうことが不適当な状態にあると判断した方

以下に該当する方は「本ワクチン」の接種に留意が必要な方です

- 50歳未満（通常37.5歳以上）でいる方
- 過去に自己免疫疾患などを経験したことがある方や過敏な方
- 心臓や血管、腎臓、肝臓、末梢の神経や脳脊髄などの障害などの基礎疾患のある方
- 今までに、子供接種を受けて2回以上に発熱があった方や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状がきたことがある方
- 通常これらをしておこしたことがある方
- 本ワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある方
- 骨髄抑制症のある方
- 副作用の既往歴のある方
- 症状または既往歴でアレルギーがある方、妊娠中の方、授乳期の母乳育児や授乳期での育児などの基礎疾患のある方
- 既往または既往歴でアレルギーがある方、妊娠中の方、授乳期の母乳育児や授乳期での育児などの基礎疾患のある方
- 「ご自身の健康状態」を医療機関の診察時に忘れず伝えてしまふ

以下に該当する方は「本ワクチン」の接種 対象外の方です

- ①日本に本ワクチン以外の新規コロナワイルスワクチンを接種された方
- ②5歳未満の方
- ③18歳未満を対象とした臨床試験は実施していません
これらの外にも医療機関に注意していただきたいことがあります。必ず、3ページをごらんください。

接種箇所名

武田薬品工業株式会社
COVID-19ワクチンモデルナ筋注に関するお問い合わせ窓口
コロナワクチン相談センター
URL: <https://covid19.vaccine.merck.com/merck/covid19/>

QRコード

*上記画像はサンプル画像であり実際の資料とは異なる場合があります

接種時の手順（3）；ロットシール貼付




■ 接種したワクチンのロット番号が記載されているロットシールを 予防接種済証・予診票等の必要書類に貼付してください

- 2次元バーコードのある大きなシールが予防接種済証用ロットシールです。
- 予診票その他書類には、二次元バーコードのない接種シールを使用してください。

ロットシールは、10接種分の
シールセット（右図/予防接種
済証用：1枚、その他用：3枚
で1セット）が1枚のシートに
張られた状態で提供されます

予防接種済証用ロットシール その他書類用ロットシール



※上記画像はサンプル画像であり実際のロット番号等ではありません

接種時の手順（4）；接種後の説明



■ 被接種者に対して、接種後の注意点を再確認してください

- 接種後15～30分程度は接種医療機関（会場）の施設内等でお待ちいただく必要があること
- 施設内で待っている間に体調に異常を感じた場合には近くの医師や看護師に連絡すること
- 接種翌日以降には副反応の発現に注意し、必要に応じて医師に相談すること
- 本ワクチンは4週間の間隔で2回目の接種を受ける必要があること

■ 被接種者の方に対して、接種後も引き続き手洗い等の基本的な感染予防対策を行うよう、指導をお願いいたします

安全に接種していただくため、武田薬品より様々な形で情報提供を行っています

- 武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト

<https://take-care-COVID-19.jp>

- COVID-19 ワクチンモデルナ専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120-793-056

9:00 ~ 17:30

（土日祝日・弊社休業日を除く）

- 各種パンフレット

適正使用のための情報提供体制（2）



武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイトでは、最新の製品情報（添付文書等）や関連資材等の情報提供しています。

最新情報のご確認の際には是非こちらをご確認ください

URL <https://take-care-COVID-19.jp>

自治体様向けホームページ内では
以下の情報が提供されています

- 添付文書
- ワクチンの安全性・有効性について
- 適正使用情報（資材等）
- ワクチンの取り扱い
- ワクチン接種時の留意点
- Q&A

The screenshot shows the homepage of the Takeda COVID-19 Vaccine Special Website. At the top, there's a navigation bar with links to 'ホーム' (Home), '会社情報' (Company Information), '製品情報' (Product Information), '製品' (Product), '製品情報' (Product Information), and '会員登録' (Member Registration). Below the navigation is a large banner featuring a smiling man and the text '新型コロナウイルス感染症' (Novel Coronavirus Infection) and '武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト (日本)' (Takeda Pharmaceuticals COVID-19 Vaccine Special Website (Japan)). The main content area is divided into three sections: '医療関係者の皆さま' (For Healthcare Professionals), '自治体でワクチン接種に係る皆さま' (For Local Government Personnel), and '一般の皆さま' (For General Public). Each section contains sub-sections and links for more detailed information.

適正使用のための情報提供体制（2）



被接種者様向けの特設サイトではワクチンについて正しく理解し、接種していただくための情報を掲載しています。

なお、被接種者様向けの情報サイトへは、**予防接種済証用ロットシール**の2次元バーコードからアクセス可能です。

URL <https://take-care-COVID-19.jp>

The screenshot shows the homepage of the website <https://take-care-COVID-19.jp>. The page has a light gray background with a green header bar at the top containing white text. Below the header, there is a large white area with black text and a green button at the bottom right.

新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種を受けた方・受ける予定のある方へ

COVID-19ワクチンについて正しく理解し、接種してい
ただくための情報サイトです。

詳しく見る >

適正使用のための情報提供体制（3）



各種パンフレットを準備しております。取り扱いの確認や被接種者様への説明等にご活用ください。

■ COVID-19ワクチンモデルナ筋注の保管および接種に関する注意

■ 適正使用ガイド（医療従事者向け）

■ COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種を受ける方へ（被接種者向け）

資材については今後特設ホームページ上で、順次ご案内させていただく予定です。

なお、添付文書、ロットシール、取り扱い説明書はワクチンと一緒に届けいたします

※上記画像はサンプル画像であり実際の資材とは異なる場合があります

副反応情報収集へのご協力のお願い



- 本ワクチンの販売開始後6か月間は、新医薬品の市販後安全管理の一環として市販直後調査を実施いたします。ご協力をお願いいたします。
- 被接種者の方から副反応情報を聞いた際には、当社まで報告いただきますようお願いいたします。
 - 副反応発生時の当社への副反応報告窓口を医療従事者向けサイトに開設しております。こちらのサイトから副反応報告は可能であり、同時に予防接種法に基づく国への報告も提出可能となっております。
 - 戴いた情報は薬機法に従ってPMDAに提供され、製品の安全性監視活動に活用されます。ご協力の程、よろしくお願ひいたします。

外箱及び包装ラベルの記載事項に関する注意①



外箱及び包装バイアルラベル及び外箱の記載事項については、以下のように読み替えてください。読み替え内容は日本国内での承認内容に合わせて一部表現を変更しています。英語と日本語の表現が違う場合、日本語の表現を優先してください。

販売名	劇薬 COVID-19ワクチンモデルナ筋注
	生物学的製剤基準 「コロナウイルス修飾ウリジンRNA ワクチン(SARS-CoV-2)」
製造販売元	武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号
規制区分	劇薬、処方箋医薬品(注意—医師等の処方箋により使用すること)
貯法	-20±5°Cで凍結した状態で保存
包装	5mL×10バイアル
有効成分及び分量	CX-024414 として0.10mg/0.5mL(1接種あたり0.5mL)
	製造番号:外箱横面にある「LOT」参照 最終有効年月日:同「EXP」(DD/MM/YYYY) 参照
	本剤の検定合格情報は、以下で確認可能です https://www.niid.go.jp/niid/ja/kentei-info/3677-kentei-info.html
	箱及びラベルに記載ある二次元コード及び国際取引商品番号は 日本国内での使用及び流通には使用できません。

外箱及び包装ラベルの記載事項に関する注意②



外箱及び包装バイアルラベル及び外箱の記載事項については、以下のように読み替えてください。読み替え内容は日本国内での承認内容に合わせて一部表現を変更しています
英語と日本語の表現が違う場合、日本語の表現を優先してください

以下の赤丸で囲んだ最終有効年月日(EXP)及びLot番号(LOT)を除き、外箱やバイアルラベルに記載されている情報及び二次元コードは海外向けのものです
接種にあたっては必ず最新の添付文書及び本資料の内容をご確認ください




国内における本製品のお問い合わせ先

- ◆ くすり相談室 COVID-19 ワクチンモデルナ専用ダイヤル
〒103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号
フリーダイヤル 0120-793-056
受付時間9:00 ~17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)
- ◆ 武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト(日本)
URL <https://take-care-COVID-19.jp>

外箱及び包装ラベルの記載事項に関する注意③



外箱の記載事項について（日本語読み替え）



① 包装容量に関する記載です

10接種分保存バイアル
(1接種:0.5mLが10回分)

② 製品名に関する記載です

0.2mg/mL注射用懸濁液
COVID-19mRNAVaccin
(nucleoside modified)筋注用

③ 会社名・製造所に関する記載です

④ 含有物等に関する記載です

1バイアルには10接種(0.5mL/接種)の薬液が充填されています。含有物は、SM-102、コレステロール、1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスコリン(DSPC)、1,2-ジミレステオイル-rac-グリセロ-3-メトキシポリエチレンギリコール-2000(PEG2000-DMG)、トロメタミン、トロメタミン塩酸塩、酢酸ナトリウム、ショ糖、注射用水です。

⑤ 貯法等に関する記載です


-25°C～-15°Cで凍結した状態で保存してください。初回の薬液採取後の保存期間やその他の保存方法については最新の添付文書をご参照ください。

バイアルは元の箱に入れて、遮光保管してください。子供の目や手の届かないところに保存してください。廃棄処分する際は各自治体の規制に従ってください。

バイアルラベルの記載事項について（日本語読み替え）

-20±5°Cで凍結した状態で保存してください。
本剤のご使用にあたっては、最新の添付文書をご参考ください。

0.2mg/mL注射用懸濁液
COVID-19mRNAVaccine
(nucleoside modified)
筋注用



LOT EXP

LOT:Lot番号*
EXP:使用期限*

最新の添付文書は、上記二次元
バーコードをスキャン、または下
記URLから入手できます。
(国内では利用できません)

10回分保存バイアル
(1接種:0.5mLが10回分)

廃棄日:日時

外箱及び包装ラベルの記載事項に関する注意⑤



日本向けGS1コード等主な製品コード

統一商品コード	123002400
GS1コード(調剤包装単位)	04987123565202 (01)04987123565202
GS1コード(販売包装単位)	14987123002407 (01)14987123002407
GS1コード(元梱包装単位)	24987123002404
JANコード	4987123002400
HOT(13桁)番号	1821116010101
販売包装単位コード	14987123002407
個別医薬品コード(YJコード)	631341EA1020

ファイザー社 ワクチンの特性について

ワクチンの種類

ウイルスベクターウクチン

DNAワクチン

mRNAワクチン

組み換えタンパクワクチン

ワクチンの特徴

- 抗原となるタンパク質を作り出すための設計図となるmRNAを脂質の膜に包んで筋肉内に接種するワクチンです
- 本ワクチンは温度によって、保存期間が異なります

ワクチンに関する最新情報の提供方法

- 本ワクチンの添付文書ほか製品情報は、ファイザー新型コロナウイルスワクチン医療従事者専用サイトにて確認ください。(自治体担当者もアクセス可能です)
- FAQ、問合せ先の情報も併せて掲載しています。

ワクチンに関する情報掲載先・問合せ先

・ファイザー新型コロナウイルスワクチン医療従事者専用サイト
<https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp>



・ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト
<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/>
短縮URL：<https://pfisrv/v>



・特設コールセンター
電話番号：0120-146-744
対応時間：09:00~20:00（平日・土曜日）

上記サイトに関する問合せ先

・特設コールセンター
電話番号：0120-291-017
対応時間：09:00~20:00（平日・土曜日）

ワクチンの取扱いについて

- 本ワクチンは「**3週間間隔で2回接種**」です。
- ワクチン**バイアル1本で6回の接種**ができます。
接種場所には1箱195本届くため、1,170回接種ができます。
- ドライアイスにより超低温状態が維持された配送箱（**図1**）で届きます。
- 接種場所では、超低温冷凍庫、通常の冷凍庫または冷蔵庫で、保存します（**表1**）。
- 接種時には解凍し、生理食塩液にて希釈し、厚労省支給の注射針・シリンジを用いて接種してください。
※バイアルを室温で解凍する場合は、解凍および希釈を2時間以内に行い、希釈後は6時間以内に接種してください。

図1 配送されるワクチンセットのイメージ




表1 ワクチンの保存期間

超低温冷凍庫 (-90~-60°C)	ワクチンの有効期間（6ヵ月間*）までの保存が可能
通常の冷凍庫 (-25~-15°C)	14日間までの保存が可能
冷蔵庫(2~8°C)	5日間までの保存が可能 ※現在、保存期間延長(1ヵ月間)について添付文書の改訂を申請中**

*海外工場での製造時から起算した期間となります。ワクチンの最終有効年月日は、バイアルおよびバイアル箱のラベルに記載されています

**数日以内の改訂が見込まれています

ファイザーウクチン「コミナティ筋注」の追加情報

ウイルスワクチン類 生物学的製剤基準


 **コミナティ 筋注**

COMIRNATY intramuscular injection

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)

劇薬 処方箋医薬品^{注1)} 注意-医師等の処方箋により使用すること 薬価基準:適用外

ファイザーウクチン「コミナティ筋注」は国内接種開始から3か月が経過しました



冷蔵(2~8°C)での保存期間の延長に係る添付文書改訂を申請中*です



保存温度

現状の保存可能期間

改訂後の保存可能期間

2~8°C**

5日間



1カ月（改訂後）

-25~-15°C

14日間

変更なし

-90~-60°C

ワクチンの有効期間
(6カ月間***)

変更なし

*数日以内の改訂が見込まれています

**衝撃・振動を避けていただくようお願いします

***海外工場での製造時から起算した期間となります。ワクチンの最終有効年月日は、バイアルおよびバイアル箱のラベルに記載されています

ファイザー社では、専用サイトなどを通じて各種情報の提供・収集を行っています



医療従事者・
自治体向け



専用サイト



<https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/>



接種された方と
そのご家族向け



専用サイト



<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/>

短縮URL : <https://pfi.sr/v>



<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp/>

短縮URL : <https://pfi.sr/v>

専用サイト

専用モバイルアプリ



8月中旬にリリース予定です

コールセンター

医療従事者向け
専用サイトに
関するお問合せ先

0120-291-017



有害事象報告サイト

Pfizer Safety Reporting

<https://www.pfizersafety-reporting.com/#/ja>

- 専用サイトからもアクセス
することができます
- 有害事象をいつでも
報告することができます



接種記録アプリ

 Health Amulet



Health Amuletは
ミナケア社が
提供・運営する
アプリです

<https://www.health-amulet.net/covid19>

当社ワクチンに
関するお問合せ先

0120-146-744



平日・土曜日
9:00～20:00

保管・調製・接種に係る留意点について

保管

- 製剤もしくは設備の見えやすいところに『遺伝子組換え生物学的製剤』であることを表示して保管してください。
- アストラゼネカ新型コロナワイルスワクチンは、凍結を避けて、2～8℃で保存してください。
- 有効期間は製造日から6ヵ月です。

添付文書*	貯 法	2～8℃で保存
	有効期間	6ヵ月

* 最新の添付文書をご参照ください

調製（シリンジへの充填）

- 被接種者や他のスタッフから離れた場所*で行ってください。 *カーテンやパーティションで仕切ることでもよい

接種

- 接種前後の待機場所と接種場所を分けてください。
- 接種後の刺入部は、絆創膏を貼り、一定時間（30分程度）保護するよう指導してください。

接種後の処理について

製剤の廃棄・関連資材の廃棄・再利用

- 原則、未使用バイアルの原液やバイアルの残液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号、以下「廃棄物処理法」という。）に従って感染性廃棄物の専用廃棄ボックスなどに入れ、漏出しない状態で、感染性廃棄物処理業者に廃棄委託してください。委託できない場合は、廃棄物処理法に従って、医療用ハイターなどで適切に不活化処理を行ってから廃棄してください。
- 再利用する器具（例；トレーなど）は、廃棄物処理法に従って、高圧蒸気滅菌・医療用ハイターなどによる不活化処理を行った上で十分洗浄してください。

被接種者への指導

- 注射部位に貼られた絆創膏は、施設内の専用ボックスなど*に廃棄するよう指導してください。
* 専用ボックス（たとえば、廃棄ボックス、ビニール袋、ごみ袋など）
- 施設外で廃棄する場合は、使用後のマスクなどと同様にビニール袋などに入れたうえでゴミ箱に廃棄するよう指導してください。

製品や安全性に関する最新情報の提供、安全性情報の収集、品質苦情や製品に関する問い合わせの受付を行います

本サイトの目的

- アストラゼネカ新型コロナワイルスワクチンは、国及び地方自治体において、予防接種事業として各市区町村の住民に対し接種されます。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から医薬情報担当者（MR）による施設訪問の制限が想定されるため、Webツールを構築しました。
- MRの施設訪問によることなく、本サイトを通じ、製品・安全性情報の提供や収集などを行います。

本サイトへのアクセス方法

<https://azcovid-19.jp/>



本サイトでできること

- アストラゼネカ新型コロナ
ウイルスワクチンの製品情報
や安全性情報の閲覧
- 添付文書や製品関連資材の
閲覧・ダウンロード
- 副反応・品質苦情の報告、
製品に関する問い合わせ

※Webサイトの各画面はイメージです。変更される場合があります。

Webサイトに関するお問い合わせはこち
ら
(9:00～17:30 土日祝祭日および弊社休業日を除く)

フリーダイヤル：0120-162-283

※間違い電話にご注意ください。