

# 4

## 使用上の注意の改訂について (その314)

令和2年6月16日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

### 1 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩

[販売名] メマリー錠5mg, 同錠10mg, 同錠20mg, 同OD錠5mg, 同OD錠10mg, 同OD錠20mg, 同ドライシロップ2% (第一三共株式会社) 他

(旧記載要領)

[副作用  
(重大な副作用)  
(新設)] 完全房室ブロック, 高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈: 完全房室ブロック, 高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(新記載要領)

11. 副作用 完全房室ブロック, 高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈

11.1 重大な副作用

(新設)

### 2 その他の腫瘍用薬 ベバシズマブ (遺伝子組換え) ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続1] ベバシズマブ (遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続2]

[販売名] アバスチン点滴静注用100mg/4mL, 同点滴静注用400mg/16mL (中外製薬株式会社)  
他バイオ後続品

(旧記載要領)

[副作用  
(重大な副作用)  
(新設)] 動脈解離: 大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 本剤の投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

(新記載要領)

11. 副作用 動脈解離: 大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。

11.1 重大な副作用

(新設)