

成分名(一般名)	検討する効能・効果	候補成分に対応する医療用医薬品の情報				備考
		販売名	会社名	効能・効果	用法・用量	
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和:鼻づまり, 鼻みず(鼻汁過多), くしゃみ	ナゾネックス点鼻液50 µg 56噴霧用 同点鼻液50 µg 112噴霧用	オルガノン株式会社	アレルギー性鼻炎	<p>〈成人〉 通常、成人には、各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日200 µg)。</p> <p>〈小児〉 通常、12歳未満の小児には、各鼻腔に1噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日100 µg)。 通常、12歳以上の小児には、各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回投与する(モメタゾンフランカルボン酸エステルとして1日200 µg)。</p>	
アダパレン	尋常性ざ瘡(ニキビ)	ディフェリンゲル0.1%	マルホ株式会社	尋常性ざ瘡	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。	
ツロブテロール	せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん	ホクナリンテープ0.5mg 同テープ1mg 同テープ2mg	ヴィアトリス製薬株式会社	下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解 気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫	通常、成人にはツロブテロールとして2mg、小児にはツロブテロールとして0.5~3才未満には0.5mg、3~9才未満には1mg、9才以上には2mgを1日1回、胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付する。	