患者からの医薬品副作用報告の状況について

令和7年10月24日 医薬安全対策課

今回報告分:令和7年4月1日から令和7年7月31日まで

前回報告分: 令和6年 12 月1日から令和7年3月 31 日まで

| | | 症例数(例) | |
|--------|----------------------------------|-------------|----|
| | | 今回報告分 前回報告分 | |
| 総受付症例数 | | 73 | 64 |
| | うち、回復していない、後遺症がある又は死亡した、と報告されたもの | 42 | 43 |

【今回報告分の詳細】

- 今回の報告期間中の報告数は 73 例であった。
- 報告された73例のうち、回復していない、後遺症がある又は死亡した、と報告されたものは42例であった。
- 医療用医薬品を1つでも含む報告は 70 例であり、要指導・一般用医薬品を1つでも含む報告は3例であった。
- 副作用報告の状況は別紙のとおりであり、医療用医薬品の副作用件数を別紙 1、要指導・一般用医薬品の副作用件数を別紙2に示した。

【報告の多い薬効分類】

医療用医薬品

精神神経用剤(12件)、その他の中枢神経系用薬(7件)、ワクチン類(7件)

一般用•要指導医薬品

鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤(2件)、その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(1件)、漢方製剤(1件)

【患者等からの健康被害等報告の集計結果についての注意事項】

- (1) 健康被害等報告については、患者またはその家族から報告された情報をとりまとめたものであり、個別に 医薬品との関連性を評価したものではない。
- (2) 「回復していない、後遺症がある又は死亡した、と報告されたもの」の症例数は、1 症例に含まれる症状について最も重篤なものが、回復していない、後遺症がある又は死亡した、と報告された症例数をカウントしている。
- (3) 【報告の多い薬効分類】については、「副作用を引き起こしたと疑われる医薬品」として報告されたすべての 医薬品ごとに、対応する薬効分類を割り当て、その数を集計している。複数の症例で同一の医薬品に関す る報告がなされた場合、症例ごとに対応する薬効分類を割り当てて集計しているため、別紙 1 の対応する 薬効分類内の医薬品名数とは異なる場合がある。

患者からの医薬品副作用報告の状況について (令和7年4月1日から令和7年7月31日までの報告受付分)

患者等からの健康被害等報告の集計結果についての注意事項

- (1) 健康被害等報告については、患者またはその家族から報告された情報をとりまとめたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- (2) 令和7年4月1日から令和7年7月31日に報告されたものである。
- (3) 別紙1の医薬品名は、医薬品名統一のため、「医療用医薬品名データファイル(コード表)」(再審査用コード)に基づき、成分名で表示している。ただし、成分名及び投与経路を特定できない場合は薬効分類名で表示している。
- (4) 別紙1の副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term(PT):基本語)で表示している。
- (5) 別紙1の件数は、医薬品名と副作用名別の件数を示したものであり、1 症例で複数の副作用を発現する場合や 1 症例に複数の被疑薬を含む場合があるので、集計値の合計は総受付症例数にならない。

患者副作用報告の状況(医療用医薬品) (令和7年4月1日~令和7年7月31日)

| 薬効分類 | 医薬品名 | 副作用名 | 件数 |
|--|---------------|--------------|----|
| 全身麻酔剤 | チオペンタールナトリウム | 酸素飽和度低下 | |
| | ブロチゾラム | 冷感 | |
| | | 傾眠 | |
| | | 頭痛 | |
| | ジアゼパム | 羞 明 | |
| | | 周期性四肢運動障害 | |
| | | よだれ | : |
| /님···································· | | 悪性症候群 | : |
| 催眠鎮静剤,抗不安剤 | ロラゼパム | 発熱 | : |
| | | 振戦 | |
| | | 筋骨格硬直 | : |
| | ミダゾラム | アナフィラキシーショック | |
| | | 咽頭炎 | |
| | | 尿閉 | |
| | | 咽頭腫脹 | |
| | | 歩行障害 | |
| | 精神神経用剤 | 骨粗鬆症 | |
| | | よだれ | |
| | | 悪性症候群 | |
| | ゾテピン | 発熱 | |
| | , , = . | 振戦 | |
| | | 筋骨格硬直 | |
| | エチゾラム | 運動障害 | |
| | 27774 | 意識レベルの低下 | |
| | | 発声障害 | |
| | リスペリドン | 高血糖 | |
| | | 斜頚 | |
| | | 意識レベルの低下 | |
| | | 発声障害 | |
| | クエチアピンフマル酸塩 | 高血糖 | |
| | | 食欲亢進 | |
| | | よだれ | |
| | | 悪性症候群 | |
| | オランザピン | 悉性症候群 発熱 | |
| 精神神経用剤 | | 振戦 | |
| | | | |
| | | 筋骨格硬直 | |
| | | 腹部膨満 | |
| | | 血管性浮腫 | |
| | | ジストニア | |
| | | 転倒 | |
| | アリピプラゾール | 歩行障害 | |
| | | 四肢痛 | |
| | | 光線過敏性反応 | |
| | | 多飲症 | |
| | | 体重増加 | |
| | | 四肢不快感 | |
| | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 周期性四肢運動障害 | |
| | ベンラファキシン塩酸塩 | 咳嗽 | |
| | | 体位性めまい | |
| | | 転倒 | |

| | リスデキサンフェタミンメシル酸塩 | 頭痛 | 1 |
|----------------|---|---------------|---|
| | | 悪心 | 1 |
| | | 発 熱 | 1 |
| 総合感冒剤 | 非ピリン系感冒剤(4) | | 1 |
| | | 中期不眠症 | 1 |
| | プレガバリン | 睡眠慣性 | 1 |
| | | 調節障害 | 1 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 注意力障害 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | ミロガバリンベシル酸塩 | 判断力低下 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| この他の中枢神経を田英 | | 幻覚 | 1 |
| その他の中枢神経系用薬 | レンボレキサント | 幻聴 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 口腔咽頭痛 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | ラスミジタンコハク酸塩 | 筋力低下 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 回転性めまい | 1 |
| | | よだれ | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | バルベナジントシル酸塩 | 発熱 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| 局所麻酔剤 | オキセサゼイン | 湿疹 | 1 |
| | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 眼脂 | 1 |
| | | 眼瞼腫脹 | 1 |
| 眼科用剤 | モキシフロキサシン塩酸塩 | 眼充血 | 1 |
| | エピナスチン塩酸塩 | 眼脂 | 1 |
| | | 眼瞼腫脹 | 1 |
| 耳鼻科用剤 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 高血圧 | 1 |
| 不整脈用剤 | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | シルニジピン | 光線過敏性反応 | 1 |
| 血圧降下剤 | アジルサルタン | 光線過敏性反応 | 1 |
| | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド酉 | 光線過敏性反応 | 1 |
| | 合剤 | 元称20岁年11人 | 1 |
| 血管拡張剤 | ベニジピン塩酸塩 | 光線過敏性反応 | 1 |
| 高脂血症用剤 | フェノフィブラート | 蕁麻疹 | 1 |
| その他の循環器官用薬 | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | 光線過敏性反応 | 1 |
| 与第 士抗理划 | ◇ カロ J カバン・プロ L2 → \ . ★☆ + → − ! | 上咽頭炎 | 1 |
| 気管支拡張剤 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 免疫抑制 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | | 1 |
| | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメ クリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェ ニル酢酸塩 | | 1 |
| - W | | (| 1 |
| その他の呼吸器官用薬 | | : | 1 |
| | | 片麻痺 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | 1 | 恩見 | |

| | | 1 | 喘鳴 | 1 |
|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | 頭痛 | 1 |
| | | メサラジン | 倦怠感 | 1 |
| その他の消化器官用薬 | | | 発熱 | 1 |
| | | | | 1 |
| | | モサプリドクエン酸塩水和物 | 腹部膨満 | 1 |
| | | | 不整脈 | 1 |
| | | | 体温上昇 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| 副腎 | ホルモン剤 | ベタメタゾン・dークロルフェニラミンマレイ | | 1 |
| | | ン酸塩 | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 不眠症 | 1 |
| | | | 口唇腫脹 | 1 |
| | | | 痙攣発作 | 1 |
| | | | 抑うつ症状 | 1 |
| その | 他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含 | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 薬効欠如 | 1 |
| む。 |) | | (未为)八为L | _ |
| | | | 上腹部痛 | 1 |
| こ へ | 仙 | カルナロフ | 紅斑 | 1 |
| その | 他の外皮用薬 | タピナロフ | 顔面浮腫 | 1 |
| | | | 感覚障害 | 1 |
| 歯科 | 用局所麻酔剤 | プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン | 髄膜症 | 1 |
| | | | 腹痛 | 1 |
| 止血 | 剤 | トラネキサム酸 | 下痢 | 1 |
| 痛風 | | ドチヌラド | 尿路結石 | 1 |
| | | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | トファシチニブクエン酸塩 | 腸瘻造設 | 1 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| 他に | 分類されない代謝性医薬品 | | 胸痛 | 1 |
| | | ロモソズマブ(遺伝子組換え) | 下痢 | 1 |
| | | | 唱吐 | 1 |
| | | <u>-</u> トレミフェンクエン酸塩 | 劇症肝炎 | 1 |
| その | 他の腫瘍用薬 | レゴラフェニブ水和物 | 体重減少 | 1 |
| | | | 粘膜乾燥 | 1 |
| 抗ヒ | スタミン剤 | d -クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 口渇 | |
| 370 — | | | 併用薬の薬効減弱 | 1 |
| | | エピナスチン塩酸塩 | 期外収縮 | |
| その | 他のアレルギー用薬 | ビラスチン | 脱毛症 | |
| 漢方 | 製剤 製剤 | 黄連解毒湯 | 腸間膜静脈硬化症 | |
| 7,0,3 | 520713 | アモキシシリン水和物 | 薬疹 | 1 |
| | | | 倦怠感 | |
| | | | 悪心 | |
| | | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 嘔吐 | 1 |
| | | | 起立障害 | 1 |
| | | | 発声障害 | <u>_</u> |
| | | | 湿疹 | 1 |
| | | | 口唇腫脹 | <u>_</u> |
| | | セフメタゾールナトリウム | そう痒症 | 1 |
| | | | 舌腫脹 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | | 口腔腫脹 | 1 |
| | | | 発声障害 | 1 |
| | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する | | 湿疹 | 1 |
| | | | 口唇腫脹 | 1 |
| 生 | もの | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 1 |
| 生物 | | こうドラテオランテドララム小相切 | | 1 |
| イソノ | | | 舌腫脹 | 1 |

| 質 | | | 蕁麻疹 | 2 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------------|--------|
| 製 | | | 口腔腫脹 | 1 |
| 剤 | | | 下痢 | 1 |
| | | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 出血 | 1 |
| | | | 予 | 1 |
| | | | 湿疹 | 1 |
| | | | 口唇腫脹 | 1 |
| | | タゾバクタム・ピペラシリン水和物 | そう痒症 | 1 |
| | | | 舌腫脹 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | | | 1 |
| | | クラリスロマイシン | 口腔腫脹 | 1 |
| | ナレーマグニ / 限州帯 マノコプニブラ | クラリスロマイン <i>ン</i> | 腱断裂 | 1 1 |
| | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマ | 7. 7. 7. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 紅斑 | 1 |
| | に作用するもの | アジスロマイシン水和物 | そう痒症 | 1 |
| | | | 発疹 | 1 |
| | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチ | ミノサイクリン塩酸塩 | 浮動性めまい | 2 |
| <u> </u> | ア, クラミジアに作用するもの | | 高血圧 | 1 |
| | | | 発声障害 | 1 |
| | | | 湿疹 | 1 |
| | | | 口唇腫脹 | 1 |
| 合成 | 抗菌剤 | レボフロキサシン水和物 | そう痒症 | 1 |
| | | | 舌腫脹 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | | 口腔腫脹 | 1 |
| | | | 無尿 | 1 |
| | | | 血圧上昇 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| | | バラシクロビル塩酸塩 | 悪心 | 2 |
| | A secondary | | 発熱 | 1 |
| 抗ウ | イルス剤 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 |
| | | | 筋力低下 | 1 |
| | | | 体重減少 | 1 |
| | | ニルマトレルビル・リトナビル | 活動状態低下 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | アラニンアミノトランスフェラー | |
| | | | ゼ増加 | 1 |
| | | | アスパラギン酸アミノトランス | |
| | | | フェラーゼ増加 | 1 |
| | | ホスラブコナゾール L - リシンエタノール付 | * 1 | 1 |
| その | 他の化学療法剤 | | | 1 |
| | | 加物 | 倦怠感 | 1 |
| | | | 動悸 | 1 |
| | | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| <u> </u> | | | 味覚障害 | 1 |
| | | ウイルスワクチン類 | ベル麻痺 | 1 |
| | | | 顔面麻痺 | 1 |
| | | | 関節障害 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | コロナウイルス(SARS-CoV-2)RN | | 1 |
| | | A ワクチン(コミナティ) | 痙攣発作 | 1 |
| | | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | | 振戦 | 1 |
| | チン類 | | 田 ケッウ | 1 |
| ワク | チン類 | | 関節痛 | |
| ワク | チン類 | 組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子 | | 1 |
| ワク | チン類 | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子 ワクチン(酵母由来) | | 1 1 |

| | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハ | 脱毛症 | 1 |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|---|
| | 20 20 20 20 20 20 20 20 | 顔面麻痺 | 1 |
| | ムスター卵果細胞田米 <i>)</i> | 胃腸出血 | 1 |
| | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子 | 注射部位疼痛 | 1 |
| | ワクチン(酵母由来) | /注列 a 附近 / 交佣 | 1 |
| 血液製剤類 | 血液製剤類 | 真性多血症 | 1 |
| 混合生物学的製剤 | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチ | 注射部位紅斑 | 2 |
| 形 口 工 10 于 H V 表 A V | ン | ワクチン接種部位疼痛 | 2 |
| X線造影剤 | イオトロラン | 薬疹 | 1 |

患者からの要指導・一般用医薬品副作用報告の状況について (令和7年4月1日から令和7年7月31日までの報告受付分)

患者等からの健康被害等報告の集計結果についての注意事項

- (6) 健康被害等報告については、患者またはその家族から報告された情報をとりまとめたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- (7) 令和7年4月1日から令和7年7月31日に報告されたものである。
- (8) 別紙2の医薬品名は、医薬品名統一のため、「医薬品銘柄コード」(経済課コード)に基づき、販売名で表示している。ただし、販売名を特定できない場合は、最も疑われると考えられる医薬品の販売名で表示している。
- (9) 別紙2の副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term(PT):基本語)で表示している。
- (10) 別紙2の件数は、医薬品名と副作用名別の件数を示したものであり、1 症例で複数の副作用を発現する場合や 1 症例に複数の被疑薬を含む場合があるので、集計値の合計は総受付症例数にならない。

患者副作用報告の状況(要指導医薬品・一般用医薬品) (令和7年4月1日~令和7年7月31日)

| 薬効分類 | 医薬品名 | 副作用名 | 件数 |
|-------------------|-------------|--------|----|
| | トレンタムGクリーム | 適用部位腫脹 | 1 |
| 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | ロードパスC | 接触皮膚炎 | 1 |
| 製用, 製件, 収燃, /月处剂 | | 紅斑 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| 漢方製剤 | クラシエ八味地黄丸 A | 脳梗塞 | 1 |
| その他の生薬及び漢方処方に基 | ユリナール | 12.10 | 1 |
| づく医薬品 | | 脳梗塞 | 1 |