

RevMate[®]

レナリドミド・ボマリドミド適正管理手順

服薬指導箋

—保管・管理のお願い—

レナリドミド・ポマリドミドを服用される方へ

あなたが服用している薬剤は、お腹の赤ちゃん(胎児)に重大な障害を及ぼす恐れがありますので、特別な管理が必要です

妊婦さん、赤ちゃん(胎児)を守るために避妊を徹底してください。

A男性 妊娠する・させる力の有無にかかわらず、治療開始から治療終了4週間後まで性交渉を控えるか、避妊(コンドームの着用)を徹底してください。
女性パートナーが妊娠中の場合は性交渉は完全に控えてください。
なお、女性パートナーにおいても、治療開始から治療終了4週間後まで規定された避妊法※が推奨されます。

C女性 治療開始4週間前から治療終了4週間後まで性交渉を控えるか、規定された避妊法※を徹底してください。その際、男性パートナーは必ずコンドームを使用してください。

※避妊法の詳細については、レブメイト[®]ホームページをご確認ください。

守らなければならないこと

● 治療終了4週間後まで

A男性

- 避妊(コンドームの着用)を実施してください。妊婦との性交渉は完全に控えてください。
- 精子・精液の提供はしないでください。
- 献血をしないでください。

C女性

- 規定された避妊法を実施してください。男性パートナーは必ずコンドームを着用してください。
- 授乳をしないでください。
- 献血をしないでください。

B女性

- 献血をしないでください。

● 治療終了まで

A男性 B女性 C女性

- カプセルを開けずにそのまま飲んでください。
- 処方医師から指示された内容とは異なった飲み方をした場合は、処方医師、薬剤師に報告してください。
- 不要となった薬剤は薬剤部に返却してください。
- 紛失した場合は、処方医師、薬剤師に報告してください。
- 他の人に譲渡しないでください。
- 飲食物と区別された、子供の手の届かない場所に保管してください。
- レブメイト[®]カードは、受診時に必ずご持参ください。

医療担当者名: _____

年 月 日

入院(転院)・入所、介助を受ける際に医療関係者に提示してください

- レナリドミド・ポマリドミドは、ヒトで催奇形性を示すサリドマイドに似たお薬です。そのため、特別な管理(レブメイト®の遵守)が必要です。
誤投与防止を徹底するとともに、医療関係者の皆さまも薬剤曝露にご注意ください。

表面の「守らなければならないこと」を徹底してください。

誤投与防止のための薬剤保管と、配薬・与薬・服薬確認徹底のお願い

薬剤保管

「レナリドミド・ポマリドミドは特別な管理(レブメイト®の遵守)を必要とする薬剤である」ことが容易に認識できるよう、他のお薬とは区別して保管*1してください。

- 薬剤曝露を防止するため脱カプセルは絶対にしないでください。
- 不要なレナリドミド・ポマリドミドは勝手に廃棄せず、薬剤部に返却してください。*2
- 薬剤を紛失した場合は、処方医師または責任薬剤師に報告してください。*2

*1 各医療機関の基準に基づき管理してください。

*2 レブメイト®登録医療機関ではない場合は、レブメイト®センターにご連絡ください。

配薬

患者名、薬剤名、用量について**ダブルチェック**を行ってください。

与薬

必ず**本人確認**を行ってください。

服薬確認

患者さんが服用した後は、**服薬確認**を行ってください。

詳細については、レブメイト®ホームページをご覧ください。

レブメイト®ホームページ

レブメイト



<https://www.revmate-japan.jp/>



