

# 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状 に係る実態調査について

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括

# 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査(概要)

## 背景

新型コロナワクチンの接種により新型コロナウイルスによる重症例は減ったものの、世間ではワクチン接種後の遷延する症状があるのではないかと意見が散見されるが、その実態は不明である。そのため、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状について、遷延する症状も含め、実態の把握を行うことを目的に評価を行うこととした。

## 目的

ワクチンとの因果関係の有無にかかわらず、ワクチン接種後の症状を訴え専門的な医療機関を受診した者の実態を収集、把握し、得られた知見について必要な情報提供等を行うことを目的とする。

## 調査方法

### 【調査の方針】

本調査は、受診実態の把握を目的とした記述的な評価（※）を行うこととし、ワクチン接種後の症状を呈した患者が受診した専門的な医療機関に対して調査票を送付し、症例に関する情報を収集・分析することとした。また、令和5年度調査（「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査」）及び令和6年度調査（「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査」）において報告された症状のうち、軽快又は回復以外の転帰であった症例については、その後の経過を収集することとした。

### 【調査対象】

全国の都道府県において、自治体やかかりつけ医等の紹介によりワクチン接種後に副反応を疑う症状を専門的見地から診療する約360の専門的な医療機関が整備されている。このうち「本調査への協力が可能」との回答が得られた146の医療機関を調査対象とした。

### 【調査方法】

以下の2種類の調査票を作成し、調査を行った。調査対象者は、令和6年6月1日から令和7年12月31日※までに受診した者とした。

※令和5年度調査及び令和6年度調査の調査期間中に提出できなかった症例についても調査対象者とした。


- ① 事務的調査票：性別・年齢・受診した診療科等の受診状況の全体像を把握することを目的に、地域連携室宛に送付。
- ② 医学的調査票：症状や診断や治療の結果明らかとなった病名等医学的な内容を把握することを目的に、医師宛に送付。
- ③ 令和8年2月13日より調査票を送付し、令和8年3月19日までに回答があった報告を評価・報告対象とした。
- ④ 令和5年度調査及び令和6年度調査で転帰が未回復と報告された症例のその後の経過を調査し、回答があった報告を報告対象とした。

### 【主な調査項目】

| 事務的調査票（地域連携室宛）                                             | 医学的調査票（医師宛）                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発症日、当該症状に係る初診日、当該症状に係る初診日以降の診療科、当該症状に係る初診日以前の診療科、直近の受診状況 等 | 受診のきっかけとなった症状、当該症状の発現日、ワクチン接種の状況、基礎疾患、当該症状にかかる病名、検査、治療内容、転帰、症状の持続期間、日常生活・就労・就学への影響、経過の概要 等 |


※PwCコンサルティング合同会社に委託して調査を実施。調査計画の立案、調査結果のとりまとめに当たっては、国立健康危機管理研究機構から助言をいただいた。

## 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査のイメージ図




- ※1 全国の都道府県において、自治体やかかりつけ医等の紹介により、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状を専門的見地から診療する約360の医療機関を整備。この専門的医療機関のうち、事前に調査への協力が可能との回答が得られた146の医療機関を調査対象。被接種者が専門的な医療機関を直接受診する可能性もある。
- ※2 専門的な医療機関の受診状況の全体像を把握するために、事務的調査票を地域連携室等宛に送付。
- ※3 医学的な内容を把握するために、医学的調査票を担当医師宛に送付（追加調査及び追跡調査）。

# 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態の追加・追跡調査結果の概要



|          | 事前に調査・研究に協力の同意を得られた医療機関数 | 地域医療連携室から回答が得られた医療機関数※ | 担当医師から回答が得られた医療機関数 |
|----------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 北海道・東北地方 | 44                       | 1+15                   | 0                  |
| 関東地方     | 15                       | 2+3                    | 3                  |
| 中部地方     | 15                       | 2+4                    | 3                  |
| 近畿地方     | 25                       | 1+6                    | 1                  |
| 中国・四国地方  | 34                       | 1+6                    | 3                  |
| 九州地方・沖縄  | 13                       | 0+5                    | 0                  |

※地域医療連携室から回答が得られた医療機関数は、前者が該当症例ありの医療機関数、後者が該当症例なしの医療機関数



## 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査 (令和5年度調査・令和6年度調査・今回の調査)

### 【実態調査/追加調査】

|                 |       | 令和5年度調査    | 令和6年度調査    | 今回の調査      |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|
| 全国の専門的な医療機関     |       | およそ470施設   | およそ360施設   | およそ360施設   |
| 事前に協力の同意を得た医療機関 |       | 193施設      | 136施設      | 146施設      |
|                 | 該当者なし | 40施設       | 32施設       | 39施設       |
|                 | 参加辞退  | 12施設       | 7施設        | 11施設       |
| 地域連携室（症例数）      |       | 29施設(268例) | 14施設(179例) | 7施設(42症例)  |
| 担当医師（症例数）       |       | 27施設(212例) | 12施設(144例) | 10施設(56症例) |

### 【追跡調査】

|            | 令和5年度の追跡調査<br>(2024年8月～11月) | 令和6年度の追跡調査<br>(2025年2月) | 今回の追跡調査<br>(2026年2～3月) |
|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 回答が得られた症例数 | 6施設(16例)                    | 6施設(31例)                | 4施設(12例)               |

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料



## 地域連携室宛に送付した事務的調査票の回答の全体の状況

(地域連携室宛調査)

### <回答依頼施設数、回答施設数、症例数>

| 回答施設依頼数 | 回答施設数 | 該当症例あり施設 |       | 該当症例なし施設数 | 辞退施設数 |
|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|
|         |       | 回答施設数    | 回答症例数 |           |       |
| 146施設   | 57施設  | 7施設      | 42症例  | 39施設      | 11施設  |

### <年齢、性別内訳>

※小数点以下第2位四捨五入

| 男性     | 15 | 35.7% | 女性     | 27 | 64.3% | 合計 | 42 |
|--------|----|-------|--------|----|-------|----|----|
| 0～9歳   | 0  | 0.0%  | 0～9歳   | 0  | 0.0%  | 合計 | 0  |
| 10～19歳 | 1  | 2.4%  | 10～19歳 | 2  | 4.8%  | 合計 | 3  |
| 20～29歳 | 1  | 2.4%  | 20～29歳 | 0  | 0.0%  | 合計 | 1  |
| 30～39歳 | 1  | 2.4%  | 30～39歳 | 1  | 2.4%  | 合計 | 2  |
| 40～49歳 | 4  | 9.5%  | 40～49歳 | 5  | 11.9% | 合計 | 9  |
| 50～59歳 | 3  | 7.1%  | 50～59歳 | 3  | 7.1%  | 合計 | 6  |
| 60～69歳 | 1  | 2.4%  | 60～69歳 | 6  | 14.3% | 合計 | 7  |
| 70～79歳 | 4  | 9.5%  | 70～79歳 | 2  | 4.8%  | 合計 | 6  |
| 80～89歳 | 0  | 0.0%  | 80～89歳 | 7  | 16.7% | 合計 | 7  |
| 90～99歳 | 0  | 0.0%  | 90～99歳 | 1  | 2.4%  | 合計 | 1  |

※事務的調査にあたっては、当該施設の「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う患者の紹介に対応する窓口」に紹介があり、令和6年(2024年)6月

1日から令和7年(2025年)12月31日までに受診した全患者をリストとし、それぞれの患者さんについて事務的な 回答を依頼しているものであり、医学的な回答を求めている。

## それぞれの患者において最も受診回数の多い診療科

(地域連携室宛調査)

| 診療科       | 人数 |
|-----------|----|
| 脳神経内科     | 9  |
| 整形外科      | 8  |
| 内科        | 8  |
| 呼吸器内科     | 5  |
| 総合内科      | 3  |
| 救急科       | 2  |
| 腎臓内科      | 2  |
| 内分泌・糖尿病内科 | 1  |
| 総合診療科     | 1  |
| 耳鼻いんこう科   | 1  |
| 循環器内科     | 1  |
| リウマチ科     | 1  |
| 合計        | 42 |

## 症状発症日及びワクチン接種後の症状について 当該医療機関を受診した初診日

(地域連携室宛調査)

### <症状発症日>

|     | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1月  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2月  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 3月  | 1     | 7     | 0     | 0     | 0     |
| 4月  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 5月  | 0     | 2     | 1     | 0     | 0     |
| 6月  | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 7月  | 4     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 8月  | 3     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 9月  | 3     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 10月 | 1     | 0     | 2     | 2     | 1     |
| 11月 | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     |
| 12月 | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     |
| 不明  | 2     |       |       |       |       |

### <初診日>

|     | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1月  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 2月  | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 3月  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 4月  | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 5月  | 0     | 3     | 0     | 0     | 2     |
| 6月  | 0     | 1     | 2     | 1     | 0     |
| 7月  | 2     | 1     | 0     | 3     | 1     |
| 8月  | 2     | 2     | 0     | 0     | 0     |
| 9月  | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 10月 | 2     | 2     | 1     | 1     | 0     |
| 11月 | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 12月 | 0     | 0     | 0     | 3     | 1     |

※初診日が2024年6月以降の症例(今回の主たる調査対象)は42.9%。

## 発症日からワクチン接種後の症状について 当該医療機関を初回受診するまでの期間

(地域連携室宛調査)

| 日数 | 人数 |
|----|----|
| 0  | 1  |
| 1  | 2  |
| 4  | 1  |
| 6  | 2  |
| 7  | 1  |
| 11 | 2  |
| 16 | 2  |
| 18 | 1  |
| 19 | 1  |
| 23 | 2  |

| 日数 | 人数 |
|----|----|
| 25 | 2  |
| 26 | 1  |
| 31 | 1  |
| 33 | 1  |
| 37 | 1  |
| 55 | 1  |
| 65 | 1  |
| 70 | 1  |
| 71 | 1  |
| 82 | 1  |

| 日数   | 人数 |
|------|----|
| 84   | 1  |
| 85   | 1  |
| 138  | 1  |
| 146  | 1  |
| 276  | 1  |
| 310  | 1  |
| 830  | 1  |
| 1045 | 1  |
| 1046 | 1  |
| 1076 | 1  |

| 日数   | 人数 |
|------|----|
| 1093 | 1  |
| 1342 | 1  |
| 1522 | 1  |
| 1523 | 1  |

| 日数      | 人数 |
|---------|----|
| 0～7日    | 7  |
| 8～30日   | 11 |
| 31～60日  | 4  |
| 61～90日  | 6  |
| 91～365日 | 4  |
| 366日以上  | 8  |
| 不明      | 2  |
| 合計      | 42 |

※発症日から初診日までの日数が評価できる症例において、発症日から1週間以内に初回受診した割合は17.5%。

## 地域連携室からの調査報告のまとめ

(地域連携室宛調査)

- 女性の報告数が全体の6割程度であり、これまで同様、男性よりも多く認められた。
- 年齢別では40歳代以上が多く、令和6年度の調査と同様の傾向であった。
- 主な受診診療科は、脳神経内科、整形外科、内科が多かった。
- 受診患者数は、2024年から2025年にかけて減少傾向にあった。
- 初診日が2024年6月以降の症例(今回の主たる調査対象)は、全体の4割程度であった。
- 発症から初診日までの日数が評価できる症例において、発症日から1週間以内に初回受診した割合は、令和6年度の調査時と比較して低下傾向を示した(21.9%→17.5%)。

※本調査では、診断とワクチン接種との因果関係は評価できない点に留意を要する。

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

## 医師宛に送付した医学的調査票の回答の全体状況

(医師宛調査)

<回答依頼施設数、回答施設数、症例数>

| 回答施設依頼数 | 施設数<br>(該当症例あり施設数) | 症例数  |
|---------|--------------------|------|
| 146施設   | 57施設(10施設)         | 56症例 |

<年齢、性別内訳>

※小数点以下第2位四捨五入

| 年齢     | 男性 |       | 女性 |       | 合計 |
|--------|----|-------|----|-------|----|
|        | 19 | 33.9% | 37 | 66.1% |    |
| 0～9歳   | 0  | 0.0%  | 0  | 0.0%  | 0  |
| 10～19歳 | 1  | 1.8%  | 2  | 3.6%  | 3  |
| 20～29歳 | 2  | 3.6%  | 0  | 0.0%  | 2  |
| 30～39歳 | 1  | 1.8%  | 1  | 1.8%  | 2  |
| 40～49歳 | 5  | 8.9%  | 7  | 12.5% | 12 |
| 50～59歳 | 4  | 7.1%  | 5  | 8.9%  | 9  |
| 60～69歳 | 0  | 0.0%  | 9  | 16.1% | 9  |
| 70～79歳 | 4  | 7.1%  | 5  | 8.9%  | 9  |
| 80～89歳 | 2  | 3.6%  | 7  | 12.5% | 9  |
| 90～99歳 | 0  | 0.0%  | 1  | 1.8%  | 1  |



## 受診患者のワクチン接種前の基礎疾患と日常生活自立度

(医師宛調査)

### <基礎疾患>

※小数点以下第2位四捨五入

| 基礎疾患の有無 | 人数 | 割合     |
|---------|----|--------|
| あり      | 29 | 51.8%  |
| なし      | 25 | 44.6%  |
| 不明      | 0  | 0.0%   |
| 回答なし    | 2  | 3.6%   |
| 合計      | 56 | 100.0% |

### <日常生活>

※小数点以下第2位四捨五入

| 自立度     | 人数 | 割合     |
|---------|----|--------|
| 自立      | 55 | 98.2%  |
| 一部介助が必要 | 0  | 0.0%   |
| 介助      | 0  | 0.0%   |
| 回答なし    | 1  | 1.8%   |
| 合計      | 56 | 100.0% |

## ワクチン接種後の症状に係る受診状況

(医師宛調査)

### <入院の有無>

※小数点以下第2位四捨五入

| 入院の有無 | 人数 | 割合     |
|-------|----|--------|
| あり    | 4  | 7.1%   |
| なし    | 45 | 80.4%  |
| 回答なし  | 7  | 12.5%  |
| 合計    | 56 | 100.0% |

### <前医の受診状況>

※小数点以下第2位四捨五入

| 受診状況                                |       | 人数 | 割合     |
|-------------------------------------|-------|----|--------|
| 他の医療機関の受診はなく、<br>当該医療機関を初診医療機関として受診 |       | 7  | 12.5%  |
| 他の医療機関受診後に<br>当該医療機関を受診             | 1施設   | 36 | 64.3%  |
|                                     | 2施設   | 5  | 8.9%   |
|                                     | 3施設   | 1  | 1.8%   |
|                                     | 4施設以上 | 1  | 1.8%   |
|                                     | 不明    | 4  | 7.1%   |
| 不明                                  |       | 1  | 1.8%   |
| 回答なし                                |       | 1  | 1.8%   |
| 合計                                  |       | 56 | 100.0% |

## ワクチン接種後の症状に係る当該医療機関の初診日

(医師宛調査)

|     | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1月  | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 1人    |
| 2月  | 0人    | 0人    | 0人    | 1人    | 1人    |
| 3月  | 0人    | 0人    | 0人    | 1人    | 0人    |
| 4月  | 0人    | 1人    | 1人    | 1人    | 1人    |
| 5月  | 0人    | 3人    | 1人    | 0人    | 2人    |
| 6月  | 1人    | 1人    | 2人    | 1人    | 0人    |
| 7月  | 2人    | 1人    | 0人    | 3人    | 1人    |
| 8月  | 2人    | 2人    | 1人    | 0人    | 0人    |
| 9月  | 1人    | 1人    | 0人    | 1人    | 1人    |
| 10月 | 3人    | 4人    | 1人    | 3人    | 0人    |
| 11月 | 3人    | 1人    | 0人    | 1人    | 0人    |
| 12月 | 0人    | 1人    | 0人    | 3人    | 1人    |
| 合計  | 12人   | 15人   | 6人    | 15人   | 8人    |

## 今回の症状との関連が考えられるワクチンの接種時期・接種回数

(医師宛調査)

### <接種時期>

|     | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1月  | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 2月  | 0人    | 1人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 3月  | 1人    | 5人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 4月  | 0人    | 2人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 5月  | 0人    | 2人    | 1人    | 0人    | 0人    |
| 6月  | 2人    | 0人    | 1人    | 0人    | 0人    |
| 7月  | 4人    | 2人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 8月  | 6人    | 4人    | 0人    | 0人    | 0人    |
| 9月  | 3人    | 2人    | 1人    | 0人    | 0人    |
| 10月 | 2人    | 0人    | 2人    | 3人    | 1人    |
| 11月 | 2人    | 1人    | 0人    | 2人    | 0人    |
| 12月 | 0人    | 1人    | 0人    | 2人    | 0人    |
| 不明  | 3人    |       |       |       |       |
| 合計  | 56人   |       |       |       |       |

### <接種回数>

| 接種回数 | 人数 | 割合     |
|------|----|--------|
| 1回   | 9  | 16.1%  |
| 2回   | 14 | 25.0%  |
| 3回   | 11 | 19.6%  |
| 4回   | 4  | 7.1%   |
| 5回   | 3  | 5.4%   |
| 6回   | 3  | 5.4%   |
| 7回   | 1  | 1.8%   |
| 8回   | 6  | 10.7%  |
| 不明   | 5  | 8.9%   |
| 合計   | 56 | 100.0% |

## 今回の症状に影響を及ぼした可能性のあるワクチンの種類

(医師宛調査)

### <ワクチンの種類>

| ワクチン種類           | 人数 | 割合     |
|------------------|----|--------|
| ファイザー            | 21 | 37.5%  |
| ファイザー(6ヶ月-4歳用)   | 0  | 0.0%   |
| ファイザー(5-11歳用)    | 0  | 0.0%   |
| ファイザー/ビオンテック     | 2  | 3.6%   |
| 武田/モデルナ          | 13 | 23.2%  |
| 武田(ノババックス)       | 0  | 0.0%   |
| アストラゼネカ          | 0  | 0.0%   |
| 第一三共             | 0  | 0.0%   |
| Meiji Seika ファルマ | 0  | 0.0%   |
| 不明               | 11 | 19.6%  |
| 回答なし             | 9  | 16.1%  |
| 合計               | 56 | 100.0% |

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

当該医療機関の受診のきっかけとなった症状のうち  
日常生活を送る上で支障を来している主な症状①

(医師宛調査)

(複数回答あり、回答のあったすべての症状を集計)

| 症状        | 人数 |
|-----------|----|
| 疼痛        | 14 |
| 倦怠感       | 11 |
| 発熱(37度以上) | 9  |
| 筋肉痛       | 6  |
| 胸痛        | 5  |
| 息切れ       | 4  |
| 頭痛        | 4  |
| 関節痛       | 3  |
| 嘔気・嘔吐     | 3  |
| 下痢        | 3  |

| 症状   | 人数 |
|------|----|
| 咳嗽   | 2  |
| 歩行障害 | 2  |
| 記憶障害 | 1  |
| 不眠   | 1  |
| 抑うつ  | 1  |
| 腹痛   | 1  |
| 嗅覚障害 | 1  |
| 味覚障害 | 1  |
| その他  | 26 |

## 当該医療機関の受診のきっかけとなった症状のうち 日常生活を送る上で支障を来している主な症状②

(医師宛調査)

(複数回答あり、回答のあったすべての症状を集計)

### <疼痛の内訳>

| 症状               | 人数 |
|------------------|----|
| 左上腕              | 2  |
| 左腕接種部            | 1  |
| 胸、左足             | 1  |
| 左腕のしびれ           | 1  |
| 左上腕～肘部疼          | 1  |
| 上肢               | 1  |
| 頸部、両上腕、左股関節      | 1  |
| 両足関節・膝裏・股関節周囲の痛み | 1  |
| 右上腕              | 1  |
| 左腕               | 1  |
| 左頸部、上肢           | 1  |
| 両腕               | 1  |
| 左肩               | 1  |

### <その他の内訳>


| 症状        | 人数 |
|-----------|----|
| しびれ       | 6  |
| めまい       | 5  |
| ふらつき      | 2  |
| 意識レベル低下   | 1  |
| 意識消失      | 1  |
| 胃の不快感     | 1  |
| 下口唇麻痺     | 1  |
| 下肢脱力      | 1  |
| 感覚障害      | 1  |
| 顔のほてり     | 1  |
| 口腔内違和感、発赤 | 1  |
| 紅斑        | 1  |
| 食欲不振      | 1  |

| 症状  | 人数 |
|-----|----|
| 複視  | 1  |
| 放散痛 | 1  |



# ワクチン接種後から当該症状※<sup>1</sup>が出現 又は 悪化するまでの期間※<sup>2</sup>

(医師宛調査)



※<sup>1</sup> 受診のきっかけとなった症状のうち、日常生活を送るうえで支障をきたしている症状

※<sup>2</sup> 1つの症例において複数の症状が報告された場合、ワクチン接種から当該症状の出現・悪化までが最も長かった期間を集計

# ワクチン接種後から当該症状※<sup>1</sup>が出現 又は 悪化するまでの期間※<sup>2</sup>が8日以上であった症例

(医師宛調査)

| ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 | 日数 | 年齢 | 性別 | 症状                  | 病名（確定病名・疑い病名）            | 転帰   | 当該症状の持続期間 |
|-----------------------|----|----|----|---------------------|--------------------------|------|-----------|
| 8～21日                 | 8  | 72 | 男性 | 胸痛                  | 前胸部痛                     | 回答なし | 回答なし      |
|                       | 8  | 50 | 女性 | 紅斑                  | 瘢痕                       | 回答なし | 回答なし      |
|                       | 14 | 70 | 女性 | 下痢                  | 下痢症                      | 不変   | 5日        |
|                       | 16 | 45 | 女性 | 倦怠感<br>めまい<br>嘔気・嘔吐 | 良性頭位変換性めまい<br>体位性起立頻脈症候群 | 軽快   | 1,643日    |


| ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 | 日数  | 年齢 | 性別 | 症状                  | 病名（確定病名・疑い病名）              | 転帰                          | 当該症状の持続期間 |
|-----------------------|-----|----|----|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 365日以上                | 406 | 40 | 男性 | 筋肉痛<br>倦怠感<br>記憶障害  | 腰部脊柱管狭窄症<br>片頭痛<br>神経障害性疼痛 | 筋肉痛:不変<br>倦怠感:軽快<br>記憶障害:不変 | 1,606日    |
|                       | 595 | 83 | 女性 | 意識消失<br>歩行障害<br>倦怠感 | 両側内頸動脈狭窄症<br>全身倦怠感         | 不変                          | 1,657日    |

※<sup>1</sup> 受診のきっかけとなった症状のうち、日常生活を送るうえで支障をきたしている症状

※<sup>2</sup> 1つの症例において複数の症状が報告された場合、症状の出現又は悪化するまでの最も長かった期間を集計している

## 当該症状※<sup>1</sup>の持続期間※<sup>2</sup>について

(医師宛調査)



※<sup>1</sup> 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も症状の持続期間が長かった症状について集計している。

※<sup>2</sup> 当該症状の持続期間については、症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計している。ただし、症状発現日が不明な症例を除く。

## 症状の持続期間が31日以上であった症例①

(医師宛調査)

| 持続期間   | 日数 | 年齢 | 性別 | 症状  | 病名（確定病名・疑い病名）           | 転帰 | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|--------|----|----|----|-----|-------------------------|----|-----------------------|
| 31～60日 | 34 | 44 | 女性 | めまい | 2型糖尿病<br>末梢性めまい症<br>頰椎症 | 回復 | 0                     |

| 持続期間   | 日数 | 年齢 | 性別 | 症状                | 病名（確定病名・疑い病名）        | 転帰 | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|--------|----|----|----|-------------------|----------------------|----|-----------------------|
| 61～90日 | 82 | 44 | 女性 | 発熱(37度以上)<br>倦怠感  | 高血圧症                 | 不変 | 0                     |
|        | 86 | 55 | 男性 | 疼痛(左腕接種部)<br>感覚障害 | ビタミンB12欠乏症<br>末梢神経障害 | 回復 | 0                     |

※1 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も症状の持続期間が長かった症状について集計している。

※2 当該症状の持続期間については、症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計している。

## 症状の持続期間が31日以上であった症例②

(医師宛調査)

| 持続期間     | 日数  | 年齢 | 性別 | 症状        | 病名（確定病名・疑い病名）  | 転帰 | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|----------|-----|----|----|-----------|----------------|----|-----------------------|
| 121～365日 | 213 | 81 | 女性 | 疼痛(左上腕)   | コロナワクチン副反応     | 軽快 | 0                     |
|          | 244 | 18 | 男性 | しびれ       | 末梢神経障害<br>運動麻痺 | 不変 | 3                     |
|          | 338 | 17 | 女性 | 発熱<br>しびれ |                | 回復 | 0                     |

| 持続期間   | 日数  | 年齢 | 性別 | 症状                 | 病名（確定病名・疑い病名）                     | 転帰              | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|--------|-----|----|----|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 365日以上 | 378 | 80 | 女性 | 疼痛(胸、左足)<br>息切れ    | てんかん<br>神経痛<br>関節リウマチ<br>手指変形性関節症 | 回復:疼痛<br>軽快:息切れ | 4                     |
|        | 435 | 39 | 女性 | 疼痛(左腕のしこり)<br>神経障害 | 末梢神経障害<br>橈骨神経傷害                  | 回復              | 0                     |
|        | 456 | 90 | 女性 | 疼痛(両腕)             | リウマチ性多発筋痛症                        | 軽快              | 1                     |
|        | 487 | 82 | 女性 | 筋肉痛                | リウマチ性多発筋痛症                        | 回復              | 1                     |

※1 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も症状の持続期間が長かった症状について集計している。

※2 当該症状の持続期間については、症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計している。

## 症状の持続期間が31日以上であった症例③

(医師宛調査)

| 持続期間   | 日数   | 年齢 | 性別 | 症状                      | 病名（確定病名・疑い病名）              | 転帰                          | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|--------|------|----|----|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 365日以上 | 730  | 71 | 女性 | 発熱(37度以上)<br>関節痛<br>筋肉痛 | 成人スチル病                     | 回復                          | 6                     |
|        | 730  | 75 | 男性 | 息切れ<br>咳嗽<br>発熱(37度以上)  | 特発性器質化肺炎                   | 回復                          | 1                     |
|        | 1287 | 48 | 男性 | 倦怠感<br>息切れ<br>嘔気・嘔吐     |                            | 不変                          | 3                     |
|        | 1436 | 61 | 女性 | 関節痛<br>筋肉痛              | 予防接種後関節障害<br>肩関節拘縮         | 軽快                          | 0                     |
|        | 1606 | 40 | 男性 | 筋肉痛<br>倦怠感<br>記憶障害      | 腰部脊柱管狭窄症<br>片頭痛<br>神経障害性疼痛 | 不変:筋肉痛<br>軽快:倦怠感<br>不変:記憶障害 | 406                   |
|        | 1643 | 45 | 女性 | 倦怠感<br>めまい<br>嘔気・嘔吐     | 良性頭位変換性めまい<br>体位性起立頻脈症候群   | 軽快                          | 16                    |

※1 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も症状の持続期間が長かった症状について集計している。

※2 当該症状の持続期間については、症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計している。

## 症状の持続期間が31日以上であった症例④

(医師宛調査)

| 持続期間   | 日数   | 年齢 | 性別 | 症状                  | 病名（確定病名・疑い病名）               | 転帰                           | ワクチン接種から症状発現又は悪化までの日数 |
|--------|------|----|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 365日以上 | 1657 | 83 | 女性 | 意識消失<br>歩行障害<br>倦怠感 | 両側内頸動脈狭窄症<br>全身倦怠感          | 不変:意識消失<br>回復:歩行障害<br>不変:倦怠感 | 595                   |
|        | 1730 | 41 | 女性 | 倦怠感<br>下痢<br>腹痛     | 予防接種副反応<br>慢性疲労症候群<br>脳循環不全 | 不変                           | 1                     |

※1 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も症状の持続期間が長かった症状について集計している。

※2 当該症状の持続期間については、症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計している。

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料



## ワクチン接種後の症状に対して行われた検査及び検査所見の概要

(医師宛調査)

|        | 実施所見   |        | 未実施 | 未回答 |
|--------|--------|--------|-----|-----|
|        | 異常所見あり | 異常所見なし |     |     |
| 血液検査   | 30     |        | 24  | 2   |
|        | 8      | 22     |     |     |
| 尿検査    | 16     |        | 38  | 2   |
|        | 0      | 16     |     |     |
| 髄液検査   | 3      |        | 51  | 2   |
|        | 1      | 2      |     |     |
| 心電図検査  | 16     |        | 37  | 3   |
|        | 0      | 16     |     |     |
| 超音波検査  | 9      |        | 45  | 2   |
|        | 0      | 9      |     |     |
| 脳波     | 1      |        | 53  | 2   |
|        | 0      | 1      |     |     |
| 神経伝導速度 | 9      |        | 44  | 3   |
|        | 0      | 9      |     |     |
| 筋電図    | 1      |        | 53  | 2   |
|        | 0      | 1      |     |     |
| 筋生検    | 1      |        | 53  | 2   |
|        | 0      | 1      |     |     |
| 単純X線検査 | 24     |        | 29  | 3   |
|        | 1      | 23     |     |     |
| CT     | 18     |        | 36  | 2   |
|        | 2      | 16     |     |     |
| MRI    | 22     |        | 33  | 1   |
|        | 4      | 18     |     |     |

## ワクチン接種後の症状に対して行われた治療内容

(医師宛調査)

### <治療内容>

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 薬剤治療(補液のみも含む)                           | 21 |
| 経過観察、薬剤治療(補液のみも含む)                      | 7  |
| 経過観察、薬剤治療(補液のみも含む)、<br>硬膜外ブロック、坐骨神経ブロック | 1  |
| 薬剤治療(補液のみも含む)、ストレッチ                     | 1  |
| 薬剤治療(補液のみも含む)、他院紹介                      | 1  |
| 経過観察                                    | 19 |
| 経過観察、リハビリ                               | 1  |
| 外科的治療                                   | 2  |

※経過観察には1日終診を含む

### <薬剤治療あり31症例>

|       |    |
|-------|----|
| 解熱鎮痛剤 | 15 |
| ステロイド | 5  |
| 補液    | 2  |
| 血液製剤  | 0  |
| 免疫抑制剤 | 0  |
| その他   | 16 |
| 回答なし  | 3  |

※薬剤治療の内容は重複あり

## 主治医により報告された確定病名の一覧①

(医師宛調査)

| ICD-10コード | 症例数 | 確定病名           |
|-----------|-----|----------------|
| G629      | 5   | 末梢神経障害         |
| I10       | 3   | 高血圧症           |
| M4782     | 3   | 頸椎症            |
| T881      | 3   | 予防接種副反応        |
| B029      | 2   | 顔面帯状疱疹、帯状疱疹    |
| E11       | 2   | 2型糖尿病          |
| E86       | 2   | 脱水症            |
| G552      | 2   | 頸椎症性神経根症       |
| G98       | 2   | 神経障害性疼痛        |
| I208      | 2   | 労作性狭心症         |
| M0690     | 2   | 関節リウマチ         |
| M353      | 2   | リウマチ性多発筋痛症     |
| M750      | 2   | 肩関節周囲炎、左肩関節周囲炎 |
| M750      | 2   | 肩関節周囲炎         |
| A099      | 1   | 下痢症            |
| B022      | 1   | ハント症候群         |

※上記の病名は、症状とワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、当該医療機関より報告された確定病名をそのまま記載していることに留意。

## 主治医により報告された確定病名の一覧②

(医師宛調査)

| ICD-10コード | 症例数 | 確定病名       |
|-----------|-----|------------|
| B022      | 1   | 帯状疱疹後神経痛   |
| E039      | 1   | 甲状腺機能低下症   |
| E050      | 1   | バセドウ病      |
| E538      | 1   | ビタミンB12欠乏症 |
| E780      | 1   | 高コレステロール血症 |
| F410      | 1   | パニック発作     |
| F411      | 1   | 不安神経症      |
| G049      | 1   | 髄膜脳炎       |
| G20       | 1   | パーキンソン症候群  |
| G409      | 1   | てんかん       |
| G439      | 1   | 片頭痛        |
| G442      | 1   | 緊張型頭痛      |
| G470      | 1   | 不眠症        |
| G510      | 1   | 顔面神経麻痺     |
| G520      | 1   | 神経性嗅覚障害    |
| G522      | 1   | 迷走神経反射     |

※上記の病名は、症状とワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、当該医療機関より報告された確定病名をそのまま記載していることに留意。

## 主治医により報告された確定病名の一覧③

(医師宛調査)

| ICD-10コード | 症例数 | 確定病名       |
|-----------|-----|------------|
| G560      | 1   | 左手根管症候群    |
| G573      | 1   | 腓骨神経麻痺     |
| G839      | 1   | 運動麻痺       |
| G993      | 1   | 慢性疲労症候群    |
| H811      | 1   | 良性頭位変換性めまい |
| H813      | 1   | 末梢性めまい症    |
| I652      | 1   | 両側内頸動脈狭窄症  |
| I678      | 1   | 脳循環不全      |
| J329      | 1   | 慢性副鼻腔炎     |
| J841      | 1   | 特発性器質化肺炎   |
| K591      | 1   | 下痢症        |
| L309      | 1   | 皮膚炎        |
| L905      | 1   | 瘢痕         |
| M0229     | 1   | 予防接種後関節障害  |
| M0610     | 1   | 成人スチル病     |
| M169      | 1   | 変形性股関節症    |

※上記の病名は、症状とワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、当該医療機関より報告された確定病名をそのまま記載していることに留意。

## 主治医により報告された確定病名の一覧④

(医師宛調査)

| ICD-10コード | 症例数 | 確定病名       |
|-----------|-----|------------|
| M171      | 1   | 変形性膝関節症    |
| M1991     | 1   | 変形性肩関節症    |
| M1994     | 1   | 手指変形性関節症   |
| M2451     | 1   | 肩関節拘縮      |
| M4712     | 1   | 頸椎性脊髄症     |
| M4806     | 1   | 腰部脊柱管狭窄症   |
| M6092     | 1   | 上腕二頭筋筋炎    |
| M7929     | 1   | 神経痛        |
| R000      | 1   | 洞頻脈        |
| R072      | 1   | 前胸部痛       |
| R198      | 1   | 心窩部不快      |
| R53       | 1   | 全身倦怠感      |
| S541      | 1   | 正中神経障害     |
| S542      | 1   | 橈骨神経傷害     |
| T782      | 1   | アナフラキシー    |
| U12       | 1   | コロナワクチン副反応 |

※上記の病名は、症状とワクチン接種との因果関係の有無にかかわらず、当該医療機関より報告された確定病名をそのまま記載していることに留意。

## 報告された症状の経過（転帰、受診状況）

（医師宛調査）

|       |    |
|-------|----|
| 回復/軽快 | 31 |
| 未回復   | 10 |
| 死亡    | 0  |
| 悪化    | 0  |
| その他   | 1  |
| 不明    | 4  |
| 回答なし  | 10 |
| 合計    | 56 |

※1つの症例において複数の症状が報告された場合、症状の転帰は、①転帰「不明」のものがあった場合は「不明」、  
②「回復/軽快」と「未回復」の両方があった場合は「未回復」として計上した。

## 入院した4症例の症状・病名・検査・治療・転帰

(医師宛調査)

| 年齢・性別  | 症状                          | 病名 1          | 病名 2    | 疾患名                                    | 検査・治療内容            | 転帰 |
|--------|-----------------------------|---------------|---------|----------------------------------------|--------------------|----|
| 46歳・女性 | 意識レベル低下、嘔吐・嘔気、<br>発熱(37度以上) | 髄膜炎           |         |                                        | ジクロフェナクナトリウム<br>補液 | 回復 |
| 75歳・男性 | 息切れ、咳嗽、<br>発熱(37度以上)        | 特発性器質化肺炎      |         | 脂質異常、高尿酸血症                             | プレドニゾロン            | 回復 |
| 83歳・女性 | 意識消失、歩行障害、倦怠感               | 両側内頸動脈狭窄<br>症 | 全身倦怠感   | 肺気腫、頸椎症性神経根症、内頸動脈狭窄、<br>緑内障、高血圧症、脂質異常症 | 十全大補湯              | 不変 |
| 85歳・女性 | 疼痛(左腕の痛み)、しびれ               | 正中神経障害        | 左手根管症候群 |                                        | メチコバル              | 軽快 |

※病名は確定病名及び疑い病名



## 医師からの調査報告のまとめ

(医師宛調査)

- 報告のうち約6割が女性であり、女性の中では60代、次いで40代と80代が多かった。
- 受診患者数は、2024年から2025年にかけて減少傾向にあった。
- 初診日が2024年6月以降の症例(今回の主たる調査対象)は、全体の1/3程度であった。
- 接種から症状の発現までの期間は、約87%が1週間以内であり、その多くは疼痛、倦怠感などの症状であった。
- 転帰が確認できた42症例のうち、31例(74%)が回復・軽快、10例(24%)が未回復、1例がその他であった。
- 31日以上症状が持続した18例のうち、16例(89%)で何らかの診断(疑いを含む)に至り、12例(67%)が回復・軽快していた。
- 4例(7.1%)が入院歴があったが、3例の転帰は軽快・回復であった。不変とされた1例の症状は意識消失、歩行障害、倦怠感であり、病名は両側内頸動脈狭窄症、全身倦怠感であった。

※ 本調査は、全国の都道府県において、自治体やかかりつけ医等の紹介により、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状を専門的見地から診療する専門的医療機関に対して、「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する追加・追跡調査」として行っており、症状と接種との因果関係は評価できない点に留意が必要。

## 過去の調査において未回復であった症例の追跡結果※1

(医師宛調査)

| 年齢<br>(調査時) | 性別 | 症状                | 転帰<br>(今回) | 症状の<br>持続期間※2<br>(日数) | 受診状況等     |
|-------------|----|-------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 45          | 女性 | 倦怠感、めまい、嘔気・嘔吐     | 軽快         | 1,643                 | 外来通院を継続   |
| 48          | 男性 | 倦怠感、息切れ、嘔気・嘔吐     | 不変         | 1,287                 | 外来通院を継続   |
| 48          | 男性 | 疼痛(左肩)            | 回答なし       | －                     | 他院受診      |
| 50          | 男性 | しびれ               | 回答なし       | －                     | 他院受診      |
| 50          | 女性 | 紅斑                | 回答なし       | －                     | 初診のみ      |
| 64          | 女性 | しびれ               | 回答なし       | －                     | 他院受診      |
| 70          | 女性 | 下痢                | 不変         | －                     | 他院受診      |
| 71          | 女性 | 発熱(37度以上)、関節痛、筋肉痛 | 回復         | 730                   | 外来通院を終診   |
| 75          | 男性 | 息切れ、咳嗽、発熱(37度以上)  | 回復         | 730                   | 外来通院を終診   |
| 80          | 男性 | ふらつき              | 不変         | －                     | 外来通院を自己中断 |
| 82          | 女性 | 疼痛(左頸部)           | 軽快         | －                     | 他院受診      |
| 82          | 男性 | 複視                | 不変         | －                     | 他院受診      |

※1 令和3年2月1日から令和6年5月31日までに受診した患者のうち、令和4年度の「新型コロナワクチン追加接種並びに適応拡大にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）」（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）の分担研究班「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査」（分担研究者国立国際医療研究センター 国際感染症センター長 大曲 貴夫、川崎市健康安全研究所 所長 岡部 信彦）、令和6年度の「特例臨時接種終了・定期接種化を見据えた国産新型コロナワクチンを含むコホート調査」（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）の分担研究班「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査」（分担研究者 国立国際医療研究センター 国際感染症センター長 大曲 貴夫、川崎市健康安全研究所 参与 岡部 信彦）において、軽快又は回復以外の転帰症例を対象とした。

※2 1つの症例において複数の症状が報告された場合、最も長かった症状の持続期間を集計している。  
(持続期間は症状が回復している場合は回復までの持続期間を、症状が持続または通院を自己中断している場合は最終受診日までの期間を集計)

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

## 総括

1. 接種から相当期間を経た症例や過去調査からの追跡症例が含まれるため、発症から受診までの期間や観察上の症状持続期間が長い症例がみられた(ただし、これらは調査設計、後ろ向き収集、選択バイアスの影響を受ける記述的所見であり、症状の遷延化そのものを示すものではない)。
2. 過去の調査において転帰が回復/軽快以外の症例について追跡調査を行ったが転帰不明の割合が多く、アンケート調査による評価の限界も見られた。加えて、医師票の回答は146施設中10施設56症例に限られており、選択バイアスと未回答バイアスを考慮して結果を解釈する必要がある。
3. 今後も継続してワクチン接種後の症状に関する情報を収集し、得られた知見を医療現場に提供するとともに、評価及び診断に応じた適切な診療提供を継続することが重要となる。

※ 本調査の性質上、症状とワクチン接種の間の因果関係を検証することはできないことに留意を要する。

## 資料内容

1. 今回の実態調査の概要等について
2. 事務的調査票(地域医療連携室宛)の結果について
3. 医学的調査票(医師宛)の結果について
  - 全体の状況(症例数、症例背景等)について
  - 症状について
    - 主な症状について
    - 接種後から症状が出現又は悪化するまでの期間について
    - 症状の持続期間について
  - 検査内容、治療内容、病名、転帰について
4. 今回の実態調査の総括
5. 参考資料

# 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査（令和7年度調査研究事業）

## 目的・調査方法等

- 【目的】 ワクチンとの因果関係の有無にかかわらず、ワクチン接種後の症状を訴え専門的な医療機関を受診した者の実態を把握し、得られた知見について必要な情報提供等を行うこと。
- 【調査方法】 ワクチン接種後の症状を呈した患者が受診した専門的な医療機関に対して調査票を送付し、症例に関する情報を収集。詳細な情報を収集した56症例について分析を実施。（対象施設：10施設、調査対象者：R6.6～R7.12に受診した者）
- 【調査内容】 受診のきっかけとなった症状、当該症状の発現日、当該症状にかかる病名、基礎疾患、検査、治療内容、転帰、症状の持続期間、日常生活・就労・就学への影響、経過の概要 等

## 結果の概要

- 男性よりも女性からの報告数の方が多く認められた。（男性19例、女性37例）
- 報告された症状は、疼痛、倦怠感、発熱、筋肉痛、胸痛、息切れ、頭痛、関節痛、嘔気・嘔吐、下痢等、多様であり、特定の症状が集中して認められることはなく、多くの場合、軽快又は回復している。（転帰のデータがある42例のうち31例が、軽快又は回復）
- 症状とワクチン接種との因果関係を検証することはできないが、一部には症状の回復に長期間かかる事例や、発症から長期間経過しても未回復の事例が報告されている。（持続期間のデータがある32例のうち12例が、366日以上症状が持続）
- 症状が31日以上遷延した症例については、多くが何らかの疾患の診断に至っているが、特定の病名への集中はない。（持続期間のデータがある32例のうち、30日以上遷延した症例は18例。そのうち診断に至った症例は16例。）  
診断病名の例：末梢神経障害（3例）、リウマチ性多発筋痛症（2例）等

※ 令和5年度調査（R3.2～R4.5に受診した者：212症例（27施設））、令和6年度調査（R4.6～R6.5に受診した者：144症例（12施設））においても、同様の傾向であった。

※ 令和8年度も調査を継続して実施中。