


・外箱の表示（ロキソニンS）

< 上面 >



< 側面 >



< 正面 >



< 側面 >



< 下面 >

成分・分量 (1錠中)	効能・効果	MADE IN JAPAN 10®登録商標
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg) 添加物: ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、三酸化鉄	○頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱	

< 裏面 >

解熱鎮痛薬 ロキソニンS		注 意			
日本薬局方 第1類医薬品 ロキソプロフェンナトリウム錠 用法・用量 次の量を、水又はお湯で服用して下さい。 <table border="1"> <tr> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>1日2回まで。 症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。</td> </tr> </table> 15歳未満は、服用しないで下さい。		成人 (15歳以上)	1日2回まで。 症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。	1. 次の人は服用しないで下さい。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児 (4) 医療機関で次の治療を受けている人 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病 (5) 医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常(血液の病気)を指摘されている人 (6) 出産予定日12週以内の妊婦 2. 長期連続して服用しないで下さい。 3. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 (7) 次の病気にかかったことがある人 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気 4. 服用に際しては、説明文書をよくお読み下さい。 5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。 6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。 7. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。	
成人 (15歳以上)	1日2回まで。 症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。				

押し開ける
ここを