

ご購入時の確認事項

次の人はこのお薬を服用することはできません ← ポイント!

- ☐ 過去に本剤又は本剤に含まれる成分でアレルギー症状等の過敏な反応を起こしたことがある人
- ☐ 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

ロキソプロフェンナトリウム水和物、アスピリン(アセチルサリチル酸)、アスピリンアルミニウム、エテンザミド、イブプロフェン、アセトアミノフェン及びイソプロピルアンチピリンが配合されているもの
- ☐ 15歳未満の小児
- ☐ 医療機関で次の治療を受けている人
 - 胃・十二指腸潰瘍 ●肝臓病 ●腎臓病 ●心臓病
- ☐ 医師から以下のような血液異常(血液の病気)を指摘されている人
 - 赤血球数が少ない(貧血)
 - 血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)
 - 白血球数が少ない
- ☐ 出産予定日12週以内の妊婦

次の人はこのお薬を服用する際に注意が必要です 購入される前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談下さい。

- ☐ 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- ☐ 妊婦(出産予定日12週以内の妊婦を除く)又は妊娠していると思われる人
- ☐ 授乳中の人
- ☐ 高齢者(65歳以上)
- ☐ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ☐ 次の診断を受けた人
 - 気管支ぜんそく ●潰瘍性大腸炎 ●クローン病
 - 全身性エリテマトーデス ●混合性結合組織病
- ☐ 次の病気にかかったことがある人
 - 胃・十二指腸潰瘍 ●肝臓病 ●腎臓病 ●血液の病気

服用時の注意事項

このお薬の使い方は?

○症状がある場合だけ服用して下さい。

痛みや熱等の原因になっている病気そのものを治療するお薬ではありません。
発現している症状を抑えるお薬ですので、症状がある場合だけ服用して下さい。

ロキソニン®S	ロキソニン®Sプラス	ロキソニン®S グイック
1回1錠	1回1錠	1回1錠
ロキソニン®S プレミアム	ロキソニン®S プレミアムファイン	ロキソニン®PROフィジカル
1回2錠	1回2錠	1回2錠

なるべく空腹時をさけて、コップ1杯程度の水又はぬるま湯で服用して下さい。

○1日2回まで

再度痛み等の症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上時間をおいて下さい。

このお薬を服用する際に、確認すべきことは?

- 症状が改善したら服用を中止して下さい。
- 1～2回服用しても症状が一向によくならない場合は、他の疾患の可能性がありますので服用を中止し、説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 長期連続して服用しないで下さい。 ← ポイント!
(3～5日間服用しても痛み等の症状が繰り返される場合には、服用を中止し、医師の診療を受けて下さい。)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、**乗物酔い薬【ロキソニンSプレミアムのみ】**
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります。)[ロキソニンSプレミアムのみ]
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 誤って多く服用した場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- このお薬を服用した後、**消化性潰瘍(胃もたれ、胸やけ、背中での痛み)、むくみがあらわれた場合には、直ちに服用を中止し、説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。**

実際に服用する際には、添付文書をよく読んで、用法・用量を守って正しくお使い下さい。