令和８年 10 月 29 日
令和８年度第３回医薬品等安全対策部会
参考資料１－２

・外箱の表示（ロキソニンＳ）

＜上面＞

＜側面＞



＜正面＞

＜側面＞

＜下面＞

成分・分量（1錠中）

ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg（無水物として60mg）

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、三二酸化鉄

効能・効果

○頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
○悪寒・発熱時の解熱

MADE IN JAPAN　10 ®登録商標

4 987107 610867

＜裏面＞

解熱鎮痛薬 ロキソニンS
日本薬局方 第1類医薬品
ロキソプロフェンナトリウム錠

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

成人（15歳以上）1回1錠	1日2回まで。症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

15歳未満は、服用しないで下さい。

注　意

1.次の人は服用しないで下さい。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
(3)15歳未満の小児
(4)医療機関で次の治療を受けている人
胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病
(5)医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等の血液異常（血液の病気）を指摘されている人
(6)出産予定日12週以内の妊婦
2.長期連続して服用しないで下さい。
3.次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)次の診断を受けた人
気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
(7)次の病気にかかったことがある人
胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気
4.服用に際しては、説明文書をよくお読み下さい。
5.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
6.小児の手の届かない所に保管して下さい。
7.表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

◀ここを押し開ける