

参考資料

- ・製造販売業者からの提供情報抜粋（プロピペリン塩酸塩の適正使用に関する対応）

第1類移行時に実施した適正使用のための対策（赤字部分）

- 購入希望者向けの対策として、外箱表示及びセルフチェックシートの改訂等を行った。
- 販売店向けの対策として、直近2年の取扱店舗へのDM案内等を行った。

2021年11月

要指導医薬品

【購入希望者向け】

- ・TVCM、交通、WEB広告等における対象者の明示
- ・製品公式サイトでの疾患情報含む情報提供
- ・セルフチェックシート（公式サイト掲載）
- ・お薬手帳シール
- ・服用者向け解説書



【社内向け】

- ・MR教育

【販売店向け】

- ・情報提供用動画
 - ・製品取扱い店舗へ情報提供資材セット送付
- ＋MR訪問、遠隔地等へは電話での適正使用情報案内
- <資材内容>

セルフチェックシート・お薬手帳シール

販売店向け解説書・お客様向け解説書

下敷き（販売時の注意点・接客案内用）

2026年1月

第1類医薬品

【購入希望者向け】

- ・TVCM、交通、WEB広告等における対象者の明示
- ・製品公式サイトでの併用薬禁忌・セルフチェックシート強調表示
- ・セルフチェックシート（公式サイト掲載）改訂
- ・お薬手帳シール
- ・服用者向け解説書改訂
- ・外箱の表示改訂



【社内向け】

- ・MR教育（抗コリン作用、対象者設定理由の復習）

【販売店向け】

- ・直近2年取扱店舗へのDM案内
 - ・情報提供用動画改訂
 - ・新規取扱い店舗へ情報提供資材セット送付
- ＋MR訪問、遠隔地等へは電話での適正使用情報案内

外箱パッケージ

- 表面に、年齢制限・女性用の旨・公式HPへの二次元コードを追加した。
- 裏面の「効能・効果」「用法・用量」に関する記載部分を強調した。



表面に以下を表示

- ・年齢制限
- ・女性用の旨
- ・二次元コード

購入・服用される方へ

ご購入・服用にあたって、ご確認ください。詳細な情報を掲載しています。

ご購入の際は、セルフチェックシートのご確認および薬剤師の説明を受けてご購入いただけます。

セルフチェックシート

添付文書

説明文書

お客様向け解説書

服用方法

成人女性 (15歳以上70歳未満) は、1日1錠を1日1回食後に服用してください。


服用時の注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 毎回同じ時間帯に服用してください。

※服用は、1週間単位での継続服用をお願いします。頓服 (症状が出たときに服用すること) での使用で効果があるとのデータはありません。

※このお薬は「抗コリン作用」を有しているため、一緒に服用してはいけないお薬があります。 BUP-FORLADY を服用中は、以下のお薬は服用しないでください。

※炎症性腸炎、かぜ薬、薬物酔い、腎臓病、糖尿病、ロートエクスを含有する胃腸薬



裏面の「効能・効果」及び「用法・用量」を強調 (赤枠・赤字)

セルフチェックシート

○ 服用可能な対象者の部分を強調し、イラストを追加するなど「服用できるかどうか」をわかりやすい様式に変更。

バップフォーレディ セルフチェックシート

初回購入用

バップフォーレディは、女性における尿意切迫感（急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ）及びそれを伴う頻尿（尿の回数が多い）、尿もれを改善するお薬です。
お薬を購入する前に以下のチェック項目を確認し、薬剤師にお渡しください。不明な点がある場合は薬剤師にご相談ください。

該当項目にチェック☑をしてください。

☐ 女性である

☐ 15～69歳である

☐ 尿意切迫感（急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ）がある

全ての項目に該当する

☐ 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある

☐ 妊婦である、又は妊娠していると思われる

☐ 排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態）の症状がある

☐ 血尿、排尿痛、膀胱痛の症状がある

☐ 胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下）の診断を受けている

☐ 幽門・腸管の閉塞の診断を受けている

☐ パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）の診断を受けている

☐ 緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患の診断を受けている

該当する項目がない

☐ 医師の治療を受けている

☐ 年齢が65歳以上（高齢者）である

☐ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある

☐ 頻尿や尿もれの症状が発症後1ヵ月以内である

☐ 夜間頻尿のみで日中には頻尿がない

☐ 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けている

☐ 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛、膀胱痛の症状が起きたことがある（現在はこれら症状がない）

☐ 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある

☐ 現在、下記のお薬を服用中である
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬

該当する項目がない

該当しない項目が1つでもある

本剤を服用することはできません。

1項目でも該当する

本剤を服用することはできません。

バップフォーレディを服用できます。

バップフォーレディを服用するにあたり、薬剤師からの説明を受け、お薬に添付されている説明文書をお読みください。
本剤を服用中、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬と併用はしないでください。
また、服用後、乗物又は機械類の運転操作はしないでください。授乳中の人は服用しないか、服用中は授乳を避けてください。
◆服用後、何か気になることがある場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

大鵬薬品工業株式会社

バップフォーレディ セルフチェックシート

初回購入用

バップフォーレディは、女性における尿意切迫感（急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ）及びそれを伴う頻尿（尿の回数が多い）、尿もれを改善するお薬です。
お薬を購入する前に以下のチェック項目を確認し、薬剤師にお渡しください。不明な点がある場合は薬剤師にご相談ください。

該当項目にチェック☑をしてください。

☐ 女性である

☐ 15～69歳である

☐ 尿意切迫感（急におしっこがしたくなり、もれそうになる感じ）がある

全ての項目に該当する

☐ 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある

☐ 妊婦である、又は妊娠していると思われる

☐ 排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態）の症状がある

☐ 血尿、排尿痛、膀胱痛の症状がある

☐ 胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下）の診断を受けている

☐ 幽門・腸管の閉塞の診断を受けている

☐ パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）の診断を受けている

☐ 緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患の診断を受けている

該当する項目がない

☐ 医師の治療を受けている

☐ 年齢が65歳以上（高齢者）である

☐ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある

☐ 頻尿や尿もれの症状が発症後1ヵ月以内である

☐ 夜間頻尿のみで日中には頻尿がない

☐ 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けている

☐ 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛、膀胱痛の症状が起きたことがある（現在はこれら症状がない）

☐ 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある

☐ 現在、下記のお薬を服用中である
鼻炎用内服薬、かぜ薬、乗物酔い薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬

該当する項目がない

該当しない項目が1つでもある

本剤を服用することはできません。

1項目でも該当する

本剤を服用することはできません。

バップフォーレディを服用できます。

バップフォーレディを服用するにあたり、薬剤師からの説明を受け、お薬に添付されている説明文書をお読みください。
本剤を服用中、鼻炎用内服薬、かぜ薬、乗物酔い薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬と併用はしないでください。
また、服用後、乗物又は機械類の運転操作はしないでください。授乳中の人は服用しないか、服用中は授乳を避けてください。
◆服用後、何か気になることがある場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

大鵬薬品工業株式会社

お客様相談室 TEL: 0120-4527-66
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

医師又は薬剤師に
ご相談ください。
本剤を服用できない場合があります。

解説書はこちらへ



セルフチェックシート（店頭用ミニリーフレット）

○ 購入希望者が事前に適格性を確認できるよう新たに店頭用リーフレットを作成した。

15歳以上70歳未満の女性用薬

**バップフォーレディは、
女性における尿意切迫感
(突然起こる抑えきれないような強い尿意)、
尿意切迫感を伴う
頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ
を改善するお薬です。**

🔴 **ご購入前セルフチェックシート**



実物大

バップフォーレディ

セルフレディケーション
税控除対象
第1類医薬品

【販売名】バップフォーレディ
 【効能・効果】尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ
 【用法・用量】成人女性(15歳以上70歳未満)、1日1錠を1日1回食後に服用してください。
 この医薬品は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

4つのポイント

医療用成分をスイッチ

.....

過活動膀胱の一般的な治療薬である医療用医薬品「バップフォー」を、OTC医薬品にスイッチ
(※医療用医薬品と分量は異なる)

「尿意切迫感」の効能・効果

.....

OTC医薬品としては、唯一の「尿意切迫感」
という効能・効果

1日1回1錠

.....

1日1回1錠、飲みやすい小粒(直径7.1mm)の錠剤

2つの作用で効果を発揮

.....

抗コリン作用とCa拮抗作用により、
膀胱の異常収縮を抑制します。

注意 このお薬は、一緒に服用できないお薬があります。

鼻炎内服薬、かぜ薬、乗物酔い薬
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬

本剤とこれらのお薬と一緒に服用すると、副作用が出たり、増強することがあるため、これらのお薬と一緒に服用することはできません。

🔴 ご購入前に、以下のチェック項目を確認し、薬剤師にお渡しください。

初回購入用 バップフォーレディ セルフチェックシート

バップフォーレディは、女性における尿意切迫感(急に尿がしたいと感じたり、もれそうになる感じ)及びそれを伴う頻尿(尿の回数が多い)、尿もれを改善するお薬です。お薬を購入する前に以下のチェック項目を確認し、薬剤師にお渡しください。不明な点がある場合は薬剤師にご相談ください。

該当項目にチェック☑をしてください。

☐ 女性である ☐ 15～69歳である

☐ 尿意切迫感(急に尿がしたいと感じたり、もれそうになる感じ)がある

3項目全てに **該当する**

☐ 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起したことがある

☐ 妊婦である、又は妊娠していると思われる

☐ 排尿困難、尿閉(尿意があるのに排尿しづらい、できない状態)の症状がある

☐ 血尿、排尿痛、膀胱痛の症状がある

☐ 胃アトニー(胃下腹に伴う胃のはたらきの低下)、腸アトニー(腸の運動低下)の診断を受けている

☐ 幽門・腸管の閉塞の診断を受けている

☐ パーキンソン病、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)の診断を受けている

☐ 緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患の診断を受けている

該当する項目がない

☐ 医師の治療を受けている

☐ 年齢が65歳以上(高齢者)である

☐ 薬などによりアレルギー症状を起したことがある

☐ 頻尿や尿もれの症状が発症後1ヵ月以内である

☐ 夜間頻尿のみで日中には頻尿がない

☐ 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けている

☐ 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛、膀胱痛の症状が起きたことがある
(現在はこれら症状がない)

☐ 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある

☐ 現在、下記のお薬を服用中である
鼻炎内服薬、かぜ薬、乗物酔い薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬

該当する項目がない


バップフォーレディを服用できます。

バップフォーレディを服用するにあたり、薬剤師からの説明を受け、お薬に添付されている説明書を必ずお読みください。本剤を服用中、鼻炎内服薬、かぜ薬、乗物酔い薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬と併用はしないでください。また、服用後、乗物又は機械類の運転操作はしないでください。授乳中の人は服用しないか、服用中は授乳を避けてください。



➡

該当しない項目が1つでもある



➡

1項目でも該当する

本剤を服用することはできません。



➡

1項目でも該当する

医師又は薬剤師にご相談ください。
本剤を服用できない場合があります。

5