




毒物に指定するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
フッ化スルフリル	 $\text{F}_2\text{O}_2\text{S}$ 分子量 102.06 CAS No. 2699-79-8	原体及びこれを含有する製剤	外観：無色気体 気体密度：3.52(空気 = 1) 融点：-136.7 沸点：-55.2 蒸気圧：8.319 × 10 ⁵ Pa (-5) 1.217 × 10 ⁶ Pa (10) 1.788 × 10 ⁶ Pa (25) 溶解度：(g/L) 水 0.75[25] ウエツソイル 7.8[20] アセトン 17.4[22] クロホルム 21.2[22]	原体： 急性吸入毒性 L C ₅₀ 値(ppm, 4H) マウス ♂ ♀ 400 ~ 600 急性経皮毒性 L C ₅₀ 値(ppm, 4H) ラット ♂ ♀ >9599	農薬（殺虫剤）

劇物から除外するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
(S) - α - シアノ - 3 - フェノキシベンジル = (1R, 3R) - 2, 2 - ジメチル - 3 - (2 - メチル - 1 - プロペニル) - 1 - シクロプロパンカルボキシラートと(R) - α - シアノ - 3 - フェノキシベンジル = (1R, 3R) - 2, 2 - ジメチル - 3 - (2 - メチル - 1 - プロペニル) - 1 - シクロプロパンカルボキシラートの混合物((S) - α - シアノ - 3 - フェノキシベンジル = (1R, 3R) - 2, 2 - ジメチル - 3 - (2 - メチル - 1 - プロペニル) - 1 - シクロプロパンカルボキシラート91%以上99%以下を含有し、かつ、(R) - α - シアノ - 3 - フェノキシベンジル = (1R, 3R) - 2, 2 - ジメチル - 3 - (2 - メチル - 1 - プロペニル) - 1 - シクロプロパンカルボキシラート1%以上9%以下を含有するものに限る。)	 $C_{24}H_{25}NO_3$ 分子量 375.46 CAS No. 39515-40-7	10%以下を含有するマイクロカプセル製剤	外観： 原体 - 淡黄色のろう状の固体又は淡黄色～黄褐色の粘稠な液体 製剤 - 白色の粘稠液体 融点：41～44 溶解度：水0.007g/L メタノール混和 アセトン混和 トルエン混和	原体： 急性経口毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット ♂ 1080 ♀ 1250 急性経皮毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット ♂ ♀ >2000 10%マイクロカプセル製剤： 急性経口毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット ♂ ♀ >2000 急性経皮毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット ♂ ♀ >2000	シロアリ防除剤

劇物に指定するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
4 - クロロ - 3 - エチル - 1 - メチル - N - [4 - (パラトリルオキシ) ベンジル] ピラゾール - 5 - カルボキサミド	 <chem>CC1=CN(C(=O)NCC2=CC=C(OCC3=CC=C(C)C=C3)C=C2)C(Cl)=C1CC</chem> C₂₁H₂₂ClN₃O₂ 分子量 383.9 CAS No. 129558-76-5	原体及びこれを 含有する製剤	外観：類白色・固体粉末 臭気：無臭 密度：1.18 (25) 融点：87.8 ~ 88.2 沸点：250 以上で分解 のため測定不能。 蒸気圧：5 × 10 ⁻⁷ Pa以下 (25) 溶解度：(25) 水 0.087mg/L n-ヘキサン 7.41g/L ジクロロメタン 500g/ L以上 アセトン 368g/L トルエン 366g/L メタノール 59.6g/L 酢酸エチル 339g/L	原体： 急性経口毒性 L D ₅₀ (mg / kg) ラット ♂ 86 ♀ 75 マウス ♂ 114 ♀ 107 急性経皮毒性 L D ₅₀ (mg / kg) ラット ♂ >2000 ♀ >3000 急性吸入毒性 L C ₅₀ (mg / L) ラット ♂ 2.21 ♀ 1.50	農薬 (殺虫剤)