

1. 品目の概要

対象品目	<p>以下の薬剤のうち、「原則禁忌」に過敏症の既往歴に係る記載がある品目 (対象品目の一般名等詳細については、別紙参照のこと)</p> <p>セフェム系抗生物質 (別紙: ①⑤⑫～⑳㉔)</p> <p>ペニシリン系抗生物質 (別紙: ②③⑥～⑪⑳㉔～㉗)</p> <p>グリコペプチド系抗生物質 (別紙: ④)</p> <p>ペネム系抗生物質 (別紙: ㉖)</p> <p>カルバペネム系抗生物質 (別紙: ㉘㉙～㉛㉜㉝)</p>
------	---

2. 「禁忌」への移行を検討する「原則禁忌」の記載状況

記載状況	<p>①⑤⑫～⑳㉔ 本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>②③⑥～⑪⑳㉔～㉗ 本剤の成分又はペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>④ 本剤の成分又はテイコプラニン、ペプチド系抗生物質、アミノグリコシド系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>㉖㉘㉙～㉛㉜㉝ 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>
------	--

3. 海外添付文書における関連記載

米国	<p>「CONTRAINDICATIONS」の項に、関連記載あり</p> <p>記載事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グリコペプチド系抗生物質④における関連記載の抜粋 Vancomycin Hydrochloride for Injection is contraindicated in patients with known hypersensitivity to vancomycin. ・セフェム系抗生物質⑫における関連記載の抜粋 KEFLEX is contraindicated in patients with known hypersensitivity to cephalexin or other members of the cephalosporin class of antibacterial drugs. <p>なお、下記の薬剤については、関連する記載なし ①②⑤⑧⑨⑬⑭⑯⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟</p>
----	---

欧州	<p>「4.3 Contraindications」の項に、関連記載あり</p> <p>記載事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グリコペプチド系抗生物質④における関連記載の抜粋 <p>Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 (see section 4.4).</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セフェム系抗生物質⑫における関連記載の抜粋 <p>Cefalexin is contraindicated in patients with known allergy to the cephalosporin group of antibiotics or to any of the excipients listed in section 6.1.</p> <p>なお、下記の薬剤については、関連する記載なし</p> <p>①②③⑤⑧⑨⑪⑭⑯⑰⑲～⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷</p>
----	---

4. その他の関連情報（ガイドライン、文献等）

該当なし

5. 「禁忌」とする理由

<p>ペニシリン系抗生物質であるタゾバクタム・ピペラシリン、注射用バンコマイシン塩酸塩の類薬であるテイコプラニン等の抗生物質では、「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者」が禁忌となっていることから禁忌とする。</p>
--

6. 改訂案

○改訂方針

- ・「原則禁忌」に記載のある過敏症既往歴に係る記載のうち、「本剤の成分に対する過敏症の既往歴」に関しては、「原則禁忌」から削除し、現行「禁忌」に記載のある「本剤の成分によるショックの既往歴」と統合する。
- ・「原則禁忌」に、本剤の成分以外の薬剤に係る過敏症既往歴の記載がある場合、当該記載は「原則禁忌」のままとする。

○改訂案（下記は⑫の場合）

現行	改訂案
<p>原則禁忌</p> <p><u>本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者</u></p>	<p>禁忌</p> <p><u>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</u></p>

7. 関係学会の意見

<p>【公益社団法人日本化学療法学会】</p> <p>特に異論なし。</p>
<p>【一般社団法人日本感染症学会】</p> <p>問題なし。</p>

(別添)

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
①	セフメノキシム 塩酸塩	ベストロン点眼 用 0.5% (千寿製薬株式 会社)	平成 19 年 8 月	<適応菌種> セフメノキシムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ・ラクナータ (モラー・アクセンフェルト菌)、セラチア・マルセスセンス、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス (コッホ・ウィークス菌)、緑膿菌、アクネ菌 <適応症> 眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎 (角膜潰瘍を含む)、眼科周術期の無菌化療法
①	セフメノキシム 塩酸塩	ベストロン耳鼻 科用 1% (千寿製薬株式 会社)	平成 19 年 8 月	<適応菌種> セフメノキシムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、ペプトストレプトコッカス属 <適応症> 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎 (ただし、ネブライザーを用いた噴霧吸入においては中鼻道閉塞が高度の症例を除く)
①	セフメノキシム 塩酸塩	ベストコール筋 注用 0.5g (武田テバ薬品 株式会社)	昭和 57 年 10 月	<適応菌種> セフメノキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モル

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				ガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属 <適応症> 敗血症 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 膀胱炎、腎盂腎炎 腹膜炎 胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎
①	セフメノキシム 塩酸塩	ベストコール静 注用 0.5g、同静 注用 1g (武田テバ薬品 株式会社)	昭和 57 年 10 月	<適応菌種> セフメノキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属 <適応症> 敗血症 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 膀胱炎、腎盂腎炎 腹膜炎

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 化膿性髄膜炎
②	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	バイシリンG顆粒40万単位 (MSD株式会社)	昭和53年8月	<適応菌種> ベンジルペニシリンに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、梅毒トレポネーマ <適応症> リンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、梅毒、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、リウマチ熱の発症予防
③	ベンジルペニシリンカリウム	注射用ペニシリンGカリウム20万単位、同100万単位 (MeijiSeikaファルマ株式会社)	20万単位：昭和23年11月、100万単位：平成15年10月	<適応菌種> ベンジルペニシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、髄膜炎菌、ジフテリア菌、炭疽菌、放線菌、破傷風菌、ガス壊疽菌群、回帰熱ボレリア、ウイルス病レプトスピラ、鼠咬症スピリルム、梅毒トレポネーマ <適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、淋菌感染症、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、炭疽、ジフテリア（抗毒素併用）、鼠咬症、破傷風（抗毒素併用）、ガス壊疽（抗毒素併用）、放線菌症、回帰熱、ウイルス病、梅毒

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
④	バンコマイシン 塩酸塩	塩酸バンコマイ シン点滴静注用 0.5g (塩野義製薬株 式会社) 他	平成3年 10月	<p>1. <適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)</p> <p><適応症> 敗血症, 感染性心内膜炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髄炎, 関節炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 腹膜炎, 化膿性髄膜炎</p> <p>2. <適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性コアグラウゼ陰性ブドウ球菌 (MRCNS)</p> <p><適応症> 敗血症, 感染性心内膜炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 骨髄炎, 関節炎, 腹膜炎, 化膿性髄膜炎</p> <p>3. <適応菌種> バンコマイシンに感性のペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)</p> <p><適応症> 敗血症, 肺炎, 化膿性髄膜炎</p> <p>4. MRSA 又は MRCNS 感染が疑われる発熱性好中球減少症</p>
⑤	セフチブテン水 和物	セフテムカプセル 100mg、同カ プセル 200mg (塩野義製薬株 式会社)	平成4年 10月	<p><適応菌種> 本剤に感性の淋菌, 大腸菌, クレブシエラ属, エンテロバクター属, セラチア属, プロテウス属, モルガネラ・モルガニー, プロビデンシア・レットゲリ, インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 急性気管支炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性に限る） ○ 尿道炎
⑥	アモキシシリン水和物（ワイドシリン細粒 20%を除く）	サワシリンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250 （アステラス製薬株式会社）、 パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250 （アスペンジャパン株式会社） 他	サワシリンカプセル 125：平成 22 年 11 月、同カプセル 250：平成 20 年 4 月、同錠 250：昭和 54 年 5 月、パセトシンカプセル 125、同カプセル 250：平	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、ヘリコバクター・ピロリ、梅毒トレポネーマ</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、淋菌感染症、梅毒、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、涙嚢炎、麦粒腫、中耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、猩紅熱、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p>

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
			成 19 年 11 月、同 錠 250 : 昭和 54 年 6 月	
⑥	アモキシシリン 水和物	サワシリン細粒 10% (アステラス製 薬株式会社)、 パセトシン細粒 10% (アスペンジャ パン株式会社) 他	サワシリ ン細粒 10% : 平 成 20 年 4 月、パセ トシン細 粒 10% : 平成 19 年 11 月	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸 菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、ヘリコバクター・ピロリ、 梅毒トレポネーマ <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄 炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感 染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸 炎）、淋菌感染症、梅毒、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、涙嚢 炎、麦粒腫、中耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、猩紅熱、胃潰瘍・十二 指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症
⑦	アンピシリン水 和物	ビクシリンカプ セル 250mg (Meiji Seika フ アルマ株式会	昭和 49 年 4 月	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、炭疽 菌、放線菌、大腸菌、赤痢菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、 梅毒トレポネーマ

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		社)		<p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、梅毒、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、眼瞼膿瘍、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症</p>
⑦	アンピシリン水和物	ビクシリンドライシロップ 10% (Meiji Seika ファルマ株式会社)	昭和 41 年 10 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、炭疽菌、放線菌、大腸菌、赤痢菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、眼瞼膿瘍、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症</p>
⑧	バカンピシリン塩酸塩	ペングッド錠 250mg (日医工株式会)	平成 13 年 9 月	<p><適応菌種></p> <p>アンピシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌</p>

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		社)		<p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，腹膜炎，子宮内感染，子宮付属器炎，眼瞼膿瘍，麦粒腫，角膜炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，抜歯創・口腔手術創の二次感染，猩紅熱</p>
⑨	スルタミシリン トシル酸塩水和 物	ユナシン錠 375mg (ファイザー株 式会社)	昭和 61 年 9 月	<p><適応菌種></p> <p>スルバクタム／アンピシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、涙囊炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎</p>
⑨	スルタミシリン トシル酸塩水和 物	ユナシン細粒小 児用 10% (ファイザー株 式会社)	平成 2 年 1 月	<p><適応菌種></p> <p>スルバクタム／アンピシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎
⑩	アンピシリンナトリウム	ビクシリン注射用 0.25g、同注射用 0.5g、同注射用 1g、同注射用 2g (MeijiSeika ファルマ株式会社)	平成 21 年 7 月	<p><適応菌種> アンピシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、髄膜炎菌、炭疽菌、放線菌、大腸菌、赤痢菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、リステリア・モノサイトゲネス</p> <p><適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、化膿性髄膜炎、眼瞼膿瘍、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症</p>
⑪	ピペラシリンナトリウム	ペントシリン注射用 1g、同注射用 2g (富山化学工業株式会社) 他	昭和 54 年 5 月	<p><適応菌種> ピペラシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、シトロバクター属、肺炎桿菌、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<適応症> ●敗血症 ●急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 ●膀胱炎、腎盂腎炎 ●胆嚢炎、胆管炎 ●バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 ●化膿性髄膜炎
⑪	ピペラシリンナトリウム	ペントシリン静注用 1g バッグ、同静注用 2g バッグ (富山化学工業株式会社) 他	平成 14 年 9 月	<適応菌種> ピペラシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、シトロバクター属、肺炎桿菌、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く) <適応症> ●敗血症 ●急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 ●膀胱炎、腎盂腎炎 ●胆嚢炎、胆管炎 ●バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 ●化膿性髄膜炎
⑫	セファレキシン	ケフレックスカプセル 250mg	昭和 45 年 4 月	<適応菌種>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		(塩野義製薬株式会社) 他		<p>本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎 ○ 骨髓炎，筋炎 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎） ○ 淋菌感染症，子宮頸管炎 ○ バルトリン腺炎，子宮内感染 ○ 涙嚢炎，麦粒腫，角膜炎（角膜潰瘍を含む） ○ 外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎 ○ 歯周組織炎，歯冠周囲炎，上顎洞炎，顎炎，抜歯創・口腔手術創の二次感染
⑫	セファレキシン	ケフレックスシロップ用細粒100/ケフレックスシロップ用細粒200 (塩野義製薬株式会社) 他	昭和45年4月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，大腸菌，クレブシエラ属，インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 膀胱炎, 腎盂腎炎 ○ 涙嚢炎, 麦粒腫 ○ 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎, 顎炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染 ○ 猩紅熱
⑫	セファレキシン	L-ケフレックス 顆粒 (塩野義製薬株 式会社) 他	昭和 53 年 8 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス・ミラビリス</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 乳腺炎 ○ 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎 (扁桃周囲炎を含む), 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎, 腎盂腎炎, 前立腺炎 (急性症, 慢性症) ○ バルトリン腺炎 ○ 涙嚢炎, 麦粒腫 ○ 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎, 歯冠周囲炎, 顎炎, 抜歯創・口腔手術創の二次感染
⑫	セファレキシン	L-ケフレックス 小児用顆粒 (塩野義製薬株	昭和 53 年 8 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		式会社)		<p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎 ○ 涙嚢炎，麦粒腫 ○ 外耳炎 ○ 歯周組織炎，顎炎，抜歯創・口腔手術創の二次感染 ○ 猩紅熱
⑬	セファクロル	ケフラルカプセル 250mg (塩野義製薬株式会社) 他	昭和 56 年 12 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス・ミラビリス，インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎 ○ 麦粒腫 ○ 中耳炎 ○ 歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎 ○ 猩紅熱

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
⑬	セファクロル	ケフラル細粒 小児用 100mg (塩野義製薬株式会社) 他	昭和 56 年 12 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 大腸菌, クレブシエラ属, プロテウス・ミラビリス, インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 乳腺炎 ○ 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎, 腎盂腎炎 ○ 麦粒腫 ○ 中耳炎 ○ 歯周組織炎, 歯冠周囲炎, 顎炎 ○ 猩紅熱
⑬	セファクロル	L-ケフラル顆粒 (塩野義製薬株式会社)	昭和 63 年 6 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属 (肺炎球菌を除く), 大腸菌, クレブシエラ属, インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 慢性膿皮症 ○ 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 中耳炎
⑭	セフロキサジン水和物	オラスポア小児用ドライシロツ	平成 19 年 8 月	<適応菌種>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		プ10% (アルフレッサ ファーマ株式会 社)		本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、クレブシエラ 属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌 ＜適応症＞ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支 炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、麦粒腫、中耳炎、猩紅熱
⑮	セフィキシム水 和物	セフspanカプ セル 50mg、同 カプセル 100mg (長生堂製薬株 式会社)	昭和 62 年 6 月	＜適応菌種＞ 本剤に感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ (ブランハメラ) ・ カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガ ネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌 ＜適応症＞ 急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道 炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱
⑮	セフィキシム水 和物	セフspan細粒 50mg (長生堂製薬株 式会社) 他	昭和 62 年 6 月	＜適応菌種＞ 本剤に感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ (ブランハメラ) ・ カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガ ネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌 ＜適応症＞ 急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道 炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱
⑯	セフテラム ピ ボキシル	トミロン錠 50、同錠 100	昭和 62 年 6 月	＜適応菌種＞

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		(富山化学工業株式会社)		セフテラムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属 <適応症> ●咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ●膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎 ●バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎 ●中耳炎、副鼻腔炎 ●歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
⑩	セフテラム ピ ボキシル	トミロン細粒小 児用 10%、同 細粒小児用 20% (富山化学工業 株式会社) 他	10%：平 成 2 年 6 月、 20%：平 成 28 年 2 月	○小児 <適応菌種> セフテラムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌 <適応症> 咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱 ○成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合) <適応菌種>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				セフトラムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属 <適応症> 咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
⑰	セフロキシム アキセチル	オラセフ錠 250mg (グラクソ・スミスクライン株式会社)	平成 19 年 2 月	<適応菌種> セフロキシムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌 <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎(単純性に限る)、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
⑱	セフトキシム プロキセチル	バナ錠 100mg (第一三共株式会社) 他	平成元年 9月	<p><適応菌種></p> <p>セフトキシムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p>
⑱	セフトキシム プロキセチル	バナンドライシ ロップ 5% (第一三共株式会社) 他	平成3年 1月	<p><適応菌種></p> <p>セフトキシムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、プロビデンシア属、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱</p>
⑲	セフジニル	セフゾンカプセル 50mg、同カ	平成3年 10月	<p><適応菌種></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		プセル 100mg (アステラス製薬株式会社) 他		本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌 <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
⑱	セフジニル	セフゾン細粒小児用 10% (アステラス製薬株式会社) 他	平成 18 年 5 月	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌 <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱
⑳	セフジトレンピボキシル	メイアクト MS錠 100mg (MeijiSeika フ	平成 6 年 4 月	<適応菌種> セフジトレンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		アルマ株式会社) 他		<p>属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p>
⑳	セフジトレン ピボキシル	メイアクトMS 小児用細粒 10% (MeijiSeika ファルマ株式会 社) 他	平成 10 年 2 月	<p>1. 小児</p> <p><適応菌種></p> <p>セフジトレンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、百日咳菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<p>吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、顎炎、猩紅熱、百日咳</p> <p>2. 成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）</p> <p><適応菌種></p> <p>セフジトレンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p>
⑳	セフカペン ピ ボキシル塩酸塩 水和物	フロモックス錠 75mg、同錠 100mg (塩野義製薬株 式会社) 他	平成9年 4月	<p><適応菌種></p> <p>セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガ</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<p>ニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く），アクネ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎 ○ 尿道炎，子宮頸管炎 ○ 胆嚢炎，胆管炎 ○ バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎 ○ 涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎 ○ 外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎
⑳	セフカペン ピ ボキシル塩酸塩 水和物	フロモックス小 児用細粒 100mg (塩野義製薬株 式会社) 他	平成9年 4月	<p>1. 小児</p> <p><適応菌種></p> <p>セフカペンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く），アクネ菌</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎 ○ 中耳炎，副鼻腔炎 ○ 猩紅熱 <p>2. 成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）</p> <p><適応菌種></p> <p>セフカペンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，淋菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く），アクネ菌</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎 ○ 尿道炎，子宮頸管炎

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 胆嚢炎, 胆管炎 ○ バルトリン腺炎, 子宮内感染, 子宮付属器炎 ○ 涙嚢炎, 麦粒腫, 瞼板腺炎 ○ 外耳炎, 中耳炎, 副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎, 歯冠周囲炎, 顎炎
⑳	セフォチアム塩 酸塩	パンスポリン筋 注用 0.25g (武田テバ薬品 株式会社)	昭和 55 年 10 月	<p><適応菌種></p> <p>セフォチアムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>敗血症</p> <p>深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染</p> <p>骨髄炎、関節炎</p> <p>扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染</p> <p>膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）</p> <p>腹膜炎</p> <p>胆嚢炎、胆管炎</p> <p>バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎</p> <p>化膿性髄膜炎</p> <p>中耳炎、副鼻腔</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
②②	セフォチアム塩 酸塩	パンスポリン静 注用 0.25g、同 静注用 0.5g、同 静注用 1g、同 静注用 1g バッ グ S、同静注用 1g バッグ G (武田テバ薬品 株式会社)、 ハロスポア静注 用 0.25g、同静 注用 0.5g、同 静注用 1g (富山化学工業 株式会社) 他	静注用及 び筋注 用；昭和 55年10 月、バッ グ：平成 8年10月	<p><適応菌種> セフォチアムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シト ロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガ ネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌</p> <p><適応症> 敗血症 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 骨髄炎、関節炎 扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、 膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） 腹膜炎 胆嚢炎、胆管炎 バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 化膿性髄膜炎 中耳炎、副鼻腔炎</p>
②③	セファゾリンナ トリウム	セファメジン α 注射用 0.25g、 同 α 注射用 0.5g、同 α 注射 用 1g、同 α 注	平成 18 年 1 月	<p><適応菌種> セファゾリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎 桿菌、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属</p> <p><適応症></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		射用 2g (LTL ファーマ株式会社) 他		敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
⑳	セファゾリンナトリウム	セファメジン α 点滴用キット 1g、同 α 点滴用キット 2g (LTL ファーマ株式会社) 他	平成 18 年 2 月	<p><適応菌種> セファゾリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属</p> <p><適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎</p>
㉑	セファゾリンナトリウム	セファメジン α 筋注用 0.25g、同 α 筋注用 0.5g (LTL ファーマ株式会社)	平成 18 年 1 月	<p><適応菌種> セファゾリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属</p> <p><適応症></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
②④	セファロチンナトリウム	コアキシン注射用 1g、同注射用 2g (株式会社ケミックス)	平成 18 年 8 月	<p><適応菌種> セファロチンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、大腸菌</p> <p><適応症> 敗血症、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、膀胱炎、腎盂腎炎、精巣上体炎（副睾丸炎）、淋菌感染症、腹膜炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、中耳炎、猩紅熱</p>
②⑤	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾン筋注用 0.5 g (第一三共株式会社)	昭和 54 年 8 月	<p><適応菌種> セフメタゾールに感性の黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)</p> <p><適応症></p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎
②⑤	セフメタゾール ナトリウム	セフメタゾン静 注用0.25g、 同静注用0.5 g、同静注用1 g、同静注用2 g、同キット点 滴静注用1g (第一三共株式 会社)他	静注用： 昭和54 年8月、 キット点 滴静注 用：平成 15年3月	<p><適応菌種> セフメタゾールに感性の黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス属、 モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペプトストレプトコッカス属、 バクテロイデス属、プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く)</p> <p><適応症> 敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎</p>
②⑥	セフォタキシム ナトリウム	クラフォラン注 射用0.5g、同注 射用1g (サノフィ株式 会社)他	昭和56 年9月	<p><適応菌種> セフォタキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター 属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モル ガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプ トコッカス属、バクテロイデス属</p> <p><適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、急性気管支 炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎
⑳	セフトラジジム水和物	モダシン静注用0.5g、同静注用1g (グラクソ・スミスクライン株式会社) 他	平成 18 年 1 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス (ザントモナス) ・マルトフィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く)</p> <p><適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎 (扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎 (急性症、慢性症)、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎</p>
㉑	セフトリアキソンナトリウム水和物	ロセフィン静注用0.5g、同静注用1g、同点滴静注用1g バッグ (太陽ファルマ	静注用 : 昭和 61 年 3 月、 バッグ : 平成 15 年 3 月	<p><適応菌種> セフトリアキソンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く)</p>

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		株式会社) 他		<p><適応症></p> <p>敗血症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、骨盤内炎症性疾患、直腸炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎</p>
⑳	セフミノクスナトリウム水和物	メイセリン静注用 1g (MeijiSeika ファルマ株式会社)	昭和 62 年 6 月	<p><適応菌種></p> <p>セフミノクスに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）</p> <p><適応症></p> <p>敗血症、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎</p>
㉑	セフピロム硫酸塩	セフピロム硫酸塩静注用 0.5g 「CMX」、同静注用 1g 「CMX」 (株式会社ケミ	平成 18 年 3 月	<p><適応菌種></p> <p>セフピロムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、エンテロコッカス・フェカーリス、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		ックス)		<p>膿菌、バークホルデリア・セパシア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属</p> <p><適応症></p> <p>敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎</p>
③①	セフェピム塩酸 塩水和物	注射用マキシピ ーム 0.5g、同 1g (ブリストル・ マイヤーズスク イブ株式会社) 他	平成7年 6月	<p>1. 一般感染症</p> <p><適応菌種></p> <p>セフェピムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）</p> <p><適応症></p> <p>敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				染，複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎，子宮内感染，子宮旁結合織炎，中耳炎，副鼻腔炎 2. 発熱性好中球減少症
③②	セフォゾプラン 塩酸塩	ファーストシン 静注用 0.5g、同 静注用 1g、同 静注用 1g バッグ S、同静注用 1g バッグ G (武田テバ薬品 株式会社)	静注用： 平成 7 年 6 月、バ ッグ：平 成 12 年 7 月	<適応菌種> セフォゾプランに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属 <適応症> 敗血症 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） 腹膜炎、腹腔内膿瘍 胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 化膿性髄膜炎

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				眼窩感染、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼内炎（全眼球炎を含む） 中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
③③	セフチゾキシム ナトリウム	エポセリン坐剤 125、同坐剤 250 (長生堂製薬株 式会社)	昭和 61 年 7 月	<適応菌種> セフチゾキシムに感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター 属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モル ガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプ トコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ・メラノジェニカ <適応症> 急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎
③④	ラタモキシセフナ トリウム	シオマリン静注 用 1g (塩野義製薬株 式会社)	昭和 56 年 12 月	<適応菌種> ラタモキシセフに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロ バクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデ ンシア属、インフルエンザ菌、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテ ラ・ビビアを除く） <適応症> ○ 敗血症 ○ 急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 腹膜炎 ○ 胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 ○ 子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				○ 化膿性髄膜炎
③⑤	フロモキシセフナ トリウム	フルマリン静注 用 0.5g、同静注 用 1g、同キッ ト静注用 1g (塩野義製薬株 式会社)	静注用： 昭和 63 年 3 月、 キット静 注用：平 成 12 年 9 月	<p><適応菌種> フロモキシセフに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 敗血症，感染性心内膜炎 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症） ○ 尿道炎 ○ 腹膜炎，腹腔内膿瘍 ○ 胆嚢炎，胆管炎 ○ バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎 ○ 中耳炎，副鼻腔炎
③⑥	ファロペネムナ トリウム水和物	ファロム錠 150mg、同 200mg	平成 9 年 4 月	<p><適応菌種> ファロペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレ</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		(マルホ株式会社)		<p>ブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p>
③⑥	ファロペネムナトリウム水和物	ファロムドライシロップ小児用10% (マルホ株式会社)	平成11年9月	<p><適応菌種></p> <p>ファロペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌、百日咳菌</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、猩紅熱、百日咳</p>
③⑦	テビペネムピボキシル	オラペネム小児用細粒10%	平成21年4月	<適応菌種>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		(MeijiSeika ファルマ株式会社)		<p>テビペネムに感性の黄色ブドウ球菌、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ (ブランハメラ) ・カタラーリス、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>肺炎、中耳炎、副鼻腔炎</p>
③⑧	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	オーグメンチン配合錠 125SS、同配合錠 250RS (グラクソ・スミスクライン株式会社)	平成 21 年 6 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、インフルエンザ菌、バクテロイデス属、プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く)</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎</p>
③⑧	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	クラバモックス小児用配合ドレイシロップ (グラクソ・スミスクライン株式会社)	平成 21 年 6 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性の肺炎球菌 (ペニシリン G に対する MIC ≤ 2μg/mL) 、モラクセラ (ブランハメラ) ・カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテロイデス属、プレボテラ属 (プレボテラ・ビビアを除く)</p> <p><適応症></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
③⑨	メロペネム水和物	メロペン点滴用バイアル 0.25g、同点滴用バイアル 0.5g、同点滴用キット 0.5g (大日本住友製薬株式会社) 他	平成 19 年 11 月	<p>1. 一般感染症 <適応菌種> メロペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、髄膜炎菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、バクテロイデス属、プレボテラ属</p> <p><適応症> 敗血症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髄炎、関節炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎</p> <p>2. 発熱性好中球減少症</p>
④⑩	ビアペネム	オメガシン点滴用 0.3g、同点滴用 0.3g バッグ (MeijiSeika ファルマ株式会社)	平成 13 年 10 月	<p><適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属（エンテロコッカス・フェシウムを除く）、モラクセラ属、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、フソバクテリウム属</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<p><適応症> 敗血症、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、子宮旁結合織炎</p>
④	ドリペネム水和物	フィニバックス 点滴静注用 0.25g、同点滴 静注用 0.5g、同 キット点滴静注 用 0.25g (塩野義製薬株 式会社)	点滴静注 用 0.25g：平 成 17 年 7 月、点滴 静注用 0.5g：平 成 23 年 7 月、キッ ト点滴静 注用：平 成 18 年 3 月	<p><適応菌種> ドリペネムに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属（エンテロコッカス・フェシウムを除く），モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロバクター属，クレブシエラ属，エンテロバクター属，セラチア属，プロテウス属，モルガネラ・モルガニー，プロビデンシア属，インフルエンザ菌，緑膿菌，アシネトバクター属，ペプトストレプトコッカス属，バクテロイデス属，プレボテラ属</p> <p><適応症></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 敗血症，感染性心内膜炎 ○ 深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 骨髓炎，関節炎 ○ 咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む） ○ 肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎） ○ 腹膜炎，腹腔内膿瘍 ○ 胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 子宮内感染, 子宮付属器炎, 子宮旁結合織炎 ○ 化膿性髄膜炎 ○ 眼窩感染, 角膜炎 (角膜潰瘍を含む), 眼内炎 (全眼球炎を含む) ○ 中耳炎 ○ 顎骨周辺の蜂巣炎, 顎炎
④②	セフォペラゾン ナトリウム・ス ルバクタムナト リウム	スルペラゾン静 注用 0.5g、同静 注用 1g、同キ ット静注用 1g (ファイザー株 式会社) 他	静注用： 昭和 61 年 4 月、 キット静 注用：平 成 21 年 6 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、プロビデンシア・レットゲリ、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、バクテロイデス属、プレボテラ属</p> <p><適応症></p> <p>敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎</p>
④③	イミペネム水和 物・シラスタチ ンナトリウム	チエナム点滴静 注用 0.25g、同 点滴静注用 0.5g、同点滴静 注用キット 0.5g (MSD株式会	点滴静注 用：昭和 62 年 6 月、キッ ト：平成 9 年 7 月	<p><適応菌種></p> <p>イミペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、パークホルデリア・セパシア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属</p>

番号	一般名	販 売 名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
		社) 他		<p><適応症></p> <p>敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、眼内炎(全眼球炎を含む)</p>
④③	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	チエナム筋注用0.5g (MSD株式会社)	平成5年7月	<p><適応菌種></p> <p>イミペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属</p> <p><適応症></p> <p>外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎</p>
④④	パニペネム・ベタミプロン	カルベニン点滴用0.25g、同点滴用0.5g(第一三共株式会社)	平成5年10月	<p><適応菌種></p> <p>パニペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モル</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
				<p>ガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属</p> <p><適応症></p> <p>敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼窩感染、眼内炎(全眼球炎を含む)、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎</p>
④⑤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	ユナシン-S キット静注用 1.5g、同-S キット静注用 3g (ファイザー株式会社)	平成 18 年 10 月	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ (ブランハメラ) ・カタラーリス、大腸菌、プロテウス属、インフルエンザ菌</p> <p><適応症></p> <p>肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腹膜炎</p>
④⑤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリ	ユナシン-S 静注用 0.75g、同-S 静注用 1.5g、	静注用 0.75g 及び 1.5g :	<p><適応菌種></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ (ブランハメラ) ・カタラーリス、大腸菌、プロテウス属、インフルエンザ菌</p>

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
	ウム	同-S 静注用 3g (ファイザー株式会社) 他	平成 6 年 7 月、静 注用 3g: 平成 24 年 12 月	<適応症> 肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腹膜炎
④⑥	アンピシリン水 和物・クロキサ シリンナトリウ ム水和物	ビクシリン S 配 合錠 (MeijiSeika フ ァルマ株式会 社)	昭和 49 年 5 月	<適応菌種> アンピシリン/クロキサシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球 菌、腸球菌属、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌 <適応症> 肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染
④⑥	アンピシリンナ トリウム・クロ キサシリンナト リウム水和物	注射用ビクシリ ン S100 (MeijiSeika フ ァルマ株式会 社)	昭和 43 年 10 月	1. 新生児の細菌感染予防 2. その他 <適応菌種> アンピシリン/クロキサシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球 菌、腸球菌属、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌 <適応症> 慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感 染、外耳炎
④⑦	アンピシリンナ トリウム・クロ キサシリンナト	注射用ビクシリ ン S500、同 S1000	S500 : 昭 和 45 年 1 月、	<適応菌種> アンピシリン/クロキサシリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球 菌、腸球菌属、大腸菌、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

番号	一般名	販売名 (承認取得者)	承認年月	効能・効果
	リウム水和物	(MeijiSeika フ アルマ株式会 社)	S1000 : 昭和 50 年 1 月	<適応症> 敗血症、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎

平成 31 年 2 月 15 日

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長 殿

公益社団法人日本化学療法学会
理事長 清田 浩



「原則禁忌」の廃止に係る協力依頼について

平成 30 年 12 月 3 日付でご依頼頂きました標記については、当学会理事会で検討した結果、添付文書記載要領改正に伴う原則禁忌の廃止（ツベルクリンを除く）については、特に異論がない旨、ご回答申し上げます。



2019年2月15日

厚生労働省

医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

関野 秀人 殿

一般社団法人 日本感染症学会

理事長 箱田 一博



『「原則禁忌」の廃止に係る協力をお願い』への感染症学会からの意見

日頃より学会活動にご理解・ご協力をいただき誠に有難うございます。

2018年11月22日に頂いた上記に関して、日本感染症学会の専門の先生方にご意見を伺いました。感染症関連の薬剤において、当学会としては、ご提案いただいた内容で問題はないと考えます。個々の薬剤において特殊な事情が考えられる場合には、引き続き日本感染症学会として議論させていただきます。

以上



※2018年10月改訂（第13版、発売元の住所変更に伴う改訂）
※2018年5月改訂

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：外箱等に表示（使用期間2年）

日本標準商品分類番号
876132

経口用セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 セファレキシンカプセル

処方箋医薬品^{注1)}

ケフレックス[®]カプセル250mg

Keflex[®]

承認番号	21900AMX00246
薬価収載	2007年6月
販売開始	1970年5月
再評価結果	2004年9月
効能追加	2005年3月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤の成分によるショックの既往歴のある患者

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とする が、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】



本剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

販売名	ケフレックスカプセル 250mg
有効成分 (1カプセル中)	セファレキシン 250mg (力価)
添加物	トウモロコシデンプン、タルク、ステアリン酸マグネシウム、含水二酸化ケイ素 カプセル本体中：ラウリル硫酸ナトリウム、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、黄色5号

2. 性状

販売名	ケフレックスカプセル 250mg
性状・剤形	ボディは白色、キャップは帯灰緑色の硬カプセル剤で、内容物はほとんど白色の粉末で、においはほとんどない。
外形	
大きさ	2号カプセル
重量	約0.36g
識別コード	

【効能・効果】

<適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌

<適応症>

- 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症
- 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎
- 骨髄炎、筋炎
- 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染
- 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睪丸炎）
- 淋菌感染症、子宮頸管炎
- パルトリン腺炎、子宮内感染
- 涙嚢炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）
- 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
- 歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染

<効能・効果に関連する使用上の注意>*

咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」¹⁾を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

【用法・用量】

通常、成人及び体重20kg以上の小児にはセファレキシンとして1回250mg（力価）を6時間ごとに経口投与する。

重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には1回500mg（力価）を6時間ごとに経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

【使用上の注意】*

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - (1) ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
 - (2) 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
 - (3) 高度の腎障害のある患者〔血中濃度が持続するので、投与量を減らすか、投与間隔をあけて使用すること。（「薬物動態」の項参照）〕
 - (4) 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者〔ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。〕
 - (5) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕
2. 重要な基本的注意
ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。
3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度については文献、自発報告等を参考に集計した。
 - (1) 重大な副作用
 - 1) ショック、アナフィラキシー（0.1%未満）：ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、浮腫等）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 2) 急性腎障害（0.1%未満）：急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 3) 溶血性貧血（0.1%未満）：溶血性貧血があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1) 注意—医師等の処方箋により使用すること

- 4) 偽膜性大腸炎 (0.1%未満) : 偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 5) 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN), 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) (0.1%未満) : 中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) 間質性肺炎, PIE 症候群 (0.1%未満) : 発熱, 咳嗽, 呼吸困難, 胸部 X 線異常, 好酸球增多等を伴う間質性肺炎, PIE 症候群等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

種類\頻度	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
過敏症 ^{注1}	発疹, 蕁麻疹, 紅斑, そう痒, 発熱, リンパ腺腫脹, 関節痛等		
血液 ^{注1}			顆粒球減少, 好酸球增多, 血小板減少
肝臓 ^{注2}			黄疸, AST (GOT) 上昇, ALT (GPT) 上昇, AI-P 上昇
消化器		悪心, 嘔吐, 下痢, 軟便, 腹痛, 食欲不振, 胃不快感等	
菌交代症			口内炎, カンジダ症
ビタミン欠乏症			ビタミンK欠乏症状 (低プロトロンビン血症, 出血傾向等), ビタミンB群欠乏症状 (舌炎, 口内炎, 食欲不振, 神経炎等)
その他			頭痛, めまい, 全身倦怠感

注1 : 症状 (異常) が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注2 : 症状 (異常) が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

4. 高齢者への投与

高齢者には、次の点に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- (1) 高齢者では生理機能が低下していることが多く副作用が発現しやすい。
- (2) 高齢者ではビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることがある。

5. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

6. 臨床検査結果に及ぼす影響

- (1) テステープ反応を除くベネディクト試薬, フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。
- (2) 直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

7. 適用上の注意

薬剤交付時 : PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。(PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

【薬物動態】

1. 血中濃度

(1) 健康成人

健康成人にセファレキシンカプセル 250mg (力価), 500mg (力価) を食後単回経口投与したときの血中濃度及び薬物動態パラメータを図1・表1に示す²⁾。




図1 経口投与時の血中濃度

表1 薬物動態パラメータ

記号	投与量 [mg (力価)]	n	Cmax (μg/mL)	Tmax (hr)	AUC ₀₋₆ (μg・hr/mL)	T _{1/2} (hr)
◆	250	7	5.5±0.8	2.9±0.4	14.94±3.69	1.24±0.74
■	500	8	10.3±2.9	2.9±0.6	29.11±8.53	1.05±0.34

(測定法 : bioassay) (mean ± S. D.)

(2) 腎機能障害患者

腎機能障害患者に 500mg (力価) を単回経口投与したとき、GFR (glomerular filtration rate : 糸球体ろ過値) の低下に伴い、Cmax, Tmax が高値を示す傾向がみられた³⁾。(外国人によるデータ)

表2 薬物動態パラメータ

GFR (mL/min)	n	Cmax (μg/mL)	Tmax (hr)
<10	9	25.9	2.7
10~20	4	32.6	4
20~50	4	21.9	1.6
>50	1	19.0	1.0
腎機能正常者	18	12.7	1.0

(mean)

また、GFR が 30mL/min 以下では半減期が著明に延長した³⁾。(外国人によるデータ)

2. 代謝

健康成人に経口投与後、生体内で代謝されず、未変化のまま尿中に排泄された⁴⁾。

3. 排泄

健康成人に 250mg (力価) (n=8), 500mg (力価) (n=8) を食後経口投与したときの6時間までの平均尿中回収率は約90%であった²⁾。

4. その他

血清蛋白結合率 : 限外ろ過法にて測定された血清蛋白結合率は約15%であった⁵⁾。(外国人によるデータ)

【臨床成績】

承認時における一般臨床試験での有効性評価対象例は1243例(カプセル, 錠[※]を含む)であり、有効率は85.9% (1068例)であった。(※ケフレックス錠は販売中止)

表3 臨床成績

疾患	有効例数/有効性評価対象例数	有効率 (%)
皮膚科領域感染症	188/212	88.7
外科領域感染症	30/38	78.9
整形外科領域感染症	6/6	—
呼吸器感染症	129/147	87.8
尿路感染症	427/510	83.7
性感染症	66/84	78.6

疾患	有効例数/有効性評価対象例数	有効率 (%)
産婦人科領域感染症	16/19	84.2
眼科領域感染症	22/25	88.0
耳鼻科領域感染症	67/78	85.9
歯科・口腔外科領域感染症	117/124	94.4

【薬効薬理】

1. 薬理作用

抗菌作用

セファレキシンは、試験管内でブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラピリスに抗菌力を示す^{6),7)}。

2. 作用機序

細菌の細胞壁合成を阻害することにより抗菌作用を発揮し、その作用は殺菌的である⁸⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般的名称：セファレキシン (JAN) [日局]

Cefalexin


略号：CEX

化学名：(6*R*, 7*R*)-7-[(2*R*)-2-Amino-2-phenylacetyl-amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

分子式：C₁₆H₁₇N₃O₄S

分子量：347.39

化学構造式：



性状：白色～淡黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。

水にやや溶けにくく、メタノールに溶けにくく、エタノール(95)又は*N,N*-ジメチルホルムアミドにほとんど溶けない。吸湿性である。

融点：約 170°C (分解)

分配係数：0.14 [pH7.2, 1-オクタノール/緩衝液]

【包装】

ケフレックスカプセル 250mg：PTP100 カプセル (10 カプセル × 10)

【主要文献】*

- 1) 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
- 2) 前川秀幸ほか：Jpn. J. Antibiot., 1977, 30(8), 631
- 3) Bailey, R. R. et al. : Postgrad. Med. J., 1970, 46(S), 60
- 4) 西村治雄ほか：最新医学, 1969, 24(9), 1983
- 5) Kind, A. C. et al. : Antimicrob. Agents Chemother., 1968, 361
- 6) 西野武志ほか：Chemotherapy, 1979, 27(S-7), 38
- 7) 中沢昭三ほか：Jpn. J. Antibiot., 1969, 22(4), 269
- 8) 上田泰ほか：化学療法ハンドブック, 1975, pp. 16-18, 永井書店, 東京

【文献請求先】**

共和薬品工業株式会社 学術情報課

〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4

☎ 0120-041-189

FAX 06-6121-2858



発売元**

共和薬品工業株式会社
大阪市北区中之島 3-2-4

製造販売元

塩野義製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号