

スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望状況について(令和元年度要望)(2020年4月1日～2020年6月30日)

資料 3-4

No.	要望番号	要望者	成分名	要望する効能・効果	要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報				スイッチOTC化の可否	備考																						
					販売名	会社名	効能・効果	用法・用量																								
1	R2-1	個人以外	ピランテルパモ酸塩	蟻虫の駆除	コンバントリン錠100mg コンバントリンドライシロップ100mg	佐藤製薬	蟻虫の駆除	<p>(1) コンバントリン錠100mg(1) 通常体重1 kg当りピランテルとして10 mgを1回経口投与する。</p> <p>体重換算による服用量の概算は、次表の通りである。</p> <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>20 kg</td> <td>30 kg</td> <td>40 kg</td> <td>50 kg以上</td> </tr> <tr> <td>服用量</td> <td>2錠</td> <td>3錠</td> <td>4錠</td> <td>5錠</td> </tr> </table> <p>本剤は食事に関係なく投与することができ、また下剤を使用する必要はない。 なお、投与は1回のみである。</p> <p>(2) コンバントリンドライシロップ100mg(2) 通常小児に対し体重1 kg当りピランテルとして10 mgを1回経口投与する。</p> <p>体重換算による服用量の概算は、次表の通りである。</p> <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>10 kg</td> <td>20 kg</td> <td>30 kg</td> <td>40 kg</td> <td>50 kg以上</td> </tr> <tr> <td>服用量</td> <td>1包</td> <td>2包</td> <td>3包</td> <td>4包</td> <td>5包</td> </tr> </table> <p>本剤は食事に関係なく投与することができ、また下剤を使用する必要はない。 本剤は、用時適量の水を加えシロップ剤として投与するが、そのまま経口投与することもできる。</p>	体重	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg以上	服用量	2錠	3錠	4錠	5錠	体重	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg以上	服用量	1包	2包	3包	4包	5包		
体重	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg以上																												
服用量	2錠	3錠	4錠	5錠																												
体重	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg以上																											
服用量	1包	2包	3包	4包	5包																											
2	R2-2	個人	過酸化ベンゾイル	にきび	ベピオゲル2.5%	マルホ	尋常性ざ瘡	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。																								

注)「成分名」、「要望する効能・効果」、「要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報(販売名、会社名)」については、要望内容を参考にして記載。

進捗状況について(令和2年度要望)

	要望 番号	成分名	成分情報等の提 出依頼(産業界)	成分情報シート の作成	関係医学会・医会 (要望に係る見 解)	評価検討会議①	パブコメ	評価検討会議②	備考
1	R2-1	ピランテルパモ酸塩							
2	R2-2	過酸化ベンゾイル							