

# ヒアレイン®S 使用チェックシート



資料5-3

購入される前に、このフローチャートに従って、薬剤師と確認しつつ、この医薬品をご使用いただけるかどうかチェックしてください。

はい・いいえでお答えください(該当するチェック欄に  を記入してください)。

1 次に当てはまりますか?

- 本剤を使ったことがある
- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある

はい

(使用経験あり)

前回使用時に異常はなかったか、どれくらいの期間連続して使用しているか、薬剤師とチェックしてください。

本剤の使用経験があつて使用可能と判断された場合は、②に進んでください。

(アレルギー既往歴あり)

使用しないでください。

アレルギー症状を起こしたことがある人は、再び起こすおそれがあります。

はい

使用しないでください。

病状が悪化するおそれがありますので、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください。

はい

使用できない場合があるため、使用する前に医師または薬剤師に相談してください。

使用可能と判断された場合は、④に進んでください。

2 次のいずれかに当てはまりますか?

- 医療機関で次の診断を受けている：  
ドライアイ、シェーグレン症候群、ステーブンス・ジョンソン症候群、角膜感染症
- はげしい目の痛みがある
- 急な視力低下

いいえ

3 次のいずれかに当てはまりますか?

- (眼科に限らず) 現在、医師の治療を受けている
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
- 緑内障と診断を受けた
- 口や皮ふなどに乾燥感や紅斑などのはげしい症状がある
- 本剤を連用しようとしている

いいえ

4 本剤の使用に際しては、次の内容を遵守することを薬剤師と確認してください。

- 症状が改善されない場合  
1週間くらい使用(1本目を使い切る目安)しても症状の改善がみられない場合は、ドライアイやその他の目の疾患が原因の可能性があります(目のかすみ改善されない場合は、緑内障が原因である可能性があります)。2本目を使用する前に製品の説明書を持って、医師または薬剤師に相談してください。
- 症状が悪化した場合  
速やかに医師の診断を受けてください。
- 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合  
ドライアイ等の本剤の適応ではない目の疾患の可能性がありますので、製品の説明書を持って医師または薬剤師に相談してください。

全て確認した

5 次に当てはまりますか?

- コンタクトレンズを使用している

いいえ

はい

6 次のいずれかに当てはまりますか?

- コンタクトレンズ装着時または装着中に強い痛みを感じる
- 眼科での定期検査を受けていない
- ご使用のコンタクトレンズについて、正しい使い方を守らないことがある

はい

本剤は使用できません。医師の診察を受けてください。

いいえ

7 次に当てはまりますか?

- カラーコンタクトレンズを使用している

はい

カラーコンタクトを装着したまま使用できません。外してからご使用ください。

いいえ

はずす

ヒアレイン®Sをご使用いただけます。

薬剤師から説明を受け、製品の説明書をよく読んで使用してください。

参天製薬株式会社

大阪市北区大深町4-20  
http://www.santen.co.jp

# ヒアレイン®Sのご使用にあたって 要指導医薬品

ヒアレイン®Sは、目の乾きやそれに伴う不快感の緩和に使用いただける製品です。

ただし、目に強い不快感が生じている時や頻繁に目の乾きが生じる場合には、医師の診断・治療が必要な“ドライアイ”という目の疾患である可能性があります。

“ドライアイ”とは、さまざまな要因により目の表面に広がる涙の層が不安定になる疾患で、目の不快感(乾きや異物感など)や物を見る機能に異常を生じ、目の表面に障害を伴うことがあるものです。

目の乾きは、周りの空気が乾燥している時(エアコン使用など)や、長時間のパソコン作業、テレビの鑑賞などでまばたきの回数が減ったり、コンタクトレンズを使用している時などに生じますが、症状だけでは“ドライアイ”との違いは自己判断できません。

したがって、ヒアレイン®Sを1週間ほど使用しても、症状の改善がみられない場合には、“ドライアイ”やその他の目の疾患のおそれもありますので、薬剤師に相談したり、眼科医を受診するようにしてください。“ドライアイ”は目の疾患であり、ヒアレイン®Sはご使用いただけません。

製品名:ヒアレイン®S

有効成分:精製ヒアルロン酸ナトリウム 配合濃度:0.1%

このお薬は、有効成分ヒアルロン酸ナトリウムが、角膜表面に水分を補い、うるおいを与えるとともに、涙液層を安定化させることで目の乾きや目の疲れ、異物感などを改善する目薬です。

## このお薬の効果

このお薬は目の乾き、目の異物感(コロコロ・チクチクする感じ)、目の疲れ、目のかすみ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感を緩和します。

## このお薬の使用前に確認すること

- 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(本剤の使用によりアレルギー症状が引き起こされる可能性がある)ので使用できません
  - (2) 次の診断を受けた人  
ドライアイ、シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、角膜感染症  
(病状が悪化する恐れがありますので、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください。)
  - (3) 次の症状のある人  
急な視力低下、はげしい目の痛み  
(他の病気の可能性がありますので自己判断で治療をすることなく医師の診断を受けてください)
- 次の人は、使用前に医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) (眼科に限らず)医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 目の症状以外に、次の症状がある人
    - 口の乾燥、鼻腔の乾燥
    - 高熱、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤などの持続や急激な悪化
  - (4) 次の診断を受けた人  
緑内障
- 上記のほか、コンタクトレンズを装着することがある人で下記に該当する人は本剤を使用できません。
  - コンタクトレンズを装着する際、あるいは装着中に、強い痛みを感じる人
  - 眼科での定期検査を受けていない人
  - 使用するコンタクトレンズについて、正しい使い方を守らないことがある人

## このお薬の使い方

**[用法・用量]** 1回1滴、1日5～6回点眼してください。


- 次の注意事項をお守りください。
  - (1) 必ず用法・用量を守ってお使いください。  
コンタクトレンズをご使用される方に:コンタクトレンズは、眼科医の指導、正しい取扱いやレンズケアを守りましょう。本剤の用法・用量を守らなかったりコンタクトレンズを不適切に使用するとコンタクトレンズの性能に影響を与えたり眼障害を引き起こすことがあります。十分に注意して使用してください。
  - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (3) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
  - (4) 点眼用にのみ使用してください。
  - (5) カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。

## 開栓方法

肩口にとどくまで  
まわすと…



点眼口に  
穴があきます



## このお薬の使用中に気をつけなければならないこと

- (1) この薬を使用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、製品の説明書を持って、医師または薬剤師に相談してください。
- (2) 目のかすみ改善されない場合は、他の疾患(緑内障)が原因の可能性も考えられますので、使用を中止して、製品の説明書を持って、医師または薬剤師に相談してください。
- (3) 症状が悪化する場合は、直ちに使用を中止し、製品の説明書を持って、医師または薬剤師に相談してください。
- (4) 1週間くらい使用(1本目を使い切る目安)しても症状がよくならない場合は、ドライアイや他の眼疾患の可能性もあります。放置すると、目の表面に障害(角膜上皮障害)を引き起こしたり、視力低下を引き起こしたりする可能性がありますので、2本目を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
- (5) 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み、刺激感、異物感、目やに

## お薬の保管・取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が悪化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

このお薬についてのお問合せ先

商品の内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
参天製薬株式会社「お客様相談室」  
電話番号 0120-127-023  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)