

(案)

令和3年10月15日
第13回重篤副作用総合対策検討会
資料2 - 12

重篤副作用疾患別対応マニュアル

痙攣・てんかん

平成21年5月
(令和3年 月時点修正)
厚生労働省

参考1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、医薬品医療機器等法）第68条の10に基づく副作用報告件数（医薬品別）

注意事項

- 1) 医薬品医療機器等法 第68条の10の規定に基づき報告があったもののうち、報告の多い推定原因医薬品を列記したもの。
- 注)「件数」とは、報告された副作用の延べ数を集計したもの。例えば、1症例で肝障害及び肺障害が報告された場合には、肝障害1件・肺障害1件として集計。
- 2) 医薬品医療機器等法に基づく副作用報告は、医薬品の副作用によるものと疑われる症例を報告するものであるが、医薬品との因果関係が認められないものや情報不足等により評価できないものも幅広く報告されている。
- 3) 報告件数の順位については、各医薬品の販売量が異なること、また使用法、使用頻度、併用医薬品、原疾患、合併症等が症例により異なるため、単純に比較できないことに留意すること。
- 4) 副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）ver. 24.0に収載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。

年度	副作用名	医薬品名	件数
2018年度 (2021年3月集計)	てんかん	ラコサミド	48
		レベチラセタム	27
		ラモトリギン	12
		カルバマゼピン	11
		ペランパネル水和物	8
		バルプロ酸ナトリウム	7
		クロザピン	6
		リスペリドン	5
		タクロリムス水和物	4
		デュロキセチン塩酸塩	4
		プレドニゾロン	4
		その他	131
		合 計	267
2019年度 (2021年3月集計)	てんかん	レベチラセタム	36
		ラコサミド	34
		ラモトリギン	17
		カルバマゼピン	10
		ペランパネル水和物	9
		メチルフェニデート塩酸塩	7

	クロザピン	6
	バルプロ酸ナトリウム	6
	プレガバリン	6
	A型ボツリヌス毒素	5
	リスペリドン	5
	その他	154
	合 計	295

医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、このホームページにリンクしている独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品 情報検索」から確認することができます。

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>

参考2 ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J) ver.24.0 における主な関連用語一覧

日米 EU 医薬品規制調和国際会議 (ICH) において検討され、取りまとめられた「ICH 国際医薬用語集 (MedDRA)」は、医薬品規制等に使用される医学用語 (副作用、効能・使用目的、医学的状态等) についての標準化を図ることを目的としたものであり、平成 16 年 3 月 25 日付薬食安発第 0325001 号・薬食審査発第 0325032 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長通知「ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J)」の使用について」により、薬機法に基づく副作用等報告において、その使用を推奨しているところである。下記に関連する MedDRA 用語を示すが、「痙攣」或いは「てんかん」を含む用語数が多いため PT (基本語) のみを示す。また、MedDRA でコーディングされたデータを検索するために開発された MedDRA 標準検索式 (SMQ) には、「痙攣 (SMQ)」があり、これらを利用すれば、MedDRA でコーディングされたデータから包括的な症例検索が実施することができる。

名称	英語名
てんかん	Epilepsy
てんかんにおける原因不明の突然死	Sudden unexplained death in epilepsy
てんかんの前兆	Epileptic aura
てんかん手術	Epilepsy surgery
てんかん重積状態	Status epilepticus
てんかん性自動症	Automatism epileptic
てんかん性脳症	Epileptic encephalopathy
てんかん精神病	Epileptic psychosis
サブレスションバーストを伴う早期乳児てんかん性脳症	Early infantile epileptic encephalopathy with burst-suppression
バルト型ミオクロニーてんかん	Baltic myoclonic epilepsy
ミオクロニーてんかん	Myoclonic epilepsy
ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	Epilepsy with myoclonic-atonic seizures
ラフォラ・ミオクロニーてんかん	Lafora's myoclonic epilepsy
一過性てんかん性健忘	Transient epileptic amnesia
外傷後てんかん	Post-traumatic epilepsy
後天性てんかん性失語症	Acquired epileptic aphasia
若年性ミオクロニーてんかん	Juvenile myoclonic epilepsy
小発作てんかん	Petit mal epilepsy
新生児てんかん発作	Neonatal epileptic seizure
赤色ぼろ線維・ミオクロニーてんかん症候群	Myoclonic epilepsy and ragged-red fibres
先天性てんかん	Epilepsy congenital
前頭葉てんかん	Frontal lobe epilepsy
側頭葉てんかん	Temporal lobe epilepsy
點頭てんかん	Infantile spasms

特発性全般てんかん	Idiopathic generalised epilepsy
特発性部分てんかん	Idiopathic partial epilepsy
乳児重症ミオクロニーてんかん	Severe myoclonic epilepsy of infancy
熱性感染症関連てんかん症候群	Febrile infection-related epilepsy syndrome
脳卒中後てんかん	Post stroke epilepsy
非定型良性部分てんかん	Atypical benign partial epilepsy
良性ローランドてんかん	Benign rolandic epilepsy
アルコール性痙攣	Alcoholic seizure
横隔膜痙攣	Diaphragmatic spasm
黄斑部血管痙攣	Macular vasospasm
間代性痙攣	Clonic convulsion
眼瞼痙攣	Blepharospasm
顔面痙攣	Facial spasm
奇異性気管支痙攣	Bronchospasm paradoxical
気管支痙攣	Bronchospasm
気管支痙攣予防	Prophylaxis against bronchospasm
強直性痙攣	Tonic convulsion
局在性痙攣	Convulsions local
血管痙攣	Vasospasm
口蓋垂痙攣	Uvular spasm
口腔咽頭痙攣/	Oropharyngeal spasm
喉頭痙攣	Laryngospasm
抗痙攣剤濃度	Anticonvulsant drug level
抗痙攣剤濃度異常	Anticonvulsant drug level abnormal
抗痙攣剤濃度減少	Anticonvulsant drug level decreased
抗痙攣剤濃度治療量	Anticonvulsant drug level therapeutic
抗痙攣剤濃度治療量以下	Anticonvulsant drug level below therapeutic
抗痙攣剤濃度治療量以上	Anticonvulsant drug level above therapeutic
抗痙攣剤濃度増加	Anticonvulsant drug level increased
高血糖性痙攣	Hyperglycaemic seizure
子宮痙攣	Uterine spasm
瞬目痙攣	Nictitating spasm
小児痙攣	Convulsion in childhood
食道痙攣	Oesophageal spasm
新生児痙攣	Neonatal seizure
舌痙攣	Tongue spasm
潜水夫痙攣	Diver's cramp
前弯痙攣	Emprosthotonus

胎児抗痙攣剤症候群	Foetal anticonvulsant syndrome
低カルシウム血症性痙攣	Hypocalcaemic seizure
低ナトリウム血症性痙攣	Hyponatraemic seizure
低血糖性痙攣	Hypoglycaemic seizure
尿道痙攣	Urethral spasm
熱性痙攣	Febrile convulsion
熱痙攣	Heat cramps
脳卒中後痙攣発作	Post stroke seizure
噴門痙攣	Cardiospasm
片側気管支痙攣	Unilateral bronchospasm
片頭痛により誘発される痙攣	Migraine-triggered seizure
毛様体筋痙攣	Ciliary muscle spasm
薬物離脱性痙攣	Drug withdrawal convulsions
幽門痙攣	Pylorospasm
卵管痙攣	Fallopian tube spasm
良性家族性新生児痙攣	Benign familial neonatal convulsions
痙攣性発声障害	Spasmodic dysphonia
痙攣発作	Seizure
痙攣発作予防	Seizure prophylaxis
痙攣閾値低下	Convulsive threshold lowered
肛門痙攣	Anal spasm

参考3 医薬品副作用被害救済制度の給付決定件数

○注意事項

- 1)平成27年度～令和元年度の5年間に給付が決定された請求事例について原因医薬品の薬効小分類（原則として上位5位）を列記したもの。
- 2)一般的な副作用の傾向を示した内訳ではなく、救済事例に対する集計であり、単純に医薬品等の安全性を評価又は比較することはできないことに留意すること。
- 3)1つの健康被害に対して複数の原因医薬品があるので、請求事例数とは合致しない。
- 4)副作用による健康被害名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）ver. 23.1 に収載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。
- 5)薬効小分類とは日本標準商品分類の医薬品及び関連製品(中分類87)における分類で、3桁の分類番号で示され、医薬品の薬効又は性質を表すものである。

年度	副作用による健康被害名	原因医薬品の薬効小分類（分類番号）	件数
平成27年 ～令和元 年度 (令和3 年3月集 計)	●てんかん	精神神経用剤(117)	1
		気管支拡張剤(225)	1
		合計	2

※ 副作用救済給付の決定に関する情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにおいて公表されている。

(<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0043.html>)

参考4 医薬品副作用被害救済制度について

○「医薬品副作用被害救済制度」とは

病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品、又は再生医療等製品（医薬品等）を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。

昭和55年5月1日以降（再生医療等製品については、平成26年11月25日以降）に使用された医薬品等が原因となって発生した副作用による健康被害が救済の対象となります。

○救済の対象とならない場合

次のような場合は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象にはなりません。

- 1) 医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合。
- 2) 医薬品等の副作用において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合。
- 3) 対象除外医薬品による健康被害の場合（抗がん剤、免疫抑制剤などの一部に対象除外医薬品があります）。
- 4) 医薬品等の製造販売業者などに明らかに損害賠償責任がある場合。
- 5) 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
- 6) 法定予防接種を受けたことによるものである場合（予防接種健康被害救済制度があります）。なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となります。

○「生物由来製品感染等被害救済制度」とは

平成16年4月1日に生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。創設日以降（再生医療等製品については、平成26年11月25日以降）に生物由来製品、又は再生医療等製品（生物由来製品等）を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介して感染などが発生した場合に、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。制度のしくみについては、「医薬品副作用被害救済制度」と同様です。

○7 種類の給付

給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の7種類があります。

○給付の種類と請求期限

- ・疾病（入院治療を必要とする程度）について医療を受けた場合

医療費	副作用による疾病の治療に要した費用（ただし、健康保険などによる給付の額を差し引いた自己負担分）について実費償還として給付。
医療手当	副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付。
請求期限	医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。 医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内。

- ・障害（日常生活が著しく制限される程度以上のもの）の場合
（機構法で定める等級で1級・2級の場合）

障害年金	副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償などを目的として給付。
障害児養育年金	副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付。
請求期限	なし

- ・死亡した場合

遺族年金	生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直しなどを目的として給付。
遺族一時金	生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付。
葬祭料	副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付。
請求期限	死亡の時から5年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のときから2年以内。

○救済給付の請求

給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA） に対して行います。

○必要な書類（ 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等）

救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となりますので、請求者はそれらの書類の作成を医師等に依頼し、請求者が記入した請求書とともに、PMDA に提出します。また、医療費・医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要となります。請求書、診断書などの用紙は、PMDA のホームページからダウンロードすることができます。

（ <http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html> ）