


食品衛生分科会 文書による報告事項

- ① 食品中の農薬等の残留基準の設定について
 - ・ オキサチアピプロリン(インポートトレランス申請)……………1

厚生労働省発生食 0324 第7号
令和2年3月24日

薬事・食品衛生審議会
会長 橋田 充 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信



諮問書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。

記

次に掲げる農薬等の食品中の残留基準設定について

動物用医薬品チルジピロシン
動物用医薬品ナナフロシン
農薬オキサチアピプロリン
農薬ピジフルメトフェン
農薬ピリミジフェン
農薬メフェントリフルコナゾール

以上

令和2年5月11日

薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会長 穂山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会報告について

令和2年3月24日付け厚生労働省発生食0324第7号をもって諮問された、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくオキサチアピプロリンに係る食品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

オキサチアピプロリン

今般の残留基準の検討については、関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

1. 概要

(1) 品目名：オキサチアピプロリン [Oxathiapiprolin (ISO)]

(2) 用途：殺菌剤


ピペリジニル・チアゾール・イソキサゾリン系の殺菌剤である。オキシステロール結合タンパクに作用し、べと病菌や疫病菌に対して殺菌効果を示すと考えられている。

(3) 化学名及びCAS番号

(*RS*)-1-(4-{4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl]thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]ethan-1-one (IUPAC)

Ethanone, 1-[4-[4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]-2-thiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]- (CAS : No. 1003318-67-9)

(4) 構造式及び物性



(ラセミ体、*R*体 : *S*体 = 1 : 1)

分子式 $C_{24}H_{22}F_5N_5O_2S$

分子量 539.52

水溶解度 1.749×10^{-4} g/L (20°C)

分配係数 $\log_{10}P_{ow} = 3.67$ (20°C, pH 7)

2. 適用の範囲及び使用方法

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。

ただし、レモン等に係る残留基準の設定についてインポートトレランス申請がなされている。

(1) 国内での使用方法

① 10.2%オキサチアピプロリンフロアブル

| 作物名 | 適用 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数 |
|---------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|---------|------|-----------------------|
| ばれいしょ | 疫病 | 5000倍 | 100～300 L/10 a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| トマト | | | | 収穫前日まで | | | |
| きゅうり はくさい レタス | べと病 | | | | | | |
| ぶどう | | | | 200～700 L/10 a | | | |

② 2.8%オキサチアピプロリン・28.0%ファモキサドンフロアブル

| 作物名 | 適用 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|-----|-------|-------------------|----------|---------|------|-----------------------|
| ばれいしょ | 疫病 | 2000倍 | 100～300 L/10 a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | | 500倍 | 25 L/10 a | | | | |
| レタス 非結球レタス | べと病 | 4000倍 | 100～300 L/10 a | 収穫7日前まで | | | |
| はくさい | | | | 収穫14日前まで | | | |

③ 2.7%オキサチアピプロリン・23.0%マンジプロパミドフロアブル

| 作物名 | 適用 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数 |
|---------------------|-----|-------|-------------------|---------|---------|------|-----------------------|
| トマト | 疫病 | 2000倍 | 100～300 L/10 a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| キャベツ はくさい レタス | べと病 | | | 収穫7日前まで | | | |
| ねぎ | | | | | | | |
| たまねぎ | | | | 収穫前日まで | | | |

④ 0.60%オキサチアピプロリン・60.0%マンゼブ水和剤

| 作物名 | 適用 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数 |
|------|------------|------|-------------------|--------------|---------|------|-----------------------|
| トマト | 疫病 | 750倍 | 100～300 L/10 a | 収穫前日 まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| きゅうり | べと病 | | | | | | |
| ぶどう | べと病 晩腐病 | | 200～700 L/10 a | 収穫45日前 まで | | | |

(2) 海外での使用方法

① 18.7%オキサチアピプロリンフロアブル (米国)

| 作物名 | 1回当たりの使用量 | 年間の 最大使用量 | 使用時期 | 散布間隔 | 使用回数 | 使用方法 |
|----------------------|---|----------------------------------|---------|-------|------|------|
| かんきつ類 Group 10-10 | 33～131 g ai/ha (2.4～9.6 fl oz/acre) | 262 g ai/ha (19.2 fl oz/acre) | 収穫当日まで* | 30日以上 | 2回以内 | 土壌処理 |
| | 16.5～33 g ai/ha (1.2～2.4 fl oz/acre) | 33 g ai/ha (2.4 fl oz/acre) | | — | 1回 | 散布 |

ai : active ingredient (有効成分)

fl oz : 液量オンス (米液量オンス 1 fl oz = 0.0000295735 m³)

acre : エーカー (1 acre = 約4,047 m²)

*収穫当日までとなっているが、散布後4時間は収穫を含め、圃場に入れないと規定している。

② 10.2%オキサチアピプロリンOD (Oil Dispersion) 剤 (米国)

| 作物名 | 1回当たりの使用量 | 年間の 最大使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------|---------------|
| あぶらな科野菜類 (結球及び茎) Subgroup 5-16 | 14.6～35.1 g ai/ha | 140.3 g ai/ha | 収穫当日まで* | 6回以内/年 | 散布 |
| 鱗茎野菜類 Group 3-07 | | | | | |
| 果菜類 Group 8-10 | 35.1～282.1 g ai/ha | 564.2 g ai/ha | | | 土壌処理 |
| | 葉菜類 Subgroup 4-16B | 14.6～35.1 g ai/ha | | | 143.0 g ai/ha |
| | 70.2～282.1 g ai/ha | 564.2 g ai/ha | 土壌処理 | | |


3. 作物残留試験

(1) 分析の概要


【国内】

① 分析対象物質


- ・ オキサチアピプロリン
- ・ 1-[2-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-オキソエチル]-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸 (以下、代謝物Bという)
- ・ 3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸 (以下、代謝物Cという)
- ・ 5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-酢酸 (以下、代謝物Dという)



代謝物B



代謝物C



代謝物D

② 分析法の概要

i) オキサチアピプロリン、代謝物C及び代謝物D

試料からアセトニトリル・ギ酸・水 (50 : 1 : 10) 混液で抽出し、酢酸エチル・ヘキサン (1 : 1) 混液に転溶する。オキサチアピプロリンはSCXカラムとNH₂カラムの連結カラム及びPSAカラムを用いて精製した後、代謝物C及び代謝物DはSCXカラムとNH₂カラムの連結カラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・質量分析計 (LC-MS) で定量する。

ii) オキサチアピプロリン、代謝物B、代謝物C及び代謝物D


試料からアセトニトリル・ギ酸・水 (50 : 1 : 10) 混液で抽出し、酢酸エチル・ヘキサン (1 : 1) 混液に転溶する。オキサチアピプロリンはNH₂カラム及びPSAカラムを用いて精製した後、代謝物B、代謝物C及び代謝物DはNH₂カラムを用いて精製した後、LC-MSで定量する。

| | |
|-----------------|------------|
| 定量限界：オキサチアピプロリン | 0.01 mg/kg |
| 代謝物B | 0.01 mg/kg |
| 代謝物C | 0.01 mg/kg |
| 代謝物D | 0.01 mg/kg |


【海外】

① 分析対象物質


- ・オキサチアピプロリン
- ・代謝物C
- ・代謝物D
- ・1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-イル]エタノン (以下、代謝物Fという)
- ・1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-3-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-イル]エタノン (以下、代謝物Lという)
- ・5-(ヒドロキシメチル)-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-酢酸 (以下、代謝物Xという)
- ・1-β-D-グルコピラノシル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-5-カルボン酸 (以下、代謝物Zという)
- ・3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-5-メタノール (以下、代謝物fという)




代謝物F




代謝物L



代謝物X



代謝物Z



代謝物f

② 分析法の概要

試料からアセトニトリル・ギ酸・水 (120 : 1 : 40) 混液で抽出し、必要に応じてアセトニトリル/ヘキサン分配又はグラファイトカーボンカラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計 (LC-MS/MS) で定量する。

| | |
|-----------------|------------------|
| 定量限界：オキサチアピプロリン | 0.001~0.01 mg/kg |
| 代謝物C | 0.001~0.01 mg/kg |
| 代謝物D | 0.001~0.01 mg/kg |
| 代謝物F | 0.001~0.01 mg/kg |

| | |
|------|------------------|
| 代謝物L | 0.001～0.01 mg/kg |
| 代謝物X | 0.001～0.01 mg/kg |
| 代謝物Z | 0.001～0.01 mg/kg |
| 代謝物f | 0.001～0.01 mg/kg |

(2) 作物残留試験結果

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-1、海外で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-2を参照。

4. 畜産物における推定残留濃度

(1) 家畜残留試験（動物飼養試験）

① 産卵鶏を用いた代謝試験

産卵鶏を用いた残留試験は実施されていないが、放射性同位体標識¹⁴Cを用いた代謝試験が実施されている。

産卵鶏（5羽/群、体重1.34～1.92 kg）に対して、¹⁴Cで標識した2種類の放射性オキサチアピプロリン（[pyrazole-¹⁴C]-oxathiapiprolin 及び [thiazole-¹⁴C]-oxathiapiprolin）を含むカプセルを飼料中濃度として17.4～17.8 ppmに相当する量を14日間にわたり経口投与した。最終投与6時間後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び卵に含まれる総放射性残留物（TRR：Total Radioactive Residues）濃度を測定した。

その結果、オキサチアピプロリンの残留濃度はすべて0.01 mg/kg未満であった。代謝物で0.01 mg eq/kg*を超えて認められたものは代謝物Bのみで、肝臓で0.014 mg eq/kg（7.7～13.5%TRR）の残留が認められた。

* mg eq/kg：親化合物（オキサチアピプロリン）に換算した濃度（mg/kg）

上記の結果に関連して、JMPRは、肉用鶏及び産卵鶏のMDB^{注1)}を0.20 ppm、STMR dietary burden^{注2)}を0.068 ppmと評価している。

JMPRは、産卵鶏を用いた代謝試験の結果から、飼料作物を通じた鶏の畜産物の最大残留濃度を定量限界値である0.01 mg/kg以下とし、暴露評価に用いる各組織及び卵中の残留濃度の中央値（Supervised Trials Median Residue：STMR）を0 mg/kgと評価している。

注1) 最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）：飼料として用いられる全ての飼料品目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露される最大濃度。飼料中濃度として表示される。

注2) 平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden 又は mean dietary burden）：飼料として用いられる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得られた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露される最大濃度。飼料中濃度として表示される。

5. ADI及びARfDの評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委員会あて意見を求めたオキサチアピプロリンに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されている。

(1) ADI

無毒性量：346 mg/kg 体重/day
(動物種) 雄ラット
(投与方法) 混餌
(試験の種類) 2世代繁殖試験
(期間) 2世代
安全係数：100
ADI：3.4 mg/kg 体重/day

(2) ARfD 設定の必要なし

オキサチアピプロリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったため、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。

6. 諸外国における状況

JMPR における毒性評価が行われ、2016年にADIが設定され、ARfDは設定の必要なしと評価されている。国際基準はブロッコリー、果菜類等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてうり科野菜類、トマト等に、カナダにおいてばれいしょ、トマト等に、EUにおいてレタス、トマト等に、豪州においてレタス、たまねぎ等に、ニュージーランドにおいて根菜類に基準値が設定されている。

7. 基準値案

(1) 残留の規制対象

オキサチアピプロリンとする。

国内作物残留試験では代謝物B、代謝物C及び代謝物Dの分析が行われているが、いずれも定量限界未満であること、海外作物残留試験では代謝物C、代謝物D、代謝物F、代謝物L、代謝物X、代謝物Z及び代謝物fが測定されているが、大部分の場合に定量限界未満であることから、残留の規制対象はオキサチアピプロリンのみとする。畜産物においても代謝試験でオキサチアピプロリンを明らかに超える残留を示す代謝物がほとんど認められなかったことから、残留の規制対象はオキサチアピプロリンのみとする。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

(3) 暴露評価対象

オキサチアピプロリンとする。

国内作物残留試験では代謝物B、代謝物C及び代謝物Dの分析が行われているが、いずれも定量限界未満であること、海外作物残留試験では代謝物C、代謝物D、代謝物F、代謝物L、代謝物X、代謝物Z及び代謝物fが測定されているが、大部分の場合に定量限界未満であることから、暴露評価の対象はオキサチアピプロリンのみとする。畜産物においても代謝試験でオキサチアピプロリンを明らかに超える残留を示す代謝物がほとんど認められなかったことから、暴露評価対象物質をオキサチアピプロリンとする。

JMPRでは暴露評価対象物質をオキサチアピプロリン、代謝物C及び代謝物Zとしているが、代謝物Cは親化合物より毒性が低く、代謝物Zは代謝物Cの抱合体であり親化合物よりも毒性が低いことから、暴露評価対象物質をオキサチアピプロリンとする。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質をオキサチアピプロリン（親化合物のみ）としている。

(4) 暴露評価

① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。

| | TMDI/ADI (%) ^{注)} |
|-------------|----------------------------|
| 国民全体 (1歳以上) | 0.6 |
| 幼小児 (1~6歳) | 0.8 |
| 妊婦 | 0.5 |
| 高齢者 (65歳以上) | 0.7 |

注) 各食品の平均摂取量は、平成17~19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

<参考>

| | EDI/ADI (%) ^{注)} |
|-------------|---------------------------|
| 国民全体 (1歳以上) | 0.1 |
| 幼小児 (1~6歳) | 0.2 |
| 妊婦 | 0.1 |
| 高齢者 (65歳以上) | 0.1 |

注) 各食品の平均摂取量は、平成17~19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

オキサチアピプロリンの作物残留試験一覧表 (国内)

| 農作物 | 試験圃場数 | 試験条件 | | | | 各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注) 【オキサチアピプロリン/代謝物B/代謝物C/代謝物D】 |
|---------------|-------|------------|---------------------------|----|-------------|--|
| | | 剤型 | 使用量・使用方法 | 回数 | 経過日数 | |
| ばれいしょ (塊茎) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 187~198 L/10 a | 2 | 7, 14, 21 | 圃場A : <0.01/-/<0.01/<0.01 圃場B : <0.01/-/<0.01/<0.01 |
| はくさい (茎葉) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 200~300 L/10 a | 2 | 1, 3, 7, 14 | 圃場A : *0.04/-/<0.01/<0.01 (*2回, 3日) 圃場B : *0.05/-/<0.01/<0.01 (*2回, 3日) |
| レタス (茎葉) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 200~300 L/10 a | 2 | 1, 3, 7, 14 | 圃場A : *0.14/-/<0.01/<0.01 (*2回, 3日) 圃場B : 0.15/-/<0.01/<0.01 |
| トマト (果実) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 243~280 L/10 a | 2 | 1, 3, 7, 14 | 圃場A : *0.06/<0.01/<0.01/<0.01 (*2回, 3日) 圃場B : *0.04/<0.01/<0.01/<0.01 (*2回, 7日) |
| きゅうり (果実) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 280 L/10 a | 2 | 1, 3, 7, 14 | 圃場A : 0.03/<0.01/<0.01/<0.01 圃場B : 0.04/<0.01/<0.01/<0.01 |
| ぶどう (果実) | 2 | 10.2%フロアブル | 5000倍散布 325~350 L/10 a | 2 | 1, 3, 7, 14 | 圃場A : 0.06/-/<0.01/<0.01 圃場B : 0.15/-/<0.01/<0.01 |

- : 分析せず

適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下の作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について () 内に記載した。

オキサチアピプロリンの作物残留試験一覧表 (米国)

| 農作物 | 試験圃場数 | 試験条件 | | | | 各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注1)} 【オキサチアピプロリン/代謝物C/代謝物D/代謝物F/代謝物L/代謝物X/代謝物Z/ 代謝物E】 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------|---|---|
| | | 剤型 | 総使用量・使用方法 | 回数 | 経過日数 | |
| ブロッコリー (花蕾) | 5 | 10.2% OD剤 | 139~142 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 5 | 圃場A : 0.81/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場B : 0.21/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C : 0.066/<0.003/<0.008/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) |
| | | | | | | 圃場D : 0.17/<0.003/<0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) |
| | | | | | | 圃場E : 0.23/<0.003/<0.01/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 29日) |
| ねぎ (茎葉) | 5 | 10.2% OD剤 | 137.81~149.5 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 4 | 圃場A : 0.400/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場B : 0.450/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C : 0.570/<0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 6日) |
| | | | | | | 圃場D : 0.850/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場E : 0.630/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| ほうれんそう (茎葉) | 10 | 10.2% OD剤 | 136.4~144.8 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 3 | 圃場A : 3.2/<0.003/<0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場B : 2.2/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C : 1.6/<0.003/<0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場D : 2.3/<0.003/<0.006/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場E : 4.0/<0.003/<0.006/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場F : 3.5/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場G : 6.4/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場H : 6.5/<0.003/<0.003/<0.003/<0.005/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場I : 1.4/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場J : 5.7/<0.003/<0.008/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 14日) |
| | | | | | | 圃場K : 0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| ほうれんそう (茎葉) | 13 | 18.7% フロアブル | 549.4~575.4 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 3 | 圃場A : 1.6/<0.003/<0.006/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場B : *2.2/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場C : *2.0/<0.003/<0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場D : 0.12/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場E : *0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場F : *1.8/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場G : *0.013/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場H : 0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場I : 0.11/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (2回, 4日) |
| | | | | | | 圃場J : 0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場K : 0.011/0.026/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| トマト (果実) | 23 | 10.2% OD剤 | 136.3~146.8 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 5 | 圃場A : 0.024/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場B : 0.022/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C : 0.039/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場D : 0.034/<0.003/<0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) |
| | | | | | | 圃場E : 0.023/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場F : 0.032/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場G : 0.048/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場H : 0.078/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場I : 0.032/<0.003/<0.004/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) |
| | | | | | | 圃場J : 0.14/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場K : *0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) |
| | 圃場L : 0.032/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | |
| | 圃場M : 0.042/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | |
| | 圃場N : *0.12/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) | | | | | |
| | 圃場O : 0.10/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | |
| | 圃場P : 0.035/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | |
| | 圃場Q : 0.31/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | |
| | 圃場R : *0.009/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) | | | | | |
| | 圃場S : *0.031/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) | | | | | |
| | 圃場T : *0.009/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 5日) | | | | | |
| | 圃場U : *0.079/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*4回, 10日) | | | | | |
| 圃場V : 0.047/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場W : 0.075/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 24 | 18.7% フロアブル | 553.8~610.9 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 5 | 圃場A : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場B : <0.003/<0.003/<0.004/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 5日) | |
| | | | | | 圃場C : *0.005/<0.003/<0.006/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (*2回, 5日) | |
| | | | | | 圃場D : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場E : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場F : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場G : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場H : 0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場I : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| | | | | | 圃場J : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | |
| 圃場K : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場L : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場M : 0.009/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場N : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場O : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場P : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場Q : 0.24/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場R : 0.028/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場S : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場T : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場U : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場V : <0.003/0.011/0.016/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/0.005/<0.003 | | | | | | |
| 圃場W : <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場X : 0.086/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |

オキサチアピプロリンの作物残留試験一覧表 (米国)

| 農作物 | 試験圃場数 | 試験条件 | | | 各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注1) | |
|--|-------|----------------|---|-----|---|--|
| | | 剤型 | 総使用量・使用方法 | 回数 | 経過日数 | 【オキサチアピプロリン/代謝物C/代謝物D/代謝物F/代謝物L/代謝物X/代謝物Z/代謝物F】 |
| とうがらし (果実) | 6 | 10.2% OD剤 | 142~156 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 5 0, 4, 11, 15, 30 | 圃場A: *0.029/<0.003/*0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※4回, 5日) |
| | | | | | | 圃場B: 0.084/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | 3 | 10.2% OD剤 | 559~574 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 5 0, 6 | 圃場A: <0.003/<0.003/*0.016/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※2回, 5日) |
| | | | | | | 圃場B: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | 4 | 18.7% フロアブル | 546~562 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 5 9, 13, 28 | 圃場A: <0.003/*0.003/*0.010/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※2回, 4日) |
| | | | | | | 圃場C: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| スカッシュ (果実) | 10 | 10.2% OD剤 | 138~149 g ai/ha 散布 | 4 | 0, 3 0, 3, 6, 13, 28 | 圃場A: 0.12/*0.004/*0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場B: 0.020/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C: 0.030/<0.003/*0.007/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場D: 0.023/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場E: 0.01/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場F: 0.083/<0.003/*0.005/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※4回, 3日) |
| | | | | | | 圃場G: 0.039/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場H: 0.033/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場I: 0.031/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場J: 0.039/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| スカッシュ (果実) | 1 | 10.2% OD剤 | 560 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 3 | 圃場A: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場B: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | 10 | 18.7% フロアブル | 557~578 g ai/ha 土壌処理 | 2 | 0, 3 8, 5, 30 | 圃場A: 0.007/<0.003/*0.004/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場B: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場C: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場D: 0.026/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場E: *0.017/<0.003/*0.014/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※2回, 3日) |
| | | | | | | 圃場F: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場G: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| | | | | | | 圃場H: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 |
| 圃場I: 0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 | | | | | | |
| 圃場J: <0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003/<0.003 (※2回, 8日) | | | | | | |
| オレンジ (果実全体) | 12 | 18.7% フロアブル | 0.272~0.288 lb ai/A (305~323 g ai/ha) 土壌処理+散布 | 2+1 | 0 0, 3, 7, 10, 13 0 0, 3, 7, 10, 15 0 | 圃場A: 0.0104/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場B: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場C: 0.0158/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場D: 0.0244/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場E: 0.0178/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 (3日, 3回) |
| | | | | | | 圃場F: 0.0217/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場G: 0.0216/<0.01/<0.01/<0.0241/0.0244/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場H: 0.0198/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場I: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場J: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| グレープフルーツ (果実全体) | 6 | 18.7% フロアブル | 0.269~0.289 lb ai/A (301~324 g ai/ha) 土壌処理+散布 | 2+1 | 0 0, 3, 7, 10, 13 0 | 圃場A: 0.0115/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場B: 0.0113/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場C: 0.0182/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場D: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| レモン (果実全体) | 5 | 18.7% フロアブル | 0.277~0.283 lb ai/A (310~317 g ai/ha) 土壌処理+散布 | 2+1 | 0 0, 3, 7, 10, 14 | 圃場A: 0.0148/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場B: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場C: <0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場D: 0.0222/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |
| | | | | | | 圃場E: 0.0333/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01 |

オキサチアピプロリンの作物残留試験一覧表 (米国)

| 農作物 | 試験圃場数 | 試験条件 | | | | 各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注1) |
|--|-------|---|----------------------------|---|------|---|
| | | 剤型 | 総使用量・使用方法 | 回数 | 経過日数 | 【オキサチアピプロリン/代謝物C/代謝物D/代謝物F/代謝物L/代謝物X/代謝物Z/代謝物f】 |
| ぶどう注2) (果実) | 18 | 10.2% OD剤 | 97.51~125.09 g ai/ha 散布 | 2 | 14 | 圃場A : 0.034/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場B : 0.20/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場C : 0.021/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場D : 0.029/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場E : 0.21/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場F : 0.23/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- |
| | | | | | | 圃場G : 0.20/<0.01/0.003/-/-/-/-/- |
| | | | 15 | 圃場H : 0.037/<0.01/<0.01/-/-/-/-/- | | |
| | | | 9~11 | 圃場I : 0.018/<0.01/0.006/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | |
| | | 圃場J : 0.060/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場K : 0.11/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場L : 0.13/<0.01/<0.01/0.004/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場M : 0.049/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場N : 0.049/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| 圃場O : 0.37/<0.01/0.007/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | | | |
| | | 圃場P : 0.044/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場Q : 0.41/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |
| | | 圃場R : 0.31/<0.01/<0.01/<0.01/<0.01/-/-/-/# | | | | |

OD剤 = Oil Dispersion剤

- : 分析せず

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

注1) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下の作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について () 内に記載した。

注2) ぶどうの米国基準値 (インポートトレランスのみ) の根拠となった作物残留試験は、EUの使用量 (10.2%OD剤、最大総使用量120 g ai/ha(0.107 lb ai/A)、PHI (Pre-Harvest Interval)= 14日、使用回数2回) により、EUで実施された。

| 食品名 | 基準値 案 ppm | 基準値 現行 ppm | 登録 有無 | 参考基準値 | | 作物残留試験成績等 ppm |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | 国際 基準 ppm | 外国 基準値 ppm | |
| とうもろこし | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 大豆 | 0.01 | | IT | 0.01 | | |
| ばれいしょ | 0.05 | 0.05 | ○ | 0.04 | | <0.01,<0.01(¥) |
| さといも類(やつがしらを含む。) | 0.04 | | | 0.04 | | |
| かんしょ | 0.04 | | | 0.04 | | |
| やまいも(長いもをいう。) | 0.04 | | | 0.04 | | |
| こんにゃくいも | 0.04 | | | 0.04 | | |
| その他のいも類 | 0.04 | | | 0.04 | | |
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | 10 | | | 10 | | |
| かぶ類の葉 | 10 | | | 10 | | |
| クレソン | 10 | 15 | | 10 | | |
| はくさい | 10 | 2 | ○ | 10 | | |
| キャベツ | 2 | 2 | ○ | 0.7 | 1.5 米国 | 【米国ブロッコリー(0.066~0.81(n=5))】 |
| 芽キャベツ | 2 | 2 | | | 1.5 米国 | 【米国ブロッコリー参照】 |
| ケール | 10 | | | 10 | | |
| こまつな | 10 | | | 10 | | |
| きょうな | 10 | | | 10 | | |
| チンゲンサイ | 10 | | | 10 | | |
| カリフラワー | 2 | 2 | | 0.3 | 1.5 米国 | 【米国ブロッコリー参照】 |
| ブロッコリー | 2 | 2 | | 1.5 | | |
| その他のあぶらな科野菜 | 10 | 2 | IT | 10 | | |
| エンダイブ | 15 | 15 | | | 15 米国 | 【米国ほうれんそう(1.4~6.5(n=10))】 |
| しゅんぎく | 15 | 15 | | | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) | 15 | 15 | ○ | 5 | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| その他のきく科野菜 | 15 | 15 | | | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| たまねぎ | 0.04 | 0.04 | ○ | 0.04 | | |
| ねぎ(リーキを含む。) | 2 | 2 | ○ | 2 | | |
| にんにく | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | | |
| にら | 2 | 2 | | | 2.0 米国 | 【米国ねぎ(0.400~0.850(n=5))】 |
| アスパラガス | 2 | | IT | 2 | | |
| わけぎ | 0.04 | | | 0.04 | | |
| その他のゆり科野菜 | 2 | 2 | | 2 | | |
| パセリ | 15 | 15 | | | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| トマト | 0.5 | 0.5 | ○ | 0.4 | 0.50 米国 | 【0.005~0.31(n=23)(米国)】 |
| ピーマン | 0.5 | 0.5 | | 0.4 | 0.50 米国 | 【米国トマト参照】 |
| なす | 0.5 | 0.5 | | 0.4 | 0.50 米国 | 【米国トマト参照】 |
| その他のなす科野菜 | 0.5 | 0.5 | | 0.4 | 0.50 米国 | 【米国トマト参照】 |
| きゅうり(ガーキンを含む。) | 0.2 | 0.2 | ○ | 0.2 | | 0.03,0.04(¥) |
| かぼちゃ(スカッシュを含む。) | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | |
| しろうり | 0.2 | | | 0.2 | | |
| すいか | | 0.01 | | | | |
| すいか(果皮を含む。) | 0.2 | | | 0.2 | | |
| メロン類果実 | | 0.01 | | | | |
| メロン類果実(果皮を含む。) | 0.2 | | | 0.2 | | |
| まくわうり(果皮を含む。) | 0.2 | | | 0.2 | | |
| その他のうり科野菜 | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | |
| ほうれんそう | 15 | 15 | | 15 | | |
| オクラ | 0.5 | 0.5 | | 0.4 | 0.50 米国 | 【米国トマト参照】 |
| 未成熟えんどう | 1 | 1 | | 1 | | |

| 食品名 | 基準値案 ppm | 基準値 現行 ppm | 登録 有無 | 参考基準値 | | 作物残留試験成績等 ppm |
|--------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|
| | | | | 国際 基準 ppm | 外国 基準値 ppm | |
| その他の野菜 | 15 | 15 | | 2 | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| みかん(外果皮を含む。) | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン(<0.01~0.0333(n=5))】 |
| なつみかんの果実全体 | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| レモン | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| グレープフルーツ | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| ライム | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| その他のかんきつ類果実 | 0.06 | | IT | 0.05 | 0.06 米国 | 【米国レモン参照】 |
| ラズベリー | 0.5 | | IT | 0.5 | | |
| ブラックベリー | 0.5 | | IT | 0.5 | | |
| その他のベリー類果実 | 0.5 | | IT | 0.5 | | |
| ぶどう | 0.9 | 0.7 | ○ | 0.9 | | |
| その他の果実 | 0.5 | 0.5 | | 0.4 | 0.50 米国 | 【米国トマト参照】 |
| ひまわりの種子 | 0.01 | | IT | 0.01 | | |
| その他のスパイス | 0.05 | | IT | 0.05 | | |
| その他のハーブ | 15 | 15 | | 10 | 15 米国 | 【米国ほうれんそう参照】 |
| 鶏の筋肉 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの筋肉 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 鶏の脂肪 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの脂肪 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 鶏の肝臓 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの肝臓 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 鶏の腎臓 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの腎臓 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 鶏の食用部分 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの食用部分 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 鶏の卵 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| その他の家きんの卵 | 0.01 | | | 0.01 | | |
| トマト(乾燥させたもの) | | | | 3 | | ※ |
| とうがらし(乾燥させたもの) | | | | 4 | | ※ |
| 干しぶどう | | | | 1.3 | | ※ |
| バジル(乾燥させたもの) | | | IT | 80 | | ※ |

申請(国内における登録、承認等の申請、インポートライセンス申請)以外の理由により本基準(暫定基準以外の基準)を見直す基準値案については、太枠線で囲んで示した。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、インポートライセンス申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

(¥)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。

※加工食品であるトマト(乾燥させたもの)、とうがらし(乾燥させたもの)、干しぶどう及びバジル(乾燥させたもの)について、国際基準が設定されているが、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えないことから、基準値を設定しないこととする。基準値が設定されていない加工食品については、原材料の基準値に基づき加工係数を考慮して適否を判断することとする。なお、本物質について、JMPRはトマト(乾燥させたもの)、とうがらし(乾燥させたもの)及び干しぶどうの加工係数を6.9、10及び1.4と算出している。バジル(乾燥させたもの)の加工係数についてはJMPRのデータを基に8.5と算出した。

オキサチアピプロリンの推定摂取量 (単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

| 食品名 | 基準値案 (ppm) | 暴露評価に 用いた数値 (ppm) | 国民全体 (1歳以上) TMDI | 国民全体 (1歳以上) EDI | 幼児 (1~6歳) TMDI | 幼児 (1~6歳) EDI | 妊婦 TMDI | 妊婦 EDI | 高齢者 (65歳以上) TMDI | 高齢者 (65歳以上) EDI |
|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| とうもろこし | 0.01 | 0.112 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 |
| 大豆 | 0.01 | 0.176 | 0.4 | 6.9 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 8.1 |
| ばれいしょ | 0.05 | 0.01 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4 |
| さといも類 (やつがしらを含む。) | 0.04 | 0.116 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| かんしょ | 0.04 | 0.116 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 |
| やまいも (長いものをいう。) | 0.04 | 0.116 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| こんにやくいも | 0.04 | 0.116 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| その他のいも類 | 0.04 | 0.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| だいこん類 (ラディッシュを含む。) | 10 | 3.28 | 17.0 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | 31.0 | 10.2 | 28.0 | 9.2 |
| かぶ類の葉 | 10 | 3.28 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 2.0 |
| クレソン | 10 | 3.28 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| はくさい | 10 | 0.297 | 177.0 | 5.3 | 51.0 | 1.5 | 166.0 | 4.9 | 216.0 | 6.4 |
| キャベツ | 2 | 0.297 | 48.2 | 7.2 | 23.2 | 3.4 | 38.0 | 5.6 | 47.6 | 7.1 |
| 芽キャベツ | 2 | 0.297 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ケール | 10 | 3.28 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 |
| こまつな | 10 | 3.28 | 50.0 | 16.4 | 18.0 | 5.9 | 64.0 | 21.0 | 64.0 | 21.0 |
| きょうな | 10 | 3.28 | 22.0 | 7.2 | 4.0 | 1.3 | 14.0 | 4.6 | 27.0 | 8.9 |
| チンゲンサイ | 10 | 3.28 | 18.0 | 5.9 | 7.0 | 2.3 | 18.0 | 5.9 | 19.0 | 6.2 |
| カリフラワー | 2 | 0.297 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
| ブロッコリー | 2 | 0.297 | 10.4 | 1.5 | 6.6 | 1.0 | 11.0 | 1.6 | 11.4 | 1.7 |
| その他のあぶらな科野菜 | 10 | 3.104 | 34.0 | 10.6 | 6.0 | 1.9 | 8.0 | 2.5 | 48.0 | 14.9 |
| エンダイブ | 15 | 3.68 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
| しゅんぎく | 15 | 3.68 | 22.5 | 5.5 | 4.5 | 1.1 | 39.0 | 9.6 | 37.5 | 9.2 |
| レタス (サラダ菜及びちしゃを含む。) | 15 | 3.68 | 144.0 | 35.3 | 66.0 | 16.2 | 171.0 | 42.0 | 138.0 | 33.9 |
| その他のきく科野菜 | 15 | 3.68 | 22.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 9.0 | 2.2 | 39.0 | 9.6 |
| たまねぎ | 0.04 | 0.011 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 |
| ねぎ (リーキを含む。) | 2 | 0.58 | 18.8 | 5.5 | 7.4 | 2.1 | 13.6 | 3.9 | 21.4 | 6.2 |
| にんにく | 0.04 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| にら | 2 | 0.58 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 3.6 | 1.0 | 4.2 | 1.2 |
| アスパラガス | 2 | 0.681 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 1.7 |
| わけぎ | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のゆり科野菜 | 2 | 0.656 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.8 |
| パセリ | 15 | 3.68 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 3.0 | 0.7 |
| トマト | 0.5 | 0.059 | 16.1 | 1.9 | 9.5 | 1.1 | 16.0 | 1.9 | 18.3 | 2.2 |
| ピーマン | 0.5 | 0.059 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 2.5 | 0.3 |
| なす | 0.5 | 0.059 | 6.0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 8.6 | 1.0 |
| その他のなす科野菜 | 0.5 | 0.059 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| きゅうり (ガーキンを含む。) | 0.2 | 0.035 | 4.1 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 5.1 | 0.9 |
| かぼちゃ (スカッシュを含む。) | 0.2 | 0.035 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 |
| しろうり | 0.2 | 0.035 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| すいか (果皮を含む。) | 0.2 | 0.035 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | 0.4 |
| メロン類果実 (果皮を含む。) | 0.2 | 0.035 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| まくわうり (果皮を含む。) | 0.2 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| その他のうり科野菜 | 0.2 | 0.035 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| ほうれんそう | 15 | 3.7 | 192.0 | 47.4 | 88.5 | 21.8 | 213.0 | 52.5 | 261.0 | 64.4 |
| オクラ | 0.5 | 0.059 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 未成熟えんどう | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.9 |
| その他の野菜 | 15 | 3.68 | 201.0 | 49.3 | 94.5 | 23.2 | 151.5 | 37.2 | 211.5 | 51.9 |
| みかん (外果皮を含む。) | 0.06 | 0.018 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 |
| なつみかんの果実全体 | 0.06 | 0.018 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| レモン | 0.06 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| オレンジ (ネーブルオレンジを含む。) | 0.06 | 0.016 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| グレープフルーツ | 0.06 | 0.012 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| ライム | 0.06 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のかんきつ類果実 | 0.06 | 0.018 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| ラズベリー | 0.5 | 0.056 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ブラックベリー | 0.5 | 0.056 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| その他のベリー類果実 | 0.5 | 0.056 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ぶどう | 0.9 | 0.14 | 7.8 | 1.2 | 7.4 | 1.1 | 18.2 | 2.8 | 8.1 | 1.3 |
| その他の果実 | 0.5 | 0.059 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| ひまわりの種子 | 0.01 | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のスパイス | 0.05 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他のハーブ | 15 | 3.68 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 21.0 | 5.2 |
| 家さんの肉類 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 家さんの卵類 | 0.01 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 計 | | | 1061.6 | 234.2 | 429.7 | 98.2 | 1021.5 | 224.6 | 1278.4 | 284.3 |
| ADI比 (%) | | | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

TMDI試算法: 基準値案×各食品の平均摂取量

EDI: 推定1日摂取量 (Estimated Daily Intake)

EDI試算法: 作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

とうもろこし、大豆、さといも類 (やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも (長いものをいう。)、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類 (ラディッシュを含む。)) の葉、かぶ類の葉、はくさい、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、たまねぎ、ねぎ (リーキを含む。)、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、きゅうり (ガーキンを含む。)、かぼちゃ (スカッシュを含む。)、しろうり、すいか (果皮を含む。)、メロン類果実 (果皮を含む。)、まくわうり (果皮を含む。)、その他のうり科野菜、ほうれんそう、未成熟えんどう、ラズベリー、ブラックベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、ひまわりの種子、その他のスパイス、家さんの肉類及び家さんの卵類については、JMPPの評価に用いられた残留試験データを用いてEDI試算をした。なお、JMPPの評価に用いられた残留試験データには、オキサチアピプロリンに加えて代謝物C及び代謝物Zの残留濃度が含まれている。

(参考)

これまでの経緯

| | | |
|-------|--------|---|
| 平成27年 | 2月20日 | 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：ばれいしょ、はくさい等） |
| 平成27年 | 3月9日 | 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請 |
| 平成27年 | 7月7日 | 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知 |
| 平成27年 | 9月29日 | 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 |
| 平成28年 | 4月4日 | 残留農薬基準告示 |
| 平成28年 | 3月22日 | インポートトレランス申請（キャベツ、たまねぎ等） |
| 平成28年 | 7月11日 | 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請 |
| 平成28年 | 9月6日 | 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知 |
| 平成28年 | 12月27日 | 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 |
| 平成29年 | 7月18日 | 残留農薬基準告示 |
| 平成30年 | 3月7日 | インポートトレランス申請（だいず、レモン等） |
| 令和元年 | 7月31日 | 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請 |
| 令和元年 | 10月15日 | 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知 |
| 令和2年 | 3月24日 | 薬事・食品衛生審議会へ諮問 |
| 令和2年 | 4月3日 | 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 |

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- 穂山 浩 国立医薬品食品衛生研究所食品部長
石井 里枝 埼玉県衛生研究所副所長（兼）食品微生物検査室長
井之上 浩一 学校法人立命館立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室教授
大山 和俊 一般財団法人残留農薬研究所化学部長
折戸 謙介 学校法人麻布獣医学園麻布大学獣医学部生理学教授
魏 民 公立大学法人大阪大阪市立大学大学院医学研究科
環境リスク評価学准教授
佐々木 一昭 国立大学法人東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授
佐野 元彦 国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授
瀧本 秀美 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長
永山 敏廣 学校法人明治薬科大学薬学部特任教授
根本 了 国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長
二村 睦子 日本生活協同組合連合会組織推進本部長
宮井 俊一 元 一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問
吉成 浩一 静岡県公立大学法人静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授

(○：部会長)

答申(案)

オキサチアピプロリン

| 食品名 | 残留基準値 ppm |
|----------------------------|--------------|
| とうもろこし | 0.01 |
| 大豆 | 0.01 |
| ばれいしょ | 0.05 |
| さといも類(やつがしらを含む。) | 0.04 |
| かんしょ | 0.04 |
| やまいも(長いもをいう。) | 0.04 |
| こんにやくいも | 0.04 |
| その他のいも類 ^{注1)} | 0.04 |
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | 10 |
| かぶ類の葉 | 10 |
| クレソン | 10 |
| はくさい | 10 |
| キャベツ | 2 |
| 芽キャベツ | 2 |
| ケール | 10 |
| こまつな | 10 |
| きょうな | 10 |
| チンゲンサイ | 10 |
| カリフラワー | 2 |
| ブロッコリー | 2 |
| その他のあぶらな科野菜 ^{注2)} | 10 |
| エンダイブ | 15 |
| しゅんぎく | 15 |
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) | 15 |
| その他のきく科野菜 ^{注3)} | 15 |
| たまねぎ | 0.04 |
| ねぎ(リーキを含む。) | 2 |
| にんにく | 0.04 |
| にら | 2 |
| アスパラガス | 2 |
| わけぎ | 0.04 |
| その他のゆり科野菜 ^{注4)} | 2 |
| パセリ | 15 |
| トマト | 0.5 |
| ピーマン | 0.5 |
| なす | 0.5 |
| その他のなす科野菜 ^{注5)} | 0.5 |

| 食品名 | 残留基準値 ppm |
|------------------------------|--------------|
| きゅうり(ガーキンを含む。) | 0.2 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む。) | 0.2 |
| しろうり | 0.2 |
| すいか(果皮を含む。) | 0.2 |
| メロン類果実(果皮を含む。) | 0.2 |
| まくわうり(果皮を含む。) | 0.2 |
| その他のうり科野菜 ^{注6)} | 0.2 |
| ほうれんそう | 15 |
| オクラ | 0.5 |
| 未成熟えんどう | 1 |
| その他の野菜 ^{注7)} | 15 |
| みかん(外果皮を含む。) | 0.06 |
| なつみかんの果実全体 | 0.06 |
| レモン | 0.06 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | 0.06 |
| グレープフルーツ | 0.06 |
| ライム | 0.06 |
| その他のかんきつ類果実 ^{注8)} | 0.06 |
| ラズベリー | 0.5 |
| ブラックベリー | 0.5 |
| その他のベリー類果実 ^{注9)} | 0.5 |
| ぶどう | 0.9 |
| その他の果実 ^{注10)} | 0.5 |
| ひまわりの種子 | 0.01 |
| その他のスパイス ^{注11)} | 0.05 |
| その他のハーブ ^{注12)} | 15 |
| 鶏の筋肉 | 0.01 |
| その他の家きん ^{注13)} の筋肉 | 0.01 |
| 鶏の脂肪 | 0.01 |
| その他の家きんの脂肪 | 0.01 |
| 鶏の肝臓 | 0.01 |
| その他の家きんの肝臓 | 0.01 |
| 鶏の腎臓 | 0.01 |
| その他の家きんの腎臓 | 0.01 |
| 鶏の食用部分 | 0.01 |
| その他の家きんの食用部分 ^{注14)} | 0.01 |
| 鶏の卵 | 0.01 |
| その他の家きんの卵 | 0.01 |

注1)「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにやくいも以外のものをいう。

注2)「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

注3)「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。

注4)「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

注5)「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

注6)「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

注7)「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

注8)「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

注9)「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

注10)「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

注11)「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注12)「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

注13)「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

注14)「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。



府 食 第 394 号
令和元年 10 月 15 日

厚生労働大臣
加藤 勝信 殿

食品安全委員会
委員長 佐藤 洋



食品健康影響評価の結果の通知について

令和元年 7 月 31 日付け厚生労働省発生食 0731 第 4 号をもって厚生労働大臣から食品安全委員会に意見を求められたオキサチアピプロリンに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第 2 項の規定に基づき通知します。

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。

記

オキサチアピプロリンの許容一日摂取量を 3.4 mg/kg 体重/日と設定し、急性参照用量は設定する必要がないと判断した。

別 添

農薬評価書

オキサチアピプロリン

(第3版)

2019年10月
食品安全委員会

目次

| | 頁 |
|-----------------------------|----|
| ○ 審議の経緯..... | 4 |
| ○ 食品安全委員会委員名簿..... | 5 |
| ○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿..... | 5 |
| ○ 要約..... | 7 |
| | |
| I. 評価対象農薬の概要..... | 8 |
| 1. 用途..... | 8 |
| 2. 有効成分の一般名..... | 8 |
| 3. 化学名..... | 8 |
| 4. 分子式..... | 8 |
| 5. 分子量..... | 8 |
| 6. 構造式..... | 8 |
| 7. 開発の経緯..... | 9 |
| | |
| II. 安全性に係る試験の概要..... | 10 |
| 1. 動物体内運命試験..... | 10 |
| (1) ラット①..... | 10 |
| (2) ラット②..... | 17 |
| 2. 植物体内運命試験..... | 19 |
| (1) ばれいしょ①..... | 19 |
| (2) ばれいしょ②..... | 21 |
| (3) レタス①..... | 22 |
| (4) レタス②..... | 24 |
| (5) ぶどう..... | 26 |
| (6) ズッキーニ..... | 27 |
| 3. 土壌中運命試験..... | 28 |
| (1) 好氣的土壌中運命試験..... | 28 |
| (2) 好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験..... | 29 |
| (3) 土壌吸着試験①..... | 30 |
| (4) 土壌吸着試験②..... | 30 |
| (5) 土壌表面光分解試験..... | 30 |
| 4. 水中運命試験..... | 31 |
| (1) 加水分解試験..... | 31 |
| (2) 水中光分解試験（緩衝液及び自然水）..... | 31 |
| 5. 土壌残留試験..... | 32 |
| 6. 作物残留試験..... | 32 |

| | |
|---------------------------|----|
| (1) 作物残留試験 | 32 |
| (2) 推定摂取量 | 32 |
| 7. 一般薬理試験 | 33 |
| 8. 急性毒性試験 | 33 |
| (1) 急性毒性試験 | 33 |
| (2) 急性神経毒性試験（ラット） | 34 |
| 9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 | 34 |
| 10. 亜急性毒性試験 | 34 |
| (1) 28日間亜急性毒性試験（ラット） | 34 |
| (2) 90日間亜急性毒性試験（ラット） | 35 |
| (3) 28日間亜急性毒性試験（マウス） | 35 |
| (4) 90日間亜急性毒性試験（マウス） | 36 |
| (5) 90日間亜急性毒性試験（イヌ） | 36 |
| (6) 28日間亜急性毒性試験（イヌ）＜参考資料＞ | 36 |
| (7) 28日間亜急性経皮毒性試験（ラット） | 37 |
| (8) 28日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物C） | 37 |
| 11. 慢性毒性試験及び発がん性試験 | 38 |
| (1) 1年間慢性毒性試験（イヌ） | 38 |
| (2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット） | 38 |
| (3) 18か月間発がん性試験（マウス） | 39 |
| 12. 生殖発生毒性試験 | 39 |
| (1) 2世代繁殖試験（ラット） | 39 |
| (2) 1世代繁殖試験（ラット）＜参考資料＞ | 41 |
| (3) 発生毒性試験（ラット） | 42 |
| (4) 発生毒性試験（ウサギ） | 42 |
| 13. 遺伝毒性試験 | 42 |
| 14. その他の試験 | 45 |
| (1) 14日間反復投与毒性試験（ラット） | 45 |
| (2) 28日間免疫毒性試験（マウス） | 45 |
| (3) 内分泌系への影響 | 46 |
| III. 食品健康影響評価 | 47 |
| ・別紙1：代謝物/分解物略称 | 52 |
| ・別紙2：検査値等略称 | 55 |
| ・別紙3：作物残留試験成績（国内） | 56 |
| ・別紙4：作物残留試験成績（海外） | 58 |
| ・別紙5：推定摂取量 | 97 |

· 参照 98

<審議の経緯>

—第1版関係—

- | | | | |
|-------|----|-----|--|
| 2015年 | 2月 | 20日 | 農林水産省から厚生労働省へ登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（新規：ばれいしょ、はくさい等） |
| 2015年 | 3月 | 9日 | 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安0309第1号） |
| 2015年 | 3月 | 10日 | 関係書類の接受（参照1～66） |
| 2015年 | 3月 | 17日 | 第553回食品安全委員会（要請事項説明） |
| 2015年 | 4月 | 22日 | 第44回農薬専門調査会評価第四部会 |
| 2015年 | 5月 | 15日 | 第123回農薬専門調査会幹事会 |
| 2015年 | 5月 | 26日 | 第562回食品安全委員会（報告） |
| 2015年 | 5月 | 27日 | から2015年6月25日まで 国民からの意見・情報の募集 |
| 2015年 | 6月 | 29日 | 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告 |
| 2015年 | 7月 | 7日 | 第569回食品安全委員会（報告） （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照68） |
| 2016年 | 4月 | 4日 | 残留農薬基準告示（参照69） |

—第2版関係—

- | | | | |
|-------|----|-----|--|
| 2016年 | 3月 | 22日 | インポートトレランス設定の要請（キャベツ、たまねぎ等） |
| 2016年 | 7月 | 11日 | 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食0711第1号） |
| 2016年 | 7月 | 13日 | 関係書類の接受（参照70～84） |
| 2016年 | 7月 | 19日 | 第615回食品安全委員会（要請事項説明） |
| 2016年 | 9月 | 6日 | 第621回食品安全委員会（審議） （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照85） |
| 2017年 | 7月 | 18日 | 残留農薬基準告示（参照86） |

—第3版関係—

- | | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 2018年 | 3月 | 7日 | インポートトレランス設定の要請（だいず、レモン等） |
| 2019年 | 7月 | 31日 | 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食0731第4号）、関係書類の接受（参照87～97） |
| 2019年 | 8月 | 6日 | 第752回食品安全委員会（要請事項説明） |
| 2019年 | 10月 | 15日 | 第761回食品安全委員会（審議） （同日付厚生労働大臣へ通知） |

<食品安全委員会委員名簿>

| (2015年6月30日まで) | (2017年1月6日まで) | (2018年7月1日から) |
|----------------|---------------|---------------|
| 熊谷 進 (委員長) | 佐藤 洋 (委員長) | 佐藤 洋 (委員長) |
| 佐藤 洋 (委員長代理) | 山添 康 (委員長代理) | 山本茂貴 (委員長代理) |
| 山添 康 (委員長代理) | 熊谷 進 | 川西 徹 |
| 三森国敏 (委員長代理) | 吉田 緑 | 吉田 緑 |
| 石井克枝 | 石井克枝 | 香西みどり |
| 上安平冽子 | 堀口逸子 | 堀口逸子 |
| 村田容常 | 村田容常 | 吉田 充 |

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2016年3月31日まで)

| | | |
|-------------|-------|-------|
| ・幹事会 | | |
| 西川秋佳 (座長) | 小澤正吾 | 林 真 |
| 納屋聖人 (座長代理) | 三枝順三 | 本間正充 |
| 赤池昭紀 | 代田眞理子 | 松本清司 |
| 浅野 哲 | 永田 清 | 與語靖洋 |
| 上路雅子 | 長野嘉介 | 吉田 緑* |
| ・評価第一部会 | | |
| 上路雅子 (座長) | 清家伸康 | 藤本成明 |
| 赤池昭紀 (座長代理) | 林 真 | 堀本政夫 |
| 相磯成敏 | 平塚 明 | 山崎浩史 |
| 浅野 哲 | 福井義浩 | 若栗 忍 |
| 篠原厚子 | | |
| ・評価第二部会 | | |
| 吉田 緑 (座長) * | 腰岡政二 | 細川正清 |
| 松本清司 (座長代理) | 佐藤 洋 | 本間正充 |
| 小澤正吾 | 杉原数美 | 山本雅子 |
| 川口博明 | 根岸友恵 | 吉田 充 |
| 栗形麻樹子 | | |
| ・評価第三部会 | | |
| 三枝順三 (座長) | 高木篤也 | 中山真義 |
| 納屋聖人 (座長代理) | 田村廣人 | 八田稔久 |
| 太田敏博 | 中島美紀 | 増村健一 |
| 小野 敦 | 永田 清 | 義澤克彦 |
| ・評価第四部会 | | |
| 西川秋佳 (座長) | 佐々木有 | 本多一郎 |

長野嘉介（座長代理）
井上 薫**
加藤美紀

代田真理子
玉井郁巳
中塚敏夫

森田 健
山手丈至
與語靖洋

* : 2015年6月30日まで

** : 2015年9月30日まで

要 約

ピペリジニル・チアゾール・イソキサゾリン系殺菌剤である「オキサチアピプロリン」(CAS No. 1003318-67-9)について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、海外作物残留試験(だいず、レモン等)の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命(ラット)、植物体内運命(ばれいしょ、レタス等)、作物残留、亜急性毒性(ラット、マウス及びイヌ)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性併合(ラット)、発がん性(マウス)、2世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、遺伝毒性、免疫毒性等の試験成績である。

各種毒性試験結果から、オキサチアピプロリン投与による影響は、ラット2世代繁殖試験における児動物の体重増加抑制及び包皮分離完了日齢遅延のみに認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

各試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をオキサチアピプロリン(親化合物のみ)と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2世代繁殖試験の346 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した3.4 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量(ADI)と設定した。

また、オキサチアピプロリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、急性参照用量(ARfD)は設定する必要がないと判断した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺菌剤

2. 有効成分の一般名

和名：オキサチアピプロリン

英名：oxathiapiprolin

3. 化学名

IUPAC

和名：1-(4-{4-[(5*RS*)-5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-イル]エタノン


英名：1-(4-{4-[(5*RS*)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]ethanone

CAS (No. 1003318-67-9)

和名：1-[4-[4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-3-イソキサゾリル]-2-チアゾリル]-1-ピペリジニル]-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1*H*-ピラゾール-1-イル]エタノン

英名：1-[4-[4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]-2-thiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]ethanone


4. 分子式



5. 分子量

539.53

6. 構造式



(ラセミ体、*R*体：*S*体=1：1)

7. 開発の経緯

オキサチアピプロリンは、米国デュポン社によって開発されたピペリジニル・チアゾール・イソキサゾリン系の殺菌剤であり、オキシステロール結合タンパクに作用し、卵菌類に分類されるべと病菌や疫病菌に対して殺菌効果を示すと考えられている。今回、インポートトレランス設定（だいず、レモン等）の要請がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験 [II. 1~4] は、オキサチアピプロリンのイソキサゾリン環の 5 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[iso- ^{14}C] オキサチアピプロリン」という。）、ピラゾール環の 5 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[pyr- ^{14}C] オキサチアピプロリン」という。）及びチアゾール環の 5 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[thi- ^{14}C] オキサチアピプロリン」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からオキサチアピプロリンの濃度（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は、別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット①

①吸収

a. 血中濃度推移

SD ラット（一群雌雄各 4 匹）に [iso- ^{14}C] オキサチアピプロリン又は [pyr- ^{14}C] オキサチアピプロリンを 10 mg/kg 体重（以下 [1. (1) 及び (2)] において「低用量」という。）又は 200 mg/kg 体重（以下 [1. (1) 及び (2)] において「高用量」という。）で単回経口投与して、血中濃度推移が検討された。

各投与群の血漿中の放射能から得られた薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

高用量群では、吸収率が低く消失相での放射能濃度が定量限界未満であり、投与 30 時間後までの血漿中放射能濃度を用いて $T_{1/2}$ を算出したことから、低用量群と比較して短い $T_{1/2}$ が得られた。（参照 2、3）

表 1 薬物動態学的パラメータ

| 投与量 (mg/kg 体重) | 10 | | | | 200 | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | [iso- ^{14}C] | | [pyr- ^{14}C] | | [iso- ^{14}C] | | [pyr- ^{14}C] | |
| 性別 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| C_{\max} ($\mu\text{g/g}$) | 0.39 | 0.81 | 0.17 | 0.27 | 2.53 | 2.82 | 0.59 | 0.69 |
| T_{\max} (hr) | 1.75 | 3.0 | 1.75 | 2.0 | 0.25 | 0.25 | 2.75 | 9.5 |
| $T_{1/2}$ (hr) | 44.0 ^a | 39.8 ^a | 42.2 ^a | 50.9 ^a | 6.8 ^b | 5.0 ^b | 14.2 ^b | 11.4 ^b |
| AUC_{0-12} (hr · $\mu\text{g/g}$) | 1.84 | 4.76 | 0.99 | 1.39 | 6.23 | 9.22 | 3.89 | 4.66 |
| $\text{AUC}_{0-\infty}$ (hr · $\mu\text{g/g}$) | 3.41 | 7.68 | 2.31 | 2.60 | 8.18 | 11.2 | 6.84 | 12.7 |

[iso- ^{14}C] : [iso- ^{14}C] オキサチアピプロリン

[pyr- ^{14}C] : [pyr- ^{14}C] オキサチアピプロリン

注) 血液採取は、[iso- ^{14}C] オキサチアピプロリン投与群の低用量群で投与 15 分、30 分、1、2、4、8、12、24、30、48 及び 168 時間後、高用量群で投与 15 分、30 分、1、2、4、8 及び 12 時間後、[pyr- ^{14}C] オキサチアピプロリン投与群の低用量群で投与 15 分、30 分、1、2、4、8、12、18、24、30、48 及び 168 時間後、高用量群で投与 15 分、30 分、1、2、4、8、12 及び 24 時間後に実施。

^a : 低用量群では投与 30~168 時間後の血漿中濃度より算出

^b : 高用量群では投与 4~12、4~24 又は 8~24 時間後の血漿中濃度より算出

b. 吸収率

単回投与後の胆汁中排泄試験 [1. (1)④b] から得られた単回投与後 48 時間の尿、胆汁、ケージ洗浄液及びカーカス¹の放射能から推定した吸収率は、低用量群では 31.3%~48.9%、高用量群では 5.56%~7.94%であった。(参照 2、3)

② 分布

SD ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量又は高用量で単回投与し、投与 168 時間後まで経時的に試料を採取して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。

T_{max} 付近で肝臓、副腎、脂肪、膀胱等に比較的高い残留放射能が認められた。

投与 168 時間後では組織中残留放射能濃度は肝臓で最も高かったが、低用量群で 0.030~0.072 µg/g、高用量群で 0.081~0.18 µg/g と僅かであった。

残留放射能の分布に性別差、用量及び標識化合物の違いによる顕著な差及び蓄積性は認められなかった。(参照 2、3)

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (µg/g)

| 標識化合物 | 投与量 (mg/kg 体重) | 性別 | T _{max} 付近 ^a | 投与 24 時間後 |
|----------------------------------|----------------|----|---|--|
| [iso- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | 10 | 雄 | 胃腸管(11)、肝臓(4.40)、脂肪(0.90)、副腎(0.90)、腎臓(0.54)、下垂体(0.50)、甲状腺(0.46)、膵臓(0.45)、膀胱(0.35)、カーカス(0.34)、血漿(0.26)、皮膚(0.16)、脾臓(0.16)、全血(0.16)、赤血球(0.084) | 肝臓(0.55)、胃腸管(0.48)、膀胱(0.083)、甲状腺(0.077)、腎臓(0.072)、膵臓(0.063)、カーカス(0.060)、副腎(0.054)、脂肪(0.042)、肺(0.036)、血漿(0.027)、皮膚(0.025)、全血(0.021)、骨髓(0.020)、心臓(0.017)、赤血球(0.015) |
| | | 雌 | 胃腸管(5.80)、肝臓(5.30)、副腎(3.0)、脂肪(2.80)、下垂体(1.2)、甲状腺(1.1)、腎臓(0.94)、膵臓(0.94)、卵巣(0.93)、肺(0.64)、膀胱(0.62)、心臓(0.61)、皮膚(0.60)、カーカス(0.56)、脾臓(0.47)、子宮(0.40)、血漿(0.38)、骨髓(0.38)、胸腺(0.35)、筋肉(0.33)、全血(0.25)、赤血球(0.16) | 胃腸管(0.72)、肝臓(0.65)、脂肪(0.27)、副腎(0.25)、甲状腺(0.21)、下垂体(0.20)、膵臓(0.16)、腎臓(0.12)、卵巣(0.095)、肺(0.076)、膀胱(0.073)、カーカス(0.063)、心臓(0.054)、皮膚(0.050)、血漿(0.046)、子宮(0.044)、脾臓(0.039)、全血(0.036)、骨髓(0.036)、胸腺(0.030)、筋肉(0.027)、赤血球(0.026) |

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

| | | | | |
|--|-----|---|--|--|
| | 200 | 雄 | 胃腸管(260)、膀胱(23)、下垂体(14)、甲状腺(8.4)、肝臓(7.9)、カーカス(3.4)、副腎(2.6)、腎臓(2.5)、肺(1.5)、脂肪(1.1)、膵臓(1.1)、血漿(0.82)、皮膚(0.61)、心臓(0.59)、骨髄(0.58)、全血(0.54)、脾臓(0.50)、胸腺(0.45)、筋肉(0.29)、赤血球(0.28) | 副腎(4.9)、胃腸管(4.4)、肝臓(4.0)、膀胱(1.1)、カーカス(1.1)、脂肪(0.75)、腎臓(0.55)、膵臓(0.36)、肺(0.27)、心臓(0.25)、血漿(0.23)、脾臓(0.18)、皮膚(0.17)、胸腺(0.16)、全血(0.15)、骨髄(0.15)、赤血球(0.1) |
| | | 雌 | 胃腸管(180)、膀胱(25)、肝臓(9.5)、副腎(5.4)、腎臓(3.3)、卵巣(2.5)、脂肪(2.0)、肺(1.8)、膵臓(1.6)、子宮(1.2)、カーカス(1.1)、心臓(1.0)、血漿(0.98)、皮膚(0.97)、胸腺(0.92)、脾臓(0.89)、骨髄(0.84)、全血(0.63)、筋肉(0.57)、赤血球(0.44) | 下垂体(26)、肝臓(10)、胃腸管(10)、脂肪(7.0)、甲状腺(6.9)、卵巣(4.3)、膀胱(3.9)、膵臓(2.9)、腎臓(2.3)、カーカス(1.9)、副腎(1.8)、肺(1.5)、心臓(1.4)、脾臓(1.3)、子宮(1.3)、皮膚(1.2)、胸腺(1.0)、血漿(0.87)、骨髄(0.75)、筋肉(0.74)、全血(0.57)、骨(0.36)、赤血球(0.33) |
| [pyr- ¹⁴ C] オキサチ アピプロ リン | 10 | 雄 | 胃腸管(12)、肝臓(4.4)、脾臓(2.9)、膀胱(1.6)、副腎(1.5)、脂肪(1.2)、腎臓(0.94)、下垂体(0.75)、甲状腺(0.68)、膵臓(0.48)、肺(0.46)、血漿(0.39)、カーカス(0.37)、心臓(0.36)、皮膚(0.25)、全血(0.21)、骨髄(0.20)、胸腺(0.19)、筋肉(0.17)、赤血球(0.14) | 肝臓(0.45)、胃腸管(0.28)、腎臓(0.088)、膀胱(0.072)、カーカス(0.061)、副腎(0.054)、膵臓(0.048)、脂肪(0.041)、肺(0.041)、血漿(0.03)、全血(0.025)、赤血球(0.020) |
| | | 雌 | 胃腸管(9.2)、肝臓(5.6)、脂肪(2.0)、副腎(1.8)、膀胱(1.2)、下垂体(0.92)、甲状腺(0.87)、腎臓(0.74)、卵巣(0.66)、膵臓(0.63)、カーカス(0.53)、肺(0.52)、心臓(0.46)、血漿(0.38)、皮膚(0.33)、脾臓(0.33)、子宮(0.28)、骨髄(0.25)、全血(0.23)、胸腺(0.21)、赤血球(0.15) | 肝臓(0.26)、胃腸管(0.25)、膵臓(0.078)、血漿(0.060)、膀胱(0.046)、腎臓(0.045)、副腎(0.040)、脂肪(0.038)、肺(0.038)、カーカス(0.029)、卵巣(0.022)、全血(0.018)、赤血球(0.018) |

| | | | | |
|--|-----|---|--|---|
| | 200 | 雄 | 胃腸管(20)、膀胱(6.7)、肝臓(6.3)、副腎(2.2)、カーカス(1.6)、脂肪(1.5)、腎臓(1.3)、膵臓(0.73)、肺(0.59)、心臓(0.5)、血漿(0.46)、皮膚(0.42)、脾臓(0.42)、骨髄(0.37)、全血(0.30)、胸腺(0.30)、筋肉(0.28)、精巣(0.19)、赤血球(0.19) | 胃腸管(3.3)、肝臓(3.2)、膀胱(2.9)、副腎(1.5)、膵臓(1.1)、カーカス(1.1)、脂肪(0.69)、腎臓(0.59)、肺(0.27)、骨髄(0.26)、脾臓(0.26)、血漿(0.24)、心臓(0.21)、胸腺(0.21)、皮膚(0.17)、全血(0.15)、赤血球(0.12) |
| | | 雌 | カーカス(24)、胃腸管(15)、副腎(2.6)、肝臓(2.4)、卵巣(1.5)、脂肪(1.4)、膀胱(1.2)、赤血球(0.94)、胸腺(0.57)、膵臓(0.57)、腎臓(0.45)、肺(0.41)、子宮(0.32)、心臓(0.27)、脾臓(0.24)、皮膚(0.23)、血漿(0.19)、全血(0.13) | 下垂体(4.6)、肝臓(4.1)、副腎(3.8)、脂肪(3.4)、胃腸管(3.1)、甲状腺(2.8)、膀胱(1.9)、子宮(1.3)、卵巣(1.3)、カーカス(1.3)、膵臓(1.0)、腎臓(0.89)、肺(0.58)、心臓(0.56)、皮膚(0.50)、骨髄(0.45)、脾臓(0.45)、胸腺(0.45)、血漿(0.34)、筋肉(0.26)、全血(0.24)、赤血球(0.17) |

a: 採取時間は、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを投与した低用量群の雄及び雌で投与2及び3時間後、高用量群の雌雄で投与0.5時間後、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを投与した低用量の雌雄で投与2時間後、高用量群の雄及び雌で投与3及び9時間後。

③ 代謝

単回投与後の排泄試験[1. (1)④]で得られた投与後24時間の尿、投与後48時間の糞及び胆汁を用いて代謝物同定・定量試験が実施された。

各投与群の尿及び糞中の代謝物は表3、各投与群の胆汁中の代謝物は表4に示されている。

尿中の未変化のオキサチアピプロリンは定量限界未満であった。尿中の代謝物はイソキサゾリン環を持たない代謝物C、D、G及びXの4種でいずれも1%TAR未満であった。

糞中放射能のうち、主な成分は未変化のオキサチアピプロリンで、ほかに多数の代謝物が認められたが、いずれも僅かであった。

胆汁中では未変化のオキサチアピプロリンは、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを投与した高用量群の雌雄では検出されなかったが、それ以外の投与群では僅かに認められた。胆汁中には40種以上の代謝物が検出されたが、同定された代謝物はB、F、L、K、U4及びBの異性体及び抱合体であり、いずれも僅かであった。未同定代謝物には同定された代謝物の異性体、抱合体(グルクロン酸、システイン又はグルタチオン)等が含まれており、雄ではグルクロン酸抱合体、雌ではシステイン抱合体の割合が高かった。(参照2、3)

表3 各投与群の尿、糞及び胆汁中の代謝物 (%TAR)

| 標識化合物 | [iso- ¹⁴ C] オキサチアピプロリン | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 試料 | 尿 | | | | 糞 | | | |
| 投与量(mg/kg 体重) | 10 | | 200 | | 10 | | 200 | |
| 成分 \ 性別 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| オキサチアピプロリン | LOQ | LOQ | LOQ | LOQ | 39.1 | 41.3 | 16.6 | 21.6 |
| X | LOQ | LOQ | LOQ | LOQ | / | / | / | / |
| D | LOQ | LOQ | LOQ | LOQ | / | / | / | / |
| G | LOQ | LOQ | LOQ | LOQ | / | / | / | / |
| O/ U1 ¹⁾ | / | / | / | / | 1.14 | 0.27 | 0.023 | 0.005 |
| Q | / | / | / | / | 0.31 | 0.14 | ND | ND |
| S | / | / | / | / | 1.57 | 1.36 | ND | ND |
| T | / | / | / | / | 0.30 | 0.30 | 0.001 | 0.042 |
| V | / | / | / | / | 0.48 | 0.22 | ND | ND |
| W | / | / | / | / | 1.17 | 1.18 | 0.074 | 0.12 |
| L/U2/U3 ¹⁾ | / | / | / | / | 4.30 | 5.81 | 0.14 | 0.49 |
| F | / | / | / | / | 0.72 | 0.90 | 0.073 | 0.25 |
| H | / | / | / | / | 0.36 | 0.40 | ND | ND |
| B/ A ¹⁾ | / | / | / | / | 0.46 | 0.27 | ND | ND |
| E' | / | / | / | / | 0.044 | 0.014 | 0.093 | 0.24 |
| 抽出残渣 | - | - | - | - | 0.96 | 41.1 | 42.1 | 74.3 |
| 標識化合物 | [pyr- ¹⁴ C] オキサチアピプロリン | | | | | | | |
| 試料 | 尿 | | | | 糞 | | | |
| 投与量(mg/kg 体重) | 10 | | 200 | | 10 | | 200 | |
| 成分 \ 性別 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| オキサチアピプロリン | ND | ND | ND | ND | 61.3 | 57.8 | 87.4 | 74.6 |
| X | 0.045 | 0.006 | ND | ND | / | / | / | / |
| C | 0.710 | 0.160 | 0.099 | 0.034 | / | / | / | / |
| D | 0.336 | 0.144 | 0.057 | 0.009 | / | / | / | / |
| G | 0.189 | 0.214 | 0.021 | 0.039 | / | / | / | / |
| O | / | / | / | / | 0.15 | ND | ND | ND |
| R | / | / | / | / | 0.35 | ND | ND | ND |
| Q | / | / | / | / | 0.34 | ND | ND | ND |
| S | / | / | / | / | 0.23 | 0.34 | ND | ND |
| T | / | / | / | / | 0.18 | ND | ND | ND |
| W | / | / | / | / | 0.37 | 0.64 | ND | ND |
| L/U2/U3 ¹⁾ | / | / | / | / | 3.86 | 4.09 | 0.26 | 0.38 |
| F | / | / | / | / | ND | 0.79 | 0.072 | 0.21 |
| H | / | / | / | / | ND | 0.12 | ND | ND |
| U4 | / | / | / | / | 0.27 | 1.44 | ND | ND |
| B/A ¹⁾ | / | / | / | / | 1.77 | 0.21 | 2.01 | 0.34 |
| E' | / | / | / | / | ND | 0.34 | 0.23 | 0.13 |
| 抽出残渣 | - | - | - | - | 18.4 | 23.0 | 0.78 | 18.7 |

ND : 検出せず LOQ : 定量限界未満 - : なし / : 報告書に記載なし

¹⁾ : 分離されず

表 4 各投与群の胆汁中の代謝物 (%TAR)

| 標識化合物 投与量(mg/kg 体重) | [iso- ¹⁴ C] オキサチアピプロリン | | | | [pyr- ¹⁴ C] オキサチアピプロリン | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | 10 | | 200 | | 10 | | 200 | |
| 成分 \ 性別 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| オキサチアピプロリン | 0.115 | 0.309 | ND | ND | 0.671 | 0.130 | 0.023 | 0.145 |
| Bg | 0.274 | 0.154 | 0.011 | ND | / | / | / | / |
| K | 0.212 | 0.141 | ND | ND | 0.153 | 0.123 | 0.055 | ND |
| B' ^{a)} | 2.59 | 0.125 | 0.050 | 0.044 | / | / | / | / |
| L | 0.058 | 0.196 | 0.021 | 0.049 | 0.021 | 0.012 | 0.112 | 0.041 |
| F | 0.525 | 0.368 | 0.029 | 0.011 | 0.179 | 0.186 | ND | 0.215 |
| B' ^{b)} | 0.138 | 2.882 | ND | ND | / | / | / | / |
| U4 | / | / | / | / | 0.508 | 1.171 | 0.194 | 0.045 |
| B | / | / | / | / | 0.351 | 0.291 | 0.072 | ND |

ND : 検出せず / : 報告書に記載なし

a) : 保持時間 : 34.7 分 b) : 保持時間 : 36.2 分

オキサチアピプロリンのラット体内における主な代謝経路として、ピラゾール環メチル基の酸化とピペリジン環及びチアゾール環の開裂、ジフルオロベンゼン環の3又は4位の酸化に次いで起こるピペリジン環又はイソキサゾリン環の開裂並びにピペリジン環の酸化と環の開裂が考えられた。

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄

体内分布試験[1. (1)②]において、投与 168 時間後まで経時的に尿及び糞を採取して排泄試験が実施された。

尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。

投与後 168 時間に 92.4%TAR 以上が尿及び糞中に排泄された。主に糞中へ排泄され、尿中への排泄は 0.17%TAR~2.44%TAR と僅かであった。雄で 81.7%TAR~90.8% TAR、雌で 83.3%TAR~92.6%TAR が投与後 24 時間で排泄された。性別、標識体の違いによる排泄パターンの差は認められなかった。(参照 2、3)

表 5 尿及び糞中排泄率 (%TAR)

| 採取時間 (hr) | 投与量 (mg/kg 体重) | 10 | | | | 100 | | | |
|-----------|----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | 標識体 | [iso- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [iso- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | |
| | 性別 試料 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| 0~12 | 尿 | 1.70 | 1.64 | 1.35 | 0.65 | 0.82 | 0.80 | 0.17 | 0.12 |
| | 糞 | 14.6 | 31.1 | 51.7 | 11.7 | 54.6 | 21.4 | 45.9 | 69.4 |
| | 合計 | 16.3 | 32.7 | 53.1 | 12.4 | 55.4 | 22.2 | 46.1 | 69.5 |
| 0~24 | 尿 | 2.22 | 2.10 | 1.82 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.24 | 0.15 |
| | 糞 | 88.6 | 86.6 | 79.9 | 83.0 | 88.1 | 82.3 | 87.2 | 92.4 |
| | 合計 | 90.8 | 88.7 | 81.7 | 84.0 | 89.0 | 83.3 | 87.4 | 92.6 |
| 0~48 | 尿 | 2.40 | 2.37 | 2.01 | 1.08 | 0.94 | 1.02 | 0.34 | 0.19 |
| | 糞 | 95.6 | 99.4 | 89.4 | 92.1 | 91.4 | 93.1 | 91.1 | 94.4 |
| | 合計 | 98.0 | 102 | 91.4 | 93.2 | 92.3 | 94.1 | 91.4 | 94.6 |
| 0~168 | 尿 | 2.44 | 2.43 | 2.04 | 1.13 | 0.97 | 1.05 | 0.36 | 0.17 |
| | 糞 | 96.1 | 101 | 90.4 | 92.9 | 92.5 | 92.6 | 93.2 | 92.8 |
| | 合計 | 98.5 | 103 | 92.4 | 94.0 | 93.5 | 93.7 | 93.6 | 93.0 |
| ケージ洗浄液 | | 0.13 | 0.26 | 0.85 | 0.33 | 0.18 | 0.094 | 0.15 | 0.026 |
| 動物体 | | 0.082 | 0.058 | 0.048 | 0.043 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0056 | 0.0023 |
| 総回収率 | | 98.8 | 104 | 93.3 | 94.4 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.0 |

b. 胆汁中排泄

胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雌雄各 4 匹）に[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量又は高用量で単回投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

尿、糞及び胆汁中排泄率は表 6 に示されている。

投与後 48 時間で低用量群では糞中へ 43.3%TAR~59.8%TAR、胆汁中へ 29.2%TAR~45.2%TAR、尿中へ 1.53%TAR~3.23%TAR 排泄された。高用量群では低用量群に比べて胆汁中への排泄率が低く、糞中へ 81.1%TAR~89.6%TAR、胆汁中へ 4.08%TAR~6.67%TAR、尿中へ 0.30%TAR~1.49%TAR 排泄された。投与放射能の大部分は投与後 24 時間で排泄されており、性別、標識体の違いによって排泄パターンに大きな違いは認められなかった。（参照 2、3）

表 6 尿、糞及び胆汁中排泄率 (%TAR)

| 採取時間 (hr) | 投与量 (mg/kg 体重) | 10 | | | | 100 | | | |
|-----------|----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | 標識体 | [iso- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [iso- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | |
| | 性別 試料 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| 0~24 | 尿 | 2.49 | 3.01 | 1.69 | 1.31 | 1.25 | 1.28 | 0.47 | 0.25 |
| | 糞 | 46.7 | 41.9 | 60.4 | 55.1 | 80.9 | 99.9 | 90.8 | 84.3 |
| | 胆汁 | 38.7 | 43.5 | 28.8 | 28.3 | 3.67 | 4.02 | 5.32 | 5.45 |
| | 合計 | 87.9 | 88.4 | 90.9 | 84.7 | 85.8 | 105 | 96.6 | 90.0 |
| 0~48 | 尿 | 2.59 | 3.23 | 1.79 | 1.53 | 1.28 | 1.49 | 0.61 | 0.30 |
| | 糞 | 48.9 | 43.3 | 59.8 | 58.8 | 84.7 | 81.1 | 83.6 | 89.6 |
| | 胆汁 | 39.6 | 45.2 | 29.8 | 29.2 | 4.08 | 4.57 | 6.67 | 6.56 |
| | 合計 | 91.1 | 91.7 | 91.4 | 89.5 | 90.1 | 87.2 | 90.9 | 96.5 |
| 48 | ケージ洗浄液 | 0.104 | 0.301 | 0.359 | 0.319 | 0.119 | 0.135 | 0.293 | 0.048 |
| 48 | カーカス | 0.297 | 0.191 | 0.350 | 0.211 | 0.079 | 0.161 | 0.369 | 0.152 |

(2) ラット②

①吸収

SD ラット (一群雌雄各 4 匹) に [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量で 14 日反復経口投与 (以下 [1. (2)] において「反復投与」という。) して、血中濃度推移が検討された。

雄では投与開始 7、10、13、14、16 及び 18 日後、雌では投与開始 13 及び 18 日後の血漿、赤血球及び全血中の放射能濃度が測定された。[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量で単回投与した体内分布試験 [1. (1)②] で顕著な雌雄差は認められなかったことから、血中濃度推移は雄について検討された。

投与期間中の放射能濃度は血漿で 0.049~0.38 µg/g、赤血球で 0.075~0.24 µg/g 及び全血で 0.068~0.29 µg/g で推移した。投与終了後に残留放射能は速やかに消失し、投与開始 18 日後の放射能濃度の最高値は血漿で 0.0094 µg/g、赤血球で 0.11 µg/g 及び全血で 0.063 µg/g であった。(参照 2、4)

②分布

SD ラット (一群雌雄各 4 匹) に、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量で 14 日反復経口投与し、体内分布試験が実施された。

最終投与 2 及び 120 時間後の主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 7 に示されている。

最終投与 2 時間後の臓器及び組織における残留放射能濃度は、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量で単回投与した体内分布試験 [1. (1)②] で得られた結

果と同様であり、最終投与 120 時間後に多くの臓器及び組織では検出限界未満であった。（参照 2、4）

表 7 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (µg/g)

| 性別 | 最終投与 2 時間後 | 最終投与 120 時間後 |
|----|--|---|
| 雄 | 肝臓(6.6)、胃腸管(5.8)、下垂体(3.3)、副腎(2.6)、膀胱(1.8)、腎臓(1.5)、甲状腺(0.72)、肺(0.62)、脂肪(0.54)、膵臓(0.52)、心臓(0.39)、血漿(0.38)、カーカス(0.35)、皮膚(0.33)、脾臓(0.30)、血液(0.29)、骨髓(0.29)、胸腺(0.27)、赤血球(0.24) | 肝臓(0.65)、腎臓(0.14)、赤血球(0.082)、肺(0.065)、血液(0.054)、膵臓(0.041)、脾臓(0.039)、カーカス(0.034)、皮膚(0.030)、胃腸管(0.028)、心臓(0.021)、筋肉(0.0096)、血漿(0.0094) |
| 雌 | 胃腸管(7.2)、肝臓(6.7)、副腎(2.9)、下垂体(1.7)、甲状腺(1.5)、腎臓(1.1)、膀胱(1.1)、脂肪(0.93)、膵臓(0.83)、卵巣(0.77)、肺(0.65)、カーカス(0.59)、心臓(0.52)、皮膚(0.49)、脾臓(0.39)、子宮(0.36)、胸腺(0.35)、血漿(0.33)、骨髓(0.33)、血液(0.29)、赤血球(0.26) | 肝臓(0.22)、赤血球(0.11)、腎臓(0.10)、肺(0.064)、血液(0.063)、胃腸管(0.059)、膵臓(0.044)、脾臓(0.030)、カーカス(0.030)、皮膚(0.029)、心臓(0.024)、子宮(0.014)、筋肉(0.01)、骨(0.0096)、血漿(0.0088) |

③代謝

反復投与後の血中濃度推移の検討[1. (2)①]で得られた反復経口投与後 1、6～7 及び 13～14 日の尿及び糞並びに最終投与 2 時間後の血漿を用いて代謝物同定・定量試験が実施された。

尿中には、未変化のオキサチアピプロリンは検出されず、同定された代謝物は雄では代謝物 C、D 及び G であり、雌ではこれらに加え代謝物 L が認められた。

反復経口投与後 1、6～7 及び 13～14 日の糞中放射能のうち、主な成分は未変化のオキサチアピプロリンで雄では 48.4%TAR～53.8%TAR、雌では 49.4%TAR～55.3%TAR で投与期間中の糞中排泄率の割合はほぼ同じであった。26 種の代謝物が同定され、その中で代謝物 L が最大で反復経口投与後 13～14 日に雄で 4.98%TAR、雌で 5.90%TAR 認められた。

血漿中では未変化のオキサチアピプロリン及び 15 種の代謝物が同定されたが、放射活性が低く、定量には至らなかった。

また、反復投与終了時に採取した肝臓試料中の未変化のオキサチアピプロリンの鏡像異性体比率 (S:R) を分析した結果、雄で約 4:1、雌で約 3:1 であった。（参照 2、4）

④排泄

SD ラット（一群雌雄各 4 匹）に、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリンを低用量で 14 日反復経口投与し、反復投与終了後 5 日の尿及び糞を採取して排泄試験が実施された。

尿及び糞中排泄率は表 8 に示されている。

反復投与終了後 5 日の累積排泄率は、雄で 86.6%TAR、雌で 82.6%TAR であり、糞中への排泄が雄で 84.2%TAR、雌で 81.5%TAR であった。単回投与後の尿及び糞中排泄試験 [1. (1)④] に比べて、放射能の回収率は低かったが、反復投与終了 5 日後の動物体内の残留放射能は僅かであった。（参照 2、4）

表 8 尿及び糞中排泄率 (%TAR)

| 試料 | 反復投与終了後 5 日 | |
|--------|-------------|-------|
| | 雄 | 雌 |
| 尿 | 2.44 | 1.09 |
| 糞 | 84.2 | 81.5 |
| ケージ洗浄液 | 0.36 | 0.22 |
| 動物体 | 0.051 | 0.028 |
| 回収率 | 87.1 | 82.8 |

2. 植物体内運命試験

(1) ばれいしょ①

ばれいしょ（品種：Maris piper）を植え付け、第一花序の蕾が 3 mm 展開する時期、第一花序の第一花弁が確認できる時期及び第一花序の開花終了時期に [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 69.5～75.7 g ai/ha の用量で合計 3 回茎葉散布処理し、第 1 回処理直後から第 3 回処理 28 日後までの期間に計 7 回茎葉を、第 2 回処理 14 日後から第 3 回処理 28 日後までの期間に計 3 回塊茎を採取して、植物体内運命試験が実施された。

試料中の残留放射能の分布は、茎葉中では第 3 回処理 14 日後の 0.918～0.993 mg/kg から第 3 回処理 28 日後に 0.162～0.255 mg/kg に減少した。塊茎中では、第 2 回処理 14 日後には 0.003 mg/kg、第 3 回処理 28 日後には 0.005～0.012 mg/kg であった。

茎葉中の総残留放射能及び代謝物は表 9 に示されている。

残留放射能中の主な成分は未変化のオキサチアピプロリンであり、ほかに 10%TRR を超える成分は認められなかった。また、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区の第 3 回処理 14 日後に採取した茎葉の抽出画分中の異性体比は約 1:1 であり、ばれいしょ中でのオキサチアピプロリンの代謝におけるエナンチオ選択性はないと考えられた。（参照 2、5）

表 9 茎葉中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 | 成分 | 試料採取時期 | | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | 第 1 回処理 14 日後 | 第 2 回処理 14 日後 | 第 3 回処理 14 日後 | 第 3 回処理 28 日後 | |
| pyr | 表面洗浄液 | %TRR | 19.4 | 18.1 | 21.5 | 9.3 |
| | | mg/kg | 0.135 | 0.149 | 0.198 | 0.015 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 18.9 | 16.4 | 19.8 | 6.8 |
| | | mg/kg | 0.131 | 0.134 | 0.182 | 0.011 |

| 標識体 | 成分 | | 試料採取時期 | | 第1回処 | 第2回処 | 第3回処 | 第3回処 |
|-------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|
| | | | 理14日後 | 理14日後 | 理14日後 | 理28日後 | | |
| | 代謝物 F | %TRR | ND | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | |
| | | mg/kg | ND | 0.003 | 0.004 | <0.001 | | |
| | 水酸化体合計 | %TRR | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | | |
| | | mg/kg | 0.003 | 0.009 | 0.006 | <0.001 | | |
| | オキサチアピプロリン -ジオールグルコース抱合体 | %TRR | ND | ND | ND | 0.5 | | |
| | | mg/kg | ND | ND | ND | 0.001 | | |
| | 未同定成分 | %TRR | ND | 0.2 | 0.6 | 2.0 | | |
| | | mg/kg | ND | 0.002 | 0.006 | 0.003 | | |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 57.1 | 63.8 | 54.9 | 65.4 | | |
| | | mg/kg | 0.395 | 0.523 | 0.504 | 0.106 | | |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 35.4 | 23.4 | 19.8 | 17.8 | | |
| | | mg/kg | 0.246 | 0.192 | 0.182 | 0.029 | | |
| | 代謝物 Mg | %TRR | 2.6 | ND | 1.9 | 6.5 | | |
| | | mg/kg | 0.018 | ND | 0.017 | 0.011 | | |
| | 代謝物 E | %TRR | 1.1 | 2.0 | ND | ND | | |
| | | mg/kg | 0.008 | 0.016 | ND | ND | | |
| | 代謝物 F | %TRR | 0.9 | ND | 0.9 | ND | | |
| | | mg/kg | 0.006 | ND | 0.008 | ND | | |
| | 代謝物 L | %TRR | ND | 0.9 | 0.4 | ND | | |
| | | mg/kg | ND | 0.007 | 0.004 | ND | | |
| | 水酸化体合計 | %TRR | 6.7 | 4.7 | 3.5 | ND | | |
| | | mg/kg | 0.047 | 0.039 | 0.032 | ND | | |
| | オキサチアピプロリン -ジオールグルコース抱合体 | %TRR | 1.2 | 9.9 | 3.5 | 3.1 | | |
| | | mg/kg | 0.008 | 0.081 | 0.032 | 0.005 | | |
| 未同定成分 | %TRR | 9.2 | 22.8 | 24.8 | 38.0 | | | |
| | mg/kg | 0.063 | 0.186 | 0.226 | 0.063 | | | |
| thi | 表面洗浄液 | %TRR | 24.8 | 37.3 | 15.8 | 10.1 | | |
| | | mg/kg | 0.222 | 0.491 | 0.157 | 0.026 | | |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 24.3 | 36.1 | 14.8 | 9.0 | | |
| | | mg/kg | 0.217 | 0.475 | 0.147 | 0.023 | | |
| | 代謝物 F | %TRR | ND | 0.5 | ND | 0.4 | | |
| | | mg/kg | ND | 0.007 | ND | 0.001 | | |
| | 水酸化体合計 | %TRR | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | | |
| | | mg/kg | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | | |
| | 未同定成分 | %TRR | ND | ND | 0.8 | 0.3 | | |
| | | mg/kg | ND | ND | 0.008 | 0.001 | | |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 52.5 | 50.3 | 54.7 | 56.9 | | |
| | | mg/kg | 0.470 | 0.663 | 0.543 | 0.145 | | |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 23.5 | 22.8 | 28.4 | 33.4 | | |
| | | mg/kg | 0.210 | 0.300 | 0.282 | 0.085 | | |
| | 代謝物 Mg | %TRR | 4.0 | 7.9 | 4.0 | 6.7 | | |
| | | mg/kg | 0.036 | 0.104 | 0.040 | 0.017 | | |

| 標識体 | 試料採取時期 | | 第 1 回処 | 第 2 回処 | 第 3 回処 | 第 3 回処 |
|-----|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 成分 | | 理 14 日後 | 理 14 日後 | 理 14 日後 | 理 28 日後 |
| | 代謝物 E | %TRR | 1.5 | 1.0 | ND | ND |
| | | mg/kg | 0.013 | 0.013 | ND | ND |
| | 代謝物 F | %TRR | 0.9 | 1.4 | 1.7 | ND |
| | | mg/kg | 0.008 | 0.018 | 0.017 | ND |
| | 代謝物 L | %TRR | 0.4 | 0.9 | 1.3 | ND |
| | | mg/kg | 0.004 | 0.012 | 0.013 | ND |
| | 水酸化体合計 | %TRR | 4.6 | 4.9 | 3.2 | 4.2 |
| | | mg/kg | 0.041 | 0.065 | 0.032 | 0.011 |
| | オキサチアピプロリン -ジオールグルコース抱合体 | %TRR | 2.4 | ND | 4.6 | 5.2 |
| | | mg/kg | 0.021 | ND | 0.045 | 0.013 |
| | 未同定成分 | %TRR | 15.1 | 11.4 | 11.5 | 7.4 |
| | | mg/kg | 0.135 | 0.150 | 0.115 | 0.018 |

pyr : [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン thi : [thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン
 ND : 検出せず

(2) ばれいしょ②

ばれいしょ (品種 : Maris Bard) を深さ 10 cm で植え付け、同日、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 600 g ai/ha の用量で土壌 (壤土) 処理した後、処理 37 及び 72 日後に茎葉及び塊茎を採取して、植物体内運命試験が実施された。

土壌処理 37 日後の残留放射能は、茎葉及び塊茎で大きな違いはなく 0.013～0.026 mg/kg で、土壌処理 72 日後では茎葉で 0.056～0.108 mg/kg、塊茎で 0.006～0.013 mg/kg であった。

試料中の総残留放射能及び代謝物は表 10 に示されている。

未変化のオキサチアピプロリンが塊茎で最大で 6.9%TRR 認められたほか、代謝物 C、D 及び X が塊茎中にそれぞれ最大で 13.9%TRR (0.002 mg/kg)、25.3%TRR (0.003 mg/kg) 及び 12.2%TRR (0.001 mg/kg) 認められた。(参照 2、8)

表 10 試料中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 | 試料及び採取時期 成分 | | 処理 37 日後 | | 処理 72 日後 | |
|-------|--------------------------|-------|----------|------------------|----------|------------------|
| | | | 茎葉 | 塊茎 ¹⁾ | 茎葉 | 塊茎 ¹⁾ |
| pyr | 総残留放射能 | mg/kg | 0.026 | 0.023 | 0.108 | 0.013 |
| | 抽出放射能 | %TRR | 89.1 | 85.2 | 90.8 | 80.7 |
| | | mg/kg | 0.023 | 0.020 | 0.098 | 0.010 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | ND | 6.9 | 4.2 | ND |
| | | mg/kg | ND | 0.002 | 0.005 | ND |
| | 代謝物 C | %TRR | 11.5 | 5.8 | 5.1 | 13.9 |
| | | mg/kg | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.002 |
| | 代謝物 D | %TRR | 13.3 | 14.3 | 7.3 | 25.3 |
| | | mg/kg | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| | 代謝物 X | %TRR | 13.1 | 12.0 | 11.5 | 12.2 |
| | | mg/kg | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.001 |
| | 代謝物 Y | %TRR | 4.1 | 7.3 | 4.4 | 6.5 |
| | | mg/kg | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 |
| | 代謝物 Z | %TRR | 6.4 | 3.7 | 4.2 | 7.1 |
| | | mg/kg | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 |
| | 代謝物 e 及び f ²⁾ | %TRR | 18.8 | 2.7 | 13.1 | 5.5 |
| | | mg/kg | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.001 |
| | 未同定成分 | %TRR | 14.1 | 11.2 | 26.9 | 4.9 |
| mg/kg | | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.001 | |
| 抽出残渣 | %TRR | 10.9 | 14.8 | 9.2 | 19.3 | |
| | mg/kg | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | |
| iso | 総残留放射能 | mg/kg | 0.021 | 0.013 | 0.056 | 0.006 |
| | 抽出放射能 | %TRR | 79.6 | 77.2 | 85.0 | |
| | | mg/kg | 0.017 | 0.010 | 0.048 | |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | ND | | 9.2 | |
| | | mg/kg | ND | | 0.005 | |
| | 未同定成分 | %TRR | 40.6 | | 66.6 | |
| | | mg/kg | 0.009 | | 0.038 | |
| | 抽出残渣 | %TRR | 20.4 | 22.8 | 15.0 | |
| mg/kg | | 0.004 | 0.003 | 0.008 | | |

pyr : [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン iso : [iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン

ND : 検出せず / : 試料なし

¹⁾ : [iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では残留放射能濃度が低値であったため、抽出及び分析は実施せず。

²⁾ : 分離されず

(3) レタス①

レタス（品種不明・結球型）を植え付け、5 葉展開期、7 葉展開期及び9 葉展開期に[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリンを73.0~78.1 g ai/ha の用量で合計 3 回茎葉散布処理し、第 1 回処理直後から第 3 回処理 14 日後までの期間に計 8 回茎葉を採取して、植物体内運命試験が実施さ

れた。

試料中の残留放射能は、第3回処理直後が4.58～4.73 mg/kg、第3回処理14日後は0.473～0.520 mg/kgであった。

試料中の総残留放射能及び代謝物は表11に示されている。

残留放射能中の主な成分は表面洗浄液及び抽出画分ともに未変化のオキサチアピプロリンであり、ほかに10%TRRを超える代謝物は認められなかった。また、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区の第3回処理14日後に採取した茎葉の抽出画分中の異性体比は約1:1であり、レタス中でのオキサチアピプロリンの代謝におけるエナンチオ選択性はないと考えられた。(参照2、6)

表11 試料中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 | 試料採取時期 成分 | | 第1回処理 | | 第2回処理 | | 第3回処理 | | | |
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 処理日 | 10日後 | 処理日 | 10日後 | 処理直後 | 3日後 | 7日後 | 14日後 |
| pyr | 表面洗浄液 | %TRR | | | | 14.4 | 83.1 | 51.0 | 34.2 | 20.9 |
| | | mg/kg | | | | 0.070 | 3.93 | 0.649 | 0.214 | 0.109 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | | | | 11.8 | 81.8 | 47.9 | 31.6 | 18.5 |
| | | mg/kg | | | | 0.058 | 3.87 | 0.609 | 0.198 | 0.096 |
| | 代謝物 F | %TRR | | | | ND | ND | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| | | mg/kg | | | | ND | ND | 0.005 | 0.004 | 0.002 |
| | 水酸化体 | %TRR | | | | 0.9 | 0.8 | 1.2 | ND | 0.6 |
| | | mg/kg | | | | 0.004 | 0.038 | 0.015 | ND | 0.003 |
| | 未同定成分 | %TRR | | | | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.3 |
| | | mg/kg | | | | 0.008 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 0.007 |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 90.2 | 87.2 | 86.9 | 61.7 | 16.4 | 38.7 | 56.1 | 62.1 |
| | | mg/kg | 4.87 | 0.627 | 4.79 | 0.301 | 0.775 | 0.493 | 0.351 | 0.324 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 89.8 | 64.6 | 82.9 | 37.1 | 15.5 | 30.9 | 45.7 | 46.4 |
| | | mg/kg | 4.84 | 0.464 | 4.57 | 0.181 | 0.733 | 0.393 | 0.286 | 0.241 |
| | 代謝物 E | %TRR | ND | 1.0 | ND | 1.4 | ND | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| | | mg/kg | ND | 0.007 | ND | 0.007 | ND | 0.011 | 0.005 | 0.005 |
| | 代謝物 F | %TRR | ND | 1.5 | ND | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 0.6 |
| | | mg/kg | ND | 0.011 | ND | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.003 |
| | 水酸化体合計 | %TRR | 0.4 | 5.6 | 1.4 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | ND | 3.6 |
| | | mg/kg | 0.023 | 0.04 | 0.077 | 0.025 | 0.019 | 0.028 | ND | 0.019 |
| 未同定成分 | %TRR | ND | 14.4 | 2.7 | 15.8 | 0.3 | 4.0 | 5.2 | 10.5 | |
| | mg/kg | ND | 0.104 | 0.151 | 0.078 | 0.014 | 0.052 | 0.032 | 0.054 | |
| 抽出残渣 | %TRR | 0.4 | 11.8 | 2.4 | 14.0 | 1.3 | 4.3 | 7.7 | 12.1 | |
| | mg/kg | 0.022 | 0.085 | 0.132 | 0.068 | 0.061 | 0.055 | 0.048 | 0.063 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| thi | 表面洗浄液 | %TRR | | | | 25.4 | 70.7 | 47.7 | 23.1 | 18.5 |
| | | mg/kg | | | | 0.236 | 3.24 | 1.25 | 0.136 | 0.088 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | | | | 24.1 | 68.3 | 4.4 | 21.9 | 15.5 |
| | | mg/kg | | | | 0.223 | 3.13 | 1.17 | 0.147 | 0.073 |
| | 代謝物 A | %TRR | | | | ND | 0.7 | 0.4 | ND | ND |
| | | mg/kg | | | | ND | 0.032 | 0.011 | ND | ND |
| | 代謝物 E | %TRR | | | | ND | 0.2 | 0.2 | ND | ND |
| | | mg/kg | | | | ND | 0.009 | 0.005 | ND | ND |
| | 代謝物 F | %TRR | | | | 0.3 | ND | ND | ND | ND |
| | | mg/kg | | | | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
| | 水酸化体 | %TRR | | | | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
| | | mg/kg | | | | 0.005 | 0.023 | 0.026 | 0.005 | 0.007 |
| | 未同定成分 | %TRR | | | | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |
| | | mg/kg | | | | 0.005 | 0.041 | 0.037 | 0.003 | 0.006 |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 99.2 | 86.2 | 98.8 | 51.0 | 25.7 | 43.0 | 64.7 | 59.7 |
| | | mg/kg | 11.2 | 0.446 | 5.71 | 0.472 | 1.18 | 1.13 | 0.433 | 0.282 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 97.6 | 79.1 | 96.7 | 37.8 | 23.9 | 40.7 | 53.2 | 41.4 |
| | | mg/kg | 11.0 | 0.410 | 5.59 | 0.350 | 1.10 | 1.07 | 0.356 | 0.196 |
| | 代謝物 A | %TRR | 0.9 | ND | 0.7 | ND | 0.4 | ND | ND | ND |
| | | mg/kg | 0.102 | ND | 0.040 | ND | 0.018 | ND | ND | ND |
| | 代謝物 B | %TRR | ND | ND | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | mg/kg | ND | ND | 0.012 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | 代謝物 E | %TRR | ND | ND | ND | 1.0 | 0.3 | ND | ND | 1.1 |
| | | mg/kg | ND | ND | ND | 0.009 | 0.014 | ND | ND | 0.005 |
| | 代謝物 F | %TRR | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | ND | 1.2 |
| | | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND | 0.006 |
| | 水酸化体 | %TRR | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 5.6 | 4.3 |
| | | mg/kg | 0.034 | 0.026 | 0.058 | 0.026 | 0.032 | 0.045 | 0.037 | 0.020 |
| | 未同定成分 | %TRR | 0.3 | 2.00 | 0.2 | 9.3 | 0.4 | ND | 6.0 | 11.7 |
| | | mg/kg | 0.034 | 0.011 | 0.012 | 0.085 | 0.018 | ND | 0.040 | 0.055 |
| | 抽出残渣 | %TRR | 0.4 | 10.1 | 1.6 | 13.7 | 2.5 | 5.1 | 13.9 | 17.2 |
| | | mg/kg | 0.045 | 0.052 | 0.092 | 0.127 | 0.115 | 0.134 | 0.093 | 0.081 |

pyr : [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン thi : [thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン
 ND : 検出せず / : 試料なし

(4) レタス②

レタス（品種：Green Salad Bowl）を深さ 2 cm で播種し、同日[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 600 g ai/ha の用量で土壌（壤土）処理した後、処理 44 及び 57 日後に茎葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。なお、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では試料中の残留放射能が 0.008 mg/kg 以下と僅かであったことから、抽出及び分析は実施されなかった。

試料中の総残留放射能及び代謝物は表 12 に示されている。

試料中に未変化のオキサチアピプロリンは認められなかった。代謝物 C 及び D がそれぞれ最大で 21.2%TRR (0.003 mg/kg) 及び 29.5%TRR (0.004 mg/kg)、代謝物 e 及び f の混合物が 21.4%TRR (0.004 mg/kg) 認められた。(参照 2、9)

表 12 試料中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| 試料採取時期 | | 処理 44 日後 | 処理 57 日後 |
| 成分 | | | |
| 総残留放射能 | mg/kg | 0.019 | 0.014 |
| 抽出放射能 | %TRR | 90.5 | 88.3 |
| | mg/kg | 0.017 | 0.012 |
| オキサチアピプロリン | %TRR | ND | ND |
| | mg/kg | ND | ND |
| 代謝物 C | %TRR | 18.9 | 21.2 |
| | mg/kg | 0.004 | 0.003 |
| 代謝物 D | %TRR | 22.7 | 29.5 |
| | mg/kg | 0.004 | 0.004 |
| 代謝物 X | %TRR | 5.1 | 6.5 |
| | mg/kg | 0.001 | 0.001 |
| 代謝物 Y | %TRR | ND | 3.1 |
| | mg/kg | ND | <0.001 |
| 代謝物 Z | %TRR | 1.9 | 3.5 |
| | mg/kg | <0.001 | <0.001 |
| 代謝物 e 及び f ¹⁾ | %TRR | 21.4 | 19.0 |
| | mg/kg | 0.004 | 0.002 |
| 未同定成分 | %TRR | ND | 1.2 |
| | mg/kg | ND | <0.001 |
| 抽出残渣 | %TRR | 9.5 | 11.7 |
| | mg/kg | 0.002 | 0.002 |

¹⁾: 分離されず ND: 検出せず

(5) ぶどう

ぶどう（品種：Macabeu）を植え付け、開花初期～開花盛期、果実発達期及び果実肥大期に[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 59.4～82.7 g ai/ha の用量で合計 3 回茎葉散布処理し、第 1 回処理直後から第 3 回処理 76 日後までの期間に計 6 回茎葉を、第 2 回処理 14 日後から第 3 回処理 76 日後までの期間に計 4 回果実を採取して、植物体内運命試験が実施された。

第 3 回処理 14 及び 76 日後の試料中の総残留放射能及び代謝物は表 13 に示されている。

抽出画分中の主な成分は未変化のオキサチアピプロリンであり、果実中には代謝物 C 及び D が 10%TRR を超えて検出された。

また、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区の第 3 回処理 76 日後に採取した果実の抽出画分中の異性体比は約 1 : 1 であり、ぶどう中でのオキサチアピプロリンの代謝にエナンチオ選択性はないと考えられた。（参照 2、7）

表 13 試料中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 | 成分 | 試料及び採取時期 | 第 3 回処理 14 日後 | | 第 3 回処理 76 日後 | |
|-----|------------|----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | 茎葉 | 果実 | 茎葉 | 果実 |
| pyr | 表面洗浄液 | %TRR | 51.2 | 10.5 | 24.2 | 3.9 |
| | | mg/kg | 5.59 | 0.048 | 0.334 | 0.012 |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 37.9 | 78.3 | 45.6 | 86.9 |
| | | mg/kg | 4.14 | 0.361 | 0.630 | 0.264 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 66.3 | 35.9 | 32.0 | 9.9 |
| | | mg/kg | 7.24 | 0.165 | 0.441 | 0.030 |
| | 代謝物 B | %TRR | 1.1 | 1.6 | ND | ND |
| | | mg/kg | 0.118 | 0.007 | ND | ND |
| | 代謝物 C | %TRR | ND | 13.3 | 2.3 | 14.4 |
| | | mg/kg | ND | 0.062 | 0.032 | 0.044 |
| | 代謝物 D | %TRR | 0.4 | 15.1 | 1.0 | 18.6 |
| | | mg/kg | 0.045 | 0.069 | 0.014 | 0.057 |
| | 代謝物 E | %TRR | 2.1 | 0.1 | 0.4 | ND |
| | | mg/kg | 0.228 | 0.001 | 0.006 | ND |
| | 代謝物 F | %TRR | 1.6 | 1.5 | 1.0 | ND |
| | | mg/kg | 0.178 | 0.007 | 0.013 | ND |
| | 代謝物 L | %TRR | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0.5 |
| | | mg/kg | 0.190 | 0.001 | 0.025 | 0.002 |
| | 代謝物 X | %TRR | ND | ND | 6.3 | 6.2 |
| | | mg/kg | ND | ND | 0.087 | 0.019 |
| | 代謝物 Y | %TRR | 0.6 | 1.1 | 0.9 | ND |
| | | mg/kg | 0.064 | 0.005 | 0.012 | ND |
| | 代謝物 Z | %TRR | ND | ND | 4.2 | 4.2 |
| | | mg/kg | ND | ND | 0.058 | 0.013 |
| | 未同定成分合計 | %TRR | 21.6 | 24.0 | 25.0 | 33.2 |
| | | mg/kg | 2.36 | 0.111 | 0.343 | 0.099 |
| | 抽出残渣 | %TRR | 10.9 | 11.2 | 30.2 | 9.2 |
| | | mg/kg | 1.19 | 0.052 | 0.417 | 0.028 |

| 標識体 | 成分 | 試料及び採取時期 | 第3回処理 14日後 | | 第3回処理 76日後 | |
|---------|------------|----------|------------|-------|------------|--------|
| | | | 茎葉 | 果実 | 茎葉 | 果実 |
| thi | 表面洗浄液 | %TRR | 70.5 | 30.0 | 35.9 | 15.4 |
| | | mg/kg | 6.03 | 0.164 | 0.401 | 0.049 |
| | 抽出画分合計 | %TRR | 22.5 | 58.4 | 41.0 | 53.8 |
| | | mg/kg | 1.92 | 0.319 | 0.458 | 0.172 |
| | オキサチアピプロリン | %TRR | 82.0 | 74.2 | 60.1 | 41.0 |
| | | mg/kg | 7.01 | 0.406 | 0.672 | 0.131 |
| | 代謝物 B | %TRR | 0.5 | 0.5 | 2.3 | ND |
| | | mg/kg | 0.045 | 0.003 | 0.025 | ND |
| | 代謝物 E | %TRR | 0.3 | ND | 0.2 | 0.1 |
| | | mg/kg | 0.026 | ND | 0.002 | <0.001 |
| | 代謝物 F | %TRR | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
| | | mg/kg | 0.015 | 0.003 | 0.011 | 0.001 |
| | 代謝物 J | %TRR | ND | ND | ND | 0.3 |
| | | mg/kg | ND | ND | ND | 0.001 |
| | 代謝物 K | %TRR | 0.3 | 0.8 | ND | ND |
| | | mg/kg | 0.028 | 0.004 | ND | ND |
| | 代謝物 L | %TRR | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 0.1 |
| | | mg/kg | 0.060 | 0.016 | 0.017 | <0.001 |
| | 代謝物 a | %TRR | 0.2 | 0.3 | 1.1 | ND |
| mg/kg | | 0.015 | 0.001 | 0.012 | ND | |
| 未同定成分合計 | %TRR | 13.0 | 10.1 | 12.4 | 20.3 | |
| | mg/kg | 1.09 | 0.055 | 0.136 | 0.063 | |
| 抽出残渣 | %TRR | 7.0 | 11.6 | 23.1 | 30.8 | |
| | mg/kg | 0.598 | 0.063 | 0.258 | 0.098 | |

pyr : [pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン thi : [thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン
 ND : 検出せず

(6) ズッキーニ

ズッキーニ（品種：F Defender）を深さ 2 cm で播種し、同日[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン²を 600 g ai/ha の用量で土壌（壤土）処理した後、処理 44 及び 79 日後の茎葉及び果実を採取して、植物体内運命試験が実施された。

試料中の総残留放射能及び代謝物は表 14 に示されている。

試料中には未変化のオキサチアピプロリンが僅かに認められたほか、代謝物 C、D、Y 及び X がそれぞれ最大で茎葉中に 23.5%TRR (0.011 mg/kg)、果実中に 73.7%TRR (0.016 mg/kg)、茎葉中に 18.5%TRR (0.005 mg/kg) 及び茎葉中に 16.8%TRR (0.008 mg/kg) 認められた。10%TRR 未満の成分として代謝物 Y 及び Z が検出された。（参照 2、10）

² [iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では残留放射能濃度が低値であったため、評価に用いなかった。

表 14 試料中の総残留放射能及び代謝物

| 標識体 試料及び採取時期 | | [pyr- ¹⁴ C]オキサチアピプロリン | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------|-------|
| | | 処理 44 日後 | | 処理 79 日後 | |
| 成分 | | 果実 | 茎葉 | 果実 | 茎葉 |
| 総残留放射能 | mg/kg | 0.013 | 0.045 | 0.023 | 0.170 |
| 抽出放射能 | %TRR | 93.7 | 90.7 | 96.8 | 94.0 |
| | mg/kg | 0.012 | 0.041 | 0.022 | 0.160 |
| オキサチアピプロリン | %TRR | 0.5 | ND | ND | 4.6 |
| | mg/kg | <0.001 | ND | ND | 0.008 |
| 代謝物 C | %TRR | 4.5 | 23.5 | 4.3 | 21.1 |
| | mg/kg | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.036 |
| 代謝物 D | %TRR | 56.7 | 23.7 | 73.7 | 27.5 |
| | mg/kg | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.047 |
| 代謝物 F | %TRR | ND | ND | ND | 1.7 |
| | mg/kg | ND | ND | ND | 0.003 |
| 代謝物 X | %TRR | 2.2 | 16.8 | 3.3 | 12.4 |
| | mg/kg | <0.001 | 0.008 | 0.011 | 0.021 |
| 代謝物 Y | %TRR | 2.6 | 3.4 | 2.0 | 1.5 |
| | mg/kg | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.002 |
| 代謝物 Z | %TRR | 4.0 | 7.2 | 1.3 | 6.0 |
| | mg/kg | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.010 |
| 代謝物 e 及び f ¹⁾ | %TRR | 4.3 | 12.7 | 4.3 | 10.9 |
| | mg/kg | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.018 |
| 未同定成分 | %TRR | 3.3 | 6.2 | 5.0 | 6.7 |
| | mg/kg | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.010 |
| 抽出残渣 | %TRR | 6.3 | 9.3 | 3.2 | 6.0 |
| | mg/kg | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.010 |

ND : 検出せず 1) : 分離されず

植物におけるオキサチアピプロリンの主要代謝経路は、フェニル環の水酸化による代謝物 F 及び L の生成、イソキサゾールフェノキシ環の水酸化を経た代謝物 E の生成、ピラゾール環とピペリジン環間の開裂による代謝物 C、D、X 及び Y 並びに代謝物 a 及び K 等の生成並びにこれらに続く抱合体の生成であると考えられた。

3. 土壌中運命試験

(1) 好氣的土壌中運命試験

壤質砂土（米国）の水分含量を最大容水量の 50%に調整し、8 日間プレインキュベートした後、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン、[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 0.2 mg ai/kg 乾土となるように添加し、

20±2℃の暗条件下で[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン及び[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では最長 120 日間、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区³では最長 134 日間インキュベートする好氣的土壤中運命試験が実施された。試験期間中は連続的に空気を通気しながら揮発性成分を捕集し、8 日間のプレインキュベーションの条件はその後のインキュベーション期間と同様であった。

壤質砂土におけるオキサチアピプロリンの推定半減期は、84～131 日であった。

未変化のオキサチアピプロリンは、各処理区で経時的に減少し、処理 120 日後に[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン及び[thi-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区で 37.2%**TAR**～49.9%**TAR**、処理 134 日後に[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区で 76.9%**TAR** であった。

残留成分として分解物 B が最大 13.5%**TAR** 認められたほか、分解物 C、E、H 及び a が検出されたが、いずれも 10%**TAR** 未満であった。土壤から揮発した¹⁴CO₂は経時的に増加し、試験終了時までには 0.33%**TAR**～11.8%**TAR**回収された。また、試験期間終了後の試料中の異性体比に試験の前後で変化は認められなかったことから、土壤中でのオキサチアピプロリンの分解にエナンチオ選択性はないと考えられた。(参照 2、11、12)

(2) 好氣的/嫌氣的湛水土壤中運命試験

砂壤土(米国)の水分含量を最大ほ場容水量の 50%に調整し、18 日間プレインキュベートした後、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン又は[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリンを 0.2 mg ai/kg 乾土となるように添加し、二酸化炭素を含まない空気を通気させた好氣的条件、20±2℃の暗条件下で 30 日間インキュベートした後、脱気した水を 100 mL 湛水し、窒素気流下で最長 120 日間インキュベートする好氣的/嫌氣的湛水土壤中運命試験が実施された。試験期間中は揮発性成分を捕集した。なお、18 日間のプレインキュベーションの条件はその後の 30 日間のインキュベーション期間と同様であった。

好氣的条件下では、処理 30 日後に未変化のオキサチアピプロリンが[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では 73.4%**TAR**、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では 75.8%**TAR** 認められた。分解物 B、C、H 及び a が 5%**TAR** 未満並びに¹⁴CO₂が 1.49%**TAR**～2.75%**TAR** 検出された。

120 日間の嫌氣的インキュベーション後の未変化のオキサチアピプロリンは、[pyr-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では 65.8%**TAR**、[iso-¹⁴C]オキサチアピプロリン処理区では 74.4%**TAR** であり、嫌氣的条件下での分解は緩やかであった。

(参照 2、13)

³ 90～120 日の微生物活性が低下していたと考えられたため 134 日後の試料が採取された。

(3) 土壤吸着試験①

4 種類の土壤を用いたオキサチアピプロリンの土壤吸着試験が実施された。

各土壤における Freundlich の吸着定数は表 15 に示されている。(参照 2、14)

表 15 Freundlich の吸着係数

| 土壤 | 採取地 | K^{ads} | K^{ads}_{oc} |
|----|-----|-----------|----------------|
| 砂土 | 宮崎 | 74.4 | 13,300 |
| 壤土 | 埼玉 | 118 | 3,910 |
| 壤土 | 栃木 | 19.1 | 1,690 |
| 壤土 | 茨城 | 136 | 2,800 |

K^{ads} : Freundlich の吸着係数、 K^{ads}_{oc} : 有機炭素含有率により補正した吸着係数

(4) 土壤吸着試験②

5 種類の土壤を用いたオキサチアピプロリンの土壤吸着試験が実施された。

各土壤における Freundlich の吸着定数は表 16 に示されている。(参照 2、15)

表 16 Freundlich の吸着係数

| 土壤 | 採取地 | K^{ads} | K^{ads}_{oc} |
|--------|------|-----------|----------------|
| 埴壤土 | 米国 | 1,320 | 45,600 |
| 壤土 | ドイツ | 52.2 | 4,350 |
| 砂壤土 | フランス | 102 | 7,290 |
| シルト質埴土 | スペイン | 100 | 5,560 |
| 砂壤土 | 米国 | 87.4 | 7,280 |

K^{ads} : Freundlich の吸着係数、 K^{ads}_{oc} : 有機炭素含有率により補正した吸着係数

(5) 土壤表面光分解試験

石英製蓋付のホウケイ酸ガラス製容器中の砂土（米国）に[pyr- ^{14}C]オキサチアピプロリン又は[iso- ^{14}C]オキサチアピプロリンを 0.2 mg ai/kg 乾土となるように土壤表面に処理し、キセノン光（光強度：456 W/m²、波長：290 nm 以下をカット）を照射して 20±2°C の好氣的条件下で最長 15 日間、インキュベートする土壤表面光分解試験が実施された。試験期間中、揮発性成分は捕集され、光照射区では水分含量は最大ほ場容水量の 75%～100%に調整する系と調整しない系、暗所対照区では水分含量を調整する系のみ設定された。

光照射区では未変化のオキサチアピプロリンは経時的に減少し、水分含量を調整した条件下では処理当日の 99.3%TAR～100%TAR から 15 日後に 67.6%TAR～72.5%TAR に減少し、推定半減期は 28.2 日であった。残留成分として分解物 B、C、G、H 及び I が検出され、試験期間を通して最大で 6.42%TAR であった。水分含量を調整しなかった条件下では、未変化のオキサチアピプロリンは処理当日の 99.5%TAR～101%TAR から 15 日後に 76.2%TAR～83.7%TAR に減少し、推定半減期は 36.3 日であった。ほかに分解物 B、E 及び H が処理 15 日後に最大で 5.18%TAR 認められた。

暗所対照区では未変化のオキサチアピプロリンは、処理 15 日後に 96.4%TAR ~101%TAR であり、分解はほとんど認められなかった。

土壌から放出された $^{14}\text{CO}_2$ は光照射区では試験期間を通じて定量限界未満、暗所対照区では 3.68%TAR 認められた。（参照 2、16）

4. 水中運命試験

(1) 加水分解試験

pH4（酢酸緩衝液）、pH 7（リン酸緩衝液）及び pH 9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に、[pyr- ^{14}C]オキサチアピプロリン又は[thi- ^{14}C]オキサチアピプロリンを 0.1 mg/L となるように添加し、 $50 \pm 0.5^\circ\text{C}$ で 5 日間、暗所条件下でインキュベートして加水分解試験が実施された。

オキサチアピプロリンは、いずれの緩衝液中においても安定で、分解物は 10%TAR 未満であった。 25°C における加水分解半減期は、pH4、7 及び 9 のいずれにおいても 1 年以上と推定された。（参照 2、17）

(2) 水中光分解試験（緩衝液及び自然水）

pH 7（リン酸緩衝液）の滅菌緩衝液又は滅菌自然水（貯水池、pH 7.3、英国）に、[pyr- ^{14}C]オキサチアピプロリン、[thi- ^{14}C]オキサチアピプロリン又は[iso- ^{14}C]オキサチアピプロリンを 0.1 mg/L となるように添加し、 $25 \pm 1^\circ\text{C}$ で最長 15 日間、キセノン光（光強度：456 W/m²、波長：300~800 nm）を照射し、同時に揮発性成分を捕集して水中光分解試験が実施された。

推定半減期は表 17 に示されている。

未変化のオキサチアピプロリンは、照射開始日の 95.4%TAR~104%TAR から光照射 15 日後には 48.4%TAR~63.0%TAR まで減少した。残留成分として緩衝液中では分解物 G、I 及び b が、自然水中では分解物 b のみが認められ、最大値は緩衝液中で認められた分解物 b の 14.0%TAR であった。緩衝液及び自然水中での光分解様式は、ほぼ同様と考えられ、イソキサゾリン環の開裂によって分解物 b 及びジフルオロ安息香酸が生じ、続いてチアゾール環の開裂によって分解物 I が生成し、さらに G へと分解されると考えられた。

暗所対照区ではオキサチアピプロリンの分解はほとんど認められなかった。また、いずれの処理区においても揮発性成分は認められなかった。（参照 2、18）

表 17 オキサチアピプロリンの推定半減期（日）

| 試料 | キセノン光 | 自然太陽光（北緯 35 度、春） |
|----------|-------|------------------|
| pH 7 緩衝液 | 15.4 | 71.0 |
| 自然水 | 20.2 | 93.2 |

5. 土壌残留試験

沖積土・壤土（高知）及び火山灰土・埴壤土（熊本）を用いて、オキサチアピプロリン及び分解物 B を分析対象化合物とした土壌残留試験が実施された。

結果は表 18 に示されている。（参照 2、19）

表 18 土壌残留試験成績

| 試験 | 濃度 | 土性 | 推定半減期（日） | |
|----------|---------------------------|----------|------------|----------------------|
| | | | オキサチアピプロリン | オキサチアピプロリン ＋分解物 B |
| ほ場 畑地 | 153 g ai/ha ¹⁾ | 沖積土・壤土 | 約 17 | 約 18 |
| | | 火山灰土・埴壤土 | 約 12 | 約 12 |

¹⁾：10.2%フロアブル

6. 作物残留試験

(1) 作物残留試験

国内において、野菜、果実等を用いてオキサチアピプロリン、代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 3 に示されている。

オキサチアピプロリンの最大残留値は、最終散布 3 日後に収穫したぶどう（果実）の 0.22 mg/kg であった。代謝物 B、C 及び D はいずれの試料においても定量限界未満であった。

海外において、野菜、果実等を用いてオキサチアピプロリン、代謝物 C、D、F、L、X、Z 及び f を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別紙 4 に示されている。

オキサチアピプロリンの最大残留値は、最終散布当日に収穫したバジル（乾燥茎葉）の 34 mg/kg、代謝物 C 及び D の最大残留値は、最終散布当日に収穫したバジル（乾燥茎葉）の 0.048 及び 0.18 mg/kg、代謝物 F 及び L の最大残留値は最終散布当日に収穫したオレンジ（果実全体）の 0.0241 及び 0.0244 mg/kg、代謝物 Z の最大残留値は最終散布 85 日後に収穫したトマト（果実）の 0.006 mg/kg であった。代謝物 X 及び f はいずれも定量限界未満であった。（参照 2、20、73～84、88～97）

(2) 推定摂取量

別紙 3 の作物残留試験の分析値を用いて、オキサチアピプロリンを暴露評価対象物質とした際に食品中から摂取される推定摂取量が表 19 に示されている（別紙 5 参照）。

なお、本推定摂取量の算定は、登録された使用方法からオキサチアピプロリンが最大の残留を示す使用条件で、全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。（参照 2、48）

表 19 食品中より摂取されるオキサチアピプロリンの推定摂取量

| | 国民平均 (体重：55.1 kg) | 小児 (1～6 歳) (体重：16.5 kg) | 妊婦 (体重：58.5 kg) | 高齢者 (65 歳以上) (体重：56.1 kg) |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 摂取量 ($\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$) | 6.99 | 4.24 | 9.47 | 7.66 |

7. 一般薬理試験

マウス及びラットを用いた一般薬理試験が実施された。

結果は表 20 に示されている。(参照 2、21)

表 20 一般薬理試験概要

| 試験の種類 | 動物種 | 動物数 /群 | 投与量 (mg/kg 体重) (投与経路) | 最大無作用量 (mg/kg 体重) | 最小作用量 (mg/kg 体重) | 結果の概要 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| 一般症状 (Irwin 法) | ICR マウス | 雌雄 5 | 0、200、600、 2,000 (経口) | 2,000 | — | 影響なし |
| 自発運動量に 及ぼす影響 | ICR マウス | 雌雄 5 | 0、200、600、 2,000 (経口) | 2,000 | — | 影響なし |
| 呼吸数、1 回換 気量 | SD ラット | 雌雄 5 | 0、200、600、 2,000 (経口) | 2,000 | — | 影響なし |
| 血圧、心拍数 (Tail-cuff 法) | SD ラット | 雌雄 5 | 0、200、600、 2,000 (経口) | 2,000 | — | 影響なし |

注) 溶媒として 0.5%MC 水溶液が用いられた。

—：最小作用量は設定されなかった。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

オキサチアピプロリン (原体) のラットを用いた急性毒性試験が実施された。

結果は表 21 に示されている。(参照 2、22、23、24)

表 21 急性毒性試験概要 (原体)

| 投与経路 | 動物種 | LD ₅₀ (mg/kg 体重) | | 観察された症状 |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | 雄 | 雌 | |
| 経口 ^a | SD ラット 雌 6 匹 ^b | / | | 症状及び死亡例なし |
| 経皮 | SD ラット 一群雌雄各 5 匹 | >5,000 | >5,000 | 症状及び死亡例なし |
| 吸入 | SD ラット 一群雌雄各 5 匹 | LC ₅₀ (mg/L) | | 体重減少 |
| | | >5.1 | >5.1 | |

a：上げ下げ法で評価

b：175、500 及び 1,750 mg/kg 体重投与群で各 1 匹、5,000 mg/kg 体重投与群で 3 匹使用された。

(2) 急性神経毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 12 匹) に、オキサチアピプロリンを 0、200、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重の用量で単回経口投与して、急性神経毒性試験が実施された。

検体投与による影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量である 2,000 mg/kg 体重であると考えられた。急性神経毒性は認められなかった。(参照 2、25)

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

オキサチアピプロリン (原体) の NZW ウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施され、眼粘膜に対しては、検体投与 1 時間後に全例に結膜の発赤及び分泌物が認められたが、72 時間後には消失した。皮膚に対しては刺激性は認められなかった。

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験 (Maximization 法) が実施され、感作性は陰性であった。(参照 2、26~28)

10. 亜急性毒性試験

(1) 28 日間亜急性毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 5 匹) を用いた混餌 (原体 : 0、500、2,000、7,500 及び 20,000 ppm : 平均検体摂取量は表 22 参照) 投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 22 28 日亜急性毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

| 投与群 | | 500 ppm | 2,000 ppm | 7,500 ppm | 20,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 37 | 153 | 580 | 1,660 |
| | 雌 | 40 | 159 | 588 | 1,770 |

検体投与によって、一般状態、体重変化、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査、臓器重量及び病理組織学的検査結果に影響は認められなかった。投与期間終了後に肝臓中総 P450、CYP1A1、CYP1A2、CYP2B1/2、CYP2E1、CYP3A2、CYP4A1/2/3 の発現及び UDP-GT 活性が測定されたが、検体投与による影響は認められなかった。また、投与 21 日の血漿中代謝物の測定において、雌雄とも未変化のオキサチアピプロリンのほか、雄では代謝物 F、K 及び Y、雌では代謝物 F が認められた。雌の血漿中の未変化のオキサチアピプロリン濃度は雄に比べ約 10 倍高く、雄では代謝物 F の濃度がオキサチアピプロリンの濃度より高かったことから、オキサチアピプロリンの代謝能は雌より雄で高いことが示唆された。

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 20,000 ppm (雄 : 1,660 mg/kg 体重/日、雌 :

1,770 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、29)

(2) 90 日間亜急性毒性試験 (ラット)

SD ラット (主群: 一群雌雄各 10 匹、亜急性神経毒性試験群: 一群雌雄各 5 匹) を用いた混餌 (原体: 0、500、2,000、6,000 及び 18,000 ppm: 平均検体摂取量は表 23 参照) 投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。本試験においては神経毒性に関連する項目も合わせて検査された。

表 23 90 日間亜急性毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

| 投与群 | | 500 ppm | 2,000 ppm | 6,000 ppm | 18,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 29 | 117 | 359 | 1,100 |
| | 雌 | 36 | 145 | 433 | 1,300 |

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、亜急性毒性及び亜急性神経毒性ともに無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 18,000 ppm (雄: 1,100 mg/kg 体重/日、雌: 1,300 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、30)

(3) 28 日間亜急性毒性試験 (マウス)

ICR マウス (一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌 (原体: 0、200、800、3,500 及び 7,000 ppm: 平均検体摂取量は表 24 参照) 投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 24 28 日間亜急性毒性試験 (マウス) の平均検体摂取量

| 投与群 | | 200 ppm | 800 ppm | 3,500 ppm | 7,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 32 | 129 | 597 | 1,150 |
| | 雌 | 41 | 175 | 745 | 1,440 |

検体投与によって、一般状態、体重変化、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査、臓器重量及び病理組織学的検査結果に影響は認められなかった。投与期間終了後に肝臓中総 P450 及び UDP-GT 活性並びに抗ラット抗体を用いた CYP1A1、CYP1A2、CYP2B、CYP2E、CYP3A 及び CYP4A の発現が測定されたが、検体投与による影響は認められなかった。また、投与 21 日の血漿中には雌雄とも未変化のオキサチアピプロリンのほか、雄では代謝物 F、K、Y 及び a、雌では代謝物 F が認められた。

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,500 ppm (雄: 1,150 mg/kg 体重/日、雌: 1,440 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2、31)

(4) 90日間亜急性毒性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各 10 匹)を用いた混餌(原体:0、200、800、3,500 及び 7,500 ppm:平均検体摂取量は表 25 参照)投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 25 90 日間亜急性毒性試験(マウス)の平均検体摂取量

| 投与群 | | 200 ppm | 800 ppm | 3,500 ppm | 7,500 ppm |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 28.5 | 119 | 491 | 1,060 |
| | 雌 | 35.3 | 155 | 660 | 1,470 |

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,500 ppm(雄:1,060 mg/kg 体重/日、雌:1,470 mg/kg 体重/日)であると考えられた。(参照 2、32)

(5) 90日間亜急性毒性試験(イヌ)

ビーグル犬(一群雌雄各 4 匹)を用いた混餌(原体:0、40⁴、400、4,000 及び 36,000 ppm:平均検体摂取量は表 26 参照)投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 26 90 日間亜急性毒性試験(イヌ)の平均検体摂取量

| 投与群 | | 40 ppm | 400 ppm | 4,000 ppm | 36,000 ppm |
|-------------------------|---|--------|---------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 1.6 | 16.6 | 167 | 1,420 |
| | 雌 | | 16.1 | 172 | 1,430 |

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 36,000 ppm(雄:1,420 mg/kg 体重/日、雌:1,430 mg/kg 体重/日)であると考えられた。(参照 2、33)

(6) 28日間亜急性毒性試験(イヌ) <参考資料⁵>

混餌飼料の嗜好性を確認するため、ビーグル犬(一群雌雄各 2 匹)を用いた混餌(原体:0、1,000、10,000 及び 40,000 ppm:平均検体摂取量は表 27 参照)投与による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

⁴ 40 ppm 投与群は雄のみ設定された。

⁵ 動物数が少ないため、参考資料とした。

表 27 28 日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

| 投与群 | | 1,000 ppm | 10,000 ppm | 40,000 ppm |
|-------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 30 | 352 | 1,370 |
| | 雌 | 31 | 331 | 1,350 |

一般状態、体重変化、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査及び病理組織学的検査結果に検体投与による影響は認められなかった。また、混餌投与による嗜好性の低下も観察されなかった。

投与期間終了後に肝臓中の総 P450 及び UDP-GT 活性並びに抗ラット抗体を用いた CYP1A1、CYP2B、CYP2E、CYP3A 及び CYP4A の発現が測定された。CYP2B が 10,000 ppm 投与群以上の雄で顕著に増加した以外、検体投与による影響は認められなかった。また、投与 21 日の血漿中では雌雄とも未変化のオキサチアピプロリンが主に認められたほか代謝物 F が認められた。代謝物の雌雄差は認められなかった。

10,000 ppm 投与群以上の雄で、有意差は認められないものの肝臓の絶対及び比重量⁶が増加傾向を示した。また、病理組織学的検査において、1,000 ppm 以上投与群の雄全例でグリコーゲンの蓄積と考えられる軽度な肝細胞空胞化が認められたが、程度の増強に用量依存性はなく、認められた変化はいずれも軽度な変化であった。ほかに肝傷害を示す変化は認められなかったことから、これらの肝臓の変化が毒性影響である可能性は低く、肝重量増加は薬物代謝酵素誘導に関連している可能性が考えられた。（参照 2、34）

（7）28 日間亜急性経皮毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた経皮（原体：0、150、450 及び 1,000 mg/kg 体重/日、6 時間/日）投与による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群でも検体投与による影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量である 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 2、35）

（8）28 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 C）

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、300、1,500、7,500 及び 15,000 ppm：平均検体摂取量は表 28 参照）投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

⁶ 体重比重量のことを比重量という（以下同じ。）。

表 28 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 C）の平均検体摂取量

| 投与群 | | 300 ppm | 1,500 ppm | 7,500 ppm | 15,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 23.5 | 116 | 588 | 1,160 |
| | 雌 | 29.7 | 136 | 641 | 1,270 |

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 15,000 ppm（雄：1,160 mg/kg 体重/日、雌：1,270 mg/kg 体重/日）であると考えられた。FOB では検体投与による影響は認められなかった。（参照 2、36）

1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（原体：0、40、400、4,000 及び 36,000 ppm：平均検体摂取量は表 29 参照）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

表 29 1 年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

| 投与群 | | 40 ppm | 400 ppm | 4,000 ppm | 36,000 ppm |
|-------------------------|---|--------|---------|-----------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 1.4 | 13.6 | 148 | 1,240 |
| | 雌 | 1.4 | 13.8 | 137 | 1,460 |

4,000 ppm 以上投与群雌で、有意差は認められないものの肝絶対及び比重量が同程度増加した。これらの群では肝障害に関連する血液生化学的検査及び病理組織学的検査項目の変化は認められなかったことから、毒性影響の可能性は低いと考えられた。

本試験において、検体投与に関連した毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 36,000 ppm（雄：1,240 mg/kg 体重/日、雌：1,460 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、37）

(2) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）

SD ラット（慢性毒性試験群：一群雌雄各 10 匹、発がん性試験群：一群雌雄各 60 匹）を用いた混餌⁷（原体：0、500、2,000、6,000/7,500⁸及び 18,000 ppm：平均検体摂取量は表 30 参照）投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

⁷ ラットを用いた 90 日間亜急性毒性試験 [10. (2)] の結果に基づき、上限用量の 1,000 mg/kg 体重/日にはほぼ相当する 18,000 ppm を本試験の最高用量とした。

⁸ 投与 3 週まで 6,000 ppm、投与 4 週～105 週は 7,500 ppm で投与された。

表 30 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群 | | 500 ppm | 2,000 ppm | 6,000/7,500 ppm | 18,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------------|------------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 20.7 | 84.3 | 309 | 735 |
| | 雌 | 27.2 | 109 | 378 | 958 |

本試験において、いずれの投与群でも検体投与による影響は認められず、発生頻度の増加した腫瘍性病変も認められなかった。無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 18,000 ppm（雄：735 mg/kg 体重/日、雌：958 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、38）

（3）18 か月間発がん性試験（マウス）

ICR マウス（52 週間後中間と殺群：一群雌雄各 12 匹、発がん性試験群：一群雌雄各 51 匹）を用いた混餌（原体：0、200、800、3,500 及び 7,000 ppm、平均検体摂取量は表 31 参照）投与による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 31 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

| 投与群 | | 200 ppm | 800 ppm | 3,500 ppm | 7,000 ppm |
|-------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日) | 雄 | 26.8 | 110 | 468 | 948 |
| | 雌 | 30.0 | 125 | 529 | 1,110 |

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。7,000 ppm 投与群雌で肝絶対及び比重量が増加した。同群では肝傷害に関連した病理組織学的検査項目の変化は認められなかったことから、肝重量の増加が毒性影響である可能性は低いと考えられた。

本試験において、いずれの投与群でも検体投与による影響は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量である 7,000 ppm（雄：948 mg/kg 体重/日、雌：1,110 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、39）

1 2. 生殖発生毒性試験

（1）2 世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、500/300、1,500/900、6,000/3,500 及び 17,000/10,000 ppm：平均検体摂取量⁹は表 32 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。なお、F₂ 世代の雄児動物を各腹 1 匹ずつ無作

⁹ 生後 0～42 日では限界用量(1,000 mg/kg 体重/日)を著しく超えないようにするため、飼料中濃度をそれぞれ 0、300、900、3,500 及び 10,000 ppm とした。

為に選抜し、性成熟完了まで（生後 60 日）観察が実施された。

表 32 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群 ¹⁾ | | | 500/ 300 ppm | 1,500/ 900 ppm | 6,000/ 3,500 ppm | 17,000/ 10,000 ppm | | |
|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 平均検体 摂取量 (mg/kg 体重 /日) | P 世代 | 雄 | 交配前 | 29.2 | 86.4 | 346 | 1,010 | |
| | | 雌 | 交配前 | 34.3 | 106 | 430 | 1,210 | |
| | 妊娠期 | | 31.4 | 95.1 | 383 | 1,110 | | |
| | 哺育期 | | 40.9 | 119 | 483 | 1,370 | | |
| | F ₁ 世代 | 雄 | 交配前 ²⁾ | 36.6 | 108 | 422 | 1,230 | |
| | | | | 34.4 | 104 | 411 | 1,200 | |
| | | 雌 | 交配前 ²⁾ | 37.1 | 109 | 426 | 1,240 | |
| | | | | 41.2 | 116 | 465 | 1,360 | |
| | | 妊娠期 | 32.5 | 98.1 | 390 | 1,150 | | |
| | | 哺育期 | 41.3 | 127 | 494 | 1,420 | | |
| | F ₂ 世代 | 雄 | 哺育期 ³⁾ | | 37.2 | 111 | 430 | 1,280 |
| | | | | | 43.5 | 131 | 519 | 1,520 |

¹⁾：哺育期間（P 及び F₁ 世代）及び生後 42 日までの期間（F₁ 雌雄及び F₂ 雄）は、飼料中濃度をそれぞれ 0、300、900、3,500 及び 10,000 ppm とした。

²⁾：上段が生後 42 日まで、下段が生後 42～91 日の摂取量

³⁾：上段が生後 42 日まで、下段が生後 42～60 日の摂取量

各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。

親動物では、P 及び F₁ 世代の雌で 1,500 ppm 以上投与群の副腎絶対及び比重量が増加したが、用量相関性が明らかでなく対応する病理組織学的変化も観察されなかった。また、17,000 ppm 投与群の F₁ 雌ではやや上回るものの、いずれの値もほぼ背景データの範囲内であった。これらのことから、副腎重量の増加は検体投与による可能性はあるが、毒性影響である可能性は低いと考えられた。

F₁ 世代の雌で 1,500 ppm 以上投与群の腎絶対及び比重量増加が認められたが、腎臓に病理組織学的変化は認められず、いずれの値も背景データの範囲内であったことから、毒性学的意義のない偶発的な変化であると考えられた。

本試験において、親動物ではいずれの投与群でも検体投与による影響は認められず、児動物では 17,000 ppm 投与群の雄で包皮分離完了日齢遅延、同群の雌で体重増加抑制が認められたことから、無毒性量は親動物の雄雌で本試験の最高用量である 17,000 ppm（P 雄：1,010 mg/kg 体重/日、P 雌：1,210 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：1,200 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：1,240 mg/kg 体重/日）、児動物の雌雄で 6,000 ppm（P 雄：346 mg/kg 体重/日、P 雌：430 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：411 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：426 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 2、40）

表 33 2 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

| 投与群 | | 親：P、児：F ₁ | | 親：F ₁ 、児：F ₂ | |
|-----|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| | | 雄 | 雌 | 雄 | 雌 |
| 親動物 | 17,000/10,000 ppm 以下 | 毒性所見なし | 毒性所見なし | 毒性所見なし | 毒性所見なし |
| 児動物 | 17,000/10,000 ppm | 17,000 ppm 以下 | 17,000 ppm 以下 | ・包皮分離完了 日齢遅延 | ・体重増加抑制 (哺育 21 日) |
| | 6,000/3,500 ppm 以下 | 毒性所見なし | 毒性所見なし | 毒性所見なし | 毒性所見なし |

(2) 1 世代繁殖試験（ラット）＜参考資料¹⁰＞

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、2,000、10,000 及び 20,000 ppm：平均検体摂取量¹¹は表 34 参照）投与による 1 世代繁殖試験が実施された。

表 34 1 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

| 投与群 | | | | 2,000 ppm | 10,000 ppm | 20,000 ppm |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------|-----------|------------|------------|
| | | 雄 | 雌 | | | |
| 平均検体 摂取量 (mg/kg 体重/日) | P 世代 | 雄 | 交配前 | 129 | 653 | 1,320 |
| | | | 交配前 | 150 | 715 | 1,510 |
| | | 雌 | 妊娠期 | 140 | 676 | 1,390 |
| | | | 哺育期 | 316 | 1,660 | 3,090 |
| | F ₁ 世代 | 雄 | 生後 28～42 日 | 257 | 1,250 | 2,730 |
| | | | 生後 28～70 日 | 185 | 914 | 1,950 |
| | | | 生後 28～112 日 | 140 | 701 | 1,460 |
| | | 雌 | 生後 28～42 日 | 266 | 1,260 | 2,600 |
| | | | 生後 28～70 日 | 199 | 978 | 1,980 |
| | | | 生後 28～112 日 | 161 | 806 | 1,610 |

各投与群で認められた毒性所見は表 35 に示されている。（参照 2、66）

¹⁰ 一群当たりの使用動物数が不足しているため参考資料とした。

¹¹ ラットを用いた 28 日間亜急性毒性試験 [10. (1)] 及びラットを用いた発生毒性スクリーニング試験の結果に基づき、本試験の投与量が設定された。

表 35 1 世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

| 投与群 | | 親：P、児：F ₁ | |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------|
| | | 雄 | 雌 |
| 親動物 | 20,000 ppm | 20,000 ppm 以下 毒性所見なし | ・体重増加抑制 (交配前 0～7 日) |
| | 10,000 ppm 以下 | | 毒性所見なし |
| 児動物 | 20,000 ppm | ・体重増加抑制 ・包皮分離完了日齢遅延 | ・体重増加抑制 |
| | 10,000 ppm 以下 | 毒性所見なし | 毒性所見なし |

(3) 発生毒性試験（ラット）

SD ラット（一群雌 22 匹）の妊娠 6～20 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%MC/0.1%Tween80 混合水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、41）

(4) 発生毒性試験（ウサギ）

NZW ウサギ（一群雌 22 匹）の妊娠 7～28 日に強制経口（原体：0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%MC/0.1%Tween80 混合水溶液）投与して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、検体投与に関連した影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、42）

1 3. 遺伝毒性試験

オキサチアピプロリン（原体）の細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞を用いた遺伝子突然変異試験、ヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 36 に示されているとおり、全て陰性であったことから、オキサチアピプロリンに遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、43～46）

表 36 遺伝毒性試験概要（原体）

| 試験 | | 対象 | 処理濃度・投与量 | 結果 |
|----------|-----------|---|---|----|
| in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2uvrA 株) | ①33.3～5,000 µg/プレート (+/- S9) ②333～5,000 µg/プレート (+/- S9) | 陰性 |
| | 遺伝子突然変異試験 | チャイニーズハムスター 卵巣由来細胞 (CHO-K1) (<i>Hprt</i>) | 5～100 µg/mL (+/- S9) | 陰性 |
| | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康な複数ボランティア) | ①100～5,000 µg/mL (4 時間処理、-S9) ②50～2,000 µg/mL (4 時間処理、+S9) ③50～5,000 µg/mL (20 時間処理、-S9) | 陰性 |
| in vivo | 小核試験 | ICR マウス (一群雌雄 5 匹) (骨髓細胞) | 500、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (単回経口投与、投与 24 及び 48 時間後に採取) | 陰性 |

+/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

代謝物 B、C 及び D（動物、植物及び環境由来）、H（動物及び環境由来）並びに Z（植物由来）の細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞を用いた遺伝子突然変異試験、ヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 37 に示されているとおり、ヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験において代謝物 C が細胞増殖を 50%抑制した最高用量群で陽性であった。それ以外の試験では陰性であった。（参照 2、47～60）

表 37 遺伝毒性試験概要（代謝物）

| 被験物質 | 試験 | 対象 | 処理濃度・投与量 | 結果 | |
|------|----------|-----------|--|---|----|
| B | in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>S.typhimurium</i> (TA98 、 TA100 、 TA1535、TA1537 株) <i>E.coli</i> (WP2uvrA 株) | ①1.5～5,000 µg/プレー ト (+/- S9) ②50～5,000 µg/プレー ト (+/- S9) | 陰性 |
| | | 遺伝子突然変異試験 | チャイニーズハムス ター卵巣由来細胞 (CHO-K1) (<i>Hprt</i>) | 100～1,250 µg/mL (+/- S9) | 陰性 |
| | | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康なボランティ ア複数) | ①250～1,000 µg/mL (4 時間処理、+/- S9) ②50～250 µg/mL (22 時間処理、-S9) | 陰性 |

| 被験物質 | 試験 | | 対象 | 処理濃度・投与量 | 結果 |
|------|----------|-----------|--|---|------------------------------|
| C | in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>S.typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537株) <i>E.coli</i> (WP2uvrA株) | ①1.5~5,000 µg/プレート (+/- S9) ②50~5,000 µg/プレート (-S9) 5.0~5,000 µg/プレート (+S9) | 陰性 |
| | | 遺伝子突然変異試験 | チャイニーズハムスター卵巣由来細胞 (CHO-K1-BH ₄) (<i>Hprt</i>) | 100~1,800 µg/mL (+/- S9) | 陰性 |
| | | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康な非喫煙者の24歳女性ボランティア1名) | ①880~1,800 µg/mL (4時間処理、-S9) ②310~1,800 µg/mL (20時間処理、-S9) ③1,000~1,800 µg/mL (4時間処理、+S9) | 陽性 (構造異常) 陰性 (数的異常) |
| | in vivo | 小核試験 | ICRマウス (骨髄細胞) (一群雌雄各5匹) | 500、1,000、2,000 mg/kg 体重 (単回経口投与) (投与24及び48時間後に採取) | 陰性 |
| D | in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>S.typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537株) <i>E.coli</i> (WP2uvrA株) | ① 1.5~5,000 µg/プレート (+/- S9) ②50~5,000 µg/プレート (+/- S9) | 陰性 |
| | | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康なボランティア複数) | ①500~2,080 µg/mL (4時間処理、+/- S9) ②500~2,080 µg/mL (20時間処理、-S9) | 陰性 |
| H | in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>S.typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537株) <i>E.coli</i> (WP2uvrA株) | ①1.5~5,000 µg/プレート (+/- S9) ②50~5,000 µg/プレート (+/- S9) | 陰性 |
| | | 遺伝子突然変異試験 | チャイニーズハムスター卵巣由来細胞 (CHO-K1) (<i>Hprt</i>) | 10~250 µg/mL (+/- S9) | 陰性 |
| | | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康なボランティア複数) | ① 50~600 µg/mL (4時間処理、-S9) ②25~150 µg/mL (4時間処理、+S9) ③25~150 µg/mL (20時間処理、-S9) | 陰性 |

| 被験物質 | 試験 | | 対象 | 処理濃度・投与量 | 結果 |
|------|----------|----------|--|---|----|
| Z | in vitro | 復帰突然変異試験 | <i>S.typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、TA1537株) <i>E.coli</i> (WP2uvrA株) | ①1.5～5,000 µg/プレート (+/- S9) ②50～5,000 µg/プレート (+/- S9) | 陰性 |
| | | 染色体異常試験 | ヒト末梢血リンパ球 (健康なボランティア複数) | ①1,500～3,420 µg/mL (4時間処理、+/- S9) ②1,500～3,420 µg/mL (20時間処理、- S9) | 陰性 |

+/- S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

14. その他の試験

(1) 14日間反復投与毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 5 匹) を用いた 14 日間反復経口 (原体 : 0、25、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日) 投与による肝薬物代謝酵素活性の誘導が検討された。

検体投与によって、一般状態、体重変化、血液学的検査、血液生化学検査、尿検査、臓器重量及び病理組織学的検査結果に影響は認められなかった。投与 21 日目に総 P450、CYP1A1、CYP1A2、CYP2B1/2、CYP2E1、CYP3A 及び CYP4A の発現が測定され、1,000 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で CYP2B1 の増加が認められた。(参照 2、61)

(2) 28日間免疫毒性試験 (マウス)

ICR マウス (一群雌 10 匹) を用いた混餌 (原体 : 0、200、8,000、3,500 及び 7,000 ppm : 平均検体摂取量は表 38 参照) 投与による 28 日間免疫毒性試験が実施された。SRBC を投与 23 日後に尾静脈から投与し、投与 5 日後にマウス血清試料中の SRBC 特異的 IgM を測定した。陽性対照としてシクロホスファミド一水和物を SRBC 投与 23 日後から 5 日間連続で腹腔内投与する群が設定された。

表 38 28日間免疫毒性試験 (マウス) の平均検体摂取量

| 投与群 | | 200 ppm | 8,000 ppm | 3,500 ppm | 7,000 ppm |
|---------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 平均検体摂取量(mg/kg 体重/日) | 雌 | 38 | 151 | 645 | 1,430 |

陽性対照群ではマウス血清中抗体価の低下が認められた。オキサチアピプロリン投与群では検体投与の影響は認められず、マウス血清中抗体価には検体投与による影響は認められなかった。本試験条件下では免疫毒性は認められなかった。(参照 2、62)

(3) 内分泌系への影響

a. 雄ラットを用いた15日間反復投与試験

SDラット（主試験：一群雄15匹、確認試験：一群雄15匹）にオキサチアピプロリンを15日間強制経口（原体：0、500及び1,000 mg/kg 体重/日）投与して最終投与3時間後にと殺し、内分泌系への影響が検討された。

主試験の1,000 mg/kg 体重/日投与群で血中FSH濃度の低下が認められたが、2回実施された確認試験で再現性が認められなかったことから、検体投与による影響ではなく偶発的变化であると考えられた。甲状腺、精巣及び精巣上体において、臓器重量、肉眼的及び病理組織学的検査で検体投与による影響は認められなかった。（参照2、63）

b. 雌ラットを用いた子宮肥大試験

SDラット（一群雌10匹）の卵巣を摘出した後、オキサチアピプロリンを4日間強制経口（原体：0、500及び1,000 mg/kg 体重/日）投与して最終投与24時間後にと殺し、子宮重量及び内分泌系への影響が検討された。

検体投与による膣スメア検査、肝臓及び子宮重量に検体投与による影響は認められなかった。本試験条件下でオキサチアピプロリンは、卵巣摘出ラット子宮に対してエストロゲン作用を示さなかった。（参照2、64）

c. ヒト由来細胞を用いたステロイド産生能影響試験 (*in vitro*)

ヒト副腎皮質癌由来細胞（H295R）の培養系にオキサチアピプロリンを 2.5×10^{-9} ~ 7.9×10^{-6} Mで処理し、48時間後のテストステロン及びエストラジオールが測定された。その結果、本試験条件下でオキサチアピプロリンはテストステロン及びエストラジオール合成に影響しないと考えられた。（参照2、65）

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬「オキサチアピプロリン」の食品健康影響評価を実施した。なお、今回、海外作物残留試験（だいず、レモン等）の成績が新たに提出された。

14C で標識したオキサチアピプロリンを用いた動物体内運命試験の結果、ラットに経口投与されたオキサチアピプロリンの体内吸収率は、単回投与後 48 時間で低用量群では 31.3%~48.9%、高用量群では 5.56%~7.94%と算出された。低用量群において投与後 48 時間までの排泄率は、糞中が 43.3%~59.8%、胆汁中が 29.2%~45.2%、尿中が 1.53%~3.23%であった。

14C で標識したオキサチアピプロリンを用いた植物体内運命試験の結果、残留放射能中には未変化のオキサチアピプロリンのほか、ばれいしょ（塊茎）で代謝物 C、D 及び X が、レタス（茎葉）及びぶどう（果実）で代謝物 C 及び D が、ズッキーニ（果実）で代謝物 D が単独で 10%TRR を超えて認められた。

オキサチアピプロリン、代謝物 B、C 及び D を分析対象化合物とした国内における作物残留試験の結果、オキサチアピプロリンの最大残留値は、ぶどう（果実）の 0.22 mg/kg であった。代謝物 B、C 及び D はいずれも定量限界未満であった。オキサチアピプロリン、代謝物 C、D、F、L、X、Z 及び f を分析対象化合物とした海外における作物残留試験の結果、オキサチアピプロリンの最大残留値はバジル（乾燥茎葉）の 34 mg/kg、代謝物 C 及び D の最大残留値はバジル（乾燥茎葉）の 0.048 及び 0.18 mg/kg、代謝物 F 及び L の最大残留値はオレンジ（果実全体）の 0.0241 及び 0.0244 mg/kg、代謝物 Z の最大残留値はトマト（果実）の 0.006 mg/kg であった。代謝物 X 及び f はいずれも定量限界未満であった。

各種毒性試験結果から、オキサチアピプロリン投与による影響は、ラット 2 世代繁殖試験における児動物の体重増加抑制及び包皮分離完了日齢遅延のみに認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

植物体内運命試験の結果、10%TRR を超える代謝物として C、D 及び X が認められたが、これらはラットにおいても検出される代謝物であったことから、農産物中の暴露評価対象物質をオキサチアピプロリン（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 39 に示されている。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 世代繁殖試験の 346 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 3.4 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、オキサチアピプロリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったため、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。

ADI

3.4 mg/kg 体重/日

| | |
|--------------|----------------|
| (ADI 設定根拠資料) | 2 世代繁殖試験 |
| (動物種) | ラット |
| (期間) | 2 世代 |
| (投与方法) | 混餌 |
| (無毒性量) | 346 mg/kg 体重/日 |
| (安全係数) | 100 |

ARfD 設定の必要なし

表 39 各試験における無毒性量等

| 動物種 | 試験 | 投与量 (mg/kg 体重/日) | 無毒性量 (mg/kg 体重/日) | 最小毒性量 (mg/kg 体重/日) | 備考 1) |
|-----|-------------------------------|---|--|--|--|
| ラット | 28 日間 亜急性毒 性試験 | 0、500、2,000、7,500、 20,000 ppm ----- 雄：0、37、153、580、 1,660 雌：0、40、159、588、 1,770 | 雄：1,660 雌：1,770 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所 見なし |
| | 90 日間 亜急性 毒性試験 | 0、500、2,000、6,000、 18,000 ppm ----- 雄：0、29、117、359、 1,100 雌：0、36、145、433、 1,300 | 雄：1,100 雌：1,300 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所 見なし (亜急性神 経毒性は認 められない) |
| | 2 年間慢 性毒性/ 発がん性 併合試験 | 0、500、2,000、 6,000/7,500、18,000 ppm ----- 雄：0、20.7、84.3、309、 735 雌：0、27.2、109、378、 958 | 雄：735 雌：958 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所 見なし (発がん性 は認められ ない) |
| | 2 世代 繁殖試験 | 0、500/300、1,500/900、 6,000/3,500、 17,000/10,000 ppm ----- P 雄 (交配前)：0、29.2、 86.4、346、1,010 P 雌 (交配前)：0、34.3、 106、430、1,210 F ₁ 雄 (交配前、生後 42 日まで)：0、36.6、108、 422、1,230 F ₁ 雄 (交配前、生後 42 ～91 日)：0、34.4、104、 411、1,200 F ₁ 雌 (交配前、生後 42 日まで)：0、37.1、109、 426、1,240 F ₁ 雌 (交配前、生後 42 ～91 日)：0、41.2、116、 465、1,360 | 親動物 P 雄：1,010 P 雌：1,210 F ₁ 雄：1,200 F ₁ 雌：1,240 児動物 P 雄：346 P 雌：430 F ₁ 雄：411 F ₁ 雌：426 | 親動物 P 雄：— P 雌：— F ₁ 雄：— F ₁ 雌：— 児動物 P 雄：1,010 P 雌：1,210 F ₁ 雄：1,200 F ₁ 雌：1,240 | 親動物 雄雌：毒性所 見なし 児動物 雄：包皮分離 完了日齢遅 延 雌：体重増加 抑制 (哺育 21 日) (繁殖能に 対する影響 は認められ ない) |

| | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| | 発生毒性試験 | 0、100、300、1,000 | 母動物：1,000 胎児：1,000 | 母動物：— 胎児：— | 母動物：毒性所見なし 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない) |
| マウス | 28日間 亜急性 毒性試験 | 0、200、800、3,500、 7,000 ppm 雄：0、32、129、597、 1,150 雌：0、41、175、745、 1,440 | 雄：1,150 雌：1,440 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所見なし |
| | 90日間 亜急性 毒性試験 | 0、200、800、3,500、 7,500 ppm 雄：0、28.5、119、491、 1,060 雌：0、35.3、155、660、 1,470 | 雄：1,060 雌：1,470 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所見なし |
| | 18か月 間発がん 性試験 | 0、200、800、3,500、 7,000 ppm 雄：0、26.8、110、468、 948 雌：0、30.0、125、529、 1,110 | 雄：948 雌：1,110 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認められない) |
| ウサギ | 発生毒性試験 | 0、100、300、1,000 | 母動物：1,000 胎児：1,000 | 母動物：— 胎児：— | 母動物：毒性所見なし 胎児：毒性所見なし (催奇形性は認められない) |
| イヌ | 90日間 亜急性 毒性試験 | 雄：0、40、400、4,000、 36,000 ppm 雌：0、400、4,000、 36,000 ppm 雄：0、1.6、16.6、167、 1,420 雌：0、16.1、172、1,430 | 雄：1,420 雌：1,430 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所見なし |

| | | | | | |
|------------|-----------|---|--------------------|------------|-----------|
| | 1年間慢性毒性試験 | 0、40、400、4,000、36,000 ppm 雄：0、1.4、13.6、148、1,240 雌：0、1.4、13.8、137、1,460 | 雄：1,240 雌：1,460 | 雄：— 雌：— | 雌雄：毒性所見なし |
| ADI | | | NOAEL：346 | | |
| | | | SF：100 | | |
| | | | ADI：3.4 | | |
| ADI 設定根拠資料 | | | ラット2世代繁殖試験 | | |

ADI：許容一日摂取量、NOAEL：無毒性量、SF：安全係数

—：最小毒性量が設定できなかった。

1)：備考に最小毒性量で認められた所見の概要を示す。

<別紙 1 : 代謝物/分解物略称>

| 記号 | 略称 | 化学名 |
|----|------------------------------------|---|
| A | Q7D13 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[3-メチル-5-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]エタノン |
| B | RAB06 | 1-[2-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-オキソエチル]-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-5-カルボン酸 |
| B' | RAB06 異性体 | 3-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-({2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]アセチル}アミノ)ペンタン酸 又は 3-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-({2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]アセチル}アミノ)-3-ペンテン酸 |
| Bg | Gluc-RAB06、 RAB06 グルクロン 酸抱合体 | β -D-グルコピラノシルウロン酸, 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-オキソエチル)-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-5-カルボキシラート |
| C | E8S72 | 3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-5-カルボン酸 |
| D | WR791 | 5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-酢酸 |
| E | Q7D41 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]エタノン |
| E' | Q7D41 異性体 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-3,6-ジヒドロ-1(2 <i>H</i>)-ピリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]エタノン |
| F | Q7H09 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]エタノン |
| G | RLD51 | 1-{2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]アセチル}-4-ピペリジンカルボン酸 |
| H | RDT31 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-4-ヒドロキシ-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]エタノン |
| I | RSA90 | 1-{2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピラゾール-1-イル]アセチル}-4-ピペリジンカルボキサミド |

| 記号 | 略称 | 化学名 |
|----|--------------------|---|
| J | Q9R70 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-3,6-ジヒドロ-1(2 <i>H</i>)-ピリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]エタノン |
| K | Q9L80 | 4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}- α -オキソ-1-ピペリジン酢酸 |
| L | RDG40 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-3-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]エタノン |
| Mg | RPD37 グルコース 抱合体 | 2-[5-({6-O-(2-カルボキシアセチル)- β -D-グルコピラノシル]オキシ)メチル]-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]-1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)エタノン |
| O | RLB24 | N-(3-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-3-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-ヒドロキシペンチル)-1-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]アセトアミド |
| Q | RLB25 | 3-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-({2-[5-ヒドロキシメチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]アセチル}アミノ)ペンタン酸 |
| R | RLB26 | N-(3-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-ヒドロキシペンチル)-1-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]アセトアミド |
| S | RLB27 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-3-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-(ヒドロキシメチル)-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]エタノン |
| T | RLB28 | 3-(2,6-ジフルオロ-3-ヒドロキシフェニル)-3-ヒドロキシ-1-[2-(1-{2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]アセチル}-4-ピペリジル)-1,3-チアゾール-4-イル]-1-プロパノン |
| V | RLB67 | 1-(4-{4-[5-(2,6-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-(ヒドロキシメチル)-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]エタノン |
| W | RDT32 | 3-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-({2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-イル]アセチル}アミノ)ペンタン酸 |
| X | RZB20 | 5-(ヒドロキシメチル)-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール-1-酢酸 |
| Y | KJ552 | 5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> ピラゾール |

| 記号 | 略称 | 化学名 |
|----|-------|--|
| Z | SXS67 | 1-β-D-グルコピラノシル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-5-カルボン酸 |
| a | QPS10 | 4-{4-[5-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}ピペリジン |
| b | P3X26 | 2-(1-{2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]アセチル}-4-ピペリジル)-4-チアゾールカルボン酸 |
| e | RZB21 | 5-(ヒドロキシメチル)-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-アセトアミド |
| f | RZD74 | 3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-5-メタノール |
| U1 | — | N-(3-{4-[5-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-5-ヒドロキシペンチル)-1-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]アセトアミド |
| U2 | — | 1-(4-{4-[5-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール]-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル}-1-ピペリジル)-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]エタノン |
| U3 | — | 3-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)-3-ヒドロキシ-1-[2-(1-{2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]アセチル}-4-ピペリジル)-1,3-チアゾール-4-イル]-1-プロパノン |
| U4 | — | 1-[4-(4-[5-[2-フルオロ-6-(メチルスルフィニル)フェニル]-4,5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-1,3-チアゾール-2-イル)-1-ピペリジル]-2-[5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]エタノン |

—: なし

<別紙 2 : 検査値等略称>

| 略称 | 名称 |
|------------------|---------------------------|
| ai | 有効成分量 (active ingredient) |
| AUC | 薬物濃度曲線下面積 |
| C _{max} | 最高濃度 |
| CYP | チトクローム P450 アイソザイム |
| DHT | ジヒドロテストステロン |
| FOB | 機能観察総合検査 |
| FSH | 卵胞刺激ホルモン |
| LH | 黄体形成ホルモン |
| MC | メチルセルロース |
| P450 | チトクローム P450 |
| SRBC | ヒツジ赤血球 |
| T _{1/2} | 消失半減期 |
| T ₃ | トリヨードサイロニン |
| T ₄ | サイロキシシン |
| TAR | 総投与 (処理) 放射能 |
| TES | テストステロン |
| T _{max} | 最高濃度到達時間 |
| TRR | 総残留放射能 |

<別紙 3 : 作物残留試験成績 (国内) >

| 作物名 (栽培形態) [分析部位] 年度 | 試験 ほ場数 | 使用量* (g ai/ha) | 回 数 (回) | PHI (日) | オキサチアピプロリン | | 代謝物 C | | 代謝物 D | | 代謝物 B | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 |
| ばれいしょ (露地) [塊茎] 平成 24 年 | 1 | 40.4 | 2 | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 21 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 1 | 38.2 | 2 | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 21 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| はくさい (露地) [茎葉] 平成 24 年 | 1 | 40.8 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.04 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 1 | 61.2 | 2 | 1 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| レタス (施設) [茎葉] 平成 24 年 | 1 | 40.8 | 2 | 1 | 0.11 | 0.11 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.14 | 0.14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | 0.12 | 0.12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | 0.11 | 0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 1 | 61.2 | 2 | 1 | 0.15 | 0.15 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.08 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |

| 作物名 (栽培形態) [分析部位] 年度 | 試験 ほ場数 | 使用量* (g ai/ha) | 回 数 (回) | PHI (日) | オキサチアピプロリン | | 代謝物 C | | 代謝物 D | | 代謝物 B | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 | 最高値 | 平均値 |
| トマト (施設) [果実] 平成 23 年 | 1 | 49.6 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 3 | 0.06 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 7 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 14 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 1 | 57.1 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 3 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 7 | 0.04 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 14 | 0.05 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| きゅうり (施設) [果実] 平成 23 年 | 1 | 57.1 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 3 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 7 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 1 | 57.1 | 2 | 1 | 0.04 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 3 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | | | | 14 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ぶどう (施設) [果実] 平成 24 年 | 1 | 71.4 | 2 | 1 | 0.10 | 0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.08 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | 0.08 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | 0.06 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 1 | 66.3 | 2 | 1 | 0.19 | 0.18 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 3 | 0.22 | 0.22 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 7 | 0.18 | 0.18 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | | | | 14 | 0.15 | 0.15 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |

*：全てフロアブル剤を用いた。

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

<別紙 4：作物残留試験成績（海外）>

米国及びカナダ

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| だいず (種子) 2014年 | 1 | 109 ^{SC} 種子処 理 ^a | 1 | 141 | <0.003 (<0.003) |
| だいず (種子) 2014年 | 1 | 110 ^{SC} 種子処 理 ^a | 1 | 151 | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| だいず (種子) 2014年 | 1 | 110 ^{SC} 種子処 理 ^a | 1 | 126 | <0.003 (<0.003) |
| ブロッコリー (花蕾) 2011年 | 1 | 141 ^{OD} | 4 | 0 | 0.25 (0.23) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.18 (0.14) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.10 (0.098) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.005) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 15 | 0.073 (0.061) | <0.003 (<0.003) | 0.009 (0.008) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 29 | 0.024 (0.023) | <0.003 (<0.003) | 0.011 (0.01) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| ブロッコリー (花蕾) 2011年 | 4 | 139~ 142 ^{OD} | 4 | 0 | 0.84 (0.30) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.004*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| アスパラガス (若茎) 2012年 | 1 | 562 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.749 (0.745) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| | | | | 3 | 0.352 (0.349) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| | | | | 10 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| アスパラガス (若茎) 2012年 | 5 | 555~ 566 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.759 (0.487) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| アスパラガス (若茎) 2012年 | 2 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| アスパラガス (若茎) 2012年 | 1 | 280 ^{SC} 大株浸 漬処理 ^a | 2 | 43 ^a | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | 0.0497 (0.0356) | / |
| | | | | 314 ^a | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |
| アスパラガス (若茎) 2012年 | 1 | 789 ^{SC} 大株浸 漬処理 ^a | 2 | 19 ^a | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | 0.0269 (0.0253) | / |
| | | | | 383 ^a | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | / | / | / | <0.009 (<0.009) | / |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f | |
| マスタード グリーン (葉) 2013年 | 1 | 145 ^{OD} | 4 | 0 | 4.42 (4.29) | 0.01 (0.01) | 0.01 (0.01) | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 3 | 3.76 (3.61) | 0.01 (0.01) | 0.01 (0.01) | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 7 | 2.04 (1.83) | 0.01 (0.01) | 0.01 (0.01) | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 13 | 1.22 (1.12) | 0.01 (0.01) | 0.01 (0.01) | / | / | / | / | / | / |
| マスタード グリーン (葉) 2013年 | 9 | 138~ 144 ^{OD} | 4 | 0 | 4.51 (2.97) | 0.01 (0.01) | 0.01 (0.01) | / | / | / | / | / | / |
| ラズベリー (果実) 2012年 | 1 | 568 ^{SC} | 2 | 6 | 0.032 (0.022) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 9 | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 14 | 0.011 (<0.01) | <0.01 (<0.01) |
| ラズベリー (果実) 2012年 | 1 | 568 ^{SC} | 2 | 1 | 0.012 (0.011*) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 3 | 0.020 (0.016) | <0.01 (<0.01) |
| ラズベリー (果実) 2012年 | 1 | 567 ^{SC} | 2 | 1 | 0.370 (0.223) | <0.01 (<0.01) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| ラズベリー (果実) 2012年 | 2 | 554~ 577 ^{SC} | 2 | 1 | <0.01 (<0.01) |
| ブラックベリ ー (果実) 2012年 | 1 | 563 ^{SC} | 2 | 1 | <0.01 (<0.01) |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.31 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 136 | <0.003 (<0.003) |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.16 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 116 | <0.003 (<0.003) |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.40 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 142 | <0.003 (<0.003) |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.31 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 139 | <0.003 (<0.003) |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.25 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 129 | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f | |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.26 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 125 | <0.003 (<0.003) | |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.31 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 148 | <0.003 (<0.003) | |
| ひまわり (種子) 2014年 | 1 | 1.31 ^{SC} 種子処 理 | 1 | 105 | <0.003 (<0.003) | |
| バジル (茎葉を乾燥さ せたもの) 2012年 | 4 | 141~ 145 ^{OD} | 4 | 0 | 34 (27) | 0.048 (0.019*) | 0.18 (0.065) | | | | | | |
| カリフラワー (花蕾) 2011年 | 5 | 139~ 143 ^{OD} | 4 | 0 | 0.17 (0.094) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| キャベツ (外葉あり葉 球) 2011年 | 1 | 139 ^{OD} | 4 | 0 | 0.059 (0.057) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.065 (0.049) | <0.003 (<0.003) | 0.006 (0.005) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.038 (0.035) | <0.003 (<0.003) | 0.008 (0.008) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | 0.014 (0.013) | <0.003 (<0.003) | 0.011 (0.009) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | 0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.007 (0.007) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| キャベツ (外葉あり葉 球) 2011年 | 9 | 137~ 143 ^{OD} | 4 | 0 | 0.46 (0.0173) | 0.004 (0.003*) | 0.005 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 1 | 140 ^{OD} | 4 | 0 | 6.0 (5.7) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 3.1 (2.9) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | 2.2 (2.2) | <0.003 (<0.003) | 0.007 (0.006) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | 1.8 (1.6) | <0.003 (<0.003) | 0.009 (0.008) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | 0.88 (0.8) | <0.003 (<0.003) | 0.007 (0.006) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 9 | 136~ 145 ^{OD} | 4 | 0 | 7.0 (3.46) | <0.003 (<0.003) | 0.007 (0.004*) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.009 (0.007) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | 0.007 (0.007) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | 0.010 (0.006) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | 0.005 (0.004) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 9 | 549~ 575 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 2.1 (0.825) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 1 | 575 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 34 | 0.015 (0.011) | 0.027 (0.026) | 0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 1 | 568 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | 0.036 (0.034) | 0.004 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ほうれんそう (茎葉) 2011年 | 1 | 564 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 62 | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| 結球レタス (茎葉) 2011年 | 1 | 141 ^{OD} | 4 | 0 | 0.88 (0.83) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.55 (0.50) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 6 | 0.40 (0.28) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | 0.31 (0.24) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 27 | 0.15 (0.14) | <0.003 (<0.003) |
| 結球レタス (外葉あり茎 葉) 2011年 | 10 | 140~ 144 ^{OD} | 4 | 0 | 1.5 (0.648) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| 結球レタス (外葉あり茎 葉) 2011年 | 1 | 562 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| 結球レタス (茎葉) 2011年 | 1 | 567 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.47 (0.37) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.33 (0.29) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 6 | 0.32 (0.31) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | 0.098 (0.092) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 27 | 0.037 (0.032) | <0.003 (<0.003) |
| 結球レタス (外葉あり茎 葉) 2011年 | 10 | 545~ 578 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.47 (0.057) | <0.003 (<0.003) |
| リーフレタス (茎葉) 2011年 | 1 | 144 ^{OD} | 4 | 0 | 0.97 (0.81) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.55 (0.53) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | 0.20 (0.16) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | 0.081 (0.055) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 23 | 0.006 (0.005) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| リーフレタス (茎葉) 2011年 | 10 | 140～ 149 ^{OD} | 4 | 0 | 3.1 (1.55) | <0.003 (<0.003) |
| リーフレタス (茎葉) 2011年 | 3 | 545～ 563 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.092 (0.031) | <0.003 (<0.003) |
| リーフレタス (茎葉) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 23 | <0.003 (<0.003) |
| リーフレタス (茎葉) 2011年 | 8 | 559～ 578 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.38 (0.062) | <0.003 (<0.003) |
| たまねぎ (鱗茎) 2011年 | 10 | 135～ 146 ^{OD} | 4 | 0 | 0.023 (0.010) | 0.004 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| たまねぎ (鱗茎) 2012年 | 2 | 139~ 140 ^{OD} | 4 | 0 | 0.026 (0.017) | <0.003 (<0.003) |
| ねぎ (茎葉) 2011年 | 4 | 138~ 150 ^{OD} | 4 | 0 | 0.86 (0.568) | <0.003 (<0.003) |
| ねぎ (茎葉) 2011年 | 1 | 140 ^{OD} | 4 | 0 | 0.68 (0.630) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.49 (0.450) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.39 (0.360) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | 0.19 (0.180) | <0.003 (<0.003) |
| きゅうり (果実) 2011年 | 1 | 141 ^{OD} | 4 | 0 | 0.013 (0.012) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.006 (0.005) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 29 | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| きゅうり (果実) 2011年 | 1 | 140 ^{OD} | 4 | 0 | 0.045 (0.039) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.038 (0.033) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 29 | <0.003 (<0.003) |
| きゅうり (果実) 2011年 | 14 | 136~ 144 ^{OD} | 4 | 0 | 0.087 (0.032) | <0.003 (<0.003) |
| きゅうり (果実) 2011年 | 3 | 562~ 565 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.009 (0.006) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| きゅうり (果実) 2011年 | 1 | 578 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 29 | <0.003 (<0.003) |
| きゅうり (果実) 2011年 | 7 | 518~ 568 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.009 (0.004) | <0.003 (<0.003) |
| カンタロープ (果実全体) 2011年 | 1 | 140 ^{OD} | 4 | 0 | 0.074 (0.068) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.011 (0.011) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | 0.009 (0.009) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 14 | 0.023 (0.022) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 28 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| カンタロープ (果実全体) 2011年 | 11 | 138～ 146 ^{OD} | 4 | 0 | 0.13 (0.053) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| カンタロープ (果実全体) 2011年 | 2 | 542～ 568 ^{OD} 土壌処 | 2 | 0 | 0.007 (0.003) | <0.003 (<0.003) |
| カンタロープ (果肉) 2011年 | 3 | 138～ 142 ^{OD} | 4 | 0 | 0.008 (0.004) | <0.003 (<0.003) |
| カンタロープ (果実全体) 2011年 | 1 | 562 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.006 (0.004) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.025 (0.017) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 7 | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 14 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | | |
| | | | | 27 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | |
| カンタロープ (果実全体) 2011年 | 9 | 558～ 578 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.034 (0.007) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| スカッシュ (果実全体) 2011年 | 1 | 149 ^{OD} | 4 | 0 | 0.040 (0.039) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | 0.024 (0.018) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 6 | 0.009 (0.008) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 13 | 0.004 (0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 28 | <0.003 (<0.003) |
| スカッシュ (果実全体) 2011年 | 9 | 138~ 149 ^{OD} | 4 | 0 | 0.12 (0.043) | <0.003 (<0.003) | 0.006 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| スカッシュ (果実全体) 2011年 | 1 | 560 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| スカッシュ (果実全体) 2011年 | 1 | 571 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.003 (0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 3 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 8 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| スカッシュ (果実全体) 2011年 | 8 | 557~ 578 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.042 (0.007) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 3 | 140~ 147 ^{OD} | 4 | 0 | 0.090 (0.052) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.073 (0.052) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.081 (0.048) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 15 | 0.053 (0.033) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 30 | 0.033 (0.020) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| トマト (果実) 2011年 | 20 | 136~ 147 ^{OD} | 4 | 0 | 0.35 (0.057) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| トマト (果実) 2011年 | 2 | 560~ 611 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.037 (0.016) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.019 (0.009) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.011 (0.006) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | 0.007 (0.004) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | 0.004 (0.003) | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 17 | 554~ 566 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.44 (0.017) | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 97 | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 86 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 85 | <0.003 (<0.003) | 0.012 (0.011) | 0.018 (0.016) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.006 (0.005) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| トマト (果実) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 114 | <0.003 (<0.003) |
| トマト (果実) 2011年 | 1 | 560 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 108 | <0.003 (<0.003) |
| ピーマン (果実) 2011年 | 1 | 142 ^{OD} | 4 | 0 | 0.025 (0.020) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | 0.011 (0.010) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | 0.008 (0.008) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 15 | 0.006 (0.005) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.005) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| | | | | 37 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.005 (0.005) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | |
| ピーマン (果実) 2011年 | 11 | 138~ 146 ^{OD} | 4 | 0 | 0.14 (0.048) | <0.003 (<0.003) | 0.008 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ピーマン (果実) 2011年 | 2 | 560~ 561 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.019 (0.010) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| ピーマン (果実) 2011年 | 1 | 665 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 5 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 10 | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.003 (0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 27 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.010 (0.01) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| ピーマン (果実) 2011年 | 7 | 558~ 566 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.007 (0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.006 (0.003*) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| とうがらし (果実) 2011年 | 1 | 143 ^{OD} | 4 | 0 | 0.077 (0.059) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 4 | 0.031 (0.027) | <0.003 (<0.003) | 0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 11 | 0.023 (0.019) | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 15 | 0.013 (0.012) | 0.004 (<0.003) | 0.004 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 30 | 0.003 (0.003) | 0.003 (0.003) | 0.004 (0.004) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| とうがらし (果実) 2011年 | 5 | 142~ 156 ^{OD} | 4 | 0 | 0.13 (0.063) | <0.003 (<0.003) |
| とうがらし (果実) 2011年 | 3 | 559~ 574 ^{OD} 土壌処 理 | 2 | 0 | 0.004 (0.003) | <0.003 (<0.003) |
| とうがらし (果実) 2011年 | 1 | 546 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | 0.01 (0.009) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 4 | <0.003 (<0.003) | 0.004 (0.003) | 0.012 (0.010) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 9 | <0.003 (<0.003) | 0.006 (0.005) | 0.013 (0.012) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 13 | <0.003 (<0.003) | 0.008 (0.008) | 0.019 (0.017) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| | | | | 28 | <0.003 (<0.003) | 0.01 (0.01) | 0.026 (0.024) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) | <0.003 (<0.003) |
| とうがらし (果実) 2011年 | 3 | 558~ 562 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 0 | <0.003 (<0.003) |
| 未成熟えん ど う (さや) 2011年 | 6 | 142~ 153 ^{OD} | 4 | 0 | 0.55 (0.310) | <0.01 (<0.01) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| 未成熟えんどう (未成熟種子) 2011年 | 6 | 140~ 153 ^{OD} | 4 | 0 | 0.029 (0.014) | <0.01 (<0.01) |
| 高麗人参 (根部) 2011年 | 1 | 548 ^{OD} | 2 | 0 | 0.026 (0.026) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 6 | 0.054 (0.044) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 13 | 0.058 (0.042) | <0.01 (<0.01) |
| | | | | 20 | 0.07 (0.062) | <0.01 (<0.01) |
| 高麗人参 (根部) 2011年 | 2 | 563~ 571 ^{OD} | 2 | 13 | 0.056 (0.047) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | |
| 高麗人参 (根部) 2011年 | 1 | 1,130 ^{OD} | 4 | 13 | 0.15 (0.14) | <0.01 (<0.01) | 0.012 (0.011) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | |
| 高麗人参 (根部) 2011年 | 1 | 571 ^{OD} | 2 | 14 | 0.044 (0.044) | <0.01 (<0.01) | 0.01 (0.010) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | |
| 高麗人参 (根部) 2011年 | 1 | 1,100 ^{OD} | 4 | 14 | 0.079 (0.072) | 0.020 (0.020) | 0.028 (0.028) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果肉) 2013年 | 5 | 271～ 275 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果肉) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果肉) 2014年 | 3 | 279～ 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果肉) 2013年 | 1 | 287 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果肉) 2014年 | 1 | 284 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 26 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果肉) 2014年 | 1 | 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 32 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果肉) 2013年 | 6 | 305～ 323 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果肉) 2014年 | 4 | 314～ 319 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果肉) 2013年 | 1 | 306 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果肉) 2014年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果皮) 2013年 | 5 | 271~ 275 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果皮) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果皮) 2014年 | 3 | 279~ 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果皮) 2013年 | 1 | 287 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果皮) 2014年 | 1 | 284 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 26 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果皮) 2014年 | 1 | 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 32 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果皮) 2013年 | 7 | 306~ 323 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0718 (0.0412) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果皮) 2014年 | 5 | 314~ 319 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0581 (0.0403) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 273 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 8 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 16 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 23 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 275 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 3 | 271~ 275 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 9 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 15 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 22 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 29 | <0.005 (<0.005) | |
| オレンジ (果実全体) 2014年 | 3 | 279~ 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 (<0.005) | |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 286 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 (<0.005) | |
| オレンジ (果実全体) 2014年 | 1 | 284 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 26 | <0.005 (<0.005) | |
| オレンジ (果実全体) 2014年 | 1 | 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 32 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 306 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0198 (0.0178) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| | | | | 3 | 0.0233 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 7 | 0.0141 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 10 | 0.0119 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 13 | 0.0135 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |
| | | | | 3 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 7 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 10 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 15 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 2 | 306~ 311 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0246 (0.0201) | <0.005 (<0.005) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果実全体) 2014年 | 4 | 314～ 319 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0247 (0.0215) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | 0.0241 (0.0135*) | 0.0244 (0.0136*) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 1 | 305 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0108 (0.0104*) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| オレンジ (果実全体) 2013年 | 2 | 308～ 323 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | 0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| オレンジ (果実全体) 2014年 | 1 | 316 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果肉) 2013年 | 3 | 268~ 286 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果肉) 2013年 | 1 | 288 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果肉) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 33 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果肉) 2014年 | 1 | 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| グレープ フルーツ (果肉) 2013年 | 5 | 302～ 324 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果肉) 2014年 | 1 | 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果皮) 2013年 | 3 | 268～ 286 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果皮) 2013年 | 1 | 288 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果皮) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 33 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| グレープ フルーツ (果皮) 2014年 | 1 | 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果皮) 2013年 | 5 | 302～ 324 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0543 (0.0238) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果皮) 2014年 | 1 | 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 286 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 8 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 16 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 23 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 2 | 268~ 286 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 30 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 288 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 33 | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2014年 | 1 | 281 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 319 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0186 (0.0182) | <0.005 (<0.005) |
| | | | | 3 | 0.0105 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 7 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 10 | 0.0138 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 13 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|-----------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 302 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0121 (0.0115) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 1 | 318 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0127 (0.0113*) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2013年 | 2 | 315～ 324 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |
| グレープ フルーツ (果実全体) 2014年 | 1 | 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| レモン (果肉) 2013年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果肉) 2014年 | 2 | 276~ 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 (<0.005) |
| レモン (果肉) 2014年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果肉) 2014年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果肉) 2013年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| レモン (果肉) 2014年 | 3 | 311~ 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |
| レモン (果肉) 2014年 | 1 | 316 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2013年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 276 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2013年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0631 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果皮) 2014年 | 2 | 311~ 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0349 (0.0299) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| レモン (果皮) 2014年 | 1 | 316 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果実全体) 2013年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 9 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 16 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 23 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| | | | | 29 | <0.005 (<0.005) | |
| レモン (果実全体) 2014年 | 2 | 276~ 282 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 29 | <0.005 (<0.005) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | |
| レモン (果実全体) 2014年 | 1 | 279 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 28 | <0.005 (<0.005) | |
| レモン (果実全体) 2014年 | 1 | 280 ^{SC} 土壌処 理 | 2 | 31 | <0.005 (<0.005) | |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場 数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f |
| レモン (果実全体) 2013年 | 1 | 315 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0358 (0.0333) | <0.005 (<0.005) |
| | | | | 3 | 0.0221 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 7 | 0.0161 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 10 | 0.0189 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | | | | 14 | 0.0273 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| レモン (果実全体) 2014年 | 2 | 311~ 317 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | 0.0232 (0.0185) | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) | <0.005 (<0.005) |
| レモン (果実全体) 2014年 | 2 | 315~ 316 ^{SC} 土壌処 理×2 + 散布処 理 | 3 | 0 | <0.01 (<0.01) | <0.005 (<0.005) |

| 作物名 (分析部位) 実施年 | 試験 ほ場数 | 使用量 (g ai /ha) | 回数 (回) | PHI (日) | 残留値(最大値、mg/kg) | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | オキサチ アピプロ リン | 代謝物 C | 代謝物 D | 代謝物 F | 代謝物 L | 代謝物 X | 代謝物 Z | 代謝物 f | |
| ぶどう (果実) 2013年 | 7 | 100~ 125 ^{OD} | 2 | 14 | 0.23 (0.132) | <0.003 (<0.003) | 0.003 (0.003*) | | | | | | |
| ぶどう (果実) 2013年 | 1 | 97.5 ^{OD} | 2 | 15 | 0.037 | <0.003 | <0.003 | | | | | | |

OD：油性懸濁剤、SC：フロアブル剤、()：平均値

- ・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は、定量限界値を検出したものとして計算し、*印を付した。
- ・農薬の使用量・使用方法が登録又は申請された使用方法から逸脱している場合は、使用量に^aを付した。

<別紙 5 : 推定摂取量>

| 作物名 | 残留値 (mg/kg) | 国民平均 (体重 : 55.1 kg) | | 小児 (体重 : 16.5 kg) | | 妊婦 (体重 : 58.5 kg) | | 高齢者 (65歳以上) (体重 : 56.1 kg) | |
|------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | ff (g/人/日) | 摂取量 (μg/人/日) | ff (g/人/日) | 摂取量 (μg/人/日) | ff (g/人/日) | 摂取量 (μg/人/日) | ff (g/人/日) | 摂取量 (μg/人/日) |
| はくさい | 0.05 | 17.7 | 0.89 | 5.1 | 0.26 | 16.6 | 0.83 | 21.6 | 1.08 |
| レタス | 0.15 | 9.6 | 1.44 | 4.4 | 0.66 | 11.4 | 1.71 | 9.2 | 1.38 |
| トマト | 0.06 | 32.1 | 1.93 | 19.0 | 1.14 | 32.0 | 1.92 | 36.6 | 2.20 |
| きゅうり | 0.04 | 20.7 | 0.83 | 9.6 | 0.38 | 14.2 | 0.57 | 25.6 | 1.02 |
| ぶどう | 0.22 | 8.7 | 1.91 | 8.2 | 1.80 | 20.2 | 4.44 | 9.0 | 1.98 |
| 合計 | | | 6.99 | | 4.24 | | 9.47 | | 7.66 |

注) ・残留値は、申請されている使用時期・使用回数による各試験区の平均値のうち、オキサチアピロリンの最大値を用いた(参照 別紙3)。

・ff : 平成 17~19 年の食品摂取頻度・摂取量調査(参照 67)の結果に基づく農産物摂取量(g/人/日)

・摂取量 : 残留値及び農産物残留量から求めたオキサチアピロリンの推定摂取量(μg/人/日)

・ばれいしょのデータは全て定量限界未満であったため、摂取量の計算に用いなかった。

<参照>

1. 食品健康影響評価について（平成 27 年 3 月 9 日付、厚生労働省発食安 0309 第 1 号）
2. 農薬抄録 オキサチアピプロリン（平成 26 年 7 月 9 日改訂）：デュポン株式会社、一部公表
3. ¹⁴C-標識オキサチアピプロリンを用いたラット体内における代謝試験（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2013 年、未公表
4. ¹⁴C-標識オキサチアピプロリンの反復投与によるラット体内における代謝試験（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2013 年、未公表
5. ばれいしょにおける代謝試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2013 年、未公表
6. レタスにおける代謝試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2011 年、未公表
7. ぶどうにおける代謝試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2011 年、未公表
8. ばれいしょにおける代謝試験（土壌処理）（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2012 年、未公表
9. レタスにおける代謝試験（土壌処理）（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2012 年、未公表
10. ズッキーニにおける代謝試験（土壌処理）（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2012 年、未公表
11. 好氣的土壌中動態試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2011 年、未公表
12. 好氣的土壌中動態試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2011 年、未公表
13. 嫌氣的土壌中動態試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2012 年、未公表
14. 火山灰土壌を含む 4 種土壌を用いた土壌吸着性試験（GLP 対応）：化学物質評価研究機構、2013 年、未公表
15. 5 種土壌を用いた土壌吸着/脱着性試験（GLP 対応）：インド Advinus Therapeutics Private Limited、2010 年、未公表
16. 土壌表面における光分解試験（GLP 対応）：英国 Charles River Laboratories、2011 年、未公表
17. 加水分解動態試験（GLP 対応）：インド Advinus Therapeutics Private Limited、2010 年、未公表
18. 水中光分解動態試験（緩衝液及び自然水）（GLP 対応）：インド Advinus Therapeutics Private Limited、2011 年、未公表
19. 土壌残留試験成績：デュポン株式会社、2012 年、未公表

20. 作物残留試験成績：デュポン株式会社、2011、2012年、未公表
21. オキサチアピプロリンにおける薬理試験（GLP 対応）：食品農医薬品安全性評価センター、2012年、未公表
22. ラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：米国 Eurofins PSL、2010年、未公表
23. ラットにおける急性経皮毒性試験（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
24. ラットにおける急性吸入毒性試験（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
25. ラットを用いた急性経口神経毒性試験（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
26. ウサギを用いた皮膚刺激性試験（GLP 対応）：米国 Eurofins PSL、2010年、未公表
27. ウサギを用いた眼刺激性試験（GLP 対応）：米国 Eurofins PSL、2010年、未公表
28. モルモットを用いた皮膚感作性試験（GLP 対応）：米国 Eurofins PSL、2010年、未公表
29. ラット 90 日間反復経口投与毒性試験の用量設定試験（非 GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
30. ラットを用いた飼料混入投与による 90 日間反復経口投与毒性試験（GLP 対応）：米国 WIL Research Laboratories, LLC、2011年、未公表
31. マウスを用いた 90 日間反復経口投与毒性試験の用量設定試験（非 GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
32. マウスを用いた 90 日間反復経口投与毒性試験（GLP 対応）：韓国 Korea Institute of Toxicology、2012年、未公表
33. イヌを用いた飼料混入投与による 90 日間反復経口投与毒性試験（GLP 対応）：韓国 Korea Institute of Toxicology、2012年、未公表
34. イヌ 90 日間反復経口投与毒性試験の用量設定試験（非 GLP 対応）：米国 MPI Research, Inc.、2010年、未公表
35. ラットを用いた 28 日間反復経皮投与毒性試験（GLP 対応）：米国 Product Safety Labs.、2012年、未公表
36. ラットを用いた 28 日間反復経口投与毒性試験（代謝分解物 C）（GLP 対応）：米国 DuPont Haskell Global Centers、2013年、未公表
37. イヌを用いた飼料混入投与による 1 年間反復経口投与毒性試験（GLP 対応）：韓国 Korea Institute of Toxicology、2013年、未公表
38. ラットを用いた混餌投与による 2 年反復経口投与毒性/発がん性併合試験（GLP 対応）：米国 MPI Research, Inc.、2013年、未公表
39. マウスを用いた飼料混入投与による発がん性試験（GLP 対応）：韓国 Korea

- Institute of Toxicology、2013年、未公表
40. ラットを用いた二世代繁殖毒性 (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2013年、未公表
 41. ラットにおける催奇形性試験 (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2012年、未公表
 42. ウサギにおける催奇形性試験 (GLP 対応) : 米国 WIL Research Laboratories、2012年、未公表
 43. 細菌を用いる復帰突然変異試験 (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2011年、未公表
 44. 哺乳類細胞を用いた *in vitro* 遺伝子突然変異試験 (CHO/HGPRT 試験) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2010年、未公表
 45. ヒト末梢血リンパ球を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2010年、未公表
 46. マウスを用いた小核試験 (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2010年、未公表
 47. 細菌を用いる復帰突然変異試験(代謝分解物 B) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 48. 哺乳類細胞を用いた *in vitro* 遺伝子突然変異試験 (CHO/HGPRT 試験) (代謝分解物 B) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 49. ヒト末梢血リンパ球を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (代謝分解物 B) (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2013年、未公表
 50. 細菌を用いる復帰突然変異試験(代謝分解物 C) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2012年、未公表
 51. 哺乳類細胞を用いた *in vitro* 遺伝子突然変異試験 (CHO/HGPRT 試験) (代謝分解物 C) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2012年、未公表
 52. ヒト末梢血リンパ球 (HPBL) を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (代謝分解物 C) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 53. マウスを用いた小核試験 (代謝分解物 C) (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2013年、未公表
 54. 細菌を用いる復帰突然変異試験(代謝分解物 D) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 55. ヒト末梢血リンパ球 (HPBL) を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (代謝分解物 D) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 56. 細菌を用いる復帰突然変異試験(代謝分解物 H) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 57. 哺乳類細胞を用いた *in vitro* 遺伝子突然変異試験 (CHO/HGPRT 試験) (代謝分解物 H) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013年、未公表
 58. ヒト末梢血リンパ球 (HPBL) を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (代謝分解物 H)

- (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013 年、未公表
59. 細菌を用いる復帰突然変異試験(代謝分解物 Z) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013 年、未公表
 60. ヒト末梢血リンパ球 (HPBL) を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (代謝分解物 Z) (GLP 対応) : 米国 BioReliance、2013 年、未公表
 61. ラット 28 日間反復経口投与毒性試験の用量設定試験 (非 GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2008 年、未公表
 62. マウスを用いた飼料混入投与による 28 日間反復経口投与免疫毒性試験 (GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2012 年、未公表
 63. 雄ラットを用いた内分泌影響確認のための 15 日間試験 (非 GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2011 年、未公表
 64. 雌ラットを用いた内分泌影響確認のための 5 日間子宮肥大試験 (非 GLP 対応) : 米国 DuPont Haskell Global Centers、2011 年、未公表
 65. H295R 細胞を用いたステロイド産生能影響確認試験 (非 GLP 対応) : 米国 CeeTox, Inc、2013 年、未公表
 66. ラットを用いた二世代繁殖毒性試験の用量設定試験 (非 GLP 対応) : 米国 WIL Research Laboratories、2011 年、未公表
 67. 平成 17~19 年の食品摂取頻度・摂取量調査 (薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料、2014 年 2 月 20 日)
 68. 食品健康影響評価の結果の通知について (平成 27 年 7 月 7 日付け府食第 582 号)
 69. 食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号) の一部を改正する件 (平成 28 年厚生労働省告示第 196 号)
 70. 食品健康影響評価について (平成 28 年 7 月 11 日付け厚生労働省発生食 0711 第 1 号)
 71. 農薬抄録 オキサチアピプロリン (平成 28 年 2 月 18 日改訂) : デュポン株式会社、一部公表
 72. オキサチアピプロリン 残留基準値設定資料 : デュポン株式会社、2016 年、未公表
 73. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON ONION (GREEN & Dry Bulb) : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
 74. COMBINED DECLINE AND MAGNITUDE OF RESIDUES OF DPX-QGU42 AND ITS METABOLITES IN SPINACH (LEAFY VEGETABLES) FOLLOWING APPLICATIONS OF DPX-QGU42 100 G/L OD AND DPX-QGU42 200 G/L SC - USA AND CANADA,2011 : 米国 ABC Laboratories, Inc.、2012 年、未公表
 75. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON LETTUCE (HEAD & LEAF) : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
 76. COMBINED DECLINE AND MAGNITUDE OF RESIDUES OF DPX-QGU42

- AND ITS METABOLITES IN CABBAGE, BROCCOLI, CAULIFLOWER (HEAD AND STEM BRASSICA VEGETABLES) FOLLOWING APPLICATIONS OF DPX-QGU42 100 G/L OD - USA AND CANADA, 2011 : 米国 ABC Laboratories, Inc.、2012 年、未公表
77. COMBINED DECLINE AND MAGNITUDE OF RESIDUES OF DPX-QGU42 AND ITS METABOLITES IN TOMATOES (FRUITING VEGETABLES) FOLLOWING APPLICATIONS OF DPX-QGU42 100 G/L OD AND DPX-QGU42 200 G/L SC - USA AND CANADA,2011 : 米国 ABC Laboratories, Inc.、2012 年、未公表
78. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON PEPPER (BELL & NON-BELL) : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
79. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON CUCUMBER (FIELD & GREENHOUSE) : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
80. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON CANTALOUPE : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
81. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON SQUASH (Summer) : 米国 IR-4 Project Headquarters、2013 年、未公表
82. DPX-QGU42:Magnitude of the Residue on Succulent Peas : 米国 ABC Laboratories、2013 年、未公表
83. DPX-QGU42:MAGNITUDE OF THE RESIDUE ON GINSENG : 米国 IR-4 Project、2013 年、未公表
84. DECLINE AND MAGNITUDE OF RESIDUES OF OXATHIPIPROLIN AND ITS METABOLITES IN GRAPES AND GRAPE VINE LEAVES FOLLOWING APPLICATION OF DPX-QGU42 100 G/L OD – EUROPE,2013 : 英国 Charles River Laboratories、2014 年、未公表
85. 食品健康影響評価の結果の通知について(平成 28 年 9 月 6 日付け府食第 546 号)
86. 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の一部を改正する件(平成 29 年厚生労働省告示第 249 号)
87. 食品健康影響評価について(令和元年 7 月 31 日付け厚生労働省発生食 0731 第 4 号)
88. オキサチアピプロリン 残留基準値設定資料:デュポン株式会社、2018 年、一部公表
89. オキサチアピプロリン 海外における残留基準値及び適正農業規範:シンジェンタジャパン株式会社、2018 年、一部公表
90. Magnitude of Residues of Oxathiapiprolin and its Metabolites in Raw and Processed Soybean Commodities of Plants Grown from Seed Treated with Oxathiapiprolin (DPX-QGU42) 200 G/L SC-USA 200SC USA, 2014 : ABC Laboratories, Inc. (米国)、2015 年、未公表

91. Oxathiapiprolin (DPX-QGU42): Magnitude of the residue on asparagus Amended Report IR-4 PR No. 10623 : IR-4 North Central Region Laboratory, Michigan State University (米国) 、2015年、未公表
92. Oxathiapiprolin (DPX-QGU42): Magnitude of the residue on asparagus IR-4 PR No. 10623 : IR-4 North Central Region Laboratory, Michigan State University (米国) 、2015年、未公表
93. Oxathiapiprolin (DPX-QGU42): Magnitude of the residue on greens (mustard) IR-4 PR No. 11125 : IR-4 North Central Region Laboratory, Michigan State University (米国) 、2015年、未公表
94. Oxathiapiprolin : Magnitude of the Residue on Caneberry : ABC Laboratories, Inc. (米国) 、2015年、未公表
95. Magnitude of Residues of Oxathiapiprolin and its Metabolites in Sunflower Seed of Plants grown from Seed Treated with Oxathiapiprolin (DPX-QGU42) 200G/L SC-USA and Canada 2014 : ABC Laboratories, Inc. (米国) 、2015年、未公表
96. Oxathiapiprolin: Magnitude of the Residue on Basil: ABC Laboratories, Inc. (米国) 、2015年、未公表
97. Oxathiapiprolin SYN546539 SC (A20638A) - Magnitude of the Residues in or on Orange, Grapefruit, and Lemon as Representative Commodities of Citrus Fruits, Group 10, USA 2013 : ABC Laboratories, Inc. (米国) 、2015年、未公表