

厚生労働省発生食 0525 第 9 号
令和 3 年 5 月 25 日

薬事・食品衛生審議会
会長 太田 茂 殿

厚生労働大臣 田村 憲久
(公 印 省 略)

諮問書

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。

記

1 次に掲げる農薬等の食品中の残留基準設定について

動物用医薬品ゼラノール
農薬及び動物用医薬品エトキサゾール
農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン
農薬及び動物用医薬品スピノサド
農薬アシノナピル
農薬アミスルブロム
農薬アメトクトラジン
農薬イマザピル
農薬オキサチアピプロリン
農薬カスガマイシン
農薬グリホサート
農薬クロラントラニリプロール
農薬クロルフルアズロン
農薬シアゾファミド
農薬シエノピラフェン

農薬シクラニリプロール
農薬シフルフェナミド
農薬シフルメトフェン
農薬ジメテナミド
農薬スピネトラム
農薬ゾキサミド
農薬テトラニリプロール
農薬ピカルブトラゾクス
農薬ピラジフルミド
農薬ピリオフェノン
農薬ピロキサスルホン
農薬フェンピコキサミド
農薬フェンヘキサミド
農薬フルオキサストロビン
農薬フルキサメタミド
農薬フルチアニル
農薬フルトラニル
農薬プロフラニリド
農薬プロヘキサジオンカルシウム塩
農薬ヘキシチアゾクス
農薬ベンチアバリカルブイソプロピル
農薬マンジプロパミド
農薬マンデストロビン
農薬メソトリオン
農薬メタフルミゾン
農薬メチルテトラプロール
農薬メトラフェノン
農薬メフェントリフルコナゾール

2 次に掲げる動物用医薬品の試験法の設定について

動物用医薬品ゲンチアナバイオレット試験法

以上

令和3年8月16日

薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会長 穂山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会報告について

令和3年5月25日付け厚生労働省発生食0525第9号をもって諮問された、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第13条第1項の規定に基づくシアゾファミドに係る食品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

シアゾファミド

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

1. 概要

(1) 品目名：シアゾファミド [Cyazofamid (ISO)]

(2) 用途：殺菌剤


シアノイミダゾール系化合物の殺菌剤である。ミトコンドリア内膜電子伝達系複合体ⅢのQiサイトを阻害することにより殺菌作用を示すと考えられている。

(3) 化学名及びCAS番号

4-Chloro-2-cyano-*N,N*-dimethyl-5-*p*-tolylimidazole-1-sulfonamide (IUPAC)

1*H*-Imidazole-1-sulfonamide, 4-chloro-2-cyano-*N,N*-dimethyl-5-(4-methylphenyl)- (CAS : No. 120116-88-3)

(4) 構造式及び物性



分子式	C ₁₃ H ₁₃ ClN ₄ O ₂ S
分子量	324.79
水溶解度	1.21 × 10 ⁻⁴ g/L (20°C, pH 5) 1.07 × 10 ⁻⁴ g/L (20°C, pH 7) 1.09 × 10 ⁻⁴ g/L (20°C, pH 9)
分配係数	log ₁₀ P _{ow} = 3.2

2. 適用の範囲及び使用方法

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。

作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。

(1) 国内での使用方法

① 34.5%シアゾファミドフロアブル

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病	4000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内	
		1000～2000倍	25 L/10 a					
たまねぎ	べと病	8000倍	100～300 L/10 a		3回以内			4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)
だいず		4000～8000倍						
	茎疫病	4000倍						

② 9.4%シアゾファミドフロアブル

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌)	1000倍	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約5 L) 1箱当り0.5 L	は種時	1回	土壌灌注	1回
				発芽後～緑化期			
ぶどう	べと病	1000～2000倍	200～700 L/10 a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ	褐色腐敗病	2000倍		収穫前日まで			
いちじく 日本なし	疫病			収穫3日前まで			
小麦	褐色雪腐病	1000倍	100 L/10 a	根雪前		無人航空機による散布	
		250倍	25 L/10 a				
		8倍	0.8 L/10 a				
あずき	茎疫病	原液	種子重量の2%	は種前	1回	種子塗沫	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)
だいず		1000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
	べと病	原液	種子重量の1～2%	は種前	1回	種子塗沫	
えだまめ		茎疫病	1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	3回以内	
	べと病		原液	種子重量の2%	は種前	1回	
		1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内	散布	

② 9.4%シアゾファミドフロアブル (つづき)

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	疫病	1000～2000倍	100～300 L/10 a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内	
		375倍	25 L/10 a					
		600倍	40 L/10 a					
		32倍	3.2 L/10 a			無人航空機による散布		
さといも				収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
キャベツ カリフラワー	べと病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	4回以内	散布	6回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)	
	根こぶ病		250 mL/株	収穫14日前まで	1回	株元灌注		
はくさい		500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm、使用土壌約2.5～7 L)当り2 L	定植前日～当日		株元灌注		
	べと病 ピシウム腐敗病		250 mL/株	収穫14日前まで				
非結球 あぶらな科 葉菜類	白さび病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内	散布		3回以内
なばな類 (なばなを除く)								
なばな							4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	
ブロッコリー	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm、使用土壌約2.5～7 L)当り2 L	定植前日～当日	1回	灌注	5回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は3回以内)	
		2000倍	250 mL/株	収穫14日前まで	株元灌注			
きゅうり メロン	べと病	1000～2000倍	150～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内			
ズッキーニ		1000倍	100～300 L/10 a					
すいか	褐色腐敗病	1000～2000倍		収穫前日まで		散布		
とうがん	疫病	2000倍	150～300 L/10 a		2回以内		2回以内	
かぼちゃ	べと病				3回以内		3回以内	
		疫病						

② 9.4%シアゾファミドフロアブル（つづき）

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	疫病	1000～ 2000倍	150～300 L/10 a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
ピーマン とうがらし類							
なす	褐色腐敗病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
ねぎ	べと病						
わけぎ							
葉たまねぎ							
たまねぎ	べと病 白色疫病			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
みょうが (花穂)	根茎腐敗病	500倍	3 L/m ²	生育期 ただし、 収穫3日前まで	3回以内	土壌灌注	4回以内 (種根茎浸漬は1 回以内、土壌灌 注は3回以内)
みょうが (茎葉)		200倍	—	植付前	1回	30分間 種根茎浸漬	
		500倍	3 L/m ²	みょうが (花穂)の収穫 3日前まで ただし、花穂を 収穫しない場合 にあつては開花 期終了まで	3回以内	土壌灌注	
しょうが		1～3 L/m ² 2～3 L/m ²	生育期 ただし、 収穫30日前まで				
葉しょうが		500～ 1000倍	3 L/m ²	生育期 ただし、 収穫3日前まで	3回以内	土壌灌注	
こんにやく		根腐病	収穫14日前まで				
畑わさび		白さび病	2000倍	150～300 L/10 a	収穫7日前まで	2回以内	
わさび	畑育苗期						
エンサイ	べと病 白さび病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
かぶ				根こぶ病			
	だいこん	ワッカ症 白さび病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで	3回以内	散布
はつか だいこん	ワッカ症 白さび病 べと病						

注) —：規定されていない項目

② 9.4%シアゾファミドフロアブル (つづき)

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
みつば	べと病	2000倍	100～300 L/10 a	収穫3日前まで ただし、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	2回以内	散布	2回以内
レタス				収穫3日前まで	3回以内		3回以内
非結球レタス							
ほうれんそう							
バジル			150～300 L/10 a	2回以内	2回以内		
おかひじき							
らっきょう	白色疫病	100～300 L/10 a	100～300 L/10 a	100～300 L/10 a	4回以内	4回以内	
いちご	疫病	500～1000倍	50 mL/株	育苗期	2回以内	株元灌注	4回以内 (育苗期は2回以内、定植後は2回以内)
			100 mL/株	生育期 ただし、 収穫30日前まで			
ホップ	べと病	2000倍	200～700 L/10 a	収穫14日前まで	4回以内	散布	2回以内

③ 3.2%シアゾファミド・40.0%TPNフロアブル

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	べと病 晩腐病 黒とう病	2000倍	200～700 L/10 a	収穫60日前まで	3回以内	散布	3回以内	
もも	黒星病	1000倍		150～300 L/10 a	収穫前日まで		2回以内	2回以内
ネクタリン								
すもも	灰星病		収穫14日前まで					
きゅうり	べと病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 黒星病	1000倍	150～300 L/10 a	収穫前日まで	4回以内		4回以内	
メロン	べと病 つる枯病 うどんこ病			収穫3日前まで				
すいか	褐色腐敗病 炭疽病 つる枯病			収穫前日まで				
トマト	疫病 葉かび病 輪紋病							
なす	褐色腐敗病 黒枯病	100～300 L/10 a	100～300 L/10 a	100～300 L/10 a	4回以内	4回以内		

③ 3.2%シアゾファミド・40.0%TPNフロアブル（つづき）

作物名	適用	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
ピーマン	疫病 斑点病	1000倍	100～300 L/10 a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内
はくさい	べと病 白さび病 黒斑病 白斑病			収穫7日前まで	2回以内		6回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)
たまねぎ	べと病 灰色かび病				4回以内		4回以内
ねぎ	べと病 黒斑病			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
レタス	べと病 すそ枯病						

(2) 海外での使用方法

① 34.5%シアゾファミドフロアブル（米国）

作物名	適用	1回当たりの使用量	シアゾファミドの総使用量（年間）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
にんじん	<i>Pythium ultimo</i> による病害 しみ腐病 根腐病	438 mL/ha (175 g ai/ha)	874 g ai/ha まで	収穫14日前まで	5回以内	散布

ai:active ingredient（有効成分）

② 9.4%シアゾファミドフロアブル（台湾）

作物名	適用	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
パパイヤ	疫病	2000倍	収穫12日前まで	6回以内	散布

3. 代謝試験


(1) 植物代謝試験

植物代謝試験が、水稻、トマト、ばれいしょ及びぶどうで実施されており、可食部で10%TRR^{注)}以上認められた代謝物はなかった。ぶどうを加工したワインでは代謝物Bが10%TRR以上認められた。

注) %TRR：総放射性残留物（TRR：Total Radioactive Residues）濃度に対する比率（%）

【代謝物略称一覧】

略称	化学名
B	4-クロロ-5- <i>p</i> -トリルイミダゾール-2-カルボニトリル



代謝物B

注) 残留試験の分析対象及び暴露評価対象となっている代謝物について構造式を明記した。

4. 作物残留試験

(1) 分析の概要

【国内】

① 分析対象物質

- ・シアゾファミド
- ・代謝物B

② 分析法の概要

i) シアゾファミド

試料からアセトニトリルで抽出し、グラファイトカーボン/PSA積層カラム又はHLBカラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC-MS/MS)で定量する。

または、試料からアセトニトリルで抽出し、*n*-ヘキサンに転溶する。フロリジルカラム、グラファイトカーボン/NH₂積層カラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ(HPLC-UV)で定量する。

ii) シアゾファミド及び代謝物B

試料からアセトン又はアセトニトリル・水(4:1)混液で抽出し、C₁₈カラム、HLBカラム又はC₁₈カラム及びグラファイトカーボン/PSA積層カラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・質量分析計(LC-MS)又はLC-MS/MSで定量する。なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.49を用いてシアゾファミド濃度に換算した値として示した。

定量限界：シアゾファミド 0.005~0.5 mg/kg

代謝物B 0.01~0.05 mg/kg (シアゾファミド換算濃度)

【海外】

① 分析対象物質

- ・シアゾファミド
- ・代謝物B

② 分析法の概要

試料からアセトニトリル・水・酢酸（49：49：2）混液で抽出し、LC-MS/MSを用いて定量する。なお、代謝物Bの分析値は、換算係数1.49を用いてシアゾファミド濃度に換算した値として示した。

定量限界：シアゾファミド 0.01 mg/kg
代謝物B 0.01 mg/kg（シアゾファミド換算濃度）

(2) 作物残留試験結果

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-1、海外で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-2及び1-3を参照。

5. ADI 及び ARfD の評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委員会あて意見を求めたシアゾファミドに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されている。

(1) ADI

無毒性量：17.1 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。）

（動物種） 雄ラット

（投与方法） 混餌投与

（試験の種類）慢性毒性/発がん性併合試験

（期間） 2年間

安全係数：100

ADI：0.17 mg/kg 体重/day

(2) ARfD 設定の必要なし

シアゾファミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は、認められなかったため、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。

6. 諸外国における状況

JMPRにおける毒性評価が行われ、2015年にADI が設定され、ARfDは設定不要と評価されている。また、代謝物BについてARfD が設定されている。国際基準はレタス、ホップ等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてたまねぎ、にんじん等に、カナダにおいてぶどう、トマト等に、EUにおいてぶどう、ホップ等に、豪州においてブロッコリーに基準値が設定されている。

7. 基準値案

(1) 残留の規制対象

シアゾファミドとする。

一部の作物残留試験において、代謝物Bの分析が行われているが、代謝物Bはシアゾファミドと比較して十分に低い残留濃度であることから、残留の規制対象には代謝物Bを含めず、シアゾファミドのみとする。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

(3) 暴露評価対象

シアゾファミド及び代謝物Bとする。

植物代謝試験において、ぶどうを加工したワインで代謝物Bが10%TRRを超えて認められ、代謝物Bはシアゾファミドより急性毒性が高いと評価されている。作物残留試験でほとんど認められないが、JMPRの評価において暴露評価対象をシアゾファミド及び代謝物Bとしていることを踏まえ、暴露評価対象はシアゾファミド及び代謝物Bとする。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質をシアゾファミド（親化合物のみ）としている。

(4) 暴露評価

① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。

	TMDI/ADI (%) ^{注)}
国民全体 (1歳以上)	18.6
幼小児 (1~6歳)	30.3
妊婦	18.0
高齢者 (65歳以上)	22.2

注) 各食品の平均摂取量は、平成17~19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

<参考>

暴露評価対象がシアゾファミド及び代謝物Bであることから、代謝物Bも含めて暴露評価を実施した。

	EDI/ADI (%) ^{注)}
国民全体 (1歳以上)	6.0
幼小児 (1~6歳)	9.7
妊婦	6.0
高齢者 (65歳以上)	7.4

注) 各食品の平均摂取量は、平成17~19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

シアゾファミドの作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) 注1)	各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注2) 【シアゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
水稻 (玄米)	2	9.4%フロアブル	1000倍 育苗箱灌注 0.5 L/箱	1	112	圃場A : <0.02 ^{#1)}	圃場A : <0.01/-
					118	圃場B : <0.02 ^{#1)}	圃場B : <0.01/-
小麦 (玄麦)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 100 L/10 a	3	239	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
					187	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01
	2	9.4%フロアブル	250倍 散布 25 L/10 a	3	267	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
					255	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01
2	9.4%フロアブル	8倍 無人ヘリ散布 0.8, 0.86~0.90 L/10 a	3	244	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01	
				117	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01	
だいず (乾燥子実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200, 250 L/10 a	3	6, 14, 21	圃場A : 0.07(3回, 6日)	圃場A : *0.06/*<0.01(*3回, 6日)
					7, 14, 21	圃場B : 0.05(3回, 14日)	圃場B : *0.04/*<0.01(*3回, 14日)
2	9.4%フロアブル	原液 播種時種子塗沫 種子重量2%	1	140, 147, 154	圃場A : <0.02(1回, 140日)	圃場A : *<0.01/*<0.01(*1回, 140日)	
				116, 123, 130	圃場B : <0.02(1回, 116日)	圃場B : *<0.01/*<0.01(*1回, 116日)	
あずき (乾燥子実)	2	9.4%フロアブル	原液 播種時種子乾粉衣 種子重量2% +1000倍 散布 150, 200 L/10 a	1+3	7, 14, 21	圃場A : 0.03	圃場A : 0.02/<0.01
ばれいしょ (塊茎)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200 L/10 a	4	7, 14, 21	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
					7, 14, 21	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01
	2	9.4%フロアブル	250倍 散布 25 L/10 a	4	3, 7, 14	圃場A : <0.02(4回, 7日) (#)	圃場A : *<0.01/*<0.01(*4回, 7日) (#)
さといも (塊茎)	2	9.4%フロアブル	32倍 無人ヘリコプターによる散布 3.2, 3.0~3.2 L/10 a	4	3, 7, 14	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
					3, 7, 14	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01
	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 180~182 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A : <0.02 ^{#1)}	圃場A : <0.01/-
こんにゃく (塊茎)	2	9.4%フロアブル	1000倍 株元灌注 3 L/m ²	3	14, 28, 42	圃場A : 0.04(3回, 14日) (#) ^{#2)}	圃場A : *0.03/- (*3回, 14日) (#)
					14, 30, 45	圃場B : 0.04(3回, 14日) (#) ^{#2)}	圃場B : *0.02/- (*3回, 14日) (#)
2	9.4%フロアブル	500倍 土壌灌注 3 L/m ²	3	14, 30, 45	圃場A : 0.10(3回, 30日)	圃場A : *0.09/0.01(*3回, 30日)	
				圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01		
だいこん (根)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150~200, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
だいこん (葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150~200, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 5.11	圃場A : 5.07/0.05
					圃場B : 3.59	圃場B : 3.54/0.04	
はつかだいこん (根)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 100 L/10 a	1	3, 7, 14	圃場A : 0.01 ^{#3)}	圃場A : 0.006/-
					圃場B : 0.02 ^{#3)}	圃場B : 0.012/-	
2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A : 0.06 ^{#3)}	圃場A : 0.04/-	
				圃場B : 0.14 ^{#3)}	圃場B : 0.09/-		
はつかだいこん (葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 100 L/10 a	1	3, 7, 14	圃場A : 3.84 ^{#4)}	圃場A : 3.4/-
					圃場B : 7.46 ^{#4)}	圃場B : 6.6/-	
2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A : 19.89 ^{#4)}	圃場A : *17.6/- (*3回, 7日)	
				圃場B : 4.41 ^{#4)}	圃場B : 3.9/-		
かぶ (根)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 0.09	圃場A : 0.08/<0.01
					圃場B : 0.07	圃場B : 0.06/<0.01	
2	9.4%フロアブル	2000倍 灌注 2 L/m ² +2000倍 散布 167, 180 L/10 a	1+3	3, 7, 14	圃場A : 0.02 ^{#1)}	圃場A : 0.01/-	
				圃場B : 0.06 ^{#1)}	圃場B : 0.03/-		
かぶ (葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 14.68	圃場A : 14.6/0.08
					圃場B : 9.82	圃場B : 9.72/0.10	
2	9.4%フロアブル	2000倍 灌注 2 L/m ² +2000倍 散布 167, 180 L/10 a	1+3	3, 7, 14	圃場A : 3.82 ^{#4)}	圃場A : 3.38/-	
				圃場B : 7.22 ^{#4)}	圃場B : 6.39/-		
はくさい (茎葉)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 散布 300 L/10 a	1+4	14, 21, 28	圃場A : 0.03(5回, 14日)	圃場A : *0.02/*<0.01(*5回, 14日)
					圃場B : 0.25(5回, 14日)	圃場B : *0.24/*<0.01(*5回, 14日)	
	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株 +2000倍 散布 200, 300 L/10 a	1+1+4	14, 21, 28	圃場A : 0.09(6回, 14日)	圃場A : *0.08/*<0.01(*6回, 14日)
					圃場B : 0.33(6回, 14日)	圃場B : *0.32/*<0.01(*6回, 14日)	
2	9.4%フロアブル	250倍 灌注 1 L/セルレイ +2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株 +2000倍 散布 200 L/10 a	1+1+4	3, 7, 14	圃場A : 0.11(6回, 3日) (#)	圃場A : *0.10/*<0.01(*6回, 3日) (#)	
				圃場B : 0.73(6回, 3日) (#)	圃場B : *0.72/*<0.01(*6回, 3日) (#)		
2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 株元灌注 250 mL/株 +2000倍 散布 187~250, 153~256 L/10 a	1+1+4	3, 7, 14, 21, 28	圃場A : 0.14 ^{#5)}	圃場A : 0.09/-	
				圃場B : 0.38 ^{#5)}	圃場B : 0.25/-		

シアゾファミドの作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) 注1)	各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注2) 【シアゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
キャベツ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ	1	75	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
					97	圃場B : <0.02	圃場B : <0.01/<0.01
キャベツ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	250倍 灌注 1 L/セルレイ +2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株 +2000倍 散布 150~250, 80~200 L/10 a	1+1+4	3, 7, 14	圃場A : 0.29(6回, 3日) (#) 圃場B : 0.17(6回, 3日) (#)	圃場A : *0.28/*<0.01 (*6回, 3日) (#) 圃場B : *0.16/*<0.01 (*6回, 3日) (#)
キャベツ (葉球)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 株元灌注 250 mL/株 +2000倍 散布 172~272, 250 L/10 a	1+1+4	3, 7, 14, 21, 28	圃場A : 0.07 ^{#4)} 圃場B : 0.18 ^{#4)}	圃場A : 0.06/- 圃場B : 0.16/-
こまつな (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 100 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A : 9.13 圃場B : 3.77	圃場A : 9.10/*0.18 (*3回, 7日) 圃場B : 3.76/0.05
みずな (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A : 1.91 圃場B : 5.03	圃場A : 1.85/0.08 圃場B : 4.94/0.09
チンゲンサイ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A : 1.06 圃場B : 0.78	圃場A : 1.02/0.04 圃場B : 0.76/0.02
カリフラワー (花蕾)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 株元灌注 250 mL +2000倍 散布 187~290, 281~297 L/10 a	1+1+4	3, 7, 14, 21, 28	圃場A : 0.07 ^{#4)} 圃場B : 0.07 ^{#4)}	圃場A : 0.06/- 圃場B : 0.06/-
ブロッコリー (花蕾)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 散布 200 L/10 a	1+3	3, 7, 14	圃場A : 0.25 圃場B : 0.41	圃場A : 0.24/0.02 圃場B : 0.40/0.02
	3		500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 株元灌注 250 mL +2000倍 散布 250~253, 286 L/10 a	1+1+3	3, 7, 14	圃場A : 0.84 ^{#4)} 圃場B : 0.99 ^{#4)} 圃場C : 0.10 ^{#4)}	圃場A : 0.74/- 圃場B : 0.88/- 圃場C : 0.09/-
なばな (茎葉・花蕾)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 400, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 0.02 ^{#4)} 圃場B : 1.31 ^{#4)}	圃場A : 0.02/- (#) 圃場B : 1.16/-
なばな (花蕾)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 2 L/セルレイ +2000倍 散布 300 L/10 a	1+3	1, 3, 7	圃場A : 0.70 ^{#4)} 圃場B : 0.95 ^{#4)}	圃場A : 0.62/- 圃場B : 0.84/-
はたけな (葉菜)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	1, 3, 7, 14	圃場A : 5.76 ^{#4)} 圃場B : 14.13 ^{#4)}	圃場A : 5.1/- 圃場B : 12.5/-
はたけな (花蕾)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	1, 3, 7, 14	圃場A : 1.47 ^{#4)} 圃場B : 1.70 ^{#4)}	圃場A : 1.3/- 圃場B : 1.5/-
レタス (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 2.77 圃場B : 0.11	圃場A : 2.76/<0.01 圃場B : 0.10/<0.01
サラダ菜 (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 5.69 ^{#6)} 圃場B : 2.68 ^{#6)}	圃場A : 5.17/- 圃場B : 2.44/-
リーフレタス (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200, 130 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 1.39 ^{#6)} 圃場B : 2.40 ^{#6)}	圃場A : 1.26/- 圃場B : 2.18/-
たまねぎ (鱗茎)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	7, 14, 21	圃場A : <0.02 圃場B : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01 圃場B : <0.01/<0.01
ねぎ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	3, 7, 14	圃場A : 0.37 圃場B : 0.89(4回, 7日)	圃場A : 0.36/0.02 圃場B : *0.88/*0.01 (*4回, 7日)
わけぎ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A : 0.80 ^{#7)} 圃場B : 1.74 ^{#7)}	圃場A : 0.75/- 圃場B : 1.64/-
葉たまねぎ (葉及び鱗茎)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 120~150 L/10 a	4	3, 7, 14	圃場A : 1.92 ^{#3)} 圃場B : 1.32 ^{#3)}	圃場A : 1.28/- 圃場B : 0.88/-
らっきょう (鱗茎)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200, 300 L/10 a	4	3, 7, 14	圃場A : <0.02 ^{#1)} 圃場B : <0.02 ^{#1)}	圃場A : <0.01/- 圃場B : <0.01/-
みつば (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A : 2.31 ^{#4)} 圃場B : 3.91 ^{#4)}	圃場A : 2.04/- 圃場B : 3.46/-
ミニトマト (果実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200, 300 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 1.01 ^{#8)} 圃場B : 0.73 ^{#8)}	圃場A : 1.00/0.01 圃場B : 0.72/<0.01
トマト (果実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 0.19 圃場B : 0.53	圃場A : 0.18/<0.01 圃場B : 0.52/0.01
ピーマン (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 0.34 圃場B : 0.23	圃場A : 0.33/0.01 圃場B : 0.22/<0.01
なす (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 0.12 圃場B : 0.11	圃場A : 0.11/<0.01 圃場B : 0.10/<0.01
とうがらし (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 0.46 ^{#9)} 圃場B : 1.00 ^{#9)}	圃場A : 0.37/- 圃場B : 0.80/-
	2		2000倍 散布 200 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A : 0.85 ^{#9)} 圃場B : 0.30 ^{#9)}	圃場A : 0.68/- 圃場B : 0.24/-
ししとう (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A : 0.38 ^{#9)} 圃場B : 0.58 ^{#9)}	圃場A : 0.30/- 圃場B : 0.46/-

シアゾファミドの作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) 注1)	各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注2) 【シアゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
きゅうり (果実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: 0.09 圃場B: 0.24	圃場A: 0.08/0.01 圃場B: 0.23/<0.01
かぼちゃ (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 0.07 圃場B: 0.18	圃場A: 0.06/<0.01 圃場B: 0.17/<0.01
すいか (果肉)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200, 217.7 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: <0.02 圃場B: <0.02	圃場A: <0.01/<0.01 圃場B: <0.01/<0.01
	3		1000倍 散布 200~300 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: <0.02 ^{#10)} 圃場B: <0.02 ^{#10)} 圃場C: <0.02 ^{#10)}	圃場A: <0.01/- 圃場B: <0.01/- 圃場C: <0.01/-
すいか (果皮)	3	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200~300 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: 1.40 ^{#9)} 圃場B: 0.73 ^{#9)} 圃場C: 1.64 ^{#9)}	圃場A: 1.12/- 圃場B: 0.58/- (4回, 3日) 圃場C: 1.31/- (4回, 3日)
すいか (果実)	3	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200~300 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: 0.28 ^{#9)} 圃場B: 0.14 ^{#9)} 圃場C: 0.34 ^{#9)}	圃場A: 0.22 ^{#3)} /- 圃場B: 0.11 ^{#3)} /- (4回, 3日) 圃場C: 0.27 ^{#3)} /- (4回, 3日)
メロン (果肉)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 200 L/10 a	4	1, 3, 7	圃場A: <0.02 圃場B: <0.02	圃場A: <0.01/<0.01 圃場B: <0.01/<0.01
	3		1000倍 散布	4	1, 3, 7	圃場A: <0.02 ^{#11)} 圃場B: <0.02 ^{#11)} 圃場C: <0.02 ^{#11)}	圃場A: <0.01/- 圃場B: <0.01/- 圃場C: <0.01/-
メロン (果皮)	3	9.4%フロアブル	1000倍 散布	4	1, 3, 7	圃場A: 3.70 ^{#9)} 圃場B: 2.45 ^{#9)} 圃場C: 4.38 ^{#9)}	圃場A: 2.96/- 圃場B: 1.96/- 圃場C: 3.50/-
メロン (果実)	3	9.4%フロアブル	1000倍 散布	4	1, 3, 7	圃場A: 0.31 ^{#9)} 圃場B: 0.21 ^{#9)} 圃場C: 0.40 ^{#9)}	圃場A: 0.25 ^{#3)} /- 圃場B: 0.17 ^{#3)} /- 圃場C: 0.32 ^{#3)} /-
とうがん (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 250 L/10 a	2	1, 3, 7	圃場A: 0.03 ^{#9)} 圃場B: 0.03 ^{#9)}	圃場A: 0.02/- 圃場B: 0.02/-
ほうれんそう (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 150, 134.7 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 16.26 圃場B: 7.20 (3回, 7日)	圃場A: 16.2/0.44 圃場B: *7.17/0.16 (*3回, 7日)
しょうが (塊茎)	2	9.4%フロアブル	500倍 土壌灌注 3 L/m ²	3	30, 45, 60	圃場A: 0.24 (3回, 45日) 圃場B: 0.05	圃場A: *0.23/<0.01 (*3回, 45日) 圃場B: 0.04/<0.01
葉しょうが (根茎・茎)	2	9.4%フロアブル	500倍 土壌灌注 3 L/m ²	3	3, 14, 30, 45	圃場A: 2.07 ^{#3)} 圃場B: 1.49 ^{#3)}	圃場A: 1.38/- 圃場B: 0.99/-
えだまめ (さや)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 150, 176~200 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A: 2.36 (3回, 7日) 圃場B: 0.41	圃場A: *2.34/<0.05 (*3回, 7日) 圃場B: 0.40/<0.05
えだまめ (さや花梗を除去したもの)	2	9.4%フロアブル	原液 播種時種子塗沫 種子重量2%	1	72, 79, 86 88, 95, 102	圃場A: <0.02 (1回, 72日) 圃場B: <0.02	圃場A: *<0.01/*<0.01 (*1回, 72日) 圃場B: *<0.01/*<0.01 (*1回, 88日)
おかひじき (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 4.97 ^{#4)} 圃場B: 4.29 ^{#4)}	圃場A: 4.4/- 圃場B: 3.8/-
エンサイ (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	3, 7, 14	圃場A: 3.07 ^{#4)} 圃場B: 0.54 ^{#4)}	圃場A: 2.72/- 圃場B: 0.48/-
温州みかん (外果皮)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	3	1, 7, 14	圃場A: 3.42 (3回, 7日) 圃場B: 1.52	圃場A: *3.38/0.12 (*3回, 7日) 圃場B: 1.51/<0.05
温州みかん (果肉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	3	1, 7, 14	圃場A: 0.26 圃場B: 0.06	圃場A: 0.25/<0.01 圃場B: 0.05/<0.01
温州みかん (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	3	1, 7, 14	圃場A: 0.87 (3回, 7日) 圃場B: 0.35	圃場A: *0.85/0.03 ^{#4)} (*3回, 7日) 圃場B: 0.34/0.02 ^{#4)}
夏みかん (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	3, 4	1, 7, 14	圃場A: 0.55 (4回, 1日) 圃場B: 0.48 (3回, 7日)	圃場A: *0.54/*0.02 (*4回, 1日) (#) 圃場B: *0.47/*0.02 (*3回, 7日、**3回, 14日)
すだち (果実)	1	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	3	1, 7, 14	圃場A: 1.07	圃場A: 1.06/<0.01
かぼす (果実)	1	9.4%フロアブル	2000倍 散布 640 L/10 a	3	1, 7, 13	圃場A: 0.36	圃場A: 0.35/<0.01
レモン (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	1, 7, 14	圃場A: 2.06 圃場B: 0.36	圃場A: 2.03/0.03 圃場B: 0.33/*0.04 (*3回, 14日)
なし (果実(果梗を除去したもの))	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 470, 411 L/10 a	3	3, 7, 14, 21	圃場A: 0.16 ^{#12)} 圃場B: 0.23 ^{#12)}	圃場A: 0.14/- 圃場B: *0.20/- (*3回, 7日)
なし (果実(花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの))	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 470, 411 L/10 a	3	3, 7, 14, 21	圃場A: 0.17 ^{#12)} 圃場B: 0.23 ^{#12)}	圃場A: 0.15/- 圃場B: *0.20/- (*3回, 7日)

シアンゾファミドの作物残留試験一覧表 (国内)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) 注1)	各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注2) 【シアンゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
もも (果肉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 400, 500 L/10 a	2	1, 7, 14	圃場A: 0.02(2回, 1日) (#) 圃場B: 0.09(2回, 1日) (#)	圃場A: *0.01/*0.01(*2回, 1日) (#) 圃場B: *0.08/*<0.01(*2回, 1日) (#)
もも (果皮)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 400, 500 L/10 a	2	1, 7, 14	圃場A: 2.10(2回, 1日) (#) 圃場B: 4.19(2回, 1日) (#)	圃場A: *2.09/*0.04(*2回, 1日) (#) 圃場B: *4.09/*0.10(*2回, 1日) (#)
もも (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 400, 500 L/10 a	2	1, 7, 14	圃場A: 0.33(2回, 1日) (#) 圃場B: 0.64(2回, 1日) (#)	圃場A: *0.32/*0.01注5)(*2回, 1日) (#) 圃場B: *0.62/*0.02注5)(*2回, 1日) (#)
ネクタリン (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300, 400 L/10 a	1, 2	45, 60 1, 7, 14	圃場A: 0.19(#) ^{#13)} 圃場B: 0.33(#) ^{#13)}	圃場A: *0.18/-(*2回, 1日) (#) 圃場B: *0.32/-(*2回, 1日) (#)
すもも (果実)	2	3.2%フロアブル	1000倍 散布 300, 700 L/10 a	1, 2	14, 21, 28, 45, 59	圃場A: 0.05 ^{#14)} 圃場B: 0.01 ^{#14)}	圃場A: 0.05/-(圃場B: 0.01/-(
いちご (果実)	2	9.4%フロアブル	500倍 灌注 50 mL/ポット +500倍 灌注 100 mL/株	2+2	30, 37, 44	圃場A: 0.30 圃場B: <0.02	圃場A: 0.29/0.01 圃場B: <0.01/<0.01
ぶどう (小粒) (果実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 300 L/10 a	3	14, 21, 28	圃場A: 6.43(3回, 21日) 圃場B: 1.91(3回, 21日)	圃場A: *6.36/0.07(*3回, 21日) 圃場B: *1.90/0.02(*3回, 21日)
ぶどう (大粒) (果実)	2	9.4%フロアブル	1000倍 散布 300 L/10 a	3	14, 21, 28	圃場A: 0.54(3回, 21日) 圃場B: 1.27	圃場A: *0.53/0.01(*3回, 21日) 圃場B: 1.26/0.01
いちじく (果実)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	3	1, 3, 7	圃場A: 0.23 ^{#9)} 圃場B: 0.50 ^{#9)}	圃場A: 0.18/-(圃場B: 0.40/-(
ホップ (乾花)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 500 L/10 a	2	13, 20, 27	圃場A: 7.12 ^{#15)} 圃場B: 6.38 ^{#15)}	圃場A: 3.56/-(2回, 13日) 圃場B: 3.19/-(2回, 13日)
畑わさび (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 9.44 ^{#16)} 圃場B: 4.59 ^{#16)}	圃場A: 6.29/-(圃場B: 3.06/-(
畑わさび (根茎)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 300 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 1.05 ^{#17)} 圃場B: 0.74 ^{#17)}	圃場A: 0.70/-(圃場B: 0.49/-(
畑わさび (花、花茎及び葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 200, 300 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 3.63 圃場B: 10.04	圃場A: 3.58/<0.05 圃場B: 9.96/0.08
みょうが (花穂)	2	9.4%フロアブル	500倍 土壌灌注 3 L/m ²	3	3, 7, 14	圃場A: 0.90 圃場B: 3.51	圃場A: 0.89/0.02 圃場B: 3.50/0.07
	2		200倍 30分根茎浸漬処理 +500倍 土壌灌注 3 L/m ²	1+3	3, 7, 14	圃場A: 12.36 ^{#1)} 圃場B: 2.20 ^{#1)}	圃場A: 6.18/-(圃場B: 1.10/-(
バジル (茎葉)	2	9.4%フロアブル	2000倍 散布 162~199, 200 L/10 a	2	3, 7, 14	圃場A: 8.06 ^{#4)} 圃場B: 9.13 ^{#4)}	圃場A: 7.13/-(圃場B: 8.08/-(

- : 分析せず

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

注1) シアンゾファミド及び代謝物Bの合計濃度(シアンゾファミドに換算した値)を示した。代謝物の測定値がない農作物は以下の方法で総残留濃度を算出した。

- #1) 参照可能な補正係数が得られなかったため、作物残留試験成績で得られた補正係数のうち最大値の2.0をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #2) こんにゃくの作物残留試験成績 (PHI: 14日) より算出した補正係数1.20をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #3) かぶ(根)の作物残留試験成績 (PHI: 3日) より算出した補正係数1.50をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #4) キャベツの作物残留試験成績 (PHI: 3日) より算出した補正係数1.13をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #5) はくさいの作物残留試験成績 (PHI: 3日) より算出した補正係数1.50をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #6) レタスの作物残留試験成績 (PHI: 3日) より算出した補正係数1.10をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #7) ねぎの作物残留試験成績 (PHI: 3日) より算出した補正係数1.06をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #8) ミントマトの作物残留試験成績 (PHI: 1日) より算出した補正係数1.01をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #9) かぼちゃの作物残留試験成績 (PHI: 1日) より算出した補正係数1.25をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #10) すいか(果肉)の作物残留試験成績 (PHI: 1日) より代謝物Bの残留濃度を定量限界未満とした。
- #11) メロン(果肉)の作物残留試験成績 (PHI: 1日) より代謝物Bの残留濃度を定量限界未満とした。
- #12) みかん(果実)の作物残留試験成績 (PHI: 7日) より算出した補正係数1.13をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #13) もも(果実)の作物残留試験成績 (PHI: 1日) より算出した補正係数1.03をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #14) もも(果実)の作物残留試験成績 (PHI: 14日) より算出した補正係数1.06をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #15) はくさいの作物残留試験成績 (PHI: 14日) より算出した補正係数2.0をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #16) はくさいの作物残留試験成績 (PHI: 7日) より算出した補正係数1.50をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。
- #17) かぶ(根)の作物残留試験成績 (PHI: 7日) より算出した補正係数1.50をシアンゾファミドの濃度に乗じて総残留濃度を算出した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験(いわゆる最大使用条件下の作物残留試験)を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物Bの残留濃度は、シアンゾファミド濃度に換算した値で示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について()内に記載した。

注3) 果肉及び果皮の重量比から果実全体の残留濃度を算出した。

注4) 果肉及び果皮の重量割合が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、それぞれの割合を果肉80%及び果皮20%として果実全体の残留濃度を算出した。

注5) 果肉、果皮及び種子の重量割合が不明のため、過去の作物残留試験等のデータから、それぞれの割合を果肉77%、果皮15%及び種子8%として果実全体の残留濃度を算出した。

シアゾファミドの作物残留試験一覧表 (米国)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【シアゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
にんじん (根部)	1	34.5%フロアブル	総使用量 867 g ai/ha 散布	5	15	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 853 g ai/ha 散布	5	15	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 884 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : 0.033	圃場A : 0.023/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 882 g ai/ha 散布	5	15	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 874 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : 0.037	圃場A : 0.027/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 891 g ai/ha 散布	5	16	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 877 g ai/ha 散布	5	16	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 897 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 874 g ai/ha 散布	5	13	圃場A : 0.050	圃場A : 0.040/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 876 g ai/ha 散布	5	13	圃場A : 0.045	圃場A : 0.035/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 905 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : 0.036	圃場A : 0.026/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 875 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : 0.055	圃場A : 0.045/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 886 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : 0.043	圃場A : 0.033/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 876 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 876 g ai/ha 散布	5	14	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 867 g ai/ha 散布	5	13	圃場A : 0.040	圃場A : 0.030/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 876 g ai/ha 散布	5	15	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01
	1	34.5%フロアブル	総使用量 895 g ai/ha 散布	5	15	圃場A : <0.02	圃場A : <0.01/<0.01

注1) シアゾファミド及び代謝物Bの合計濃度(シアゾファミドに換算した値)を示した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験(いわゆる最大使用条件下の作物残留試験)を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物Bの残留濃度は、シアゾファミド濃度に換算した値を示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について()内に記載した。

シアゾファミドの作物残留試験一覧表 (台湾)

農作物	試験圃場数	試験条件				各化合物の残留濃度の合計 (mg/kg) ^{注1)}	各化合物の残留濃度 (mg/kg) ^{注2)} 【シアゾファミド/代謝物B】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
パパイヤ (果実)	1	9.4%フロアブル	2000倍 散布	4	12	圃場A : 0.12 ^{#)}	圃場A : 0.10/-

注1) シアゾファミド及び代謝物Bの合計濃度(シアゾファミドに換算した値)を示した。代謝物の測定値がない農作物は以下の方法で総残留濃度を算出した。

#) みかん(果実)の作物残留試験成績 (PHI : 14日) より算出した補正係数1.15をシアゾファミドの濃度に乘じて総残留濃度を算出した。

注2) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験(いわゆる最大使用条件下の作物残留試験)を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

食品名	基準値 案※1 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	国/地域 基準値※1 ppm	
米(玄米をいう。)	0.05	0.05	○			<0.01,<0.01(¥)
小麦	0.05	0.05	○			<0.01,<0.01(¥)
大豆	0.3	0.3	○			0.04,0.06(¥)
小豆類	0.1	0.1	○			0.02,0.02(¥)
ばれいしょ	0.05	0.05	○	0.01		<0.01,<0.01(¥)
さといも類(やつかしらを含む。)	0.01		申			<0.01,<0.01,<0.01
こんにゃくいも	0.3	0.3	○			<0.01,0.09(¥)
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根	0.3	0.3	○			0.04,0.09(¥)(はつかだいこんの根)
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉	25	25	○	15		3.9,17.6(¥)(はつかだいこんの葉)
かぶ類の根	0.3	0.3	○			0.06,0.08(¥)
かぶ類の葉	20	20	○	15		9.72,14.6(¥)
クレソン	15	10		15		
はくさい	15	15	○	15		
キャベツ	2	2	○	1.5		
芽キャベツ	2	2		1.5		
ケール	15	15	○	15		
こまつな	15	15	○	15		
きょうな	15	15	○	15		
チンゲンサイ	15	15	○	15		
カリフラワー	2	2	○	1.5		
ブロッコリー	2	2	○	1.5		
その他のあぶらな科野菜	20	20	○	15		5.1,12.5(¥)(はたけな)
チコリ	10	10		10		
エンダイブ	10	10		10		
しゅんぎく	10	10		10		
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)	10	10	○	10		
その他のきく科野菜	10	10		10		
たまねぎ	2	2	○	1.5		
ねぎ(リーキを含む。)	6	2	○	6		
にんにく	2	2		1.5		
にら	6			6		
わけぎ	6	5	○	6		
その他のゆり科野菜	10	3	○	10		
にんじん	0.09	0.09			0.09 米国	【<0.01~0.045(n=18)(米国)】
みつば	10	10	○	10		
トマト	2	2	○	0.2		0.72,1.00(¥)(ミニトマト)
ピーマン	1	1	○	0.4		0.22,0.33(¥)
なす	0.5	0.5	○	0.2		0.10,0.11(¥)
その他のなす科野菜	10	10	○	10		
きゅうり(ガーキンを含む。)	0.7	0.7	○	0.09		0.08,0.23(¥)
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	0.7	0.7	○	0.09		(きゅうり参照)
しろりり	0.1	0.1		0.09		※2
すいか		0.05	○			
すいか(果皮を含む。)	0.6		○	0.09		0.11,0.22,0.27
メロン類果実		0.05	○			
メロン類果実(果皮を含む。)	0.8		○	0.09		0.17,0.25,0.32
まくわうり		0.1				
まくわうり(果皮を含む。)	0.1		○	0.09		※2
その他のうり科野菜	10	10	○	10		

食品名	基準値 案※1 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	国/地域 基準値※1 ppm	
ほうれんそう	25	25	○	10		7.17,16.2(¥)
しょうが	3	3	○			0.99,1.38(¥)(葉しょうが)
未成熟いんげん	0.4	0.4		0.4		
えだまめ	5	5	○			0.40,2.34(¥)
その他の野菜	10	10	○	10		
みかん	2	0.7	○			
みかん(外果皮を含む。)	2		○			0.34,0.85(¥)
なつみかんの果実全体	2	2	○			0.47,0.54(＃)(¥)
レモン	5	5	○			0.33,2.03(¥)
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	5	5	○			(レモン参照)
グレープフルーツ	5	5	○			(レモン参照)
ライム	5	5	○			(レモン参照)
その他のかんきつ類果実	5	5	○			(レモン参照)
日本なし	0.5	0.5	○			0.14,0.20(¥)
もも	2	0.3	○			
もも(果皮及び種子を含む。)	2		○			0.32,0.62(＃)(¥)
ネクタリン	1	1	○			0.18,0.32(＃)(¥)
すもも(プルーンを含む。)	0.2	0.2	○			0.01,0.05(¥)
いちご	0.7	0.7	○			<0.01,0.29(¥)
ぶどう	10	10	○	1.5		1.90,6.36
パパイヤ	0.5	0.5			0.5 台湾	【0.10(台湾)】
その他の果実	1	1	○			0.18,0.40(¥)(いちじく)
ホップ	15	15	○	15		
その他のスパイス	10	10	○			1.51,3.38(¥)(みかんの果皮)
その他のハーブ	15	15	○	15		

申請(国内における登録、承認等の申請、インポートランス申請)以外の理由により本基準(暫定基準以外の基準)を見直す基準値案については、太枠線で囲んで示した。

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したものについては、斜線で示した。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

(＃)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

(¥)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。

※1) 国内の規制対象はシアゾファミドのみであるが、米国の規制対象はシアゾファミド及び代謝物B(4-クロロ-5-p-トリルイミダゾール-2-カルボニトリル)をシアゾファミドに換算したものの和である。該当食品については、作物残留試験結果から代謝物Bの影響はないものと考えられるため米国の基準値をそのまま参照する。

※2) 海外において基準値が設定されていることを考慮し、現行の基準値を維持することとする。

シアゾファミドの推定摂取量 (単位: µg/人/day)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) TMDI	国民全体 (1歳以上) EDI	幼児 (1~6歳) TMDI	幼児 (1~6歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI
米(玄米をいう。)	0.05	0.02	8.2	3.3	4.3	1.7	5.3	2.1	9.0	3.6
小麦	0.05	0.02	3.0	1.2	2.2	0.9	3.5	1.4	2.5	1.0
大豆	0.3	0.06	11.7	2.3	6.1	1.2	9.4	1.9	13.8	2.8
小豆類	0.1	0.03	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1
ばれいしょ	0.05	0.02	1.9	0.8	1.7	0.7	2.1	0.8	1.8	0.7
さといも類(やつがしらを含む。)	0.01	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
こんにゃくいも	0.3	0.06	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.4	0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)	0.3	0.1	9.9	3.3	3.4	1.1	6.2	2.1	13.7	4.6
だいこん類(ラディッシュを含む。)	25	12.15	42.5	20.7	15.0	7.3	77.5	37.7	70.0	34.0
かぶ類の根	0.3	0.08	0.8	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	1.5	0.4
かぶ類の葉	20	12.25	6.0	3.7	2.0	1.2	2.0	1.2	12.0	7.4
クレソン	15	3.7	1.5	0.4	1.5	0.4	1.5	0.4	1.5	0.4
はくさい	15	3.7	265.5	65.5	76.5	18.9	249.0	61.4	324.0	79.9
キャベツ	2	0.32	48.2	7.7	23.2	3.7	38.0	6.1	47.6	7.6
芽キャベツ	2	0.32	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
ケール	15	3.7	3.0	0.7	1.5	0.4	1.5	0.4	3.0	0.7
こまつな	15	3.7	75.0	18.5	27.0	6.7	96.0	23.7	96.0	23.7
きょうな	15	3.7	33.0	8.1	6.0	1.5	21.0	5.2	40.5	10.0
チンゲンサイ	15	3.7	27.0	6.7	10.5	2.6	27.0	6.7	28.5	7.0
カリフラワー	2	0.32	1.0	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	1.0	0.2
ブロッコリー	2	0.32	10.4	1.7	6.6	1.1	11.0	1.8	11.4	1.8
その他のあぶらな科野菜	20	9.945	68.0	33.8	12.0	6.0	16.0	8.0	96.0	47.7
チコリ	10	3.2	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3
エンダイブ	10	3.2	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3
しゅんぎく	10	3.2	15.0	4.8	3.0	1.0	26.0	8.3	25.0	8.0
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)	10	3.2	96.0	30.7	44.0	14.1	114.0	36.5	92.0	29.4
その他のさく科野菜	10	3.2	15.0	4.8	1.0	0.3	6.0	1.9	26.0	8.3
たまねぎ	2	0.062	62.4	1.9	45.2	1.4	70.6	2.2	55.6	1.7
ねぎ(リーギを含む。)	6	1.2	56.4	11.3	22.2	4.4	40.8	8.2	64.2	12.8
にんにく	2	0.062	0.8	0.0	0.2	0.0	2.0	0.1	1.0	0.0
にら	6	1.2	12.0	2.4	5.4	1.1	10.8	2.2	12.6	2.5
わけぎ	6	1.2	1.2	0.2	0.6	0.1	0.6	0.1	1.2	0.2
その他のゆり科野菜	10	3.2	6.0	1.9	1.0	0.3	2.0	0.6	12.0	3.8
にんじん	0.09	0.030	1.7	0.6	1.3	0.4	2.0	0.7	1.7	0.6
みつば	10	3.2	4.0	1.3	1.0	0.3	1.0	0.3	5.0	1.6
トマト	2	0.87	64.2	27.9	38.0	16.5	64.0	27.8	73.2	31.8
ピーマン	1	0.285	4.8	1.4	2.2	0.6	7.6	2.2	4.9	1.4
なす	0.5	0.115	6.0	1.4	1.1	0.2	5.0	1.2	8.6	2.0
その他のなす科野菜	10	3.2	11.0	3.5	1.0	0.3	12.0	3.8	12.0	3.8
きゅうり(ガーキンを含む。)	0.7	0.165	14.5	3.4	6.7	1.6	9.9	2.3	17.9	4.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	0.7	0.165	6.5	1.5	2.6	0.6	5.5	1.3	9.1	2.1
しろうり	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
すいか(果皮を含む。)	0.6	0.253	4.6	1.9	3.3	1.4	8.6	3.6	6.8	2.9
メロン類果実(果皮を含む。)	0.8	0.307	2.8	1.1	2.2	0.8	3.5	1.3	3.4	1.3
まくわうり(果皮を含む。)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
その他のうり科野菜	10	3.2	27.0	8.6	12.0	3.8	6.0	1.9	34.0	10.9
ほうれんそう	25	11.73	320.0	150.1	147.5	69.2	355.0	166.6	435.0	204.1
しょうが	3	1.78	4.5	2.7	0.9	0.5	3.3	2.0	5.1	3.0
未成熟いんげん	0.4	0.125	1.0	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	1.3	0.4
えだまめ	5	1.385	8.5	2.4	5.0	1.4	3.0	0.8	13.5	3.7
その他の野菜	10	3.2	134.0	42.9	63.0	20.2	101.0	32.3	141.0	45.1
みかん(外果皮を含む。)	2	0.61	35.6	10.9	32.8	10.0	1.2	0.4	52.4	16.0
なつみかんの果実全体	2	0.515	2.6	0.7	1.4	0.4	9.6	2.5	4.2	1.1
レモン	5	1.21	2.5	0.6	0.5	0.1	1.0	0.2	3.0	0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)	5	1.21	35.0	8.5	73.0	17.7	62.5	15.1	21.0	5.1
グレープフルーツ	5	1.21	21.0	5.1	11.5	2.8	44.5	10.8	17.5	4.2
ライム	5	1.21	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1
その他のかんきつ類果実	5	1.21	29.5	7.1	13.5	3.3	12.5	3.0	47.5	11.5
日本なし	0.5	0.195	3.2	1.2	1.7	0.7	4.6	1.8	3.9	1.5
もも(果皮及び種子を含む。)	2	0.485	6.8	1.6	7.4	1.8	10.6	2.6	8.8	2.1
ネクタリン	1	0.26	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
すもも(プルーンを含む。)	0.2	0.03	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
いちご	0.7	0.16	3.8	0.9	5.5	1.2	3.6	0.8	4.1	0.9
ぶどう	10	4.17	87.0	36.3	82.0	34.2	202.0	84.2	90.0	37.5
パパイア	0.5	0.12	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
その他の果実	1	0.365	1.2	0.4	0.4	0.1	0.9	0.3	1.7	0.6
ホップ	15	3.6	1.5	0.4	1.5	0.4	1.5	0.4	1.5	0.4
その他のスパイス	10	2.47	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	2.0	0.5
その他のハーブ	15	3.7	13.5	3.3	4.5	1.1	1.5	0.4	21.0	5.2
計			1744.5	566.3	850.9	271.2	1787.8	592.6	2118.5	708.3
ADI比(%)			18.6	6.0	30.3	9.7	18.0	6.0	22.2	7.4

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

TMDI試算法: 基準値案×各食品の平均摂取量

EDI: 推定1日摂取量 (Estimated Daily Intake)

EDI試算法: 作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

国際基準を参照したものについては、JMFRの評価に用いられた残留試験データを用いてEDI試算をした。

しろうり及びまくわうりは、個別の作物残留試験がなく、参照可能な補正係数が得られなかったため、作物残留試験成績で得られた補正係数のうち最大値の2.0を基準値案に乗じた値を用いてEDI試算をした。

(参考)

これまでの経緯

平成13年	4月26日	初回農薬登録
平成16年	6月25日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ほうれんそう及びこまつな）
平成16年	7月12日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成16年	11月4日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成16年	9月28日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成17年	4月27日	残留農薬基準告示
平成17年	6月1日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：かんきつ、非結球あぶらな科葉菜類等）
平成17年	6月14日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成18年	5月11日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成18年	5月30日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成18年	11月29日	残留農薬基準告示
平成19年	5月15日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：だいず、レタス等）
平成19年	5月22日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成19年	9月6日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成19年	10月23日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成20年	4月30日	残留農薬基準告示
平成21年	9月14日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：キャベツ及びはくさい）
平成21年	10月20日	インポートトレランス申請（にんじん及びパパイヤ）
平成21年	10月27日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成22年	3月18日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知

平成22年	9月14日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成23年	3月15日	残留農薬基準告示
平成22年	9月21日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：かぼちゃ）
平成22年11月	10日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成23年	7月21日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成23年12月	21日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成24年12月	28日	残留農薬基準告示
平成23年10月	27日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：はつかだいこん、はたけな）
平成24年	1月19日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成24年	3月13日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：こんにゃく）
平成24年	6月22日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成24年10月	30日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成25年	7月2日	残留農薬基準告示
平成24年	6月29日	インポートトレランス申請（ホップ）
平成24年	8月21日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成24年12月	10日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成25年	3月26日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成25年10月	22日	残留農薬基準告示
平成25年	2月4日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：こんにゃく及びズッキーニ）
平成25年	6月11日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成25年	7月29日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成25年10月	21日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

平成26年	8月	8日	残留農薬基準告示	
平成25年	8月	5日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：水稻）	
平成25年	11月	11日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請	
平成26年	1月	27日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知	
平成26年	7月	31日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会	
平成27年	2月	20日	残留農薬基準告示	
平成27年	8月	24日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：日本なし）	
平成28年	5月	25日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：すもも）	
平成28年	8月	25日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：カリフラワー）	
平成26年	12月	1日	インポートトレランス申請（たまねぎ及びにんにく）	
平成28年	12月	13日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請	
平成29年	10月	17日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知	
平成30年	2月	7日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会	
平成30年	10月	18日	残留農薬基準告示	
令和	元年	5月	14日	農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：さといも）
令和	2年	10月	19日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
令和	3年	1月	12日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和	3年	5月	25日	薬事・食品衛生審議会へ諮問
令和	3年	7月	7日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- 穂山 浩 学校法人星薬科大学薬学部薬品分析化学研究室教授
石井 里枝 埼玉県衛生研究所副所長（兼）食品微生物検査室長
井之上 浩一 学校法人立命館立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室教授
大山 和俊 一般財団法人残留農薬研究所化学部長
折戸 謙介 学校法人麻布獣医学園理事（兼）麻布大学獣医学部生理学教授
加藤 くみ子 学校法人北里研究所北里大学薬学部分析化学教室教授
魏 民 公立大学法人大阪大阪市立大学大学院医学研究科
環境リスク評価学准教授
佐藤 洋 国立大学法人岩手大学農学部共同獣医学科比較薬理毒性学研究室教授
佐野 元彦 国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授
須恵 雅之 学校法人東京農業大学応用生物科学部農芸化学科
生物有機化学研究室准教授
瀧本 秀美 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長
中島 美紀 国立大学法人金沢大学ナノ生命科学研究所
薬物代謝安全性学研究室教授
永山 敏廣 学校法人明治薬科大学薬学部特任教授
根本 了 国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長
野田 隆志 一般社団法人日本植物防疫協会信頼性保証室付技術顧問
二村 睦子 日本生活協同組合連合会常務執行役員

(○：部会長)

答申（案）

シアゾファミド

食品名	残留基準値 ppm
米（玄米をいう。）	0.05
小麦	0.05
大豆	0.3
小豆類 ^{注1)}	0.1
ばれいしょ	0.05
さといも類（やつがしらを含む。）	0.01
こんにゃくいも	0.3
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.3
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	25
かぶ類の根	0.3
かぶ類の葉	20
クレソン	15
はくさい	15
キャベツ	2
芽キャベツ	2
ケール	15
こまつな	15
きょうな	15
チンゲンサイ	15
カリフラワー	2
ブロッコリー	2
その他のあぶらな科野菜 ^{注2)}	20
チコリ	10
エンダイブ	10
しゅんぎく	10
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）	10
その他のきく科野菜 ^{注3)}	10
たまねぎ	2
ねぎ（リーキを含む。）	6
にんにく	2
にら	6
わけぎ	6
その他のゆり科野菜 ^{注4)}	10
にんじん	0.09
みつば	10
トマト	2
ピーマン	1
なす	0.5
その他のなす科野菜 ^{注5)}	10

食品名	残留基準値 ppm
きゅうり（ガーキンを含む。）	0.7
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	0.7
しろうり	0.1
すいか（果皮を含む。）	0.6
メロン類果実（果皮を含む。）	0.8
まくわうり（果皮を含む。）	0.1
その他のうり科野菜 ^{注6)}	10
ほうれんそう	25
しょうが	3
未成熟いんげん	0.4
えだまめ	5
その他の野菜 ^{注7)}	10
みかん（外果皮を含む。）	2
なつみかんの果実全体	2
レモン	5
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	5
グレープフルーツ	5
ライム	5
その他のかんきつ類果実 ^{注8)}	5
日本なし	0.5
もも（果皮及び種子を含む。）	2
ネクタリン	1
すもも（プルーンを含む。）	0.2
いちご	0.7
ぶどう	10
パパイヤ	0.5
その他の果実 ^{注9)}	1
ホップ	15
その他のスパイス ^{注10)}	10
その他のハーブ ^{注11)}	15

注1) 「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイ
ト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

注2) 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類（ラディッシュを含
む。）の根、だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク
レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラ
ワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

注3) 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、
チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）及びハーブ以外のものを
いう。

注4) 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ（リーキを含む。）、にんに
く、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

注5) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをい
う。

注6) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ
（スカッシュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

注7) 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科
野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょ
うが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをい
う。

注8) 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの
外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）、グレープフル
ーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

注9) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメ
ロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず（アプリコットを含む。）、すもも（プルーンを含む。）、う
め、おうとう（チェリーを含む。）、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、
アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外の
ものをいう。

注10) 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうが
らし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）の果皮、ゆずの
果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注11) 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリ
の茎及びセロリの葉以外のものをいう。

府 食 第 802 号
令和 3 年 1 月 12 日

厚生労働大臣
田村 憲久 殿

食品安全委員会
委員長 佐藤 洋
(公 印 省 略)

食品健康影響評価の結果の通知について

令和 2 年 10 月 19 日付け厚生労働省発生食 1019 第 4 号をもって厚生労働大臣から食品安全委員会に意見を求められたシアゾファミドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第 2 項の規定に基づき通知します。

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。

記

シアゾファミドの許容一日摂取量を 0.17 mg/kg 体重/日と設定し、急性参照用量は設定する必要がないと判断した。

農薬評価書

シアゾファミド (第11版)

2021年1月
食品安全委員会

目次

	頁
○ 審議の経緯.....	4
○ 食品安全委員会委員名簿.....	8
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿.....	8
○ 要約.....	13
I. 評価対象農薬の概要.....	14
1. 用途.....	14
2. 有効成分の一般名.....	14
3. 化学名.....	14
4. 分子式.....	14
5. 分子量.....	14
6. 構造式.....	14
7. 開発の経緯.....	14
II. 安全性に係る試験の概要.....	16
1. 動物体内運命試験.....	16
(1) ラット（単回投与）.....	16
(2) ラット（反復投与）.....	19
(3) ラットの血液中及び胃内容物中における <i>in vitro</i> 代謝試験.....	19
(4) ラットにおけるシアゾファミド及び代謝物 B の比較代謝試験.....	20
(5) ヤギ.....	20
(6) ニワトリ.....	23
2. 植物体内運命試験.....	24
(1) 水稻.....	24
(2) トマト（散布処理）.....	25
(3) トマト（土壌処理）.....	25
(4) トマト（幼植物における吸収移行性試験）.....	25
(5) ばれいしょ.....	26
(6) ぶどう.....	26
3. 土壌中運命試験.....	27
(1) 好氣的土壌中運命試験.....	27
(2) 好氣的湛水土壌中運命試験.....	28
(3) 嫌氣的湛水土壌中運命試験.....	29
(4) 土壌吸着試験（国内土壌）.....	29
(5) 土壌吸着試験（海外土壌）.....	29
(6) カラムリーチング試験（熟成土壌）.....	29

(7) カラムリーチング試験 (非熟成土壌)	30
(8) 土壌表面光分解試験	30
4. 水中運命試験	30
(1) 加水分解試験	30
(2) 水中光分解試験 (蒸留水及び自然水)	31
(3) 水中光分解試験 (緩衝液)	31
5. 土壌残留試験	32
6. 作物残留試験	32
(1) 作物残留試験	32
(2) 推定摂取量	32
7. 一般薬理試験	34
8. 急性毒性試験	35
(1) 急性毒性試験	35
(2) 急性神経毒性試験 (ラット)	36
9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験	37
10. 亜急性毒性試験	37
(1) 90日間亜急性毒性試験 (ラット)	37
(2) 90日間亜急性毒性試験 (イヌ)	37
(3) 28日間亜急性経皮毒性試験 (ラット)	38
(4) 90日間亜急性神経毒性試験 (ラット)	38
11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	38
(1) 1年間慢性毒性試験 (イヌ)	38
(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット)	39
(3) 18か月間発がん性試験 (マウス)	39
12. 生殖発生毒性試験	40
(1) 2世代繁殖試験 (ラット)	40
(2) 発生毒性試験 (ラット)	41
(3) 発生毒性試験 (ウサギ)	41
13. 遺伝毒性試験	41
14. その他の試験	43
(1) 28日間免疫毒性試験 (マウス)	43
III. 食品健康影響評価	44
・別紙1: 代謝物/分解物略称	49
・別紙2: 検査値等略称	50
・別紙3: 作物残留試験成績 (国内)	51
・別紙4: 作物残留試験成績 (海外)	57

・別紙 5 : 推定摂取量.....	59
・参照.....	61

＜審議の経緯＞

－第1版関係－

- 2001年 4月 26日 初回農薬登録
- 2004年 6月 25日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：ほうれんそう及びこまつな）
- 2004年 7月 12日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0712002号）、関係書類の接受（参照1～53）
- 2004年 7月 15日 第54回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2004年 7月 21日 第14回農薬専門調査会
- 2004年 9月 16日 第62回食品安全委員会（報告）
- 2004年 9月 16日 から10月13日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2004年 11月 2日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2004年 11月 4日 第68回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照54）
- 2005年 4月 27日 残留農薬基準告示（参照55）

－第2版関係－

- 2005年 6月 1日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：かんきつ、非結球あぶらな科葉菜類等）
- 2005年 6月 14日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0614001号）、関係書類の接受（参照56～59）
- 2005年 6月 16日 第99回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2005年 9月 21日 第36回農薬専門調査会
- 2006年 1月 18日 追加資料受理（参照60）
- 2006年 3月 1日 第42回農薬専門調査会
- 2006年 3月 16日 第135回食品安全委員会（報告）
- 2006年 3月 16日 から4月12日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2006年 5月 10日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2006年 5月 11日 第142回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照61）
- 2006年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照62）

－第3版関係－

- 2007年 5月 15日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：だいず、レタス等）

- 2007年 5月 22日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0522001号）、関係書類の接受（参照63～66）
- 2007年 5月 24日 第191回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2007年 7月 27日 第23回農薬専門調査会幹事会
- 2007年 9月 4日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2007年 9月 6日 第205回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照67）
- 2008年 4月 30日 残留農薬基準告示（参照68）

－第4版関係－

- 2009年 9月 14日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：キャベツ及びはくさい）
- 2009年 10月 20日 インポートトレランス設定の要請（にんじん及びパパイヤ）
- 2009年 10月 27日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安1027第2号）、関係書類の接受（参照69～76）
- 2009年 10月 29日 第307回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2010年 2月 12日 第60回農薬専門調査会幹事会
- 2010年 3月 16日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2010年 3月 18日 第324回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照77）
- 2011年 3月 15日 残留農薬基準告示（参照78）

－第5版関係－

- 2010年 9月 21日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：かぼちゃ）
- 2010年 11月 10日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安1110第3号）、関係書類の接受（参照79～82）
- 2010年 11月 18日 第356回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2011年 7月 21日 第391回食品安全委員会（審議）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照83）
- 2012年 12月 28日 残留農薬基準告示（参照84）

－第6版関係－

- 2011年 10月 27日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：はつかだいこん、はたけな等）

- 2012年 1月 19日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0119 第 2 号）、関係書類の接受（参照 85～87）
- 2012年 1月 26日 第 416 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2012年 3月 22日 追加資料受理（参照 88、89）
- 2012年 6月 21日 第 436 回食品安全委員会（審議）
- 2012年 6月 22日 厚生労働大臣へ通知（参照 90）
- 2013年 7月 2日 残留農薬基準告示（参照 91）

－第 7 版関係－

- 2012年 6月 29日 インポートトレランス設定の要請（ホップ）
- 2012年 8月 21日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0821 第 1 号）、関係書類の接受（参照 92～94）
- 2012年 8月 27日 第 444 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2012年 12月 10日 第 457 回食品安全委員会（審議）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 95）
- 2013年 10月 22日 残留農薬基準告示（参照 100）

－第 8 版関係－

- 2013年 2月 4日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：こんにゃく及びズッキーニ）
- 2013年 6月 11日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 0611 第 5 号）、関係書類の接受（参照 96～98）
- 2013年 6月 17日 第 478 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2013年 7月 29日 第 483 回食品安全委員会（審議）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 99）
- 2014年 8月 8日 残留農薬基準告示（参照 107）

－第 9 版関係－

- 2013年 8月 5日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：水稲）
- 2013年 11月 11日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安 1111 第 4 号）、関係書類の接受（参照 101～106、108）
- 2013年 11月 18日 第 494 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2014年 1月 14日 第 101 回農薬専門調査会幹事会

- 2014年 1月 23日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
 2014年 1月 27日 第501回食品安全委員会（報告）
 （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照109）
 2015年 2月 20日 残留農薬基準告示（参照110）

－第10版関係－

- 2015年 8月 24日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：日本なし）
 2016年 5月 25日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：すもも）
 2016年 8月 25日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：カリフラワー）
 2016年 12月 1日 インポートトレランス設定の要請（たまねぎ及びにんにく）
 2016年 12月 13日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食1213第4号）
 2016年 12月 14日 関係書類の接受（参照111～117）
 2016年 12月 20日 第633回食品安全委員会（要請事項説明）
 2017年 2月 20日 第61回農薬専門調査会評価第二部会
 2017年 6月 29日 追加資料受理（参照118、119）
 2017年 7月 28日 第66回農薬専門調査会評価第二部会
 2017年 8月 24日 第152回農薬専門調査会幹事会
 2017年 9月 5日 第664回食品安全委員会（報告）
 2017年 9月 6日 から10月5日まで 国民からの意見・情報の募集
 2017年 10月 11日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
 2017年 10月 17日 第669回食品安全委員会（報告）
 （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照127）
 2018年 10月 18日 残留農薬基準告示（参照128）

－第11版関係－

- 2019年 5月 14日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準値設定依頼（適用拡大：さといも）
 2020年 10月 19日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食1019第4号、関係書類の接受（参照129～131））
 2020年 10月 27日 第795回食品安全委員会（要請事項説明）
 2021年 1月 12日 第802回食品安全委員会（審議）
 （同日付け厚生労働大臣へ通知）

<食品安全委員会委員名簿>

(2006年6月30日まで)

寺田雅昭 (委員長)
寺尾允男 (委員長代理)
小泉直子
坂本元子
中村靖彦
本間清一
見上 彪

(2006年12月20日まで)

寺田雅昭 (委員長)
見上 彪 (委員長代理)
小泉直子
長尾 拓
野村一正
畑江敬子
本間清一

(2009年6月30日まで)

見上 彪 (委員長)
小泉直子 (委員長代理*)
長尾 拓
野村一正
畑江敬子
廣瀬雅雄**
本間清一

* : 2007年2月1日から

** : 2007年4月1日から

(2011年1月6日まで)

小泉直子 (委員長)
見上 彪 (委員長代理*)
長尾 拓
野村一正
畑江敬子
廣瀬雅雄
村田容常

* : 2009年7月9日から

(2012年6月30日まで)

小泉直子 (委員長)
熊谷 進 (委員長代理*)
長尾 拓
野村一正
畑江敬子
廣瀬雅雄
村田容常

* : 2011年1月13日から

(2015年6月30日まで)

熊谷 進 (委員長)
佐藤 洋 (委員長代理)
山添 康 (委員長代理)
三森国敏 (委員長代理)
石井克枝
上安平冽子
村田容常

(2017年1月6日まで)

佐藤 洋 (委員長)
山添 康 (委員長代理)
熊谷 進
吉田 緑
石井克枝
堀口逸子
村田容常

(2017年6月30日まで)

佐藤 洋 (委員長)
山添 康 (委員長代理)
吉田 緑
山本茂貴
石井克枝
堀口逸子
村田容常

(2018年7月1日から)

佐藤 洋 (委員長)
山本茂貴 (委員長代理)
川西 徹
吉田 緑
香西みどり
堀口逸子
吉田 充

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2006年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)
廣瀬雅雄 (座長代理)
石井康雄

小澤正吾
高木篤也
武田明治

出川雅邦
長尾哲二
林 真

江馬 眞
太田敏博

津田修治*
津田洋幸

平塚 明
吉田 緑

* : 2005年10月1日から

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)

廣瀬雅雄 (座長代理)

赤池昭紀

石井康雄

泉 啓介

上路雅子

臼井健二

江馬 眞

大澤貫寿

太田敏博

大谷 浩

小澤正吾

小林裕子

三枝順三

佐々木有

高木篤也

玉井郁巳

田村廣人

津田修治

津田洋幸

出川雅邦

長尾哲二

中澤憲一

納屋聖人

成瀬一郎

布柴達男

根岸友恵

林 眞

平塚 明

藤本成明

細川正清

松本清司

柳井徳磨

山崎浩史

山手丈至

與語靖洋

吉田 緑

若栗 忍

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)

林 眞 (座長代理*)

赤池昭紀

石井康雄

泉 啓介

上路雅子

臼井健二

江馬 眞

大澤貫寿

太田敏博

大谷 浩

小澤正吾

小林裕子

三枝順三

佐々木有

代田眞理子****

高木篤也

玉井郁巳

田村廣人

津田修治

津田洋幸

出川雅邦

長尾哲二

中澤憲一

納屋聖人

成瀬一郎***

西川秋佳**

布柴達男

根岸友恵

平塚 明

藤本成明

細川正清

松本清司

柳井徳磨

山崎浩史

山手丈至

與語靖洋

吉田 緑

若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清
赤池昭紀	玉井郁巳	堀本政夫
石井康雄	田村廣人	本間正充
泉 啓介	津田修治	松本清司
今井田克己	津田洋幸	柳井徳磨
上路雅子	長尾哲二	山崎浩史
臼井健二	中澤憲一*	山手丈至
太田敏博	永田 清	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	義澤克彦**
小澤正吾	西川秋佳	吉田 緑
川合是彰	布柴達男	若栗 忍
小林裕子	根岸友恵	
三枝順三***	根本信雄	

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2014年3月31日まで)

- ・幹事会

納屋聖人 (座長)	上路雅子	松本清司
西川秋佳* (座長代理)	永田 清	山手丈至**
三枝順三 (座長代理**)	長野嘉介	吉田 緑
赤池昭紀	本間正充	
- ・評価第一部会

上路雅子 (座長)	津田修治	山崎浩史
赤池昭紀 (座長代理)	福井義浩	義澤克彦
相磯成敏	堀本政夫	若栗 忍
- ・評価第二部会

吉田 緑 (座長)	栗形麻樹子	藤本成明
松本清司 (座長代理)	腰岡政二	細川正清
泉 啓介	根岸友恵	本間正充
- ・評価第三部会

三枝順三 (座長)	小野 敦	永田 清
納屋聖人 (座長代理)	佐々木有	八田稔久
浅野 哲	田村廣人	増村健一

・評価第四部会

西川秋佳* (座長)	川口博明	根本信雄
長野嘉介 (座長代理*; 座長**)	代田眞理子	森田 健
山手丈至 (座長代理**)	玉井郁巳	與語靖洋
井上 薫**		* : 2013年9月30日まで ** : 2013年10月1日から

(2018年3月31日まで)

・幹事会

西川秋佳 (座長)	三枝順三	長野嘉介
納屋聖人 (座長代理)	代田眞理子	林 真
浅野 哲	清家伸康	本間正充*
小野 敦	中島美紀	與語靖洋

・評価第一部会

浅野 哲 (座長)	栞形麻樹子	平林容子
平塚 明 (座長代理)	佐藤 洋	本多一郎
堀本政夫 (座長代理)	清家伸康	森田 健
相磯成敏	豊田武士	山本雅子
小澤正吾	林 真	若栗 忍

・評価第二部会

三枝順三 (座長)	高木篤也	八田稔久
小野 敦 (座長代理)	中島美紀	福井義浩
納屋聖人 (座長代理)	中島裕司	本間正充*
腰岡政二	中山真義	美谷島克宏
杉原数美	根岸友恵	義澤克彦

・評価第三部会

西川秋佳 (座長)	加藤美紀	高橋祐次
長野嘉介 (座長代理)	川口博明	塚原伸治
與語靖洋 (座長代理)	久野壽也	中塚敏夫
石井雄二	篠原厚子	増村健一
太田敏博	代田眞理子	吉田 充
		* : 2017年9月30日まで

<第101回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

小澤正吾	西川秋佳	林 真
------	------	-----

<第61回農薬専門調査会評価第二部会専門参考人名簿>

永田 清

松本清司

<第 66 回農薬専門調査会評価第二部会専門参考人名簿>

永田 清

松本清司

<第 152 回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

赤池昭紀

永田 清

松本清司

上路雅子

要 約

シアノイミダゾール系殺菌剤である「シアゾファミド」(CAS No.120116-88-3)について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、作物残留試験(さといも)の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命(ラット、ヤギ及びニワトリ)、植物体内運命(水稻、トマト等)、作物残留、亜急性毒性(ラット及びイヌ)、亜急性神経毒性(ラット)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性併合(ラット)、発がん性(マウス)、2世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、免疫毒性(マウス)、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、シアゾファミド投与による影響は、主に腎臓(重量増加、尿変化等:ラット)に認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、免疫毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物中のばく露評価対象物質をシアゾファミド(親化合物のみ)と設定した。

各試験の無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の17.1 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.17 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量(ADI)とした。

また、シアゾファミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったため、急性参照用量(ARfD)は設定する必要がないと判断した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺菌剤

2. 有効成分の一般名

和名：シアゾファミド

英名：cyazofamid (ISO 名)

3. 化学名

IUPAC

和名：4-クロロ-2-シアノ-*N,N*-ジメチル-5-*p*-トリルイミダゾール-1-スルホンアミド

英名：4-chloro-2-cyano-*N,N*-dimethyl-5-*p*-tolylimidazole-1-sulfonamide

CAS (No.120116-88-3)

和名：4-クロロ-2-シアノ-*N,N*-ジメチル-5-(4-メチルフェニル)-1*H*-イミダゾール-1-スルホンアミド

英名：4-chloro-2-cyano-*N,N*-dimethyl-5-(4-methylphenyl)-1*H*-imidazole-1-sulfonamide


4. 分子式

$C_{13}H_{13}ClN_4O_2S$

5. 分子量

324.8

6. 構造式



7. 開発の経緯

シアゾファミドは 1987 年に石原産業株式会社により開発されたシアノイミダゾール系殺菌剤であり、2001 年 4 月に初めて我が国で登録された。作用機序はミ

トコンドリア内電子伝達系コンプレックスⅢの Qi サイト阻害であり、藻菌類に対して種特異的に作用すると考えられている。海外では、フランス、ドイツ、英国等でばれいしょ等を対象に登録されている。

今回、農薬取締法に基づく農薬登録申請（適用拡大：さといも）がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験[II. 1～4]は、シアゾファミドのベンゼン環の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「[ben- ^{14}C]シアゾファミド」という。）及びイミダゾール環4位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[imi- ^{14}C]シアゾファミド」という。）を用いて実施された。また、一部の試験については、代謝物Bのベンゼン環の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「[ben- ^{14}C]B」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からシアゾファミドの濃度（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。

代謝物/分解物略称及び検査値等略称は、別紙1及び2に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット（単回投与）

① 吸収

a. 血中濃度推移

SDラット（一群雌雄各5匹）に[ben- ^{14}C]シアゾファミド又は[imi- ^{14}C]シアゾファミドを0.5 mg/kg 体重（以下[1.(1)及び(2)]において「低用量」という。）又は1,000 mg/kg 体重（以下[1.(1)]において「高用量」という。）で単回経口投与して、血中濃度推移について検討された。

全血中薬物動態学的パラメータは表1に示されている。

全血中薬物動態学的パラメータに標識位置による大きな違いはみられなかった。（参照2）

表1 全血中薬物動態学的パラメータ

標識体	[ben- ^{14}C]シアゾファミド				[imi- ^{14}C]シアゾファミド			
	0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重		0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
C_{\max} ($\mu\text{g/g}$)	0.34	0.24	48.1	75.6	0.35	0.28	54.2	66.6
T_{\max} (hr)	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0.50	0.25	0.25
$T_{1/2}$ (hr)	4.4	4.6	7.6	9.7	4.8	5.8	10.4	11.6
AUC (hr $\cdot\mu\text{g/g}$)	0.67	0.48	103	104	0.81	0.63	96.2	102

b. 吸収率

胆汁中排泄試験[1.(1)④b.]における投与後72時間の胆汁、尿及びケージ洗浄液並びに投与72時間後の血液中放射能から算出された吸収率は、低用量投与群で53.2%～83.7%、高用量投与群で4.0%～6.0%であった。（参照4）

② 分布

SD ラット（一群雌雄各 3～5 匹）に[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを低用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。（参照 3）

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度（ $\mu\text{g/g}$ ）

標識体	投与量	性別	T _{max} 付近*	168 時間後
[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド	0.5 mg/kg 体重	雄	腎臓(1.72)、肝臓(0.455)、血液(0.424)、脂肪(0.167)、副腎(0.166)、肺(0.145)、その他(0.2 未満)	肝臓(0.0014)、腎臓(0.0012)、その他(0.001 未満)
		雌	腎臓(1.23)、肝臓(0.776)、血液(0.334)、副腎(0.170)、卵巣(0.164)、脂肪(0.150)、肺(0.131)、甲状腺(0.109)、子宮(0.103)、その他(0.2 未満)	腎臓(0.0017)、肝臓(0.0017)、副腎(0.0011)、その他(0.001 未満)
	1,000 mg/kg 体重	雄	腎臓(64.9)、血液(28.9)、肝臓(25.1)、甲状腺(22.4)、副腎(13.4)、脂肪(11.0)、その他(10.0 未満)	全て 0.5 未満
		雌	腎臓(69.9)、脂肪(62.4)、副腎(58.3)、肝臓(41.2)、血液(34.2)、甲状腺(28.0)、卵巣(21.7)、肺(14.6)、子宮(12.7)、心臓(10.5)、その他(10.0 未満)	腎臓(0.5)、その他(0.5 未満)
[imi- ¹⁴ C] シアゾファミド	0.5 mg/kg 体重	雄	腎臓(0.715)、肝臓(0.182)、血液(0.179)、その他(0.2 未満)	全て 0.001 未満
		雌	腎臓(0.535)、肝臓(0.310)、血液(0.152)、その他(0.2 未満)	腎臓(0.0013)、その他(0.001 未満)
	1,000 mg/kg 体重	雄	腎臓(35.7)、肝臓(23.8)、血液(22.1)、脂肪(10.3)、その他(10.0 未満)	全て 0.5 未満
		雌	腎臓(57.1)、肝臓(31.3)、肺(30.7)、血液(29.4)、卵巣(18.4)、副腎(15.3)、子宮(10.7)、脂肪(10.0)、その他(10.0 未満)	全て 0.5 未満

* : T_{max} 付近は、低用量投与群で投与 0.5 時間後、高用量投与群で投与 0.25 時間後。

③ 代謝

SD ラット（一群雌雄各 3～5 匹）に[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを低用量又は高用量で単回経口投与して、代謝物同定・定量試験が実施された。

投与後 24 時間の尿及び投与後 48 時間の糞中代謝物は表 3 に示されている。

低用量投与群では、尿中代謝物として G、H 及び I が検出されたが、生成量に性差が認められた。また、糞中からは未変化のシアゾファミドが 13.5%TAR～20.8%TAR 検出された。肝臓及び腎臓における主要代謝物は G であり、そのほか肝臓で B 及び C、腎臓で B が検出された。

高用量投与群においても、尿中からは代謝物 G、H 及び I、糞中からは未変化のシアゾファミドが検出された。

シアゾファミドのラットにおける主要代謝経路は、①N,N-ジメチルスルホンアミド基の加水分解 (B)、②トリル基の酸化によるカルボン酸の生成 (G) 及び抱合体生成であると考えられた。(参照 3)

表 3 投与後 24 時間の尿及び投与後 48 時間の糞中代謝物 (%TAR)

標識体	投与量	性別	尿	糞
[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド	0.5 mg/kg 体重	雄	G(59.3)、H(0.4)、I(0.2)	シアゾファミド(20.8)、抽出残渣(6.8)
		雌	G(25.9)、H(8.3)、I(5.8)	シアゾファミド(17.7)、抽出残渣(17.7)
	1,000 mg/kg 体重	雄	G(1.78)、H(0.01)	シアゾファミド(85.1)、抽出残渣(4.7)
		雌	G(1.14)、H(0.14)、I(0.08)	シアゾファミド(92.9)、抽出残渣(1.6)
[imi- ¹⁴ C] シアゾファミド	0.5 mg/kg 体重	雄	G(47.8)、H(0.6)、I(0.2)	シアゾファミド(18.4)、抽出残渣(8.8)
		雌	G(23.1)、H(7.7)、I(5.4)	シアゾファミド(13.5)、抽出残渣(19.7)
	1,000 mg/kg 体重	雄	G(1.93)、H(0.02)、I(0.01)	シアゾファミド(89.2)、抽出残渣(5.1)
		雌	G(1.21)、H(0.09)、I(0.04)	シアゾファミド(78.4)、抽出残渣(6.5)

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄

SD ラット (一群雌雄各 3～5 匹) に [ben-¹⁴C]シアゾファミド又は [imi-¹⁴C]シアゾファミドを低用量又は高用量で単回経口投与して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

投与後 168 時間の尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

投与後 24 時間の尿及び糞中に 90%TAR 以上が排泄され、投与 168 時間後の組織中残存率は 0.5%TAR 未満であった。低用量投与群では主に尿中に排泄され、高用量投与群では主に糞中に排泄された。(参照 3)

表 4 投与後 168 時間の尿及び糞中排泄率 (%TAR)

標識体	[ben- ¹⁴ C]シアゾファミド				[imi- ¹⁴ C]シアゾファミド			
	0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重		0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿	64.8	50.8	2.6	2.6	68.2	49.0	3.6	2.1
糞	30.4	44.8	94.2	95.7	29.7	46.7	96.9	97.5

注) 尿はケージ洗浄液を含む。

b. 胆汁中排泄

胆管カニューレを挿入した SD ラット (一群雌雄各 3 匹) に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドを低用量又は高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率は表 5 に示されている。

低用量の単回経口投与では、主要代謝物として G が胆汁で 2.8%TAR～6.4%TAR、尿で 25.4%TAR～67.7%TAR、抱合体 (B、G 及び D の抱合体が含まれる) が胆汁で 7.4%TAR～25.2%TAR、尿中で 1.1%TAR～2.9%TAR 検出された。糞中からは、未変化のシアゾファミドが 2.7%TAR～34.7%TAR 検出された。(参照 4)

表 5 投与後 72 時間の胆汁、尿及び糞中排泄率 (%TAR)

標識体	[ben- ¹⁴ C]シアゾファミド				[imi- ¹⁴ C]シアゾファミド			
	0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重		0.5 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
胆汁	22.1	38.8	0.8	1.4	12.2	28.9	1.1	1.3
尿	61.6	40.5	5.2	3.6	41.0	43.6	4.1	2.7
糞	9.8	18.6	95.0	96.0	42.3	22.4	94.7	94.7

注) 尿はケージ洗浄液を含む。

(2) ラット (反復投与)

SD ラット (一群雌雄各 2 匹) に非標識体のシアゾファミドを低用量で 1 日 1 回、14 日間反復経口投与した後、[ben-¹⁴C] シアゾファミドを低用量で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

シアゾファミドは、単回投与よりも反復投与の方が尿中に多くの放射能が排泄され、投与後 168 時間の排泄率は尿中で 62.8%TAR～72.8%TAR、糞中で 20.8%TAR～31.6%TAR であった。(参照 5)

(3) ラットの血液中及び胃内容物中における *in vitro* 代謝試験

SD ラット (雄 6 匹) から採取された血液及び胃内容物を用いて、血液中及び胃内容物中における *in vitro* 代謝試験が実施された。血液を用いた試験では、血液中に [ben-¹⁴C] シアゾファミドを 0.40 µg/mL 又は [ben-¹⁴C] B を 0.27 µg/mL (シ

アゾファミド換算値で 0.40 µg/mL 相当) となるように添加した。胃内容物を用いた試験では、胃内容物中に [ben-¹⁴C] シアゾファミドを 13.8 µg/g 又は [ben-¹⁴C] B を 9.11 µg/g (シアゾファミド換算値で 13.8 µg/g 相当) となるように添加した。

シアゾファミドは血液中で速やかに代謝され、処理 60 分後には添加量の約 30% が代謝された。主要代謝物は B であった。B は処理 60 分後において代謝は認められなかった。胃内容物中では、シアゾファミド及び B とともに処理 60 分後における代謝は認められず、胃内容物中で安定であると考えられた。動物におけるシアゾファミドから主要代謝物である G への代謝は、B を経由していると考えられた。(参照 6)

(4) ラットにおけるシアゾファミド及び代謝物 B の比較代謝試験

SD ラット (一群各雄 5 匹) に [ben-¹⁴C] シアゾファミドを 0.5 mg/kg 体重又は [ben-¹⁴C] B を 0.33 mg/kg 体重 (親化合物換算で 0.5 mg/kg 体重相当) で単回経口投与して、シアゾファミド及び代謝物 B のラットにおける比較代謝試験が実施された。

投与 30 分後の肝臓、血漿及び胃内容物における代謝物は表 6 に示されている。

シアゾファミド投与群よりも B 投与群の方が全血中及び肝臓中濃度が高く、B の方が速やかに吸収されることが示唆された。(参照 7)

表 6 投与 30 分後の肝臓、血漿及び胃内容物における代謝物 (%TRR)

試料	[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド投与群	[ben- ¹⁴ C] B 投与群
肝臓	シアゾファミド(6.1)、B(24.2)、G(41.9)	B(76.5)、G(18.2)、D(3.8)
血漿	B(61.7)、G(34.4)、D(4.0)	B(67.9)、G(26.6)、D(5.6)
胃内容物	シアゾファミド(97.2)、B(2.8)	B(100)

シアゾファミドは代謝の初期の段階で速やかに B に代謝され、B は G に代謝されると考えられた。

(5) ヤギ

泌乳ヤギ (品種不明、一群雌 2 頭) に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドを 10 mg/kg 飼料相当量で 1 日 1 回 5 日間カプセル経口投与し、最終投与 8 時間後にと殺して動物体内運命試験が実施された。

投与後 4 及び 5 日の乳汁、肝臓、腎臓、筋肉並びに脂肪における総残留放射能濃度及び代謝物は表 7 に示されている。

乳汁中放射能は、[ben-¹⁴C] シアゾファミド投与群で 0.01% TAR、[imi-¹⁴C] シアゾファミド投与群で 0.05% TAR であった。臓器及び組織中の最大残留放射能濃度は両標識体とも肝臓の 0.10% TAR であった。残りの放射能の大部分は消化管

内容物中に存在していると考えられた。乳汁及び組織中の主な代謝物は、B、C、G（システイン抱合体を含む。）及びVであり、それぞれ最大で33.4%TRR、12.2%TRR、78.1%TRR及び28.6%TRR認められた。

投与後3及び5日の尿並びに投与後3日の糞における総残留放射能濃度及び代謝物は表8に示されている。

[ben-¹⁴C]シアゾファミド投与群で59.7% TAR、[imi-¹⁴C]シアゾファミド投与群で57.9% TARが尿（膀胱内容物を含む）及び糞中に回収された。尿と糞では、糞中により多く排泄され、糞中放射能のほとんどは未変化のシアゾファミドであった。

シアゾファミドのヤギにおける主要代謝経路は、①*N,N*-ジメチルスルホンアミド基の加水分解（B）、②シアノ基の加水分解（C）、③トリル基の酸化によるカルボン酸の生成（G）及びそれに続くシステイン抱合体形成が考えられた。これらの経路はラットにおける動物体内運命試験の結果と類似するものであった。（参照103）

表8 投与後4及び5日の乳汁並びに最終投与8時間後の肝臓、腎臓、筋肉及び脂肪における総残留放射能濃度及び代謝物

標識体	試料		総残留放射能濃度 (µg/g)	シアゾファミド (%TRR)	代謝物 (%TRR)
[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド	乳汁	投与後4日	0.005	1.2	G* (37.9)、V(19.1)、B(4.8)、C(3.2)、未同定極性代謝物(2.1)
		投与後5日	0.006	1.2	G* (42.3)、V(28.6)、C(2.6)、B(0.7)、未同定極性代謝物(1.6)
	肝臓		0.111	0.2	C(12.2)、V(8.5)、G*(5.1)、B(1.6)、未同定極性代謝物(3.4)
	腎臓		0.070	0.2	G のシステイン抱合体(70.0)、C(7.6)、V(6.2)、W(4.5)、G(4.2)、B(0.3)
	腰部筋肉		0.004	0.7	B(26.8)、G* (24.0)、C(6.9)、V(3.8)、未同定極性代謝物(2.6)
	網状脂肪組織		0.006	1.9	G* (43.8)、B(33.4)、C(5.4)、V(5.0)、未同定極性代謝物(2.3)
	腎周囲脂肪組織		0.010	0.6	G* (57.6)、B(26.1)、C(10.7)、V(0.7)、未同定極性代謝物(1.5)
[imi- ¹⁴ C] シアゾファミド	乳汁	投与後4日	0.008	1.4	G* (26.1)、C(4.4)、V(2.7)、B(2.0)、未同定極性代謝物(35.6)
		投与後5日	0.010	1.0	G* (41.3)、V(3.3)、C(1.9)、B(0.4)、未同定極性代謝物(30.6)
	肝臓		0.125	0.3	C(11.1)、V(9.9)、G*(4.7)、B(1.4)、未同定極性代謝物(5.0)
	腎臓		0.106	0.1	G のシステイン抱合体(69.7)、G(8.4)、V(7.0)、C(5.0)、W(3.6)、B(0.3)
	腰部筋肉		0.006	1.0	B(22.6)、G* (22.4)、C(3.6)、V(2.0)、未同定極性代謝物(11.9)
	網状脂肪組織		0.010	3.7	G* (38.3)、B(30.5)、C(4.1)、V(1.8)、未同定極性代謝物(9.3)
腎周囲脂肪組織		0.010	1.2	G* (48.8)、B(28.6)、C(5.2)、V(0.6)、未同定極性代謝物(5.5)	

* : G のシステイン抱合体を含む。

表9 投与後3及び5日の尿並びに投与後3日の糞における
総残留放射能濃度及び代謝物

標識体	試料		総残留放射能濃度 (µg/g)	シアゾファミド (%TRR)	代謝物 (%TRR)
[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド	尿	投与後3日	1.87	ND	G(86.7)、W(3.9)、V(3.1)、B(0.2)、未同定極性代謝物(0.9)
		投与後5日	2.01	ND	G(89.4)、V(6.9)、W(3.3)
	糞		7.72	82.6	G(10.5)、B(2.7)
[imi- ¹⁴ C] シアゾファミド	尿	投与後3日	2.22	ND	G(87.7)、W(4.0)、V(3.1)、B(0.1)、未同定極性代謝物(0.7)
		投与後5日	2.53	ND	G(91.1)、W(3.6)、V(3.2)
	糞		7.35	86.1	G(7.6)、B(2.0)

ND：検出されず

(6) ニワトリ

産卵鶏（レグホン種、一群雌 10 羽）に[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを 10 mg/kg 飼料相当量で 1 日 1 回 5 日間カプセル経口投与し、最終投与後 9 時間以内にと殺して動物体内運命試験が実施された。

最終投与後 9 時間の肝臓、腎臓並びに投与後 1 及び 3 日の排泄物における総残留放射能濃度及び代謝物は表 9 に示されている。

シアゾファミドは速やかに排泄され、[ben-¹⁴C]シアゾファミド投与群で 86.2%TAR、[imi-¹⁴C]シアゾファミド投与群で 92.3%TAR が排泄物及びケージ洗浄液中に回収された。抽出放射能の大部分が未変化のシアゾファミド (63.9%TRR～77.6%TRR) で、代謝物としては G が 3.3%TRR～18.7%TRR (0.246～1.48 µg/g) 認められたほか、D の抱合体と少量の未同定成分との混合物、B、D 及び K が検出されたが、いずれも 5%TRR 未満であった。

両標識体ともに、肝臓及び腎臓中の残留放射能は 0.01%TAR～0.05%TAR で、卵及びその他の食用部位においては検出されなかった。主要代謝物として、肝臓で D の抱合体と少量の未同定成分との混合物が 3.7%TRR～11.7%TRR (0.0016～0.0103 µg/g)、腎臓で D の抱合体と少量の未同定成分との混合物が 15.0%TRR～15.5%TRR (0.0044～0.0086 µg/g)、G が 11.1%TRR～12.3%TRR (0.0035～0.0064 µg/g) 検出された。そのほか肝臓で G、肝臓及び腎臓で B、D 及び K (D のエステル抱合体を含む。) が 2%TRR 未満認められた。

排泄物、肝臓及び腎臓の抽出残渣を酸 (1N 及び 6N 塩酸)、塩基 (1N 水酸化ナトリウム) 及び酵素 (プロテアーゼ、アミラーゼ及びコラゲナーゼ) で加水分解した結果、ほとんどの放射能が抽出され、肝臓及び腎臓の抽出残渣において、最大 0.0156 µg/g の放射能が認められた。1N 塩酸加水分解画分で D の抱合体と

少量の未同定成分との混合物、B、D、G 及び K (D のエステル抱合体を含む。) が認められたが、いずれも 0.01 µg/g 未満であった。

シアゾファミドのニワトリにおける主要代謝経路は、①*N,N*-ジメチルスルホンアミド基の転移 (K) 及び加水分解 (B)、②シアノ基の加水分解、トリル基の酸化 (D 及び G) 並びに抱合体形成であると考えられた。(参照 104)

表 9 最終投与後 9 時間の肝臓及び腎臓並びに投与後 1 及び 3 日の排泄物における総残留放射能濃度及び代謝物

標識体	試料	総残留放射能濃度 (µg/g)	シアゾファミド (%TRR)	代謝物 (%TRR)	結合性残渣 (%TRR)	
[ben- ¹⁴ C] シアゾファミド	肝臓	0.0439	ND	D の抱合体 ^a (3.7)、G(0.5)、B(0.4)、K ^b (0.4)、D(0.3)	74.5	
	腎臓	0.0288	0.4	D の抱合体 ^a (15.5)、G(12.3)、D(1.2)、B(0.8)、K ^b (0.6)	59.4	
	排泄物 (投与後 1 日)	7.47	77.6	D の抱合体 ^a (3.6)、G(3.3)、B(1.7)、D(1.5)、K ^b (0.2)	2.0	
[imi- ¹⁴ C] シアゾファミド	肝臓	0.0878	0.4	D の抱合体 ^a (11.7)、G(1.7)、B(1.5)、D(1.5)、K ^b (0.8)	75.2	
	腎臓	0.0578	0.3	D の抱合体 ^a (15.0)、G(11.1)、D(1.6)、B(0.8)、K ^b (0.5)	54.0	
	排泄物	投与後 1 日	7.89	63.9	G(18.7)、B(4.7)、D の抱合体 ^a (2.2)、K ^b (1.6)、D(1.4)	2.8
		投与後 3 日	9.43	70.2	G(8.6)、D の抱合体 ^a (2.2)、B(1.4)、D(1.4)、K ^b (0.5)	2.9

ND：検出されず

^a：少量の未同定成分との混合物

^b：D のエステル抱合体を含む。

2. 植物体内運命試験

(1) 水稻

水稻 (品種：CM205) を播種した育苗箱の土壌表面に、フロアブル剤に調製した [ben-¹⁴C]シアゾファミド又は [imi-¹⁴C]シアゾファミドを、9.95 g ai/ha (以下 [2. (1)] において「1 倍量」という。) 若しくは 91.6 g ai/ha (代謝物同定用、以下 [2. (1)] において「10 倍量」という。) で処理し、3 葉期に育苗箱の土とともに水田に移植し、1 倍量処理群の処理 130 日後に茎葉、処理 154 日後に稲わら、玄米、もみ殻及び根部並びに 10 倍量処理群の処理 154 日後に稲わら、玄米及びもみ殻を採取して植物体内運命試験が実施された。

総残留放射能は、1 倍量処理群の地上部ではいずれも 0.002 mg/kg であり、根部では 0.053 mg/kg であった。10 倍量処理群の稲わら、玄米及びもみ殻中にはそれぞれ 0.024、0.014 及び 0.012 mg/kg 認められた。

1 倍量処理群の根部並びに 10 倍量処理群の稲わら及び玄米における残留成分は大部分が極性物質であった。いずれの試料からも未変化のシアゾファミドは検出されず、1 倍量処理群の根部に微量の代謝物 G (0.3%TRR、0.0002 mg/kg) が検出された。(参照 105)

(2) トマト (散布処理)

温室でポット栽培したトマト (品種: Bush Beefsteak) に、フロアブル剤に調製した[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを、1 回当たり 100 g ai/ha、1 週間間隔で 4 回茎葉散布し、最終散布 1 日後に果実及び茎葉を採取して植物体内運命試験が実施された。

果実における総残留放射能は 0.08~0.29 mg/kg であり、表面洗浄後の果実で 17.4%TRR~45.8%TRR であった。表面洗浄した果実をジュースとパルプに分けたところ、表面洗浄後果実中の残留放射能の約 71%~87%がパルプ中に、残りの約 13%~29%がジュース中に存在した。洗浄液、パルプ及びジュースの合計中に未変化のシアゾファミドは 76.4%TRR~79.9%TRR 含まれ、主要代謝物は B 及び K であったが、いずれも 5.0%TRR 以下であった。少量代謝物として B+G の抱合体、C、D、D の抱合体、E、G、G のエステル体、L 及び M が検出された。

茎葉中では未変化のシアゾファミドが 77.6%TRR~79.1%TRR、代謝物 B が 1.1%TRR~5.4%TRR を占めた。少量代謝物として B+G の抱合体、C、D、E、G、G のエステル体、K+K の異性体、L 及び M が検出された。(参照 8)

(3) トマト (土壌処理)

温室でポット栽培したトマト (品種: ポンテローザ) に、フロアブル剤に調製した[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを、1 回当たり 100 g ai/ha、1 週間間隔で 4 回土壌表面に処理し、最終散布 1 日後に果実、茎葉及び根部並びに表層から 4 cm ごとに土壌を採取して植物体内運命試験が実施された。

果実からは 0.2%TAR (0.004~0.005 mg/kg)、茎葉からは 0.2%TAR~0.3%TAR (0.010~0.014 mg/kg) が検出された。土壌では、処理層 (0~4 cm) から 66.0%TAR~74.9%TAR が検出され、それ以下の層では 3%TAR 未満であった。

シアゾファミドは、土壌表層に処理した場合、トマトへほとんど吸収されず、処理した大部分が土壌表層にとどまっていると考えられた。(参照 9)

(4) トマト (幼植物における吸収移行性試験)

人工気象器内で水耕栽培した 6~7 葉期のトマト (品種: ポンテローザ) の第 4 葉に、フロアブル剤 (125~127 µg/mL) に調製した[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミド 40 µL を表面塗布し、処理 3、7 及び 14 日後に処理葉及び非処理茎葉を採取してトマト幼植物における吸収移行性試験が実施さ

れた。

処理 7 及び 14 日後におけるトマト幼植物体の表面洗浄液から 87.1%**TAR**～115%**TAR** が検出され、洗浄後の処理葉から 0.3%**TAR**～0.5%**TAR** が検出された。非処理茎葉からは、放射能はほとんど検出されなかった。

シアゾファミドは葉表面からはほとんど吸収されず、また、吸収されたとしても、他の部位へはほとんど移行せずに葉表面にそのまま残っていると考えられた。(参照 10)

(5) ばれいしょ

ほ場栽培又は温室栽培したばれいしょ(品種、ほ場: **Kennebec**、温室: **Superior**)に、フロアブル剤に調製した[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを、1 回当たり 100 g ai/ha (以下[2.(5)]において「低濃度」という。)若しくは 400 g ai/ha (代謝物同定用、以下[2.(5)]において「高濃度」という。)、1 週間間隔で低濃度処理群(ほ場のみ)には 2～3 回、高濃度処理群のほ場栽培では 3 回、温室栽培では 5 回茎葉散布し、最終散布 1 週間後に塊茎及び茎葉を採取して植物体内運命試験が実施された。

塊茎中の総残留放射能は、低濃度処理群で 0.8～1.9 µg/kg、高濃度処理群で 16.5～21.7 µg/kg であった。未変化のシアゾファミドは、低濃度及び高濃度処理群とも 2.2 µg/kg 以下であった。代謝物として B が最大で 2.8%**TRR** 認められ、可溶性生体成分に取り込まれた極性代謝物画分は 19.7%**TRR**～55.6%**TRR** を占めた。結合性残渣は 16.5%**TRR**～60.9%**TRR** を占めたが、主に塊茎中のデンプンに存在しており、シアゾファミドは植物体内で生体成分に取り込まれる程度にまで分解されると考えられた。

茎葉の総残留放射能は、高濃度処理・温室栽培群で 64.3～66.5 mg/kg であり、未変化のシアゾファミドが 95.0%**TRR**～95.2%**TRR** を占め、主要代謝物は B (1.8%**TRR**～2.3%**TRR**) であった。少量代謝物として C、D、E、G、K、L 及び M が検出された。(参照 11)

(6) ぶどう

ほ場栽培したぶどう(品種: **Pinot Noir**)に、フロアブル剤に調製した[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを、1 回当たり 100 g ai/ha、21～25 日間隔で 5 回茎葉散布し、最終散布 44 日後に果実を収穫し、ジュース、フリーランワイン¹及びワインに加工して、植物体内運命試験が実施された。

果実中の総残留放射能は 0.44～0.50 mg/kg であった。この果実を磨砕して果実とパルプに分別したところ、ジュースで 0.073～0.077 mg/kg (15.4%**TRR**～

¹ 参照 12 では、フリーランワインは「発酵の終了時に、圧搾することなく、ろ過のみで得られたワイン」と定義されている。

16.4%TRR)、パルプで 0.36~0.41 mg/kg (81.6%TRR~81.7%TRR)、ブレンダーの洗浄液で 0.009~0.015 mg/kg (2.0%TRR~2.9%TRR) 検出された。パルプ、ジュース及びブレンダー洗浄液の中に含まれる未変化のシアゾファミドは、合計で 56.8%TRR~57.9%TRR であり、主要代謝物は極性物質(糖及びクエン酸を含む。以下同じ。)が約 10%TRR、B が 4.5%TRR~6.6%TRR 認められた。少量代謝物として B の抱合体、C+L、D、E、F、G、K 及び M が検出された。極性代謝物を含む糖を再結晶化したところ放射活性があったため、シアゾファミドは十分小さな化合物に分解され、生体成分に再吸収されたと考えられた。

フリーランワイン及びワイン中の総残留放射能はそれぞれ 0.19~0.21 mg/kg、0.26~0.32 mg/kg であった。フリーランワイン中には未変化のシアゾファミド、極性物質、代謝物 F、B 及び B の抱合体がそれぞれ 5.4%TRR~7.2%TRR、17.9%TRR~23.6%TRR、4.9%TRR~7.5%TRR、28.4%TRR 及び 2.3%TRR~3.3%TRR、ワイン中にはそれぞれ 10.2%TRR~10.9%TRR、14.3%TRR~18.9%TRR、2.5%TRR~5.6%TRR、30.4%TRR~31.1%TRR 及び 1.5%TRR~3.7%TRR 含まれていた。少量代謝物として C+L、D、E、G、K 及び M が検出された。また、ワインを蒸留して得られたエタノール中の残留放射能は 1.1%TRR~1.3%TRR であった。

茎葉中の総残留放射能は 0.43~0.68 mg/kg であり、未変化のシアゾファミド、極性物質及び代謝物 B がそれぞれ 34.2%TRR~41.1%TRR、5.5%TRR~8.9%TRR 及び 2.6%TRR~3.1%TRR 含まれていた。少量代謝物として C+L、D、E、F、G、K 及び M が検出された。(参照 12)

植物におけるシアゾファミドの主要代謝経路は、①*N,N*-ジメチルスルホンアミド基の転移(K)、②*N,N*-ジメチルスルホンアミド基の加水分解(B)とその後のトリル基の酸化によるアルコール(D)及びカルボン酸(G)の生成、③シアノ基への加水(C)、ほかに多様な代謝や抱合を受けると考えられた。

3. 土壤中運命試験

(1) 好氣的土壤中運命試験

壤質砂土(米国)の水分含量を最大容水量の 75%に調整し、[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを 0.1 mg/kg 乾土となるよう処理し、20 ±2°Cの暗条件下で最長 59 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

処理後 59 日の ¹⁴CO₂ の発生量は 11.9%TAR~14.1%TAR であった。

土壤結合性放射能は処理 15~20 日後に最大となり、その後減少した後再び増加し、処理 59 日後には 47.6%TAR~50.4%TAR となった。主要分解物は B、C 及び J であり、B は処理 5 日後に最大(14.9%TAR~16.3%TAR)に、C は、[ben-¹⁴C]シアゾファミド処理区では処理 26 日後に 11.0%TAR、[imi-¹⁴C]シアゾファミド

処理区では処理 15 日後に 13.2%TAR に、J は処理 44 日後に 9.2%TAR～9.8%TAR に達した。いずれの分解物もその後減衰し、処理 59 日後にはそれぞれ 3.9%TAR～4.7%TAR、5.9%TAR～8.8%TAR 及び 7.3%TAR～8.4%TAR となった。シアゾファミドの推定半減期及び 90%分解期間はそれぞれ 5 日以下及び 33～44 日であった。

シアゾファミドは好気性土壌中で分解を受け、B、J 等を経て結合性残渣に取り込まれ、最終的に CO₂ まで分解されると考えられた。(参照 13)

(2) 好氣的湛水土壌中運命試験

滅菌及び非滅菌の壤土(埼玉)に土壌層の厚さが 5 cm 以上、水層の厚さが 1 cm 以上となるように湛水し、25℃、暗条件下で約 4 週間プレインキュベートした後、[imi-¹⁴C]シアゾファミドをそれぞれ 0.1 mg/kg 乾土となるように処理し、25±2℃の暗条件下で非滅菌土壌は最長 120 日間、滅菌土壌は最長 30 日間インキュベートして、好氣的湛水土壌中運命試験が実施された。また、非滅菌土壌では発生した揮発性化合物を捕集した。

非滅菌土壌においては、水層中の放射能は経時的に減少し、処理直後には 69.2%TAR であったが、処理 120 日後には 2.4%TAR まで減少した。土壌からの抽出放射能は処理 14 日後に最大となった後減少し、処理 120 日後には 65.6%TAR となった。一方、抽出残渣は処理直後で 0.2%TAR であったが、処理 120 日後には 18.4%TAR に増加した。処理 120 日後の ¹⁴CO₂ は 6.7%TAR であったが、揮発性有機物質の生成は 0.1%TAR 未満であった。滅菌土壌においても、水層中の放射能は経時的に減少し、処理直後には 66.1%TAR であったが、処理 30 日後には 1.3 %TAR まで減少した。土壌からの抽出放射能は処理 8 日後に最高となり、処理 30 日後には 88.1%TAR となった。抽出残渣は処理 30 日後までに 6.8%TAR に増加した。

非滅菌土壌ではシアゾファミドは速やかに分解し、系全体における主要分解物は B、C 及び J であった。分解物 B は処理 3 日後に 51.3%TAR まで増加した後、徐々に減少し、処理 120 日後では 3.5%TAR となった。分解物 C は、処理 14 日後に 41.4%TAR まで増加した後、処理 120 日後では 13.1%TAR に減少した。一方、分解物 J は徐々に増加し、処理 120 日後に 44.0%TAR となった。

滅菌土壌でもシアゾファミドは分解し、分解物 B 及び C が認められたことから、これらは加水分解でも生成すると考えられた。また、非滅菌土壌と比べてシアゾファミドの分解速度は遅かったことから、シアゾファミドの分解には土壌微生物が重要な役割を果たすと考えられた。

好氣的湛水土壌中におけるシアゾファミドの推定半減期は、非滅菌条件で 1.6 日、滅菌条件で 4.4 日であった。また、分解物 B 及び C の非滅菌条件における推定半減期は 6.3 及び 30.3 日であった。

シアゾファミドは好氣的湛水土壌中で分解を受け、B、C 及び J を経て最終的

に CO₂ まで分解されると考えられた。(参照 106)

(3) 嫌氣的湛水土壌中運命試験

砂壤土(米国)に湛水し、嫌氣的条件下でプレインキュベートして、嫌氣性の程度を確認後、[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドをそれぞれ 0.1 mg/kg 乾土となるよう処理し、嫌氣的条件下、20±2°C、暗条件下で最長 360 日間インキュベートして、嫌氣的湛水土壌中運命試験が実施された。

360 日間の ¹⁴CO₂ の発生量は 2.9% TAR ~ 3.4% TAR であった。

土壌結合性放射能は処理 360 日後に 80.1% TAR ~ 82.6% TAR となった。主要分解物は B、C 及び J であり、B は処理 7 日後に 20.7% TAR ~ 27.2% TAR に、C は処理 7 又は 21 日後に 14.1% TAR 又は 11.3% TAR に、J は処理 56 日後に 18.9% TAR ~ 21.3% TAR に達した。いずれの分解物もその後減衰して、処理 360 日後にはそれぞれ 0.5% TAR ~ 1.0% TAR、1.6% TAR ~ 2.1% TAR 及び 10.8% TAR ~ 12.1% TAR となった。シアゾファミドの推定半減期及び 90% 分解期間はそれぞれ 4.75 ~ 6.80 及び 28.0 ~ 37.6 日であった。

シアゾファミドは嫌氣性土壌中で分解を受け、B、J 等を経て結合性残渣に取り込まれ、CO₂ まで分解されると考えられた。(参照 14)

(4) 土壌吸着試験(国内土壌)

4 種類の国内土壌 [砂壤土(滋賀)、軽埴土(茨城)、埴壤土(愛知)及び砂質埴壤土(三重)] を用いた土壌吸着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 4.92 ~ 15.4、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 375 ~ 615 であった。(参照 15)

(5) 土壌吸着試験(海外土壌)

4 種類の海外土壌 [壤質砂土(米国)、pH 7.6 の砂壤土(英国)、pH 6.9 の砂壤土(英国)及び砂土(ドイツ)] を用いた土壌吸着試験が実施された。

Freundlich の吸着係数 K_{ads} は 4.14 ~ 87.0、有機炭素含有率により補正した吸着係数 K_{oc} は 657 ~ 2,900 であった。(参照 16)

(6) カラムリーチング試験(熟成土壌)

壤質砂土(英国)に[ben-¹⁴C]シアゾファミド又は[imi-¹⁴C]シアゾファミドを 0.1 mg/kg 乾土の用量で処理した後 20±2°C、暗条件下で 90 時間インキュベートし、土壌層を 30 cm とした同じ土壌の上端に添加後、48 時間、200 mm の降雨に相当する量(181 mL/日×2 回)の 0.01 M 塩化カルシウム水溶液を流して、熟成土壌におけるカラムリーチング試験が実施された。

放射能は溶出液から 0.8% TAR、土壌層の 0 ~ 5 cm から 86.6% TAR ~ 90.3% TAR 検出され、ほかはどの画分についても 4.0% TAR 未満であった。0 ~ 5

cm の土壌中の主な成分は、未変化のシアゾファミド並びに分解物 B 及び C であり、それぞれ 39.8% TAR ~ 43.2% TAR、22.3% TAR ~ 28.4% TAR 及び 10.8% TAR ~ 12.0% TAR 認められた。（参照 17）

（7）カラムリーチング試験（非熟成土壌）

4 種類の土壌 [壤質砂土（米国）、砂質壤土、壤質砂土及び砂土（ドイツ）] に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドを 0.1 mg/kg 乾土の用量で処理し、土壌層を 30 cm とした同じ土壌の上端に添加後、48 時間、200 mm の降雨に相当する量（181 mL/日×2 回）の 0.01 M 塩化カルシウム水溶液を流して、非熟成土壌におけるカラムリーチング試験が実施された。

回収放射能は 84.7% TAR ~ 95.0% TAR であり、そのうち 0.1% TAR ~ 0.4% TAR は溶出液から検出された。土壌層の 0 ~ 5 cm から 81.9% TAR ~ 93.5% TAR の放射能が検出され、ほかはどの画分についても 6.0% TAR 以下であった。土壌層の 0 ~ 5 cm 中の主な成分は、未変化のシアゾファミド並びに分解物 B 及び C であり、当該土壌抽出物全体の放射能に対する割合は、それぞれ 45.9% ~ 72.3%、11.0% ~ 41.3% 及び不検出 ~ 8.5% であった。（参照 18）

（8）土壌表面光分解試験

壤質砂土（英国、乾燥重量約 10 g）に、[ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドの処理液 50 µL（約 1 µg のシアゾファミドを含む）を処理し、約 3 mm の厚さに広げた後、20 ± 3°C でキセノン光（波長：250 ~ 750 nm）の照射及び非照射処置を 12 時間交互に 30 日間繰り返して、土壌表面光分解試験が実施された。また、暗所対照区が設定された。

シアゾファミドの分解は光照射区及び暗所対照区ともに速やかであり、主要分解物は B 及び G であった。分解物 B の生成は暗所対照区及び光照射区ともに急速であったが、G への変換は暗所対照区の方が速かった。

シアゾファミドの推定半減期は、光照射区で 93 ~ 104 時間、暗所対照区で 95 ~ 113 時間、90% 分解期間は光照射区で 310 ~ 345 時間、暗所対照区で 315 ~ 376 時間であった。本試験では、光照射の作用が水中光分解試験 [4. (2) 及び (3)] ほど顕著には観察されなかった。（参照 19）

4. 水中運命試験

（1）加水分解試験

pH 4（酢酸緩衝液）、pH 5（酢酸緩衝液）、pH 7（リン酸緩衝液）及び pH 9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドを、それぞれ 70 µg/L となるように添加後、25 ± 1°C、暗条件下で最長 30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

pH 4、5 及び 7 の各緩衝液での主要分解物は B のみであった。pH 9 では、分

解物 B のほかに C が生成した。処理 30 日後の各緩衝液中における未変化のシアゾファミド並びに分解物 B 及び C (pH 9 のみ) はそれぞれ 14% TAR ~ 21% TAR、74% TAR ~ 83% TAR 及び 9% TAR ~ 10% TAR であった。

シアゾファミドの推定半減期は 10.6 ~ 13.3 日と算出された。(参照 20)

(2) 水中光分解試験 (蒸留水及び自然水)

非滅菌蒸留水及び非滅菌自然水 (滋賀、琵琶湖水及び日野川水) に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドをそれぞれ約 70 µg/L となるように添加し、21 ± 3°C で 12 時間キセノン光を照射 (光強度: 646 W/m²、波長: 290 nm 未満をフィルターでカット) 後、12 時間非照射のまま静置して、水中光分解試験が実施された。また、暗所対照区が設定された。

暗所対照区におけるシアゾファミドの分解は緩やかであり、処理 1 日後に 90% TAR 程度存在した。光照射によってシアゾファミドは急速に分解し、処理 1 時間後での未変化のシアゾファミドは全供試水中で不検出であった。推定半減期は 3.7 ~ 5.0 分であり、これは北緯 35 度 (東京) 春季の太陽光換算で 24 ~ 33 分であった。主要分解物は B、K、L 及び M であり、K は処理 10 ~ 30 分後に約 40% TAR を占め、処理 24 時間後には 2.3% TAR ~ 3.6% TAR に減少した。分解物 B は処理 20 ~ 120 分後に 40.4% TAR ~ 45.3% TAR を占め、処理 24 時間後には 8.7% TAR ~ 24.9% TAR に減少した。分解物 L 及び M は徐々に増加し、処理 24 時間後にそれぞれ 3.9% TAR ~ 14.9% TAR 及び 11.5% TAR ~ 18.3% TAR であった。処理 24 時間後には、さらに分解が進んだ極性分解物群が、[ben-¹⁴C] シアゾファミド処理区で 54.7% TAR ~ 60.6% TAR、[imi-¹⁴C] シアゾファミド処理区で 27.6% TAR ~ 41.5% TAR 認められた。なお、[imi-¹⁴C] シアゾファミド処理区では放射能の損失が認められたが、これは ¹⁴CO₂ の発生によるものと考えられた。(参照 21)

(3) 水中光分解試験 (緩衝液)

pH 5 の滅菌酢酸緩衝液に [ben-¹⁴C] シアゾファミド又は [imi-¹⁴C] シアゾファミドをそれぞれ約 70 µg/L になるように添加後、25 ± 2°C で [ben-¹⁴C] シアゾファミドは 36 日間、[imi-¹⁴C] シアゾファミドは 30 日間キセノン光を照射 (光強度: 12.0 W/m²、波長: 290 nm 未満をフィルターでカット) して、水中光分解試験が実施された。また、暗所対照区が設定された。

暗所対照区では、シアゾファミドは緩やかに分解し、処理 26 日後に 21% TAR まで減少した。光照射によりシアゾファミドは急速に分解した。推定半減期は 28 ~ 34 分であり、これは北緯 35 度 (東京) 春季の太陽光換算で 43 ~ 52 分であった。主要分解物は B、K 及び M であり、推定半減期はそれぞれ 20.7 ~ 25.6、2.1 ~ 2.3 及び 41.6 ~ 46.1 日と算出された。(参照 22)

5. 土壤残留試験

火山灰淡色黒ボク土・軽埴土（茨城）、沖積細粒灰色低地土・灰褐色壤土（長野）及び沖積細粒灰色低地土・灰褐色埴壤土（長野）を用いて、シアゾファミド及び3種類の分解物（B、C 及び J）を分析対象化合物とした土壤残留試験（容器内及びほ場）が実施された。結果は表 10 に示されている。（参照 23、112）

表 10 土壤残留試験成績

試験	濃度	土壌	推定半減期（日）	
			シアゾファミド	シアゾファミド ＋分解物
容器内試験 （畑地状態）	0.2 mg/kg 乾土 ^a	火山灰淡色黒ボク土・軽埴土	5	8
		沖積細粒灰色低地土・灰褐色壤土	8	26
ほ場試験 （畑地状態）	752 g ai/ha ^b	火山灰淡色黒ボク土・軽埴土	6	14
		沖積細粒灰色低地土・灰褐色壤土	3	7
	16,900 g ai/ha ^b	火山灰淡色黒ボク土・軽埴土	15	50
		沖積細粒灰色低地土・灰褐色埴壤土	15	16

a：純品 b：9.4%フロアブル剤

6. 作物残留試験

（1）作物残留試験

果実、野菜等を用いて、シアゾファミド及び代謝物 B を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。

国内での試験結果については別紙 3、海外での試験結果については別紙 4 に示されている。

国内におけるシアゾファミドの最大残留値は、最終散布 7 日後に収穫したはつかだいこん（葉）の 17.8 mg/kg であった。代謝物 B の最大残留値は、最終散布 3 日後に収穫したほうれんそう（茎葉）の 0.46 mg/kg であった。代謝物 B は、ほうれんそう（茎葉）及びこまつな（茎葉）でシアゾファミドの 2%～3%程度検出された以外は定量限界未満又は 0.1 mg/kg 未満であった。

海外におけるシアゾファミドの最大残留値は、最終散布 4 日後に収穫したホップ（乾燥実）の 6.9 mg/kg であった。代謝物 B の最大残留値は、最終散布 3 日後に収穫したホップ（乾燥実）の 0.45 mg/kg であった。（参照 24、57、58、64、65、70、82、87、89、98、108、112～116、130、131）

（2）推定摂取量

別紙 3 の作物残留試験の分析値を用いて、シアゾファミドをばく露評価対象物質とした際に食品中から摂取される推定摂取量が表 11 に示されている（別紙 5 参照）。

なお、本推定摂取量の算定は、登録されている又は申請された使用方法からシアゾファミドが最大の残留を示す使用条件で、全ての適用作物に使用され、加工・調理による残留農薬の増減が全くないとの仮定の下に行った。

表 11 食品中から摂取されるシアゾファミドの推定摂取量

	国民平均 (体重:55.1 kg)	小児 (1~6 歳) (体重:16.5 kg)	妊婦 (体重:58.5 kg)	高齢者 (65 歳以上) (体重:56.1 kg)
推定摂取量 ($\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$)	439	199	467	555

7. 一般薬理試験

マウス及びラットを用いた一般薬理試験が実施された。結果は表 12 に示されている。(参照 25)

表 12 一般薬理試験概要

試験の種類	動物種	動物数 匹/群	投与量 (mg/kg 体重) (投与経路)	最大 無作用量 (mg/kg 体重)	最小作用量 (mg/kg 体重)	結果の概要	
中枢 神経系	一般状態 (Irwin 法)	ICR マウス	雄 3	0, 320, 800, 2,000, 5,000 (腹腔内)	800	2,000	自発運動低下及 び体重減少
	ヘキソ バルビタール 睡眠	ICR マウス	雄 8	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000, 5,000 (腹腔内)	51.2	128	睡眠時間延長
呼吸 ・ 循環器	血圧、 心拍数	SD ラット	雄 5	0, 2,000, 5,000 (経口)	5,000	—	影響なし
自律 神経系	体温、 瞳孔径	SD ラット	雄 5	0, 800, 2,000, 5,000 (経口)	5,000	—	影響なし
消化 器	炭末輸送能	ICR マウス	雄 8	0, 51.2, 128, 320, 800, 2,000, 5,000 (腹腔内)	128	320	炭末輸送抑制
骨格 筋	握力	SD ラット	雄 5	0, 800, 2,000, 5,000 (経口)	5,000	—	影響なし
腎 機能	尿量、 尿中電解質、 pH、浸透圧、 潜血、蛋白、 ケトン体、 グルコース	SD ラット	雄 5	0, 2,000, 5,000 (経口)	5,000	—	影響なし

—：最小作用量は設定できない。

注) 検体を 0.5%CMC-Na 水溶液に懸濁したものが用いられた。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

シアゾファミド（原体）の急性毒性試験が実施された。

結果は表 13 に示されている。（参照 26～29）

表 13 急性毒性試験結果概要（原体）

投与経路	動物種	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口	SD ラット 雌雄各 5 匹	>5,000	>5,000	5,000 mg/kg 体重 症状及び死亡例なし
	ICR マウス 雌雄各 5 匹	>5,000	>5,000	5,000 mg/kg 体重 症状及び死亡例なし
経皮	SD ラット 雌雄各 5 匹	>2,000	>2,000	症状及び死亡例なし 投与部に軽微な紅斑（投与 3 日後以降消失）
吸入	SD ラット 雌雄各 5 匹	LC ₅₀ (mg/L)		ばく露終了後、雌雄各 1 例にラ音（翌日には消失）、雌に一過性の軽度な体重増加抑制 死亡例なし
		>5.5	>5.5	

シアゾファミドの代謝物 B、C 及び J 並びに推定代謝物 U の急性経口毒性試験が実施された。

結果は表 14 に示されている。（参照 30～32、72）

表 14 急性経口毒性試験結果概要（代謝物）

動物種	被験物質	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
SD ラット 雌雄各 5 匹	代謝物 B	324	443	雌雄：100、160、256、410、656 mg/kg 体重 656 mg/kg 体重；雌：円背位 410 mg/kg 体重；雄：振戦及び鼻吻部被毛汚染 256 mg/kg 体重以上；雌雄：深大呼吸、眼瞼下垂及び流涎、雄：自発運動低下、雌：振戦 160 mg/kg 体重以上；雌雄：はいずり歩行及び鎮静、雌：自発運動低下 100 mg/kg 体重以上；雌雄：腹臥位 雌雄：256 mg/kg 体重以上で死亡例
	代謝物 C	>3,000	>3,000	雌雄：3,000 mg/kg 体重 症状及び死亡例なし

動物種	被験物質	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
	代謝物 J	2,950	1,860	<p>雌雄：763、1,221、1,953、3,125、5,000 mg/kg 体重</p> <p>3,125 mg/kg 体重；雄：昏迷 1,953 mg/kg 体重以上；雄：削瘦、自発運動低下又は消失、呼吸緩徐、鎮静、体温低下、眼瞼下垂並びに鼻吻部及び肛門周囲部被毛汚染 1,953 mg/kg 体重；雌：昏迷 1,221 mg/kg 体重以上；雄：円背位、雌：削瘦、自発運動低下又は消失、呼吸緩徐 (5,000 mg/kg 体重では認められず)、鎮静、体温低下、眼瞼下垂並びに鼻吻部及び肛門周囲部被毛汚染 763 mg/kg 体重以上；雌：円背位</p> <p>雄：3,125 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：1,221 mg/kg 体重以上で死亡例</p>
	推定代謝物 U	3,240	2,950	<p>雌雄：1,000、1,600、2,560、4,090、6,554 mg/kg 体重</p> <p>6,554 mg/kg 体重；雌：緩徐呼吸 4,090 mg/kg 体重以上；雌雄：流涙、雄：緩徐呼吸 4,090 mg/kg 体重；雄：昏迷、雌：眼瞼下垂、体温低下及び鼻吻部周囲部被毛汚染 2,560 mg/kg 体重以上；雌雄：腹臥位及び自発運動の低下又は消失、雄：側臥位 (6,554 mg/kg 体重では認められず)、 2,560 mg/kg 体重；雄：異常呼吸音、鼻吻部周囲部被毛汚染、雌：肛門周囲部被毛汚染 1,600 mg/kg 体重以上；雌雄：鎮静 1,000 mg/kg 体重以上；雄：肛門周囲部被毛汚染 (6,554 mg/kg 体重では認められず)</p> <p>雄：4,090 mg/kg 体重以上で死亡例 雌：2,560 mg/kg 体重以上で死亡例</p>

(2) 急性神経毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 10 匹) を用いた強制経口 (原体：0、80、400 及び 2,000 mg/kg 体重、溶媒：0.5%MC 水溶液) 投与による急性神経毒性試験が実施された。

400 mg/kg 体重投与群の雌で平均着地開脚度に増加が認められたが、投与前から高い平均着地開脚度を示していたため、投与によるものとは考えられなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性所見が認められなかったため、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 2,000 mg/kg 体重である

と考えられた。急性神経毒性は認められなかった。（参照 33）

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に対し弱い刺激性、皮膚に対し非常に軽度の刺激性が認められた。（参照 34、35）

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施された。皮膚感作性は認められなかった。（参照 36）

10. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性試験（ラット）

Fischer ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌 [原体：0、10（雄のみ）、50、500、5,000 及び 20,000（雌のみ） ppm：平均検体摂取量は表 15 参照] 投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 15 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	50 ppm	500 ppm	5,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.597	2.91	29.5	295	/
	雌	/	3.30	33.3	338	

/：実施されず

各投与群で認められた毒性所見は表 16 に示されている。

本試験において、5,000 ppm 投与群の雄で尿中タンパク量の増加等、20,000 ppm 投与群の雌で肝比重量²増加が認められたことから、無毒性量は雄で 500 ppm（29.5 mg/kg 体重/日）、雌で 5,000 ppm（338 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 37）

表 16 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
20,000 ppm	/	・肝比重量増加
5,000 ppm 以上	・尿量及び尿中タンパク量増加 ・血漿中クロール増加 ・T.Chol 及び TG 減少 ・好塩基性尿細管増加	5,000 ppm 以下 毒性所見なし
500 ppm 以下	毒性所見なし	

/：実施されず

(2) 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたカプセル経口（原体：0、40、200 及

² 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。

び 1,000 mg/kg 体重/日) 投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。(参照 38)

(3) 28 日間亜急性経皮毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 5 匹) を用いた経皮 (原体: 0、250、500 及び 1,000 mg/kg 体重/日) 投与による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても、検体投与による毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。(参照 73)

(4) 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 12 匹) を用いた混餌 (原体: 0、500、2,000 及び 20,000 ppm: 平均検体摂取量は表 17 参照) 投与による 90 日間亜急性神経毒性試験が実施された。

表 17 90 日間亜急性神経毒性試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群		500 ppm	2,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	34	134	1,360
	雌	39	156	1,540

本試験において、20,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制 (投与 0~7 日) 及び摂餌量減少 (投与 0~7 及び 7~14 日) が認められ、雌ではいずれの投与群においても検体投与による毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雄で 2,000 ppm (134 mg/kg 体重/日)、雌で本試験の最高用量 20,000 ppm (1,540 mg/kg 体重/日) であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。(参照 112、118)

1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験 (イヌ)

ビーグル犬 (一群雌雄各 6 匹) を用いたカプセル経口 (原体: 0、40、200 及び 1,000 mg/kg 体重/日) 投与による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄で脾絶対及び比重量減少が認められたが、病理組織学的変化が認められなかったことから、毒性学的に意義はないものと考えられた。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性所見は認めら

れなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。(参照 39、40)

(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)

Fischer ラット(主群:一群雌雄各 50 匹、中間と殺群:一群雌雄各 35 匹から投与 26、52 及び 78 週に各群雌雄各 10 匹を無作為抽出)を用いた混餌[原体:0、10(雄のみ)、50、500、5,000 及び 20,000(雌のみ) ppm:平均検体摂取量は表 18 参照]投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 18 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)の平均検体摂取量

投与群		10 ppm	50 ppm	500 ppm	5,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	0.336	1.68	17.1	171	/
	雌	/	2.01	20.2	208	856

/:実施されず

各投与群で認められた毒性所見は表 19 に示されている。投与に関連する病理組織学的変化は認められなかった。

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、5,000 ppm 投与群の雄及び 20,000 ppm 投与群の雌で肝及び腎比重量増加等が認められたことから、無毒性量は雄で 500 ppm (17.1 mg/kg 体重/日)、雌で 5,000 ppm (208 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照 41)

表 19 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験(ラット)で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
20,000 ppm	/	<ul style="list-style-type: none"> ・体重増加抑制(投与 3 週以降) ・RBC 減少 ・尿量増加 ・肝及び腎比重量増加 ・白内障
5,000 ppm 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・血漿中クロール増加 ・T.Chol 低下 ・尿量増加 ・肝及び腎絶対及び比重量増加 	5,000 ppm 以下 毒性所見なし
500 ppm 以下	毒性所見なし	

/:実施されず

(3) 18 か月間発がん性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各 60 匹)を用いた混餌(原体:0、70、700 及び 7,000 ppm:平均検体摂取量は表 20 参照)投与による 18 か月間発がん性試験が実施さ

れた。

表 20 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		70 ppm	700 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	9.5	94.8	985
	雌	12.2	124	1,200

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

7,000 ppm 投与群の雌で腎絶対及び比重量増加が認められたが、腎臓に関する病理組織学的所見が認められなかったことから、毒性学的に意義のある所見ではないと考えられた。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,000 ppm（雄：985 mg/kg 体重/日、雌：1,200 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 42）

1 2. 生殖発生毒性試験

(1) 2 世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、200、2,000 及び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 21 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 21 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			200 ppm	2,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	9.5	94.2	958
		雌	13.4	134	1,340
	F ₁ 世代	雄	8.9	89.2	936
		雌	13.7	138	1,400

親動物では、20,000 ppm 投与群の P 及び F₁ 雌で体重増加抑制（P 世代：妊娠 7 及び 14 日）が認められたが、体重増加量には対照群との差は認められなかった。児動物では、20,000 ppm 投与群で体重増加抑制が認められた。

本試験において、親動物の雄では検体投与による毒性所見は認められず、雌では 20,000 ppm 投与群で体重増加抑制が認められたことから、親動物の無毒性量は雄で本試験の最高用量 20,000 ppm（P 雄：958 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：936 mg/kg 体重/日）、雌で 2,000 ppm（P 雌：134 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：138 mg/kg 体重/日）であると考えられた。児動物では、20,000 ppm 投与群で体重増加抑制が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 2,000 ppm（P 雄：94.2 mg/kg 体重/日、

P 雌 : 134 mg/kg 体重/日、F₁ 雄 : 89.2 mg/kg 体重/日、F₁ 雌 : 138 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。(参照 43)

(2) 発生毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌 25 匹) の妊娠 0~19 日に強制経口 (原体 : 0、30、100 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : 0.5%MC 水溶液) 投与する発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 44)

(3) 発生毒性試験 (ウサギ)

NZW ウサギ (一群雌 24 匹) の妊娠 4~28 日に強制経口 (原体 : 0、30、100 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : 0.5%MC 水溶液) 投与する発生毒性試験が実施された。

母動物において、1,000 mg/kg 体重/日投与群で妊娠 4~15 日の平均摂餌量減少が認められたが、妊娠期間を通じた摂餌量は対照群と同様であった。また、体重増加抑制傾向が妊娠前半で認められ、その後は増加傾向にあった。摂餌量及び体重増加量の所見は毒性学的に意義のある変化とは考えられなかった。

本試験において、いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 45)

1 3. 遺伝毒性試験

シアゾファミドの細菌を用いた DNA 修復試験及び復帰突然変異試験、マウスリンパ腫由来細胞 (L5178Y TK⁺) を用いた遺伝子突然変異試験、ヒトリンパ球培養細胞を用いた染色体異常試験並びにマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 22 に示されているとおり、全て陰性であったことから、シアゾファミドに遺伝毒性はないものと考えられた。(参照 46~49、75)

表 22 遺伝毒性試験概要（原体）

試験	対象	処理濃度・投与量	結果	
<i>in vitro</i>	DNA 修復試験	<i>Bacillus subtilis</i> (H17、M45 株)	250～8,000 µg/ディスク (+/-S9)	陰性
	復帰突然 変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>Escherichia coli</i> (WP2 <i>uvrA</i> /pKM101 株)	5～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	遺伝子突然 変異試験	マウスリンパ腫由来細胞 (L5178Y TK ^{+/+})	1～100 µg/mL (+/-S9)	陰性
	染色体異常 試験	ヒトリンパ球培養細胞	①50～200 µg/mL (+/-S9、3 時 間処理、18 時間培養後標本作 製) ②50～150 µg/mL (-S9、21 時間 処理後標本作製) 50～200 µg/mL (+S9、3 時間 処理、18 時間培養後標本作製)	陰性
<i>in vivo</i>	小核試験	ICR マウス(骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	500、1,000、2,000 mg/kg 体重 (単回強制経口投与 24 時間後標 本作成、2,000 mg/kg 体重投与 群では投与 24、48 及び 72 時間 に標本作製)	陰性

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

主として動物、植物、土壌及び水中由来の代謝物 B の細菌を用いた復帰突然変異試験及びチャイニーズハムスター肺由来線維芽細胞 (CHL/IU) を用いた染色体異常試験、植物、土壌及び水中由来の C、土壌由来の J 並びに推定代謝物 U の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。

結果は表 23 に示されているとおり、全て陰性であった。(参照 50～52、76、113、117)

表 23 遺伝毒性試験概要（代謝物）

被験物質	試験	対象	処理濃度	結果
代謝物 B	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	20～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター肺由来線維芽細胞 (CHL/IU)	①37.5～150 µg/mL(-S9) 52.5～210 µg/mL(+S9) (6 時間処理、18 時間培養 後標本作製) ②8.75～35 µg/mL(-S9) (24 時間処理、24 時間培 養後標本作製) 52.5～210 µg/mL(+S9) (6 時間処理、42 時間培 養後標本作製)	陰性
代謝物 C	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	20～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
代謝物 J	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	20～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
推定代謝物 U	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA1535、 TA1537 株) <i>E. coli</i> (WP2uvrA 株)	313～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

14. その他の試験

(1) 28 日間免疫毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌 10 匹）を用いた混餌（原体：0、600、3,000 及び 6,000 ppm : 平均検体摂取量は表 24 参照）投与し、投与 24 日にヒツジ赤血球を静脈内に投与する 28 日間免疫毒性試験が実施された。シクロホスファミドを 50 mg/kg 体重/日の用量で投与 24 日から 4 日間連続で腹腔内投与する陽性対照群が設定された。

表 24 28 日間免疫毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		600 ppm	3,000 ppm	6,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雌	136	599	1,380

いずれの投与群においても検体投与による毒性影響は認められず、本試験条件下において免疫毒性は認められなかった。（参照 112、119）

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて農薬「シアゾファミド」の食品健康影響評価を実施した。なお、今回、作物残留試験（さといも）の成績等が新たに提出された。

¹⁴C で標識したシアゾファミドのラットを用いた動物体内運命試験の結果、全血中濃度は単回投与 0.25～0.50 時間後に C_{max} に達し、 $T_{1/2}$ は 4.4～11.6 時間であった。吸収率は、低用量投与群で 53.2%～83.7%、高用量投与群で 4.0%～6.0%であった。投与 168 時間後の組織内濃度は腎臓及び肝臓において比較的高濃度であった。肝臓及び腎臓における主要代謝物は G であり、そのほか肝臓で B 及び C、腎臓で B が認められた。尿及び胆汁中の主要代謝物は、尿中では G、H 及び I、胆汁中では G であった。糞中では未変化のシアゾファミドが認められた。低用量投与群で主に尿中、高用量投与群で主に糞中に排泄された。投与後 24 時間の尿及び糞中に 90%**TAR** 以上が排泄された。

¹⁴C で標識したシアゾファミドの畜産動物を用いた動物体内運命試験の結果、泌乳ヤギにおいて 57.9%**TAR**～59.7%**TAR** が尿及び糞中に排泄され、乳汁、肝臓、腎臓、筋肉及び脂肪中の残留は僅かであった。乳汁及び組織中の主な代謝物は B、C、G（システイン抱合体を含む。）及び V であり、それぞれ最大で 33.4%**TRR**、12.2%**TRR**、78.1%**TRR** 及び 28.6%**TRR** 認められた。ニワトリの肝臓及び腎臓中の残留放射能は 0.01%**TAR**～0.05%**TAR** で、卵及びその他の食用部位においては検出されなかった。排泄物中には未変化のシアゾファミドの割合が最も高く、肝臓及び腎臓中の主な代謝物として D の抱合体及び G が認められ、それぞれ最大で 15.5%**TRR** 及び 12.3%**TRR** であった。

¹⁴C で標識したシアゾファミドを用いた植物体内運命試験の結果、10%**TRR** を超える代謝物として B が認められた。

シアゾファミド及び代謝物 B を分析対象化合物とした国内における作物残留試験の結果、シアゾファミドの最大残留値は、はつかだいこん（葉）の 17.8 mg/kg、代謝物 B の最大残留値は、ほうれんそうの 0.46 mg/kg であった。海外における作物残留試験の結果、シアゾファミドの最大残留値は、ホップ（乾燥実）の 6.9 mg/kg、代謝物 B の最大残留値は、ホップ（乾燥実）の 0.45 mg/kg であった。

各種毒性試験結果から、シアゾファミド投与による影響は、主に腎臓（重量増加、尿変化等：ラット）に認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性、免疫毒性及び遺伝毒性は認められなかった。

植物体内運命試験の結果、10%**TRR** を超える代謝物として B が認められたが、代謝物 B はラットにおいても検出されることから、農産物中のばく露評価対象物質をシアゾファミド（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表 25 に示されている。

食品安全委員会は、各試験の無毒性量のうち最小値がラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の 17.1 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.17 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、シアゾファミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は、認められなかったため、急性参照用量 (ARfD) は設定する必要がないと判断した。

ADI	0.17 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	17.1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100
ARfD	設定の必要なし

参考

<JMPR、2015年>

ADI	0.2 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	17.1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100
ARfD (シアゾファミド)	設定の必要なし

ARfD (代謝物 B)	0.2 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料)	急性毒性試験
(動物種)	ラット
(期間)	単回
(投与方法)	強制経口
(最小毒性量)	100 mg/kg 体重
(安全係数)	500

<EFSA、2016年>

ADI	0.17 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種)	ラット
(期間)	2年間

(投与方法)	混餌
(無毒性量)	17.1 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD 設定の必要なし

<EPA、2016年>

cRfD	0.948 mg/kg 体重/日
(cRfD 設定根拠資料)	発がん性試験
(動物種)	マウス
(期間)	18 か月間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	94.8 mg/kg 体重/日
(不確実係数)	100

aRfD 設定の必要なし

(参照 121~126)

表 25 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ¹⁾
ラット	90 日間 亜急性 毒性試験	雄：0、10、50、500、5,000 ppm 雌：0、50、500、5,000、 20,000 ppm	雄：29.5 雌：338	雄：295 雌：1,360	雄：尿中タンパク量の 増加等 雌：肝比重量増加
		雄：0、0.597、2.91、29.5、 295 雌：0、3.30、33.3、338、 1,360			
	90 日間 亜急性神経 毒性試験	雌雄：0、500、2,000、20,000 ppm	雄：134 雌：1,540	雄：1,360 雌：—	雄：体重増加抑制及び 摂餌量減少 雌：毒性所見なし (亜急性神経毒性は認められない)
		雄：0、34、134、1,360 雌：0、39、156、1,540			
	2 年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	雄：0、10、50、500、5,000 ppm 雌：0、50、500、5,000、 20,000 ppm	雄：17.1 雌：208	雄：171 雌：856	雌雄：肝及び腎比重量 増加等 (発がん性は認められない)
雄：0、0.336、1.68、17.1、 171 雌：0、2.01、20.2、208、856					
2 世代 繁殖試験	0、200、2,000、20,000 ppm	親動物 P 雄：958 P 雌：134 F ₁ 雄：936 F ₁ 雌：138	親動物 P 雄：— P 雌：1,340 F ₁ 雄：— F ₁ 雌：1,400	親動物 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制 児動物 体重増加抑制 (繁殖能に対する影響 は認められない)	
	P 雄：0、9.5、94.2、958 P 雌：0、13.4、134、1,340 F ₁ 雄：0、8.9、89.2、936 F ₁ 雌：0、13.7、138、1,400	児動物 P 雄：94.2 P 雌：134 F ₁ 雄：89.2 F ₁ 雌：138	児動物 P 雄：958 P 雌：1,340 F ₁ 雄：936 F ₁ 雌：1,400		
	発生毒性 試験	0、30、100、1,000	母動物及び胎児： 1,000	母動物及び胎児： —	毒性所見なし (催奇形性は認められない)
マウス	18 か月間 発がん性 試験	0、70、700、7,000 ppm	雄：985 雌：1,200	雄：— 雌：—	毒性所見なし (発がん性は認められない)
		雄：0、9.5、94.8、985 雌：0、12.2、124、1,200			
ウサギ	発生毒性 試験	0、30、100、1,000	母動物及び胎児： 1,000	母動物及び胎児： —	毒性所見なし (催奇形性は認められない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ¹⁾
イヌ	90日間 亜急性 毒性試験	0、40、200、1,000	雄：1,000 雌：1,000	雄：－ 雌：－	毒性所見なし
	1年間 慢性毒性 試験	0、40、200、1,000	雄：1,000 雌：1,000	雄：－ 雌：－	毒性所見なし
ADI			NOAEL：17.1 SF：100 ADI：0.17		
ADI 設定根拠資料			ラット2年間慢性毒性/発がん性併合試験		

ADI：許容一日摂取量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量

－：最小毒性量が設定できなかった。

¹⁾：最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙 1 : 代謝物/分解物略称>

記号	略称	化学名
B	CCIM	4-chloro-5- <i>p</i> -tolylimidazole-2-carbonitrile
C	CCIM-AM	4-chloro-5- <i>p</i> -tolylimidazole-2-carboxamide
D	CHCN	4-chloro-5-(4-hydroxymethylphenyl)imidazole-2-carbonitrile
F	5-CGTC	5-chloro-1- β -D-glucopyranosyl-4- <i>p</i> -tolylimidazole-2-carbonitrile
G	CCBA	4-(4-chloro-2-cyanoimidazole-5-yl)benzoic acid
H	CH ₃ SO-CCIM	4-chloro-5-[β -(methylsulfinyl)- <i>p</i> -tolyl]imidazole-2-carbonitrile
I	CH ₃ SO ₂ -CCIM	4-chloro-5-[β -(methylsulfonyl)- <i>p</i> -tolyl]imidazole-2-carbonitrile
J	CTCA	4-chloro-5- <i>p</i> -tolylimidazole-2-carboxylic acid
K	CCTS	6-(4-chloro-2-cyanoimidazol-5-yl)- <i>N,N</i> -dimethyl- <i>m</i> -toluenesulfonamide
L	CDTS	2-cyano- <i>N,N</i> -dimethyl-5- <i>p</i> -tolylimidazole-4-sulfonamide
M	HTID	5-hydroxy-5- <i>p</i> -tolyl-2,4-imidazolidinedione
U*	DMSA	dimethylsulfamic acid
V	CCBA-AM	4-(4-chloro-2-amidoimidazole-5-yl)benzoic acid
W	CSBA	4-chloro-2-cyano- <i>N,N</i> -dimethyl-5- <i>p</i> -carboxyphenylimidazole-1-sulfonamide

* : 動物体内、植物体内、土壌中及び水中において、親化合物から B への代謝過程で生成されることが推察される推定代謝物。

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
ai	有効成分量 (active ingredient)
AUC	薬物濃度曲線下面積
C _{max}	最高濃度
CMC	カルボキシメチルセルロース
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
MC	メチルセルロース
PHI	最終使用から収穫までの日数
RBC	赤血球数
TAR	総投与 (処理) 放射能
T.Chol	総コレステロール
TG	トリグリセリド
T _{max}	最高濃度到達時間
T _{1/2}	半減期
TRR	総残留放射能

<別紙3：作物残留試験成績（国内）>

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
水稻 [露地](玄米) 2010年度	2	0.047 g ^{WP1} /育苗箱	1	112 118	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01		
水稻 [露地](稲わら) 2010年度	2	0.047 g ^{WP1} /育苗箱	1	112 118	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01		
小麦 [露地](玄麦) 2000年度	2	94 ^{WP1} (散布)	3	187 239	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
小麦 [露地](玄麦) 2001年度	2	106 ^{WP1} (無人ヘリ散布)	3	117 244	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
小麦 [露地](玄麦) 2004年度	2	94 ^{WP1}	3	255 267	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
だいず [露地](乾燥子実) 2004年度	2	188~235 ^{WP1}	3	6-7 14 21	0.06 0.04 0.01	0.03* 0.03 0.01*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
だいず [露地](乾燥子実) 2007年度	2	1.88 mg ai ^{WP1} /g 種子	1	116 123 130 140 147 154	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
あずき [露地](乾燥子実) 2003年度	2	1.88 mg ai ^{WP1} /g 種子+ 141~188 ^{WP1}	4	7 14 21	0.02 0.02 <0.01	0.02 0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ばれいしょ [露地](塊茎) 1998、2003年度	4	94~188 ^{WP1}	4	7 14 21	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ばれいしょ [露地](塊茎) 2006年度	2	88~94 ^{WP1}	4	3 ^a 7 14	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
さといも [露地](塊茎) 2017年度	3	85 ^{WP1}	2	1 3 7	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01		
こんにやく [露地](球茎) 2010年度	2	2,820 ^{WP1}	3	14 28 42	0.03 0.03 0.03	0.02 0.02* 0.02*		
こんにやく [露地](球茎) 2007年度	2	5,640 ^{WP1}	3	14 30 45	0.07 0.09 0.09	0.04* 0.09 0.08	0.01 <0.01 <0.01	0.01 <0.01 <0.01
だいこん [露地](根部) 2004年度	2	71~94 ^{WP1}	3	3 7 14	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
はつかだいこん [施設](根部) 2006、2009年度	2	71 ^{WP1}	3	1 ^a 3 7	0.14 0.09 0.06	0.14 0.09 0.06		
はつかだいこん [施設](根部) 2008年度	1	47 ^{WP1}	1	3 7 14	0.012 <0.005 <0.005	0.012 <0.005 <0.005		
だいこん [露地](葉部) 2004年度	2	71~94 ^{WP1}	3	3 7 14	5.32 2.80 2.52	4.30 2.58 1.75	0.05 0.01 0.02	0.05* 0.03* 0.03*

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
はつかだいこん [施設](葉部) 2006、2009年度	2	71 ^{WP1}	3	1 ^a	22.8	21.8	/	/
				3	17.2	16.4		
				7	17.8	17.6		
はつかだいこん [施設](葉部) 2008年度	1	47 ^{WP1}	1	3	6.6	6.6	/	/
				7	2.1	2.1		
				14	<0.5	<0.5		
かぶ [施設](根部) 2004年度	2	71~94 ^{WP1}	3	3	0.09	0.05	<0.01	<0.01
				7	0.06	0.04	<0.01	<0.01
				14	0.03	0.02*	<0.01	<0.01
かぶ [施設](葉部) 2004年度	2	71~94 ^{WP1}	3	3	14.9	5.17	0.10	0.08
				7	11.5	5.27	0.07	0.06*
				14	5.78	3.65	0.02	0.04*
かぶ [施設](根部) 2012年度	2	94 ^{WP1} +78.5~84.6 ^{WP1}	4	3	0.03	0.02	/	/
				7	0.02	0.02		
				14	<0.01	<0.01		
かぶ [施設](葉部) 2012年度	2	94 ^{WP1} +78.5~84.6 ^{WP1}	4	3	6.55	4.89	/	/
				7	3.84	3.22		
				14	4.13	2.65		
はくさい [露地](茎葉) 2000年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +141 ^{WP1}	5	14	0.25	0.12*	<0.01	<0.01
				21	0.09	0.05*	<0.01	<0.01
				28	0.08	0.04*	<0.01	<0.01
はくさい [露地](茎葉) 2003年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai ^{WP1} /株+94~141 ^{WP1}	6	14	0.33	0.15	<0.01	<0.01
				21	0.21	0.08	<0.01	<0.01
				28	0.07	0.03	<0.01	<0.01
はくさい [露地](茎葉) 2007年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai ^{WP1} /株+94 ^{WP1}	6	3	0.74	0.26*	<0.01	<0.01
				7	0.30	0.15	<0.01	<0.01
				14	0.19	0.09*	<0.01	<0.01
はくさい [露地](茎葉) 2013年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai ^{WP1} /株+71.9~ 120 ^{WP1}	6	3	0.25	0.17	/	/
				7	0.06	0.05		
				14	0.01	0.01*		
キャベツ [露地](茎葉) 2001年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /株	1	75	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
				97	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
キャベツ [露地](葉球) 2006年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai ^{WP1} /株+37.6~118 ^{WP1}	6	3	0.29	0.15	<0.01	<0.01
				7	0.25	0.13	<0.01	<0.01
				14	0.07	0.04*	<0.01	<0.01
キャベツ [露地](葉球) 2013年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai ^{WP1} /株+80.8~128 ^{WP1}	6	3	0.16	0.11	/	/
				7	0.04	0.03		
				14	0.01	0.01*		
こまつな [施設](茎葉) 2002年度	2	47~71 ^{WP1}	3	1 ^a	12.3	7.73	0.14	0.07
				3	9.26	6.04	0.15	0.06*
				7	7.64	4.33	0.18	0.06*
みずな [露地](茎葉) 2003年度	2	94 ^{WP1}	3	1 ^a	6.97	4.72	0.12	0.08
				3	5.16	3.34	0.09	0.05
				7	2.84	2.10	0.07	0.04
チンゲンサイ [施設](茎葉) 2003年度	2	94 ^{WP1}	3	1 ^a	1.11	0.97	0.05	0.02*
				3	1.03	0.84	0.04	0.02*
				7	0.66	0.52	0.03	0.01*
ブロッコリー [露地](花蕾) 2002年度	2	0.4 g ai ^{WP1} /セル +94 ^{WP1}	4	3	0.41	0.27	0.03	0.02*
				7	0.25	0.14	0.01	0.01*
				14	0.16	0.08	<0.01	<0.01
ブロッコリー [露地](花蕾) 2015年度	3	0.4 g ai ^{WP1} /セルトレイ +11.8 mg ai/株 +118、119又は 134 ^{WP1}	5	3	0.89	0.57	/	/
				7	0.73	0.37		
				14	0.33	0.15		

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
カリフラワー [露地](花蕾) 2013年度	2	0.367g ai WP1/セル レ+11.8 mg ai WP1/株+87.9~136 g ai/ha又は132~ 140 WP1	6	3 7 14 21 28	0.06 0.04 <0.01 <0.01 <0.01	0.06 0.03* <0.01 <0.01 <0.01		
畑わさび [施設](茎葉) 2003年度	2	141 WP1	2	3 ^a 7 14	5.61 6.37 5.16	4.26 4.30 3.96		
畑わさび [施設](根茎) 2003年度	2	141 WP1	2	3 ^a 7 14	0.70 0.72 0.68	0.60 0.53 0.45		
畑わさび [施設] (花、花茎及び葉) 2007年度	2	94~141 WP1	2	3 ^a 7 14	10.0 10.1 6.85	7.47 6.81 4.12	0.08 0.08 0.06	0.06* 0.06* 0.06*
なばな [露地] (花蕾を含む茎葉) 2007年度	2	94~188 WP1	3	3 7 14	1.17 0.53 0.14	0.59 0.27 0.07*		
なばな [露地] (花蕾) 2008、2009年度	2	0.4 g ai WP1/セル +141 WP1	4	1 ^a 3 7	1.65 0.84 0.46	1.54 0.73 0.41		
はたけな [露地] (花蕾) 2007、2008年度	2	141 WP1	3	1 ^a 3 7 14	2.3 1.6 0.75 0.13	2.3 1.5 0.74 0.12		
はたけな [露地] (葉菜) 2007、2008年度	2	141 WP1	3	1 ^a 3 7 14	12.8 12.8 9.2 1.9	11.9 12.5 8.5 1.9		
レタス [露地](茎葉) 2005年度	2	94 WP1	3	3 7 14	2.76 0.94 0.22	1.28* 0.42* 0.06*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
サラダ菜 [施設](茎葉) 2005年度	2	71~94 WP1	3	3 7 14	5.17 4.38 0.27	3.80 2.94 0.14		
リーフレタス [露地](茎葉) 2005年度	2	61~94 WP1	3	3 7 14	2.37 1.15 0.29	1.72 0.96 0.26		
たまねぎ [露地](鱗茎) 2000年度	2	94 WP1	4	7 14 21	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ねぎ [露地](茎葉) 2003年度	2	94 WP1	4	3 7 14	0.79 0.88 0.69	0.55 0.50 0.31	0.02 0.01 <0.01	0.01* 0.01* <0.01
わけぎ [露地](茎葉) 2006年度	2	94 WP1	3	3 7 14	1.64 1.15 0.60	1.20 0.72 0.32		
葉たまねぎ [施設] (葉及び鱗茎) 2004年度	2	56~71 WP1	4	3 7 14	1.29 1.13 0.78	1.05 0.99 0.68		
らっきょう [露地](鱗茎) 2009、2010年度	2	94~141 WP1	4	3 7 14	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01		

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みつば [施設](茎葉) 2005年度	2	94 ^{WP1}	2	3 7 14	3.57 3.13 1.44	2.75 2.42 1.32	/	/
トマト [施設](果実) 1998年度	2	188 ^{WP1}	4	1 3 7	0.53 0.48 0.43	0.34 0.31 0.26	0.01 0.01 0.01	0.01* 0.01* 0.01*
ミニトマト [施設](果実) 2003、2004年度	4 (2)	188~282 ^{WP1}	4	1 3 7	1.00 1.00 0.88	0.78 0.72 0.56	0.01 0.01 0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ピーマン [露地](果実) 2001年度	2	94 ^{WP1}	4	1 3 7	0.34 0.23 0.14	0.26 0.19 0.11	0.01 0.01 <0.01	0.01* 0.01* <0.01
なす [施設](果実) 2003年度	2	94 ^{WP1}	4	1 3 7	0.12 0.1 0.02	0.09 0.07 0.01*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
ししとう [施設](果実) 2004年度	2	94 ^{WP1}	4	1 3 7	0.47 0.32 0.11	0.30 0.15 <0.05	/	/
とうがらし [施設](果実) 2004、2005年度	2	94 ^{WP1}	4	1 3 7	0.81 0.66 0.36	0.58 0.46 0.23	/	/
とうがらし [施設](果実) 2006年度	2	94 ^{WP1}	2	1 3 7	0.69 0.40 0.25	0.46 0.28 0.18	/	/
きゅうり [施設](果実) 1998年度	2	188 ^{WP1}	4	1 3 7	0.23 0.20 0.07	0.15 0.10 0.04*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
かぼちゃ [露地](果実) 2007年度	2	141 ^{WP1}	3	1 3 7	0.17 0.13 0.09	0.12 0.08 0.05	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
すいか [施設](果肉) 2001年度	2	188~205 ^{WP1}	4	1 3 7	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
メロン [施設](果実) 1998年度	2	188 ^{WP1}	4	1 3 7	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
とうがん [露地](果実) 2006年度	2	118 ^{WP1}	2	1 3 7	0.02 <0.01 <0.01	0.02 <0.01 <0.01	/	/
ほうれんそう [施設](茎葉) 2002年度	2	63~71 ^{WP1}	3	1 ^a 3 7	21.8 16.3 12.7	12.9 9.74 9.18	0.50 0.46 0.40	0.21 0.17 0.15
しょうが [露地](塊茎) 2003年度	2	5,640 ^{WP1}	3	30 45 60	0.21 0.24 0.15	0.08 0.08* 0.05*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
葉しょうが [施設] (根茎及び茎) 2006年度	2	5,640 ^{WP1}	3	3 14 30 45	1.38 0.65 0.49 0.38	1.18 0.40 0.28 0.20	/	/
えだまめ [露地](さや) 2004年度	2	141~188 ^{WP1}	3	3 7 14	2.23 2.43 1.47	1.18 1.19 0.69	0.02 0.02 0.02	0.03* 0.03* 0.03*
えだまめ [露地](さや) 2007年度	2	1.88 mg ai ^{WP1} /g 種子	1	72 79 86 88 95 102	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みょうが [施設](花穂) 2003年度	2	5,640 ^{WP1}	3	3 7 14	3.50 0.62 0.15	1.80 0.42 0.10	0.08 0.02 <0.01	0.03* 0.01* 0.01*
みょうが [施設](花穂) 2012年度	2	200倍 ^{WP1} 、30分間 根茎浸漬 +5,640 ^{WP1}	4	3 7 14	6.26 2.31 0.38	3.64 1.36 0.24		
おかひじき [施設](茎葉) 2004年度	2	94 ^{WP1}	2	3 7 14	4.4 2.9 1.5	4.1 2.8 1.1		
えんさい [露地](茎葉) 2011年度	2	141 ^{WP1}	3	3 7 14	2.74 2.08 1.03	2.72 2.02 1.00		
温州みかん [施設](外果皮) 2003年度	2	235 ^{WP1}	3	1 7 14	3.02 3.46 3.06	1.92 1.74 1.67	0.13 0.10 0.11	0.06* 0.05* 0.05*
温州みかん [施設](果肉) 2003年度	2	235 ^{WP1}	3	1 7 14	0.25 0.22 0.21	0.10 0.08 0.07*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
なつみかん [露地](果実) 2003年度	1	235 ^{WP1}	4 ^a	1 7 14	0.56 0.46 0.47	0.48 0.40 0.40	0.02 <0.01 <0.01	0.02* <0.01 <0.01
なつみかん [露地](果実) 2003年度	1	235 ^{WP1}	3	1 7 14	0.46 0.48 0.43	0.44 0.40 0.40	0.02 0.01 0.02	0.02 0.01 0.02
レモン [露地](果実) 2003年度	2	141 ^{WP1}	3	1 7 14	2.05 1.54 1.50	1.18 0.90 0.86	0.03 0.03 0.04	0.03 0.03 0.035
すだち [露地](果実) 2004年度	1	235 ^{WP1}	3	1 7 14	1.07 0.79 0.38	1.06 0.78 0.38	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01
かぼす [露地](果実) 2004年度	1	301 ^{WP1}	3	1 7 13	0.36 0.26 0.18	0.35 0.25 0.18	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01
なし [露地](果実) (果梗を除去した もの) 2013年度	2	193~221 ^{WP1}	3	3 7 14 21	0.18 0.20 0.14 0.12	0.16 0.15 0.10 0.08		
なし [露地](果実) (花おち、芯及び果 梗の基部を除去し たもの) 2013年度	2	193~221 ^{WP1}	3	3 7 14 21	0.19 0.20 0.15 0.14	0.16 0.15 0.11 0.09		
もも [露地](果肉) 2006年度	2	188~235 ^{WP1}	2	1 7 14	0.08 0.05 0.06	0.08 0.04 0.06	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
もも [露地](果皮) ^a 2006年度	2	188~235 ^{WP1}	2	1 7 14	4.11 2.64 3.41	4.09 2.56 3.26	0.10 0.08 0.10	0.10 0.08 0.10
ネクタリン [露地](果実) 2006年度	2	141~188 ^{WP1}	2	1 7 14	0.33 0.27 0.15	0.32 0.26 0.14		
ネクタリン [露地](果実) 2006年度	2	141~188 ^{WP1}	1	45 60	0.03 0.01	0.02 0.01		
すもも (果実) 2006年度	2	96~224 ^{WP2}	2	14 21 28	0.05 0.03 0.02	0.03 0.02* 0.02*		

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年度	試験 ほ場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
すもも (果実) 2006年度	2	96~224 ^{WP2}	1	45 59	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01		
いちご [施設](果実) 2003年度	2	9.4 mg ai ^{WP1} /ホ ^ッ ト 18.8 mg ai ^{WP1} /株	4	30 37 44	0.31 0.25 0.1	0.12* 0.09* 0.05*	<0.01 <0.01 <0.01	<0.01 <0.01 <0.01
大粒ぶどう [施設](果実) 1998年度	2	282 ^{WP1}	3	14 21 28	1.27 1.13 1.19	0.82 0.78 0.65	0.01 0.01 0.01	0.01* 0.01* 0.01*
小粒ぶどう [施設](果実) 1998年度	2	282 ^{WP1}	3	14 21 28	6.28 6.49 5.97	3.46 3.66 3.03	0.07 0.08 0.07	0.04 0.03 0.03
いちじく [露地](果実) 2004年度	2	141 ^{WP1}	3	1 3 7	0.40 0.28 0.17	0.29 0.19 0.12		
ホップ [露地]乾花) 2015年	2	235 ^{WP1}	2	13 ^a 20 27	3.58 1.26 0.19	3.38 1.21 0.18		
バジル [施設](茎葉) 2015年	2	76~94 ^{WP1}	2	3 7 14	8.13 5.67 2.71	7.61 4.08 1.53		

注) ・ WP1 : 9.4%水和剤、WP2 : 3.2%水和剤

- ・一部に定量限界未満を含むデータの平均値は定量限界値を検出したものとして計算し、*印を付した。
- ・全てのデータが定量限界未満の場合は、定量限界値の平均に<を付して記載した。
- ・代謝物 B の分析値はシアゾファミドに換算して記載した。
- ・試験ほ場数の括弧内の値は、シアゾファミドと値が違う場合の代謝物 B の試験ほ場数の値。
- ・複数の試験機関で定量限界が異なる場合の最高値は、大きい値を示した (例えば、A 機関で 0.006 検出され、B 機関で<0.008 の場合、<0.008 とした)。
- ・農薬の使用回数又は使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している場合は、回数又は PHI に^aを付した。

<別紙4：作物残留試験成績（海外）>

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ場 数	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)				
					シアゾファミド		代謝物B		
					最高値	平均値	最高値	平均値	
たまねぎ [露地](鱗茎) 2014年 米国	465~485 ^{WP3} (散布)	9	6	0	0.097	/	0.006	/	
					0.042		<0.005		
					0.040		<0.005		
					0.068		<0.005		
					0.042		<0.005		
					0.043		<0.005		
					0.065		<0.005		
					0.106		0.005		
0.035	<0.005								
たまねぎ [露地](鱗茎) 2014年 米国	481 ^{WP3}	1	6	0	0.868	/	0.024	/	
			6	1	0.708		0.030		
			6	3	0.384		0.023		
			6	7	0.183		0.014		
葉たまねぎ [露地] (葉及び鱗茎) 2014年 米国	455~477 ^{WP3}	5	6	0	0.563	/	0.019	/	
					0.497		0.012		
					0.802		0.014		
					0.572		0.013		
1.15	0.011								
にんじん [露地](根部) 2004年 米国	168~179 ^{WP3} (1回、土壌散布) 165~186 ^{WP3} (4回、散布)	1	3	5	13	0.040	/	<0.01	/
			7	5	14	0.045		<0.01	
			4	5	15	<0.01		<0.01	
			2	5	16	<0.01		<0.01	
			5	5	8	0.044		<0.01	
			5	14	0.026	<0.01			
			5	21	0.021	<0.01			
			5	28	0.023	<0.01			
			7	5	7	<0.01		<0.01	
			15	5	15	<0.01		<0.01	
20	5	20	<0.01	<0.01					
29	5	29	<0.01	<0.01					
きゅうり [露地](果実) 1999年 米国	27.6 ^{WP3}	6	6	0	0.02	0.02	<0.01	<0.01	
				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
				7	0.04	0.01*	<0.01	<0.01	
ぺぽかぼちゃ [露地](果実) 1999年 米国	27.6 ^{WP3}	5	6	1	0.02	0.02	<0.01	<0.01	
				3	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
				7	0.01	0.01*	<0.01	<0.01	
マスクメロン [露地](果実) 1999年 米国	27.6 ^{WP3}	6	6	0	0.03	0.03	<0.01	<0.01	
				1	0.02	0.02	<0.01	<0.01	
				3	0.01	0.01	<0.01	<0.01	
				7	0.02	0.01*	<0.01	<0.01	
パパイヤ (果実) 2006年 台湾	(不明) ^{WP1}	1	4	3	0.06	/	/	/	
				6	0.09				
				9	0.10				
				12	0.10				
				15	0.05				
				18	0.06				
				21	0.07				

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	使用量 (g ai/ha)	試験 ほ 場 数	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					シアゾファミド		代謝物B	
					最高値	平均値	最高値	平均値
ホップ [露地](乾燥実) 2007年 米国	76.6~83.7 WP3	1	6	4	6.9		0.13	
		1	6	2	3.6		0.28	
		1	6	3	2.5		0.45	

注) ・WP1 : 9.4%水和剤、WP3 : 34.5%水和剤

- ・一部に定量限界未満を含むデータの平均値は定量限界値を検出したものとして計算し、*印を付した。
- ・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。
- ・代謝物Bの分析値はシアゾファミドに換算して記載した。

<別紙5：推定摂取量>

作物名等	残留値 (mg/kg)	国民平均 (体重:55.1 kg)		小児 (1~6歳) (体重:16.5 kg)		妊婦 (体重:58.5 kg)		高齢者 (65歳以上) (体重:56.1 kg)	
		ff (g/人日)	摂取量 (g/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (g/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (g/人日)	ff (g/人日)	摂取量 (g/人日)
大豆	0.03	39.0	1.17	20.4	0.61	31.3	0.94	46.1	1.38
小豆類	0.02	2.4	0.05	0.8	0.02	0.8	0.02	3.9	0.08
こんにゃく いも	0.09	1.2	0.11	0.4	0.04	0.8	0.07	1.3	0.12
だいこん類 (根)	0.09	33.0	2.97	11.4	1.03	20.6	1.85	45.7	4.11
だいこん類 (葉)	17.6	1.7	29.9	0.6	10.6	3.1	54.6	2.8	49.3
かぶ類 (根)	0.05	2.8	0.14	0.8	0.04	0.1	0.01	5.0	0.25
かぶ類 (葉)	5.27	0.3	1.58	0.1	0.53	0.1	0.53	0.6	3.16
はくさい	0.26	17.7	4.60	5.1	1.33	16.6	4.32	21.6	5.62
キャベツ	0.15	24.1	3.62	11.6	1.74	19.0	2.85	23.8	3.57
こまつな	6.04	5.0	30.2	1.8	10.9	6.4	38.7	6.4	38.7
きょうな	3.34	2.2	7.35	0.4	1.34	1.4	4.68	2.7	9.02
チンゲンサイ	0.84	1.8	1.51	0.7	0.59	1.8	1.51	1.9	1.60
ブロッコリー	0.57	5.2	2.96	3.3	1.88	5.5	3.14	5.7	3.25
カリフラワー	0.06	0.5	0.03	0.2	0.01	0.1	0.01	0.5	0.03
その他の あぶらな科 野菜	12.5	3.4	42.5	0.6	7.50	0.8	10.0	4.8	60.0
レタス	3.8	9.6	36.5	4.4	16.7	11.4	43.3	9.2	35.0
ねぎ	0.55	9.4	5.17	3.7	2.04	6.8	3.74	10.7	5.89
わけぎ	1.2	0.2	0.24	0.1	0.12	0.1	0.12	0.2	0.24
その他の ゆり科野菜	1.05	0.6	0.63	0.1	0.11	0.2	0.21	1.2	1.26
みつば	2.75	0.4	1.10	0.1	0.28	0.1	0.28	0.5	1.38
トマト	0.78	32.1	25.0	19.0	14.8	32.0	25.0	36.6	28.6
ピーマン	0.26	4.8	1.25	2.2	0.57	7.6	1.98	4.9	1.27
なす	0.09	12.0	1.08	2.1	0.19	10.0	0.90	17.1	1.54
その他の なす科野菜	0.58	1.1	0.64	0.1	0.06	1.2	0.70	1.2	0.70
きゅうり	0.15	20.7	3.11	9.6	1.44	14.2	2.13	25.6	3.84
かぼちゃ	0.12	9.3	1.12	3.7	0.44	7.9	0.95	13.0	1.56
その他の うり科野菜	0.02	2.7	0.05	1.2	0.02	0.6	0.01	3.4	0.07
ほうれんそう	9.74	12.8	125	5.9	57.5	14.2	138	17.4	169
しょうが	1.18	1.5	1.77	0.3	0.35	1.1	1.30	1.7	2.01
えだまめ	1.19	1.7	2.02	1.0	1.19	0.6	0.71	2.7	3.21

その他の野菜	4.1	13.4	54.9	6.3	25.8	10.1	41.4	14.1	57.8
みかん	0.1	17.8	1.78	16.4	1.64	0.6	0.06	26.2	2.62
なつみかんの果実全体	0.44	1.3	0.57	0.7	0.31	4.8	2.11	2.1	0.92
レモン	1.18	0.5	0.59	0.1	0.12	0.2	0.24	0.6	0.71
その他のかんきつ類果実	1.06	5.9	6.25	2.7	2.86	2.5	2.65	9.5	10.1
日本なし	0.16	6.4	1.02	3.4	0.54	9.1	1.46	7.8	1.25
もも	0.08	3.4	0.27	3.7	0.30	5.3	0.42	4.4	0.35
ネクタリン	0.32	0.1	0.03	0.1	0.03	0.1	0.03	0.1	0.03
すもも	0.03	1.1	0.03	0.7	0.02	0.6	0.02	1.1	0.03
いちご	0.12	5.4	0.65	7.8	0.94	5.2	0.62	5.9	0.71
ぶどう	3.66	8.7	31.8	8.2	30.0	20.2	73.9	9.0	32.9
その他の果実	0.29	1.2	0.35	0.4	0.12	0.9	0.26	1.7	0.49
ホップ	1.21	0.1	0.12	0.1	0.12	0.1	0.12	0.1	0.12
その他のスパイス	1.92	0.1	0.19	0.1	0.19	0.1	0.19	0.2	0.38
その他のハーブ	7.61	0.9	6.85	0.3	2.28	0.1	0.76	1.4	10.7
合計			439		199		467		555

注) ・残留値は、申請されている使用時期・回数による各試験区の平均残留値の最大値を用いた。
(参照 別紙 3)。

- ・「ff」：平成 17～19 年の食品摂取頻度・摂取量調査(参照 120)の結果に基づく農産物摂取量 (g/人/日)。
- ・「摂取量」：残留値及び食品摂取量から求めたシアゾファミドの推定摂取量 ($\mu\text{g}/\text{人}/\text{日}$)
- ・小粒ぶどうと大粒ぶどうの摂取量はぶどうとしてまとめて算出されているため、残留値の高い小粒ぶどうの値を用いた。
- ・小豆類の値にはあずきの値を、だいこん類 (根) にははつかだいこん (根) の値を、だいこん類 (葉) にははつかだいこん (葉) の値を、きょうなにはみずなの値を、その他のあぶらな科野菜の値にははたけなの値を、レタスの値にはサラダ菜の値を、その他のゆり科野菜の値には葉たまねぎの値を、トマトの値にはミニトマトの値を、その他のなす科野菜の値にはとうがらしの値を、その他のうり科野菜の値にはとうがんの値を、しょうがの値には葉しょうが (根茎及び茎) の値を、その他の野菜の値にはおかひじきの値を、その他のかんきつ類果実の値にはすだちの値を、その他の果実の値にはいちじくの値を、その他のスパイスの値にはみかんの果皮の値を、その他のハーブの値にはバジルの値を用いた。
- ・米、小麦、ばれいしょ、さといも、たまねぎ、らっきょう、すいか及びメロンは全データが定量限界未満であったため、摂取量の計算はしていない。
- ・端数処理により合計は一致しない。

<参照>

- 1 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 16 年 6 月 22 日改訂）：石原産業株式会社、2004 年、一部公表
- 2 [14C]シアゾファミドの Sprague-Dawley ラットへの経口投与後における血液放射能の薬物動態研究（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 3 [14C]シアゾファミドの Sprague-Dawley ラットへの経口投与後における放射能の排泄及び体内分布に関する研究（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 4 [14C]シアゾファミドの Sprague-Dawley ラットへの経口投与後における胆汁排泄試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 5 [12C / 14C]シアゾファミドの Sprague-Dawley ラットへの反復経口投与後における放射能の排泄及び体内分布に関する研究（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 6 シアゾファミド及び CCIM の血液中及び胃内容物中における *in vitro* 代謝試験：石原産業株式会社、1999 年、未公表
- 7 シアゾファミド及び CCIM のラットにおける比較代謝試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 8 トマトにおける代謝試験：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 9 土壌処理したシアゾファミドのトマト植物体内での挙動：石原産業株式会社中央研究所、1999 年、未公表
- 10 トマト幼植物による吸収移行性試験：石原産業株式会社中央研究所、1999 年、未公表
- 11 ポテトにおける[14C]シアゾファミドの植物代謝試験：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 12 ブドウにおける代謝試験：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 13 [14C]シアゾファミドの好氣的土壌代謝試験：Ricerca, Inc.、1997 年、未公表
- 14 [14C]シアゾファミドの嫌氣的湛水土壌代謝試験：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 15 日本土壌における土壌吸着試験：石原産業株式会社中央研究所、1999 年、未公表
- 16 海外土壌における土壌吸着試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 17 [14C]シアゾファミドの熟成土壌カラムリーチング試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 18 [14C]シアゾファミドの非熟成土壌カラムリーチング試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 19 [14C]シアゾファミドの土壌表面光分解：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 20 シアゾファミドの加水分解試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1997 年、未公表

- 21 [14C]シアゾファミドの蒸留水及び自然水中における水中光分解試験：石原産業株式会社中央研究所、1999年、未公表
- 22 pH5における[14C]シアゾファミドの水中光分解：Ricerca, Inc.、1999年、未公表
- 23 シアゾファミドの土壌残留性試験：石原産業株式会社、1998年、未公表
- 24 シアゾファミドの作物残留試験成績：石原産業株式会社、1998～2002年、未公表
- 25 生体の機能に及ぼす影響に関する試験（GLP 対応）：財団法人残留農薬研究所、1999年、未公表
- 26 ラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998年、未公表
- 27 マウスにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999年、未公表
- 28 ラットにおける急性経皮毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998年、未公表
- 29 ラットにおける急性吸入毒性試験（ダスト）（GLP 対応）：WIL Research Laboratories, Inc.、1998年、未公表
- 30 CCIM のラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：財団法人残留農薬研究所、1999年、未公表
- 31 CCIM-AM のラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：財団法人残留農薬研究所、1999年、未公表
- 32 CTCA のラットにおける急性経口毒性試験（GLP 対応）：財団法人残留農薬研究所、1999年、未公表
- 33 ラットにおける急性神経毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、2000年、未公表
- 34 ウサギにおける眼一次刺激性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998年、未公表
- 35 ウサギにおける皮膚一次刺激性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998年、未公表
- 36 モルモットにおける皮膚感作性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998年、未公表
- 37 ラットにおける亜急性毒性試験（GLP 対応）：財団法人残留農薬研究所、1999年、未公表
- 38 イヌを用いたカプセル経口投与における亜急性経口毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999年、未公表
- 39 イヌにおける慢性毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999年、未公表
- 40 シアゾファミドの要望事項に対する回答資料：石原産業株式会社、2000年、未公表

- 41 ラットにおける慢性毒性/発がん性試験 (GLP 対応) : 財団法人残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 42 マウスにおける発がん性試験 (GLP 対応) : Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 43 ラットを用いた繁殖性試験 (GLP 対応) : Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 44 ラットにおける催奇形性試験 (GLP 対応) : Huntington Life Sciences、1999 年、未公表
- 45 ウサギにおける催奇形性試験 (GLP 対応) : Huntington Life Sciences、1999 年、未公表
- 46 細菌を用いた復帰変異試験 (GLP 対応) : Huntington Life Sciences、1998 年、未公表
- 47 ヒトリンパ球を用いた *in vitro* 染色体異常試験 (GLP 対応) : Huntington Life Sciences、1998 年、未公表
- 48 細菌を用いた DNA 修復試験 (GLP 対応) : 財団法人残留農薬研究所、1998 年、未公表
- 49 マウスにおける小核試験 (GLP 対応) : Huntington Life Sciences、1998 年、未公表
- 50 CCIM の細菌を用いた復帰変異試験 (GLP 対応) : 財団法人残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 51 CCIM-AM の細菌を用いた復帰変異試験 (GLP 対応) : 財団法人残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 52 CTCA の細菌を用いた復帰変異試験 (GLP 対応) : 財団法人残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 53 食品健康影響評価について (平成 16 年 7 月 12 日付け厚生労働省発食安第 0712002 号)
- 54 食品健康影響評価の結果の通知について (平成 16 年 11 月 4 日付け府食第 1111 号)
- 55 食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号) の一部を改正する件 (平成 17 年 4 月 27 日付け平成 17 年厚生労働省告示第 230 号)
- 56 農薬抄録シアゾファミド (殺菌剤) (平成 17 年 4 月 7 日改訂) : 石原産業株式会社、2005 年、一部公表
- 57 シアゾファミドの作物残留性試験成績 : 日本食品分析センター、2003 年、未公表
- 58 CCIM の作物残留性試験成績 : 石原産業株式会社、2003 年、未公表
- 59 食品健康影響評価について (平成 17 年 6 月 14 日付け厚生労働省発食安第 0614001 号)
- 60 シアゾファミドの追加資料要求事項について 平成 17 年 11 月 9 日 : 石原産業株式会社、2005 年

- 61 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 18 年 5 月 11 日付け府食第 372 号）
- 62 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 18 年 11 月 29 日付け平成 18 年厚生労働省告示第 643 号）
- 63 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 19 年 3 月 14 日改訂）：石原産業株式会社、2007 年、一部公表
- 64 シアゾファミドの作物残留試験成績：石原産業株式会社、2007 年、未公表
- 65 代謝物 CCIM の作物残留性試験成績：石原産業株式会社、2007 年、未公表
- 66 食品健康影響評価について（平成 19 年 5 月 22 日付け厚生労働省発食安第 0522001 号）
- 67 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 19 年 9 月 6 日付け府食第 848 号）
- 68 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 20 年 4 月 30 日付け平成 20 年厚生労働省告示第 296 号）
- 69 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 21 年 8 月 27 日改訂）：石原産業株式会社、2009 年、一部公表
- 70 シアゾファミドの作物残留試験成績：石原産業株式会社、2007 年、未公表
- 71 シアゾファミドの基準値改正検討書類：石原産業株式会社、2009 年、未公表
- 72 DMSA（推定代謝物）のラットにおける急性経口投与毒性試験（GLP 対応）：残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 73 ラットを用いた 28 日間反復経皮投与毒性試験（GLP 対応）：Ricerca, LLC、1997 年、未公表
- 74 ほ乳類培養細胞を用いた遺伝子突然変異試験（GLP 対応）：Huntington Life Sciences Ltd、1998 年、未公表
- 75 DMSA（推定代謝物）の細菌を用いる復帰変異試験（GLP 対応）：残留農薬研究所、1999 年、未公表
- 76 食品健康影響評価について（平成 21 年 10 月 27 日付け厚生労働省発食安 1027 第 2 号）
- 77 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 22 年 3 月 18 日付け府食第 210 号）
- 78 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 23 年 3 月 15 日付け平成 23 年厚生労働省告示第 52 号）
- 79 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 22 年 6 月 16 日改訂）：石原産業株式会社、2010 年、一部公表
- 80 食品健康影響評価について（平成 22 年 11 月 10 日付け厚生労働省発食安 1110 第 3 号）
- 81 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 22 年 9 月 7 日改訂）：石原産業株式会社、2010 年、一部公表

- 82 シアゾファミドの作物残留試験成績（かぼちゃ）：石原産業株式会社、2008年、未公表
- 83 食品健康影響評価の結果の通知について（平成23年7月21日付け府食第603号）
- 84 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（平成24年12月28日付け平成24年厚生労働省告示第595号）
- 85 食品健康影響評価について（平成24年1月19日付け厚生労働省発食安0119第2号）
- 86 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成23年9月15日改訂）：石原産業株式会社、2011年、一部公表
- 87 シアゾファミドの作物残留試験成績（はつかだいこん、はたけな、もも、ネクタリン）：石原産業株式会社、2006、2007、2008、2009年、未公表
- 88 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成24年2月24日改訂）：石原産業株式会社、2012年、一部公表
- 89 シアゾファミドの作物残留試験成績（こんにゃく）：石原産業株式会社、2010年、未公表
- 90 食品健康影響評価の結果の通知について（平成24年6月22日付け府食第610号）
- 91 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（平成25年7月2日付け平成25年厚生労働省告示第233号）
- 92 食品健康影響評価について（平成24年8月21日付け厚生労働省発食安0821第1号）
- 93 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成24年2月24日改訂）：石原産業株式会社、2012年、一部公表
- 94 シアゾファミドの基準値改正検討書類：石原産業株式会社、2012年、未公表
- 95 食品健康影響評価の結果の通知について（平成24年12月10日付け府食第1043号）
- 96 食品健康影響評価について（平成25年6月11日付け厚生労働省発食安0611第5号）
- 97 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成25年1月15日改訂）：石原産業株式会社、2013年、一部公表
- 98 シアゾファミドの作物残留試験成績（こんにゃく）：石原産業株式会社、2010年、未公表
- 99 食品健康影響評価の結果の通知について（平成25年7月29日付け府食第617号）
- 100 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部を改正する件（平成25年10月22日付け平成25年厚生労働省告示第337号）

- 101 食品健康影響評価について（平成 25 年 11 月 11 日付け厚生労働省発食安 1111 第 4 号）
- 102 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 25 年 7 月 3 日改訂）：石原産業株式会社、2013 年、一部公表
- 103 泌乳ヤギにおける代謝試験成績（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1998 年、未公表
- 104 産卵鶏における代謝試験成績（GLP 対応）：Ricerca, Inc.、1999 年、未公表
- 105 水稻における代謝試験成績（GLP 対応）：PTRL West, Inc.、2011 年、未公表
- 106 好氣的湛水土壌代謝試験成績（GLP 対応）：PTRL West, Inc.、2011 年、未公表
- 107 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 26 年 8 月 8 日付け平成 26 年厚生労働省告示第 323 号）
- 108 シアゾファミドの作物残留試験成績（水稻）：石原産業株式会社、2010 年、未公表
- 109 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 26 年 1 月 27 日付け府食第 96 号）
- 110 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 27 年 2 月 20 日付け平成 27 年厚生労働省告示第 30 号）
- 111 食品健康影響評価について（平成 28 年 12 月 13 日付け厚生労働省発生食 1213 第 4 号）
- 112 農薬抄録シアゾファミド（殺菌剤）（平成 28 年 3 月 24 日改訂）：石原産業株式会社、2015 年、一部公表
- 113 シアゾファミドの作物残留試験成績（日本なし）：石原産業株式会社、2014 年、未公表
- 114 シアゾファミドの作物残留試験成績（すもも）：石原産業株式会社、2006 年、未公表
- 115 シアゾファミドの作物残留試験成績（カリフラワー）：石原産業株式会社、2014 年、未公表
- 116 シアゾファミドの海外における残留試験基準値及び適正農薬規範：石原産業株式会社、2014 年、未公表
- 117 CCIM の哺乳類培養細胞（CHL/IU）を用いた染色体異常試験（GLP 対応）：Biototech、2008 年、未公表
- 118 A 90-Day Dietary Neurotoxicity Study of Cyazofamid in Rats（GLP 対応）WIL Research Laboratories、2012 年、未公表
- 119 A 28-Day Oral(Dietary) Immunotoxicity Study of Technical Cyazofamid in Female CD-1 Mice（GLP 対応）：WIL Research Laboratories、2012 年、未公表
- 120 平成 17～19 年の食品摂取頻度・摂取量調査（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料、2014 年 2 月 20 日）

- 121 JMPR① : “CYAZOFAMID” , Pesticide residues in food 2015, Evaluations, Part II Toxicological, p.187-225(2016)
- 122 JMPR② : Pesticide Residues in food 2015, Report p.103-122(2015)
- 123 JMPR③ : Pesticide Residues in food 2015, Evaluations Part I Residues p.463-538(2015)
- 124 EFSA : Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyazofamid p.1-90(2016)
- 125 US EPA① : Memorandum : Cyazofamid. Human Health Risk Assessment for proposed New Uses on Use on Crop Subgroup 19A, Peppers and Tomatoes Grown in Greenhouses, and on Bulb vegetable Crop Group 03-07, p.1-37(2015)
- 126 US EPA② : Federal Register: “CYAZOFAMID”Vol.81,No.22 5600-5605(2016)
- 127 食品健康影響評価の結果の通知について (平成 29 年 10 月 17 日付け府食第 691 号)
- 128 食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号) の一部を改正する件 (平成 30 年 10 月 18 日付け厚生労働省告示第 367 号)
- 129 食品健康影響評価について (令和 2 年 10 月 19 日付け厚生労働省発生食 1019 第 4 号)
- 130 農薬抄録シアゾファミド (殺菌剤) (平成 31 年 3 月 18 日改訂) : 石原産業株式会社、一部公表
- 131 シアゾファミドの作物残留試験成績 (さといも) : 石原産業株式会社、2018 年、未公表