

厚生労働省発生食 0829 第1号
令和4年8月29日

薬事・食品衛生審議会
会長 太田 茂 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信
(公 印 省 略)

諮問書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第13条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。

記

1 次に掲げる農薬等の食品中の残留基準の設定について

農薬アセキノシル
農薬イソピラザム
農薬ゾキサミド
農薬トリネキサパックエチル
農薬ピラジフルミド
農薬ピリダリル
農薬・添加物フルジオキサニル

以上

令和4年11月7日

薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会長 穂山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会報告について

令和4年8月29日付け厚生労働省発生食0829第1号をもって諮問された、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第13条第1項の規定に基づくゾキサミドに係る食品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

ゾキサミド

今般の残留基準の検討については、関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

1. 概要

(1) 品目名：ゾキサミド [Zoxamide (ISO)]

(2) 分類：農薬

(3) 用途：殺菌剤


ベンズアミド系殺菌剤である。菌類のチューブリンのベータサブユニットへの結合による微小管細胞骨格の破壊と、その結果もたらされる核分裂阻害により殺菌作用を示すと考えられている。

(4) 化学名及びCAS番号

(*RS*)-3, 5-Dichloro-*N*-(1-chloro-3-methyl-2-oxopentan-3-yl)-4-methylbenzamide
(IUPAC)

Benzamide, 3, 5-dichloro-*N*-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-4-methyl-
(CAS : No. 156052-68-5)

(5) 構造式及び物性



(ラセミ体 *R*体 : *S*体 = 1 : 1)

分子式	C ₁₄ H ₁₆ Cl ₃ N ₂
分子量	336.64
水溶解度	6.8 × 10 ⁻⁴ g/L (20°C)
分配係数	log ₁₀ Pow = 3.76

2. 適用の範囲及び使用方法

本剤は、国内では農薬登録がなされていない。
海外での適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。

(1) 海外での使用方法

なす、ピーマン等に係る残留基準の設定について今回インポートトレランス申請がなされており、作物名となっているものは、今回の申請にかかる作物を示している。

① 240 g/Lゾキサミドフロアブル (フィリピン)

作物名	適用	1回当たりの 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
バナナ	ブラックシガ トカ病	120~240 g ai/ha	収穫当日 まで	1回	茎葉散布

ai: active ingredient (有効成分)

② 8.3%ゾキサミド・66.7%マンコゼブドライフロアブル (米国)

作物名	適用	1回当たりの 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
たまねぎ	白斑葉枯病 べと病 乾腐病 黒斑病 さび病	134~191 g ai/ha	収穫7日前 まで	8回以内	散布

③ 6.8%ゾキサミド・40%クロロタロニルフロアブル (米国)

作物名	適用	1回当たりの 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
なす ピーマン その他の なす科野菜 オクラ	炭そ病 (<i>Colletotrichum</i> spp.) 灰色かび病 (<i>Botrytis cinerea</i>) テンサイ褐斑病 (<i>Cercospora</i> spp.) 夏疫病 (<i>A. solani</i> / <i>A. tomatophilia</i>)	34 fl oz/acre (169 g ai/ha)	収穫3日前 まで	8回以内	散布

fl oz: 液量オンス (米液量オンス 1 fl oz = 0.0000295735 m³)

acre: エーカー (1 acre = 約4,047 m²)

3. 代謝試験


(1) 植物代謝試験

植物代謝試験が、ぶどう、ばれいしょ、きゅうり及びトマトで実施されており、可食部で10%TRR^{注)}以上認められた代謝物は、代謝物B (ばれいしょ) 及び代謝物C (ばれいしょ) であった。


注) %TRR : 総放射性残留物 (TRR : Total Radioactive Residues) 濃度に対する比率 (%)

【代謝物略称一覧】

略称	JMPR 評価書の略称	化学名
B	RH-1452 RH-141452	3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシメチル安息香酸
C	RH-1455 RH-141455	2,6-ジクロロ-テレフタル酸



代謝物B



代謝物C

注) 残留試験の分析対象となっている代謝物について構造式を明記した。

4. 作物残留試験

(1) 分析の概要

【海外】

① 分析対象物質

- ・ゾキサミド
- ・代謝物B
- ・代謝物C

② 分析法の概要

i) ゾキサミド

試料からアセトニトリルで抽出し、酢酸エチルに転溶する。アルミナ (塩基性) カラム、フロリジルカラム、カーボンカラム及びアルミナ (塩基性) カラム、又はカーボン・アルミナ (塩基性) 連結カラムを用いて精製した後、電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ (GC-ECD) 又はガスクロマトグラフ・質量分析計 (GC-MS) で定量する。

定量限界：0.01～0.02 mg/kg

ii) ゾキサミド、代謝物B及び代謝物C

試料からアセトニトリル又はアセトニトリル・2%炭酸水素ナトリウム溶液(4:1)混液で抽出する。抽出液を減圧濃縮後、2%炭酸水素ナトリウム溶液及び酢酸エチルを加えて液液分配し、ゾキサミドを酢酸エチル層に、代謝物B及び代謝物Cを水層に分ける。酢酸エチル層はフロリジルカラム及びアルミナ(塩基性)カラムを用いて精製した後、ゾキサミドをGC-ECDで定量する。水層は1.0 mol/L塩酸を加えてpHを1以下として酢酸エチルに転溶する。ジアゾメタンでメチル化し、フロリジルカラムを用いて精製した後、代謝物B及び代謝物Cのメチル化体をGC-ECDで定量する。

なお、代謝物B及び代謝物Cの分析値は、それぞれ換算係数1.52及び1.43を用いてゾキサミド濃度に換算した値として示した。

定量限界：ゾキサミド 0.01～0.02 mg/kg

代謝物B 0.02 mg/kg (ゾキサミド換算濃度)

代謝物C 0.02 mg/kg (ゾキサミド換算濃度)

(2) 作物残留試験結果

海外で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1を参照。

5. ADI 及び ARfD の評価

食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委員会あて意見を求めたゾキサミドに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されている。

(1) ADI

無毒性量：47.5 mg/kg 体重/day

(動物種) 雌イヌ

(投与方法) 混餌

(試験の種類) 慢性毒性試験

(期間) 1年間

安全係数：100

ADI：0.47 mg/kg 体重/day

(2) ARfD 設定の必要なし

ゾキサミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、急性参照用量(ARfD)は設定する必要がないと判断した。

6. 諸外国における状況

JMPRにおける毒性評価が行われ、2007年にADIが設定され、ARfDは設定不要と評価されている。国際基準はきゅうり、ぶどう等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてぶどう、トマト等に、カナダにおいてばれいしょ、ポテトフ레이크等に、EUにおいてきゅうり、メロン類果実等に基準値が設定されている。

7. 残留規制

(1) 残留の規制対象

ゾキサミドとする。

植物代謝試験において、代謝物B及び代謝物Cが、ばれいしょの可食部で10%TRR以上認められたが、その他の農産物の試験では10%TRR以上の代謝物は認められなかった。作物残留試験においてもゾキサミドが残留しており、検出の指標としてはゾキサミドのみで十分と考えられることから、残留の規制対象には代謝物B及び代謝物Cを含めず、ゾキサミドのみとする。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

8. 暴露評価

(1) 暴露評価対象

ゾキサミドとする。

植物代謝試験において、代謝物B及び代謝物Cが、ばれいしょの可食部で10%TRR以上認められたが、その他の農産物の試験では10%TRR以上の代謝物は認められなかった。一部の作物残留試験においては代謝物Bがゾキサミドを上回っているが低濃度であることから、暴露評価対象には代謝物B及び代謝物Cを含めず、ゾキサミドのみとする。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質をゾキサミド（親化合物のみ）としている。

(2) 暴露評価結果

① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。

	TMDI／ADI (%) ^{注)}
国民全体 (1歳以上)	2.6
幼小児 (1～6歳)	5.3
妊婦	3.0
高齢者 (65歳以上)	3.0

注) 各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

<参考>

	EDI／ADI (%) ^{注)}
国民全体 (1歳以上)	0.4
幼小児 (1～6歳)	0.8
妊婦	0.5
高齢者 (65歳以上)	0.4

注) 各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

ゾキサミドの作物残留試験一覧表 (米国)

農作物	試験圃場数	試験条件			各化合物の残留濃度 (mg/kg) 注1)							
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	【ゾキサミド/代謝物B/代謝物C】						
たまねぎ	12	8.3%フロアブル	186 g ai/ha 散布	8	3, 7, 10, 14	圃場A: *0.304/*0.032/*<0.02 (*8回, 10日)						
						圃場B: 0.166/0.039/<0.02						
						圃場C: 0.443/<0.02/<0.02						
						圃場D: 0.262/<0.02/<0.02						
						圃場E: 0.245/0.043/<0.02						
						圃場F: 0.020/0.023/<0.02						
						圃場G: 0.074/0.053/<0.02						
						圃場H: 0.102/0.026/<0.02						
						圃場I: 0.121/0.039/<0.02						
					圃場J: 0.214/<0.02/<0.02							
					6	圃場K: 0.201/<0.02/<0.02						
					圃場L: 0.035/<0.02/<0.02							
バナナ注2)	17	240 g/Lフロアブル	499 g ai/ha 散布	1	0	圃場A: 0.167/-/- (#)						
						圃場B: 0.014/-/- (#)						
						圃場C: <0.01/-/- (#)						
						圃場D: <0.01/-/- (#)						
						圃場E: 0.028/-/- (#)						
						圃場F: <0.01/-/- (#)						
						圃場G: 0.010/-/- (#)						
						圃場H: 0.016/-/- (#)						
						圃場I: <0.01/-/- (#)						
						圃場J: <0.01/-/- (#)						
						圃場K: <0.01/-/- (#)						
						圃場L: <0.01/-/- (#)						
						圃場M: 0.011/-/- (#)						
											0, 3, 7, 14	圃場N: *0.050/-/- (*1回, 3日) (#)
											圃場O: *0.108/-/- (*1回, 7日) (#)	
											圃場P: 0.081/-/- (#)	
圃場Q: *0.020/-/- (*1回, 3日) (#)												
ピーマン	6	6.8%フロアブル	210 g ai/ha 散布	8	3	圃場A: 0.100/-/-						
						圃場B: 0.160/-/-						
						圃場C: 0.245/-/-						
						圃場D: 0.253/-/-						
						圃場E: 0.217/-/-						
					0, 3, 7, 10	圃場F: 0.259/-/-						
とうがらし	6	6.8%フロアブル	210 g ai/ha 散布	8	3	圃場A: 0.289/-/-						
						圃場B: 0.230/-/-						
						圃場C: 0.409/-/-						
						圃場D: 0.296/-/-						
						圃場E: 0.761/-/-						
					0, 3, 7, 10	圃場F: *0.134/-/- (*8回, 10日)						

-: 分析せず

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

注1) 当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆる最大使用条件下の作物残留試験) を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物B及び代謝物Cの残留濃度は、ゾキサミド濃度に換算した値で示した。

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について () 内に記載した。

注2) バナナは、エクアドル、グアテマラ、コロンビア、コスタリカ、ホンジュラス及びフィリピンで実施された作物残留試験成績より米国基準値が設定された。

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績等 ppm
				国際 基準 ppm	国/地域 基準値 ppm	
ぼれいしょ	0.02	0.02		0.02		
たまねぎ	0.7	0.7			0.7 米国	【0.020～0.443(n=12)(米国)】
トマト	2	2		2		
ピーマン	1	0.3	IT		1.0 米国	【米国ピーマン(0.100～0.259(n=6))、とうがらし(0.134～0.761(n=6))】
なす	1		IT		1.0 米国	【米国ピーマン、とうがらし参照】
その他のなす科野菜	1		IT		1.0 米国	【米国ピーマン、とうがらし参照】
きゅうり(ガーキンを含む。)	2	2		2		
かぼちゃ(スカッシュを含む。)	2	2		2		
しろうり	2	2		2		
すいか(果皮を含む。)	2	2		2		
メロン類果実(果皮を含む。)	2	2		2		
まくわうり(果皮を含む。)	2	2		2		
その他のうり科野菜	2	2		2		
オクラ	1		IT		1.0 米国	【米国ピーマン、とうがらし参照】
ぶどう	5	5		5		
バナナ	0.2	0.2			0.20 米国	【<0.01～0.167(#)(n=17)(米国)】
はちみつ	0.05	0.05				※1)
干しぶどう		15		15		※2)

本基準(暫定基準以外の基準)を見直す基準値案については、太枠線で囲んで示した。

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したもの、または、※2)のとおり、基準値を設定しないものについては、斜線で示「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、インポートトランス申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

※1)「食品中の農薬の残留基準設定の基本原則について」(令和元年7月30日農薬・動物用医薬品部会(令和3年3月11日一部改訂))の別添3「はちみつ中の農薬等の基準設定の方法について」に基づき設定。

※2)加工食品である「干しぶどう」について、国際基準が設定されているが、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えないことから、基準値を設定しないこととする。基準値が設定されていない加工食品については、原材料の基準値に基づき加工係数を考慮して適否を判断することとしている。なお、本物質について、JMPRIは加工係数を2.9と算出している。

ゾキサミドの推定摂取量 (単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品名	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民全体 (1歳以上) TMDI	国民全体 (1歳以上) EDI	幼児 (1~6歳) TMDI	幼児 (1~6歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI
ばれいしょ	0.02	0.02	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
たまねぎ	0.7	0.182	21.8	5.7	15.8	4.1	24.7	6.4	19.5	5.1
トマト	2	0.195	64.2	6.3	38.0	3.7	64.0	6.2	73.2	7.1
ピーマン	1	0.279	4.8	1.3	2.2	0.6	7.6	2.1	4.9	1.4
なす	1	0.279	12.0	3.3	2.1	0.6	10.0	2.8	17.1	4.8
その他のなす科野菜	1	0.279	1.1	0.3	0.1	0.0	1.2	0.3	1.2	0.3
きゅうり (ガーキンを含む。)	2	0.225	41.4	4.7	19.2	2.2	28.4	3.2	51.2	5.8
かぼちゃ (スカッシュを含む。)	2	0.225	18.6	2.1	7.4	0.8	15.8	1.8	26.0	2.9
しろうり	2	0.225	1.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	1.8	0.2
すいか (果皮を含む。)	2	0.225	15.2	1.7	11.0	1.2	28.8	3.2	22.6	2.5
メロン類果実 (果皮を含む。)	2	0.225	7.0	0.8	5.4	0.6	8.8	1.0	8.4	0.9
まくわうり (果皮を含む。)	2	0.225	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	1.0	0.1
その他のうり科野菜	2	0.225	5.4	0.6	2.4	0.3	1.2	0.1	6.8	0.8
オクラ	1	0.279	1.4	0.4	1.1	0.3	1.4	0.4	1.7	0.5
ぶどう	5	0.83	43.5	7.2	41.0	6.8	101.0	16.8	45.0	7.5
バナナ	0.2	0.034	2.6	0.4	3.0	0.5	3.3	0.6	3.8	0.6
はちみつ	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
計			241.3	35.8	149.9	22.5	297.5	45.9	284.9	41.3
ADI比 (%)			2.6	0.4	5.3	0.8	3.0	0.5	3.0	0.4

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

TMDI試算法: 基準値案×各食品の平均摂取量

EDI: 推定1日摂取量 (Estimated Daily Intake)

EDI試算法: 作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

●: 個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値(案)の数値を用いた。
国際基準を参照したものについては、JMPRの評価に用いられた残留試験データを用いてEDI試算をした。

(参考)

これまでの経緯

平成17年	11月29日	残留農薬基準告示
平成19年	1月12日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成20年	8月21日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成22年	9月14日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成22年	12月24日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
平成23年	6月28日	残留農薬基準告示
平成30年	5月22日	インポートトレランス申請（たまねぎ及びバナナ）
平成30年	6月21日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成31年	1月15日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和元年	5月17日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
令和2年	1月15日	残留農薬基準告示
令和3年	6月22日	インポートトレランス申請（なす、ピーマン等）
令和4年	1月19日	厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
令和4年	5月24日	食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
令和4年	8月29日	薬事・食品衛生審議会へ諮問
令和4年	9月16日	薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- 穂山 浩 学校法人星薬科大学薬学部薬品分析化学研究室教授
- 石井 里枝 埼玉県衛生研究所化学検査室長
- 井之上 浩一 学校法人立命館立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室教授
- 大山 和俊 一般財団法人残留農薬研究所業務執行理事・化学部長
- 折戸 謙介 学校法人麻布獣医学園理事（兼）麻布大学獣医学部生理学教授
- 加藤 くみ子 学校法人北里研究所北里大学薬学部分析化学教室教授
- 魏 民 公立大学法人大阪大阪公立大学大学院医学研究科
環境リスク評価学准教授
- 佐藤 洋 国立大学法人岩手大学農学部共同獣医学科比較薬理毒性学研究室教授
- 佐野 元彦 国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授
- 須恵 雅之 学校法人東京農業大学応用生物科学部農芸化学科
生物有機化学研究室教授
- 瀧本 秀美 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長
- 中島 美紀 国立大学法人金沢大学ナノ生命科学研究所
薬物代謝安全性学研究室教授
- 永山 敏廣 学校法人明治薬科大学薬学部特任教授
- 根本 了 国立医薬品食品衛生研究所食品部主任研究官
- 野田 隆志 一般社団法人日本植物防疫協会信頼性保証室付技術顧問
- 二村 睦子 日本生活協同組合連合会常務理事

(○：部会長)

答申（案）

ゾキサミド

食品名	残留基準値 ppm
ばれいしょ	0.02
たまねぎ	0.7
トマト	2
ピーマン	1
なす	1
その他のなす科野菜 ^{注1)}	1
きゅうり（ガーキンを含む。）	2
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	2
しろうり	2
すいか（果皮を含む。）	2
メロン類果実（果皮を含む。）	2
まくわうり（果皮を含む。）	2
その他のうり科野菜 ^{注2)}	2
オクラ	1
ぶどう	5
バナナ	0.2
はちみつ	0.05

注1) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

注2) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ（スカッシュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

府 食 第 281 号
令和 4 年 5 月 26 日

厚生労働大臣
後藤 茂之 殿

食品安全委員会
委員長 山本 茂貴

食品健康影響評価の結果の通知について

令和 4 年 1 月 19 日付け厚生労働省発生食 0119 第 3 号をもって厚生労働大臣から食品安全委員会に意見を求められたゾキサミドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第 2 項の規定に基づき通知します。

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。

記

ゾキサミドの許容一日摂取量を 0.47 mg/kg 体重/日と設定し、急性参照用量は設定する必要がないと判断した。

別 添

農薬評価書

ゾキサミド (第3版)

令和4年(2022年)5月
食品安全委員会

目次

	頁
○ 審議の経緯	3
○ 食品安全委員会委員名簿	4
○ 食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿	4
○ 食品安全委員会農薬第五専門調査会専門委員名簿	7
○ 要約	8
I. 評価対象農薬の概要	9
1. 用途	9
2. 有効成分の一般名	9
3. 化学名	9
4. 分子式	9
5. 分子量	9
6. 構造式	9
7. 開発の経緯	9
II. 安全性に係る試験の概要	11
1. 動物体内運命試験	11
(1) ラット	11
(2) ヤギ	16
(3) ラット (代謝物 B)	17
(4) ラット (代謝物 C)	17
2. 植物体内運命試験	17
(1) ぶどう	17
(2) ばれいしょ	17
(3) きゅうり	18
(4) トマト	18
3. 土壌中運命試験	18
(1) 好氣的土壌中運命試験	18
(2) 好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験	19
(3) 土壌表面光分解試験	19
(4) 土壌吸脱着試験	19
4. 水中運命試験	20
(1) 加水分解試験	20
(2) 水中光分解試験	20
5. 土壌残留試験	20
6. 作物残留試験	20

7. 一般薬理試験	21
8. 急性毒性試験	21
(1) 急性毒性試験	21
(2) 急性神経毒性試験	22
9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験（原体及び原体混在物①）	22
10. 亜急性毒性試験	22
(1) 90日間亜急性毒性/神経毒性併合試験（ラット）	22
(2) 90日間亜急性毒性試験（マウス）	23
(3) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）	23
(4) 28日間亜急性経皮毒性試験（ラット）	24
(5) 28日間亜急性毒性試験（原体混在物②）（ラット）	24
11. 慢性毒性試験及び発がん性試験	25
(1) 1年間慢性毒性試験（イヌ）	25
(2) 2年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）	26
(3) 18か月間発がん性試験（マウス）	27
12. 生殖発生毒性試験	27
(1) 2世代繁殖試験（ラット）	27
(2) 発生毒性試験（ラット）	28
(3) 発生毒性試験（ウサギ）	28
13. 遺伝毒性試験	28
14. その他の試験	30
(1) 骨髄分布試験（マウス）	30
Ⅲ. 食品健康影響評価	31
・別紙1：代謝物/分解物/原体混在物略称	36
・別紙2：検査値等略称	38
・別紙3：作物残留試験成績（海外）	39
・参照	45

<審議の経緯>

－第1版関係－

- 2005年 11月 29日 残留農薬基準告示（参照1）
- 2007年 1月 12日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発食安第0112009号）、同接受（参照7）
- 2007年 1月 18日 第174回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2007年 11月 30日 第11回農薬専門調査会確認評価第一部会
- 2008年 6月 24日 第40回農薬専門調査会幹事会
- 2008年 7月 10日 第246回食品安全委員会（報告）
- 2008年 7月 10日 から8月8日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2008年 8月 19日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2008年 8月 21日 第251回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照8）
- 2011年 6月 28日 残留農薬基準告示（参照9）

－第2版関係－

- 2018年 5月 22日 インポートトレランス設定の要請（たまねぎ及びバナナ）
- 2018年 6月 21日 厚生労働大臣から残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食0621第7号）、関係書類の接受（参照10～51）
- 2018年 6月 26日 第702回食品安全委員会（要請事項説明）
- 2018年 9月 14日 第76回農薬専門調査会評価第二部会
- 2018年 11月 9日 第165回農薬専門調査会幹事会
- 2018年 11月 20日 第721回食品安全委員会（報告）
- 2018年 11月 21日 から12月20日まで 国民からの意見・情報の募集
- 2019年 1月 9日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
- 2019年 1月 15日 第726回食品安全委員会（報告）
（同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照53）
- 2020年 1月 15日 残留農薬基準告示（参照54）

－第3版関係－

- 2021年 6月 22日 インポートトレランス設定の要請（なす、ピーマン等）
- 2022年 1月 19日 厚生労働大臣から残留基準値設定に係る食品健康影響評価について要請（厚生労働省発生食0119第3号）、関係書類の接受（参照55～60）
- 2022年 1月 25日 第845回食品安全委員会（要請事項説明）

2022年 3月 11日 第13回農薬第五専門調査会
2022年 5月 16日 農薬第五専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告
2022年 5月 24日 第859回食品安全委員会（報告）
(5月26日付け厚生労働大臣へ通知)

<食品安全委員会委員名簿>

(2006年6月30日まで)	(2006年12月20日まで)	(2009年6月30日まで)
寺田雅昭（委員長）	寺田雅昭（委員長）	見上 彪（委員長）
寺尾允男（委員長代理）	見上 彪（委員長代理）	小泉直子（委員長代理*）
小泉直子	小泉直子	長尾 拓
坂本元子	長尾 拓	野村一正
中村靖彦	野村一正	畑江敬子
本間清一	畑江敬子	廣瀬雅雄**
見上 彪	本間清一	本間清一

*：2007年2月1日から

**：2007年4月1日から

(2018年6月30日まで)	(2021年6月30日まで)
佐藤 洋（委員長）	佐藤 洋（委員長）
山添 康（委員長代理）	山本茂貴（委員長代理）
吉田 緑	川西 徹
山本茂貴	吉田 緑
石井克枝	香西みどり
堀口逸子	堀口逸子
村田容常	吉田 充

(2021年7月1日から)

山本茂貴（委員長）
浅野 哲（委員長代理 第一順位）
川西 徹（委員長代理 第二順位）
脇 昌子（委員長代理 第三順位）
香西みどり
松永和紀
吉田 充

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿>

(2007年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	根岸友恵
廣瀬雅雄 (座長代理)	佐々木有	林 真
赤池昭紀	高木篤也	平塚 明
石井康雄	玉井郁巳	藤本成明
泉 啓介	田村廣人	細川正清
上路雅子	津田修治	松本清司
臼井健二	津田洋幸	柳井徳磨
江馬 眞	出川雅邦	山崎浩史
大澤貫寿	長尾哲二	山手丈至
太田敏博	中澤憲一	與語靖洋
大谷 浩	納屋聖人	吉田 緑
小澤正吾	成瀬一郎	若栗 忍
小林裕子	布柴達男	

(2008年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	三枝順三	西川秋佳**
林 真 (座長代理*)	佐々木有	布柴達男
赤池昭紀	代田眞理子****	根岸友恵
石井康雄	高木篤也	平塚 明
泉 啓介	玉井郁巳	藤本成明
上路雅子	田村廣人	細川正清
臼井健二	津田修治	松本清司
江馬 眞	津田洋幸	柳井徳磨
大澤貫寿	出川雅邦	山崎浩史
太田敏博	長尾哲二	山手丈至
大谷 浩	中澤憲一	與語靖洋
小澤正吾	納屋聖人	吉田 緑
小林裕子	成瀬一郎***	若栗 忍

* : 2007年4月11日から

** : 2007年4月25日から

*** : 2007年6月30日まで

**** : 2007年7月1日から

(2010年3月31日まで)

鈴木勝士 (座長)	佐々木有	平塚 明
林 真 (座長代理)	代田眞理子	藤本成明
相磯成敏	高木篤也	細川正清
赤池昭紀	玉井郁巳	堀本政夫

石井康雄
泉 啓介
今井田克己
上路雅子
臼井健二
太田敏博
大谷 浩
小澤正吾
川合是彰
小林裕子
三枝順三***

田村廣人
津田修治
津田洋幸
長尾哲二
中澤憲一*
永田 清
納屋聖人
西川秋佳
布柴達男
根岸友恵
根本信雄

本間正充
松本清司
柳井徳磨
山崎浩史
山手丈至
與語靖洋
義澤克彦**
吉田 緑
若栗 忍

* : 2009年1月19日まで

** : 2009年4月10日から

*** : 2009年4月28日から

(2020年3月31日まで)

・幹事会

西川秋佳 (座長)
納屋聖人 (座長代理)
赤池昭紀
浅野 哲
小野 敦

代田眞理子
清家伸康
中島美紀
永田 清
長野嘉介

本間正充
松本清司
森田 健
與語靖洋

・評価第一部会

浅野 哲 (座長)
平塚 明 (座長代理)
堀本政夫 (座長代理)
赤池昭紀
石井雄二

篠原厚子
清家伸康
豊田武士
中塚敏夫

福井義浩
藤本成明
森田 健
吉田 充*

・評価第二部会

松本清司 (座長)
平林容子 (座長代理)
義澤克彦 (座長代理)
小澤正吾
久野壽也

栞形麻樹子
中島美紀
本多一郎
増村健一

山手丈至
山本雅子
若栗 忍
渡邊栄喜

・評価第三部会

小野 敦 (座長)
納屋聖人 (座長代理)
美谷島克宏 (座長代理)

佐藤 洋
杉原数美
高木篤也

中山真義
八田稔久
藤井咲子

太田敏博	永田 清	安井 学
腰岡政二		
・評価第四部会		
本間正充（座長）	加藤美紀	玉井郁巳
長野嘉介（座長代理）	川口博明	中島裕司
與語靖洋（座長代理）	代田眞理子	西川秋佳
乾 秀之	高橋祐次	根岸友恵

*：2018年6月30日まで

<食品安全委員会農薬第五専門調査会専門委員名簿>

(2022年3月31日まで)

本間正充（座長）	加藤美紀	西川秋佳
代田眞理子（座長代理）	久米利明	根岸友恵
乾 秀之	高橋祐次	美谷島克宏
宇田川潤	玉井郁巳	

(2022年4月1日から)

本間正充（座長）	加藤美紀	玉井郁巳
美谷島克宏（座長代理）	川口博明	西川秋佳
乾 秀之	久米利明	古濱彩子
宇田川潤	高橋祐次	與語靖洋
籠橋有紀子		

<第165回農薬専門調査会幹事会専門参考人名簿>

上路雅子	三枝順三	林 真
------	------	-----

<第13回農薬第五専門調査会専門参考人名簿>

川口博明（北里大学獣医学部獣医病理学研究室教授）
 與語靖洋（公益財団法人日本植物調節剤研究協会技術顧問）

要 約

ベンズアミド系殺菌剤である「ゾキサミド」(CAS No.156052-68-5)について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。第3版の改訂に当たっては、厚生労働省から、作物残留試験(ピーマン及びとうがらし)、28日間亜急性毒性試験(原体混在物、ラット)、遺伝毒性試験(原体混在物)の成績等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、動物体内運命(ラット及びヤギ)、植物体内運命(ぶどう、ばれいしょ等)、作物残留、急性神経毒性(ラット)、亜急性毒性(マウス及びイヌ)、亜急性毒性/神経毒性併合(ラット)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性併合(ラット)、発がん性(マウス)、2世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、ゾキサミド投与による影響は、主としてイヌにおける体重(増加抑制)及び肝臓(重量増加、び慢性肝細胞肥大等)に認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。

各種試験結果から、農産物中のばく露評価対象物質をゾキサミド(親化合物のみ)と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の47.5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.47 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量(ADI)と設定した。

また、ゾキサミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、急性参照用量(ARfD)は設定する必要がないと判断した。

I. 評価対象農薬の概要

1. 用途

殺菌剤

2. 有効成分の一般名

和名：ゾキサミド

英名：zoxamide (ISO 名)

3. 化学名

IUPAC

和名：(RS)-3,5-ジクロロ-N-(3-クロロ-1-エチル-1-メチル-2-オキシプロピル)-p-トルアミド

英名：(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

CAS (No. 156052-68-5)

和名：3,5-ジクロロ-N-(3-クロロ-1-エチル-1-メチル-2-オキシプロピル)-4-メチルベンザミド

英名：3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-4-methylbenzamide


4. 分子式

$C_{14}H_{16}Cl_3NO_2$

5. 分子量

336.65

6. 構造式



7. 開発の経緯

ゾキサミドは、米国ダウ・アグロサイエンス社で開発されたベンズアミド系殺菌剤であり、ぶどうのべと病、ばれいしょの粉状そうか病等の防除に用いられる。作用機構は、チューブリンのベータサブユニットへの結合による核分裂の阻害、微小

管細胞骨格の破壊である。2001年に米国においてぶどう及びばれいしょに初回農薬登録された。我が国での農薬登録はなされていない。

第3版では、インポートトレランス設定の要請（なす、ピーマン等）がなされている。

II. 安全性に係る試験の概要

各種運命試験 [II. 1～4] 及びその他の試験 [II. 14] は、ゾキサミドのフェニル環の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「 ^{14}C -ゾキサミド」という。）並びに代謝物 B 及び C のフェニル環の炭素を ^{14}C で均一に標識したもの（以下「 ^{14}C -B」及び「 ^{14}C -C」という。）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比放射能（質量放射能）からゾキサミドの濃度（mg/kg 又は $\mu\text{g/g}$ ）に換算した値として示した。

代謝物/分解物/原体混在物略称及び検査値等略称は、別紙 1 及び 2 に示されている。

1. 動物体内運命試験

(1) ラット

① 吸収

a. 血漿中濃度推移

SD ラット（一群雌雄各 3 匹）に ^{14}C -ゾキサミドを 10 mg/kg 体重（以下[1. (1)]において「低用量」という。）又は 1,000 mg/kg 体重（以下[1. (1)]において「高用量」という。）で単回経口投与して、血漿中濃度推移について検討された。

血漿中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。

雌雄間、用量間で明確な差は認められなかった。（参照 4、11、12）

表 1 血漿中薬物動態学的パラメータ

投与量 (mg/kg 体重)	10		1,000		
性別	雄	雌	雄	雌	
T_{\max} (hr)	8	8	8	8	
C_{\max} ($\mu\text{g/g}$)	0.62	0.98	31.7	43.3	
$T_{1/2}$ (hr)	α 相	5.6	6.6	5.5	6.3
	β 相	70.2	164	101	107
AUC (hr · $\mu\text{g/g}$)	26.0	44.5	1,360	1,880	

b. 吸収率

胆汁中排泄試験[1. (1) ④b.]における尿、胆汁、血液、組織及びカーカス¹中排泄率から、低用量単回投与後 72 時間の吸収率は 58.5%～62.7%と推定された。

② 分布

SD ラット（一群雌雄各 3 匹）に ^{14}C -ゾキサミドを低用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。

¹ 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ。）。

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。

投与 8 及び 22 時間後において、残留放射能濃度は、肝臓、腎臓、副腎及び甲状腺で高く認められた。(参照 4、11、12)

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度 (µg/g)

投与量 (mg/kg 体重)	性別	投与 8 時間後	投与 22 時間後	投与 7 日後
10	雄	肝臓(15.0)、カーカス(5.78)、腎臓(1.67)、血漿(0.53)、副腎(0.51)、全血(0.49)、甲状腺(0.34)、肺(0.29)、心臓(0.20)、脾臓(0.19)、骨髓(0.19)、脂肪(0.11)	カーカス(2.54)、肝臓(2.52)、副腎(0.87)、腎臓(0.41)、甲状腺(0.24)、全血(0.22)、血漿(0.20)、肺(0.13)、骨髓(0.13)、心臓(0.10)、脂肪(0.09)、脾臓(0.09)	/
	雌	肝臓(24.7)、カーカス(3.86)、腎臓(2.05)、血漿(0.73)、副腎(0.66)、卵巣(0.65)、全血(0.55)、甲状腺(0.43)、肺(0.39)、心臓(0.25)、脂肪(0.23)、脾臓(0.21)、骨髓(0.20)	肝臓(4.11)、カーカス(4.02)、副腎(0.93)、腎臓(0.59)、全血(0.31)、血漿(0.30)、甲状腺(0.29)、卵巣(0.21)、肺(0.19)、骨髓(0.17)、心臓(0.16)、脾臓(0.16)、脂肪(0.14)	
1,000	雄	肝臓(879)、カーカス(805)、腎臓(120)、副腎(59.2)、血漿(49.5)、全血(37.6)、甲状腺(29.9)、肺(28.5)、脾臓(21.5)、心臓(19.5)、骨髓(14.4)、脂肪(7.51)	カーカス(88.4)、肝臓(70.6)、腎臓(17.6)、副腎(16.3)、甲状腺(12.9)、全血(11.9)、血漿(10.8)、骨髓(6.51)、肺(6.42)、脾臓(5.30)、心臓(4.35)、脂肪(3.73)	骨髓(5.35)、全血(5.28)、肝臓(4.23)、カーカス(3.74)、腎臓(3.04)、脾臓(0.88)
	雌	肝臓(1,130)、カーカス(727)、副腎(185)、腎臓(177)、血漿(63.8)、全血(48.7)、肺(41.2)、甲状腺(38.6)、卵巣(34.5)、心臓(31.5)、脾臓(28.5)、骨髓(22.2)、脂肪(13.9)	肝臓(175)、カーカス(159)、副腎(33.3)、腎臓(30.9)、甲状腺(23.2)、全血(17.8)、血漿(16.6)、卵巣(12.0)、肺(10.8)、脂肪(9.53)、心臓(8.47)、脾臓(8.24)、骨髓(7.50)	腎臓(4.72)、カーカス(4.72)、全血(4.59)、肝臓(4.33)、脾臓(1.53)、骨髓(0.85)

/ : 該当なし

③ 代謝

尿及び糞中排泄試験[1.(1)④a.]並びに胆汁中排泄試験[1.(1)④b.]における尿、糞及び胆汁を試料として代謝物同定・定量試験が実施された。

尿、糞及び胆汁中の代謝物は表 3 に示されている。

未変化のゾキサミドは尿及び胆汁中には認められず、糞中に低用量単回投与群で 12.1%TAR~23.0%TAR、高用量投与群で 71.6%TAR~73.6%TAR 認められた。いずれの投与群においても、尿及び糞中の主な代謝物として M8A、M8B 及び M15 の混合物並びに B、M10A、M10B、M16 及び M18 の混合物が、ほかに尿中では M19 及び M20 の混合物、M21A 及び M21B の混合物、M13 等が、糞中では G、H、M、M9 等が認められた。胆汁中の主な代謝物として M14A、M19

及び M27 の混合物並びに M18、M25 及び M26 が認められた。

ゾキサミドのラット体内における主要代謝経路は、①還元的脱ハロゲン化による代謝物 D の生成及び D のベンジル位の水酸化による代謝物 H の生成、②脱ハロゲン化及び閉環により生成した代謝物 E の加水分解による代謝物 G の生成、それに続く G の酸化による代謝物 N 及び M の生成又は G のグルクロン酸抱合による代謝物 M25 の生成、③グルタチオン抱合による代謝物 M13 及び M26 の生成、④アミド結合の加水分解及びベンジル位の水酸化による代謝物 B の生成、であると考えられた。(参照 2、4、11、12)

表3 尿、糞及び胆汁中の代謝物 (%TAR)

投与方法	投与量 (mg/kg 体重)	性別	試料	ゾキサ ミド	代謝物
単回経口 投与	10	雄	尿	ND	B+M10A+M10B+M16+M18(4.30)、M19+M20(1.78)、 M21A+M21B(0.94)、M8A+M8B+M15(0.70)、 M14A+M14B(0.55)、M12(0.11)
			糞	23.0	B+M10A+M10B+M16+M18(7.47)、M(7.44)、H(5.74)、 M9(4.14)、M8A+M8B+M15(3.36)、G(2.84)、D(2.75)、 M5(2.46)
		雌	尿	ND	M13(5.06)、M8A+M8B+M15(5.05)、B+M10A+M10B+ M16+M18(4.93)、M19+M20(2.65)、 M14A+M14B(1.27)、M12(1.09)、M21A+M21B(1.02)
			糞	12.1	B+M10A+M10B+M16+M18(9.14)、M(4.93)、H(3.73)、 M9(3.58)、G(3.15)、M8A+M8B+M15(2.94)、D(2.43)、 M5(1.54)
	雄	胆汁	尿	ND	M14A+M19+M27(10.7)、M25(7.84)、M26(6.59)、M13 (4.94)、M18(3.73)、M28+M29(2.75)、N(2.58)、M12+ M22(0.87)、M24(0.64)
			雌	ND	M14A+M19+M27(11.4)、M25(8.60)、M26(5.46)、M18 (4.36)、M28+M29(3.56)、M13(3.51)、N(2.50)、M12+ M22(1.51)、M24(0.93)
	1,000	雄	尿	ND	B+M10A+M10B+M16+M18(1.49)、M19+M20(0.35)、 M8A+M8B+M15(0.21)、M21A+M21B(0.20)、M14A+ M14B(0.16)、M12(0.02)
			糞	73.6	M(1.77)、D(1.21)、M9(0.99)、B+M10A+M10B+M16+ M18(0.97)、M8A+M8B+M15(0.93)、G(0.87)、 M5(0.79)、H(0.64)
雌		尿	ND	M13(2.17)、B+M10A+M10B+M16+M18(1.44)、M8A+ M8B+M15(1.17)、M19+M20(0.59)、 M14A+M14B(0.39)、M21A+M21B(0.39)、M12(0.16)	
		糞	71.6	G(1.88)、B+M10A+M10B+M16+M18(1.51)、D(1.16)、 M(1.04)、H(0.61)、M8A+M8B+M15(0.54)、M5(0.51)、 M9(0.50)	
反復経口 投与	200 ppm (2週間)+ 10 mg/kg 体重 (単回)	雄	尿	ND	B+M10A+M10B+M16+M18(5.90)、M19+M20(2.46)、 M14A+M14B(1.67)、M8A+M8B+M15(1.38)、M21A+ M21B(1.34)、M12(0.75)、M13(0.32)
			糞	5.56	B+M10A+M10B+M16+M18(9.42)、H(6.19)、M(5.30)、 M9(5.12)、G(4.02)、D(2.64)、M8A+M8B+M15(2.22)、 M5(2.09)
		雌	尿	ND	M13(9.64)、B+M10A+M10B+M16+M18(3.64)、M8A+ M8B+M15(3.08)、M19+M20(2.26)、 M14A+M14B(1.71)、M12(1.58)、M21A+M21B(1.48)
			糞	5.84	B+M10A+M10B+M16+M18(8.12)、G(6.43)、M(5.37)、 M8A+M8B+M15(3.84)、M9(3.78)、H(2.79)、D(2.28)、 M5(1.76)

ND：検出されず

④ 排泄

a. 尿及び糞中排泄

SD ラット（一群雌雄各 5 匹）に ^{14}C -ゾキサミドを低用量若しくは高用量で単回経口投与又は 200 ppm の用量で非標識体を 2 週間混餌投与後に標識体を低用量で単回経口投与（以下 [1. (1)] において「2 週間反復経口投与」という。）して、尿及び糞中排泄試験が実施された。また、SD ラット（一群雌雄各 3 匹）に ^{14}C -ゾキサミドを低用量で 5 日間経口投与（以下 [1. (1)] において「5 日間反復経口投与」という。）して、尿及び糞中排泄試験が実施された。

最終投与後 5 日間の尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

投与放射能は、最終投与後 5 日間で単回及び 2 週間反復経口投与群では 94.9% TAR ~100% TAR 、5 日間反復経口投与群では 68.2% TAR ~71.7% TAR が尿及び糞中に排泄された。いずれの投与群においても、主に糞中に排泄された。尿中排泄率は雄より雌で高い傾向を示した。（参照 2~4、11、12）

表 4 最終投与後 5 日間の尿及び糞中排泄率 (% TAR)

投与量	単回経口投与				2 週間反復経口投与		5 日間反復経口投与	
	10 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重		200 ppm (2 週間)+ 10 mg/kg 体重(単回)		10 mg/kg 体重/日 (5 日間)	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌	雄	雌
尿 ^a	10.3	26.9	3.51	8.15	16.3	28.7	7.89	20.0
糞	87.8	73.5	92.4	88.8	78.6	71.1	60.3	51.7
血液	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.04
組織	0.16	0.17	0.04	0.05	0.58	0.19	2.69	3.27
胃内容物	—	—	—	—	—	—	0.51	0.42
胃洗浄液	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07
腸管内容物	—	—	—	—	—	—	6.97	4.93
カーカス	1.86	1.87	0.34	0.55	3.41	1.55	17.8	12.7

—：測定せず

a：ケージ洗浄液を含む。

b. 胆汁中排泄

胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雌雄各 3 匹）に ^{14}C -ゾキサミドを低用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 72 時間の胆汁中排泄率は表 5 に示されている。

投与放射能は、投与後 72 時間で胆汁中に 45.8% TAR ~47.8% TAR 、尿中に 9.49% TAR ~12.0% TAR 及び糞中に 32.2% TAR ~33.9% TAR が排泄された。（参照 11、12）

表5 投与後 72 時間の胆汁中排泄率 (%TAR)

投与量	単回経口投与 10 mg/kg 体重	
	雄	雌
胆汁	45.8	47.8
尿	9.49	12.0
糞	32.2	33.9
血液	0.01	0.01
組織	0.18	0.14
胃内容物	0.04	0.02
胃洗浄液	0.00	0.00
腸管内容物	0.05	0.04
カーカス	2.98	2.79

(2) ヤギ

泌乳ヤギ (Nubian、一群雌 1 頭) に ^{14}C -ゾキサミドを 0 及び 87.5 mg/頭/日 (0 及び 60.7 mg/kg 飼料相当) の用量で 1 日 1 回 7 日間カプセル投与して、動物体内運命試験が実施された。乳汁、尿及び糞は 1 日 2 回に、血液は 0、1 及び 3 日目の投与直前並びに最終投与 23 時間後に、主要臓器及び胆汁は最終投与 23 時間後に、それぞれ採取された。

投与放射能は、投与後 7 日間で尿中 (ケージ洗浄液を含む) に 40.9%TAR、糞中に 36.1%TAR 及び乳汁中に 0.27%TAR 認められ、乳汁中の最大値は投与 4 日の 0.236 $\mu\text{g/g}$ であった。血液及び胆汁中の残留放射能はそれぞれ 0.01%TAR 未満及び 0.10%TAR であった。臓器及び組織中の残留放射能は、肝臓で 0.450 $\mu\text{g/g}$ (0.05%TAR)、腎臓で 0.365 $\mu\text{g/g}$ (0.01%TAR)、大網脂肪で 0.197 $\mu\text{g/g}$ (0.02%TAR)、肢筋肉で 0.046 $\mu\text{g/g}$ (0.01%TAR) 及び腰部筋肉で 0.044 $\mu\text{g/g}$ (0.01%TAR 未満) であった。

乳汁、臓器及び組織中では未変化のゾキサミドは認められなかった。乳汁中の主要代謝物は D のジヒドロキシ化体の位置異性体である Pa 及び Pb であり、合量で投与 3 及び 4 日にそれぞれ 44.9%TRR 及び 37.9%TRR 検出され、ほかに代謝物 D、G 及び H が投与 3 及び 4 日にそれぞれ 8.42%TRR~20.2%TRR、7.92%TRR~11.9%TRR 及び 17.8%TRR~18.0%TRR 認められた。肝臓及び腎臓では代謝物 D、G 又は H が認められたが、いずれも 5%TRR 未満であった。筋肉では代謝物 D (15.1%TRR) 及び G (12.6%TRR) 並びに Pa 及び Pb (合量で 25.8%TRR) が認められた。脂肪では代謝物 D が 65.2%TRR、G が 15.8%TRR 検出された。ほかに肝臓、腎臓及び筋肉では極性代謝物がいずれも 7 種類 (肝臓: 14.5%TRR~23.2%TRR、腎臓: 10.5%TRR~20.1%TRR、筋肉: 2.96%TRR~8.34%TRR) 検出された。腎臓及び筋肉における代謝プロファイルは肝臓とほぼ同様であった。(参照 5、11、13)

(3) ラット (代謝物 B)

SD ラット (雄 4 匹) に ^{14}C -B (ばれいしょにおける主要代謝物) を高用量で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

投与放射能は、投与後 72 時間で尿中 (ケージ洗浄液を含む。) に 98.0%TAR、糞中に 1.70%TAR、呼気中に 0.01%TAR 未満が排泄された。尿中排泄は投与後 24 時間で、糞中排泄は投与後 48 時間でほぼ完了した。尿中放射能の 94.4%TAR が未変化の B であり、ほかに B のグルクロン酸抱合体が 3.25%TAR 認められた。糞中放射能のほとんどが未変化の B であり、ほかに B のグリシン抱合体が 0.03%TAR 認められた。投与放射能のほとんどが排泄されたため、組織中放射能の分析は実施されなかった。(参照 4、11、14)

(4) ラット (代謝物 C)

SD ラット (雄 4 匹) に ^{14}C -C (ばれいしょにおける主要代謝物) を高用量で単回経口投与して、動物体内運命試験が実施された。

投与放射能は、投与後 168 時間で糞中に 72.5%TAR、尿中に 11.1%TAR、呼気中に 0.01%TAR、ケージ洗浄液に 9.30%TAR 排泄された。下痢のため、ケージ洗浄液中放射能の多くは糞中排泄されたものとみなされた。尿及び糞中には未変化の C のみが検出された。(参照 4、11、15)

2. 植物体内運命試験

(1) ぶどう

ぶどう (品種: Concord) に、 ^{14}C -ゾキサミドを 1,670 g ai/ha の用量で茎葉部に約 4 週間隔で 3 回散布処理し、最終処理 1 日後に成熟果実を採取して、植物体内運命試験が実施された。

成熟果実の残留放射能濃度は 0.735 mg/kg であり、約 90%TRR が同定又は特徴付けされた。残留放射能の主要成分は未変化のゾキサミドで、58.3%TRR (0.429 mg/kg) 認められ、ほかに代謝物 E、F、G、I、J 及び K が同定されたが、いずれも 10%TRR 未満であった。(参照 6、11、16)

(2) ばれいしょ

植付け 39 日後のばれいしょ (品種: 不明) に、 ^{14}C -ゾキサミドを 0.8 ポンド ai/エーカー (約 900 g ai/ha) の用量で葉に 17 又は 21 日間隔で 3 回散布処理し、最終処理 14 日後に茎葉部及び塊茎を採取して、植物体内運命試験が実施された。

ばれいしょ塊茎における残留放射能濃度は 0.178 mg/kg であり、約 85%TRR が同定又は特徴付けされた。未変化のゾキサミドは認められず、主要代謝物として B が 20.9%TRR (0.037 mg/kg)、C が 39.0%TRR (0.069 mg/kg) 認められた。代謝物 B 及び C は、土壌中で生成した分解物 O が塊茎に吸収され、更に酸化代謝され生成したものであると考えられた。(参照 6、11、17)

(3) きゅうり

きゅうり（品種：Bush Champion）に、¹⁴C-ゾキサミドを 1.2 ポンド ai/エーカー（約 1,350 g ai/ha）の用量で葉に 7 日間隔で 3 回散布処理し、最終処理 1 日後に成熟果実及び成熟茎葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

残留放射能は、成熟果実で 1.53 mg/kg、成熟茎葉で 108 mg/kg 認められた。残留放射能の主要成分は未変化のゾキサミドであり、果実で最大 86.7%TRR、茎葉で最大 92.2%TRR 認められた。代謝物として、果実で D、G、K(B)等、茎葉部で D、E、F、G、K(B)、O 等が同定されたが、いずれも 10%TRR 未満であった。（参照 6、11、18）

(4) トマト

トマト（品種：Celebrity）に、¹⁴C-ゾキサミドを 0.77 ポンド ai/エーカー（約 863 g ai/ha）の用量で葉に 18 日間隔で 3 回散布処理し、最終処理 1 日後に果実及び茎葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。

残留放射能は、未成熟果実で 0.263 mg/kg、成熟果実で 0.474 mg/kg 認められた。残留放射能の主要成分は未変化のゾキサミドであり、未成熟果実で最大 48.0%TRR、成熟果実で最大 44.0%TRR 認められた。残りは少量（10%TRR 以下）の代謝物 B、D、G、O 及び極性物質であった。（参照 6、11、19）

ゾキサミドの植物における主要代謝経路は、①還元的脱ハロゲン化による代謝物 D の生成、②環化による代謝物 E の生成及び代謝物 E の加水分解による代謝物 O の生成、③これら中間代謝物の代謝的酸化と、それに続く糖及び/又はアミノ酸との結合であると考えられた。代謝物 B 及び C は、土壤中で生成した分解物 O が塊茎に吸収され、更に酸化代謝され生成したものであると考えられた。

3. 土壤中運命試験

(1) 好氣的土壤中運命試験

2 種類の米国土壤（壤質砂土及びシルト質壤土）の水分量をほ場容水量の 75% に調整し、¹⁴C-ゾキサミドを 1.5 mg/kg の用量で添加した後、好氣的条件下、25±1℃の暗所で 122 日間インキュベートして、好氣的土壤中運命試験が実施された。

処理 122 日後に未変化のゾキサミドは 6.06%TAR～10.1%TAR に減少し、主な分解物として ¹⁴CO₂ が 34.4%TAR～47.8%TAR 生成した。ほかに分解物 D、E、F 及び O が認められたが、いずれも 10%TAR 未満であった。

好氣的土壤におけるゾキサミドの推定半減期は 9.9～10.3 日と算出された。（参照 2、11、20）

(2) 好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験

壤質砂土（米国）に¹⁴C-ゾキサミドを 1.5 mg/kg の用量で添加し、好氣的条件下、25℃で 21 日間プレインキュベートした後、酸素を除去した水で湛水した。次いで、窒素ガスを通気して、嫌氣的条件下で 59 日間インキュベートして、好氣的/嫌氣的湛水土壌中運命試験が実施された。

嫌氣的条件において放射能は、水層中では 12%TAR～22%TAR、土壌層中では 76%TAR～83%TAR で推移した。¹⁴CO₂は、4.60%TAR～5.11%TAR 生成した。土壌における抽出残渣は、嫌氣的条件開始時の 27.3%TAR から 30 日後に最大 56.4%TAR に達した。土壌抽出液中において、未変化のゾキサミドは嫌氣的条件開始時の 47.4%TAR から 59 日後の 2.43%TAR に減少し、59 日後に分解物 D が最大 13.5%TAR、分解物 O が最大 16.9%TAR 認められた。ほかに 7 種類の分解物が検出されたが、いずれも 1%TAR 未満であった。抽出残渣は主にフミン酸、フルボ酸及びヒューミン画分に分布していた。

嫌氣的湛水土壌におけるゾキサミドの推定半減期は 14.2 日と算出された。（参照 11、20）

(3) 土壌表面光分解試験

壤質砂土（採取地不明）に¹⁴C-ゾキサミドを 1.0 mg/kg の用量で添加し、25℃で 30 日間キセノン光（光強度及び波長不明）を 12 時間の明暗サイクルで照射して、土壌表面光分解試験が実施された。

光照射区において、未変化のゾキサミドは照射開始時の 102%TAR から 30 日後の 14.0%TAR に減少し、30 日後に分解物 D が 8.52%TAR、分解物 O が 22.2%TAR 認められた。ほかに 10 種類の分解物が検出されたが、いずれも 7%TAR 未満であった。¹⁴CO₂の生成は 1%TAR 未満であった。

暗対照区において、ゾキサミドの分解速度及び分解物の種類が光照射区と類似したため、ゾキサミドの分解は主に加水分解又は微生物によるものであり、光照射によるものではないと考えられた。

土壌表面において、ゾキサミドの推定半減期は 7.03 日と算出された。（参照 2、11、20）

(4) 土壌吸脱着試験

5 種類の米国土壌〔壤土、シルト質埴壤土、シルト質壤土及び砂壤土（2 種類）〕を用いた¹⁴C-ゾキサミドの土壌吸脱着試験が実施された。

各土壌における Freundlich の有機炭素含有率により補正した吸着係数は 815～1,430、有機炭素含有率により補正した脱着係数は 927～1,670 であった。（参照 2、11、20）

4. 水中運命試験

(1) 加水分解試験

pH 4、7 及び 9 の滅菌水に ¹⁴C-ゾキサミドを添加（添加濃度不明）し、25°C で 30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。

処理 30 日後において、未変化のゾキサミドは pH 4 で 32.0%TAR、pH 7 で 24.7%TAR、pH 9 で 7.08%TAR 認められた。いずれの pH においても分解物 D、E、F、G、K 及び O が認められ、pH 4 では K（最大 37.6%TAR）及び O（最大 30.9%TAR）、pH 7 では E（最大 24.5%TAR）、G（最大 21.9%TAR）及び O（最大 20.8%TAR）、pH 9 では E（最大 16.4%TAR）、G（最大 50.2%TAR）及び O（最大 11.5%TAR）が 10%TAR を超えて認められた。

25°C での加水分解によるゾキサミドの推定半減期は、pH 4 で 15.5 日、pH 7 で 15.7 日、pH 9 で 8.1 日と算出された。（参照 2、11、20）

(2) 水中光分解試験

pH 4 の滅菌緩衝液に ¹⁴C-ゾキサミドを 0.5 mg/L の濃度となるように添加し、25°C で光（光源、光強度及び波長不明）を 30 日間照射して、水中光分解試験が実施された。

光照射区において、未変化のゾキサミドは照射開始時の 98.0%TAR から 30 日後には 6.99%TAR に減少し、分解物 F が 42.4%TAR、分解物 O が 27.7%TAR 認められた。暗対照区において、30 日後に分解物 F が 1.00%TAR、分解物 O が 44.6%TAR 認められたため、光分解物は O ではなく、F のみと考えられた。

水中光分解におけるゾキサミドの推定半減期は 7.8 日と算出された。（参照 2、11、20）

5. 土壌残留試験

土壌残留試験については、参照した資料に記載がなかった。

6. 作物残留試験

海外において、野菜、果実等を用いてゾキサミドを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。たまねぎについては、代謝物 B 及び C も分析対象化合物とされた。

結果は別紙 3 に示されている。

ゾキサミドの最大残留値は、最終散布 3 日後に収穫したとうがらしの 0.823 mg/kg、代謝物 B の最大残留値は、最終散布 7 日後に収穫したたまねぎの 0.0529 mg/kg であった。代謝物 C は全て定量限界（0.007 mg/kg）未満であった。（参照 5、11、21、22、56、57）

7. 一般薬理試験

一般薬理試験については、参照した資料に記載がなかった。

8. 急性毒性試験

(1) 急性毒性試験

ゾキサミド（原体）のラット及びマウスを用いた急性毒性試験が実施された。
結果は表 6 に示されている。（参照 2、3、11、23～26）

表 6 急性毒性試験概要（原体）

投与経路	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
経口 ^a	SD ラット 雌雄各 6 匹	>5,000	>5,000	雌雄：5,000 mg/kg 体重 雌雄：眼及び/又は鼻口部に赤色着色物(投与 1 日)及び白色物を含む便(投与 1 日) 雌：体重増加抑制 雌雄：死亡例なし
	ICR マウス 雌雄各 6 匹	>5,000	>5,000	雌雄：5,000 mg/kg 体重 雌雄：症状及び死亡例なし
経皮 ^b	SD ラット 雌雄各 6 匹	>2,000	>2,000	雌雄：糞便量減少、乾燥及び/又は発赤を含む皮膚の変化 雌雄：死亡例なし
吸入 ^c	SD ラット 雌雄各 6 匹	LC ₅₀ (mg/L)		雌雄：症状及び死亡例なし
		>5.3	>5.3	

a：溶媒としてコーン油が用いられた。

b：溶媒として蒸留水が用いられた。

c：4 時間ばく露（粉じん）

代謝物 B 及び C を用いた急性経口毒性試験が実施された。

結果は表 7 に示されている。（参照：11、27、28）

表 7 急性経口毒性試験概要（代謝物）

被験物質	動物種 性別・匹数	LD ₅₀ (mg/kg 体重)		観察された症状
		雄	雌	
B ^a	ICR マウス 雌雄各 6 匹	>5,000	>5,000	雄：糞便量減少 雄：死亡例なし 雌：症状及び死亡例なし
C ^a	ICR マウス 雌雄各 6 匹	>5,000	>5,000	雌雄：糞便量減少 雌雄：死亡例なし

a：溶媒としてコーン油が用いられた。

(2) 急性神経毒性試験

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口投与（原体：0、125、500 及び 2,000 mg/kg 体重、溶媒：コーン油）による急性神経毒性試験が実施された。

神経病理学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったため、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 2,000 mg/kg 体重であると考えられた。急性神経毒性は認められなかった。（参照 2～4、11、29）

9. 眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験（原体及び原体混在物①）

NZW ウサギを用いた眼及び皮膚刺激性試験が実施された。眼に対する刺激性試験では、角膜混濁及び結膜炎が全例（6 例）に認められたが、7 日後には全て消失し、適用 24 時間後に虹彩炎が 1 例に認められたが、48 時間後には消失した。これらの結果から、ウサギの眼に対して中等度の刺激性があると考えられた。皮膚に対する刺激性は認められなかった。

(DH) fBR 又は Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験が実施され、Maximization 法で 100%、Buehler 法で 80%～90%に紅斑がみられ、強い感作性が認められた。

原体混在物①の Hartley 雌モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maximization 法）が実施され、95%が陽性を示し、感作性が認められた。（参照 2、3、11、30～34、56、58）

10. 亜急性毒性試験

(1) 90 日間亜急性毒性/神経毒性併合試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌投与（原体：0、1,000、5,000 及び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 8 参照）による 90 日間亜急性毒性/神経毒性併合試験が実施された。

表 8 90 日間亜急性毒性/神経毒性併合試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群		1,000 ppm	5,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	74	372	1,510
	雌	80	401	1,620

神経病理学的検査において、検体投与による影響は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 20,000 ppm（雄：1,510 mg/kg 体重/日、雌：1,620 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められなかった。（参照 2～4、11、37）

(2) 90日間亜急性毒性試験（マウス）

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌投与（原体：0、70、700、2,500 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 9 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 9 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		70 ppm	700 ppm	2,500 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	12	123	436	1,210
	雌	17	174	574	1,670

7,000 ppm 投与群の雌で体重増加抑制傾向が認められたが、個体間のばらつきが大きく、統計学的有意差がないため、検体投与による影響ではないと考えられた。

7,000 ppm 投与群の雌で肝比重量²増加が認められたが、肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化が認められなかったため、適応性変化であると考えられた。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,000 ppm（雄：1,210 mg/kg 体重/日、雌：1,670 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2～4、11、35）

(3) 90日間亜急性毒性試験（イヌ）

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌投与（原体：0、1,500、7,500 及び 30,000 ppm：平均検体摂取量は表 10 参照）による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。

表 10 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量

投与群		1,500 ppm	7,500 ppm	30,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	54.6	281	1,140
	雌	61.8	322	1,050

各投与群で認められた毒性所見は表 11 に示されている。

7,500 ppm 投与群の雄 1 例で若年性多発性動脈炎症候群と推定される所見が、30,000 ppm 投与群の雌 1 例で多臓器の壊死性血管炎が認められたため、それぞれ切迫と殺された。また、7,500 ppm 投与群の雄 1 例及び 30,000 ppm 投与群の雄 1 例で同症候群の一時的な徴候が認められた。これらの変化はビーグル犬の自然発生病変であり、検体投与による影響ではないと判断した。

² 体重比重量を比重量という（以下同じ。）。

7,500 ppm 投与群の雌で肝絶対及び比重量増加が認められたが、肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化が認められなかったため、適応性変化であると考えられた。

本試験において、30,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 7,500 ppm (雄 : 281 mg/kg 体重/日、雌 : 322 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 2~4、11、36)

表 11 90 日間亜急性毒性試験(イヌ)で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
30,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重減少(投与 1~2 週)/増加抑制(投与 3 週以降)及び摂餌量減少(投与 1、5~10 週) ・ Lym 減少 ・ Alb 減少及び A/G 比低下 ・ 肝絶対^a及び比重量増加 ・ 甲状腺ろ胞上皮細胞肥大^a ・ び慢性肝細胞肥大 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重減少(投与 1~2 週)/増加抑制(投与 3 週以降)及び摂餌量減少(投与 1 週以降) ・ RBC 減少 ・ MCH 及び MCHC 増加 ・ 肝絶対^a及び比重量増加 ・ 甲状腺ろ胞上皮細胞肥大^a ・ び慢性肝細胞肥大
7,500 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

^a : 統計学的有意差はないが、検体投与による影響と判断した。

(4) 28 日間亜急性経皮毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌雄各 10 匹) を用いた経皮投与 (原体 : 0、150、400 及び 1,000 mg/kg 体重/日、6 時間/日、5 日/週) による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。

全ての検体投与群で閉塞処置した皮膚に痂皮及び発赤が認められ、組織学的検査では、皮脂腺の過形成、表皮の過形成、角化及び炎症性浮腫、真皮の多病巣性血管炎又は血管周囲炎が認められた。

本試験において、150 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で強い皮膚刺激性が認められたため、皮膚に対する無毒性量は求められなかった。検体投与による全身性の毒性所見はいずれの投与群においても認められなかったことから、一般毒性の無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。(参照 2~4、11、38)

(5) 28 日間亜急性毒性試験 (原体混在物②、ラット)

SD ラット (一群雌雄各 6 匹) を用いた強制経口投与 (原体混在物② : 0、15、150 及び 300 mg/kg 体重/日、溶媒 : 蒸留水) による 28 日間亜急性毒性試験が実施された。

各投与群で認められた毒性所見は表 12 に示されている。

本試験において、150 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で歩行異常、自発運動量増加等が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 15 mg/kg 体重/日であると考え

られた。(参照 2~4、11、56、59)

表 12 28 日間亜急性毒性試験 (原体混在物②、ラット) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
300 mg/kg 体重/日	<ul style="list-style-type: none"> ・流涎^a ・体重増加抑制及び摂餌量減少 ・TG 及び Ca 増加 ・肝絶対及び対脳重量比³増加 ・副腎絶対及び比重量増加 ・前胃角化亢進 	<ul style="list-style-type: none"> ・流涎^a ・Chol 及び ALP 増加 ・塩素減少 ・肝絶対、比重量及び対脳重量比増加 ・小葉中心性又は小葉中間帯肝細胞肥大
150 mg/kg 体重/日以上	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行異常^a ・自発運動量増加 ・Chol 増加 ・塩素減少 ・肝比重量増加 ・腎絶対^b及び比重量増加 ・小葉中心性又は小葉中間帯肝細胞肥大 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行異常^a ・自発運動量増加^c
15 mg/kg 体重/日	毒性所見なし	毒性所見なし

a : 統計学的有意差はないが、検体投与による影響と判断した。

b : 300 mg/kg 体重/日投与群では、腎絶対重量に統計学的有意差はないが、検体投与による影響と判断した。

c : 150 mg/kg 体重/日投与群では、自発運動量に統計学的有意差はないが、検体投与による影響と判断した。

1 1. 慢性毒性試験及び発がん性試験

(1) 1 年間慢性毒性試験 (イヌ)

ビーグル犬 (一群雌雄各 4 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、1,500、7,500 及び 30,000 ppm : 平均検体摂取量は表 13 参照) による 1 年間慢性毒性試験が実施された。

表 13 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) の平均検体摂取量

投与群		1,500 ppm	7,500 ppm	30,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	50.1	255	1,020
	雌	47.5	278	994

各投与群で認められた毒性所見は表 14 に示されている。

1,500 ppm 投与群の雄 1 例で、若年性多発性動脈炎症候群を証拠付ける組織学的所見が認められ、30,000 ppm 投与群の雌 1 例が、同症候群様病態発症のため切迫と殺された。これらの変化はビーグル犬でみられる自然発生病変であり、検

³ 脳重量に比した重量を対脳重量比という。(以下同じ。)

体投与による影響ではないと判断した。

7,500 ppm 投与群の雌で肝比重量増加が認められたが、肝毒性を示唆する血液生化学的パラメータの変化及び病理組織学的変化が認められなかったことから、適応性変化であると考えられた。

本試験において、30,000 ppm 投与群の雄及び 7,500 ppm 以上投与群の雌で体重増加抑制等が認められたことから、無毒性量は雄で 7,500 ppm (255 mg/kg 体重/日)、雌で 1,500 ppm (47.5 mg/kg 体重/日) であると考えられた。(参照 4、11、39)

表 14 1 年間慢性毒性試験 (イヌ) で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
30,000 ppm	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体重増加抑制(投与 3 週以降)及び摂餌量減少^a(投与 1 週以降) ・ ALP 増加 ・ Alb 減少 ・ 肝絶対及び比重量増加 ・ び慢性肝細胞肥大 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 摂餌量減少(投与 1 週以降) ・ ALP 増加 ・ Alb 減少 ・ 肝比重量増加 ・ 甲状腺絶対及び比重量増加 ・ び慢性肝細胞肥大
7,500 ppm 以上	7,500 ppm 以下 毒性所見なし	・ 体重減少 ^b /増加抑制 ^c 。 毒性所見なし
1,500 ppm		

^a : 統計学的有意差はないが、検体投与による影響と判断した。

^b : 30,000 ppm 投与群で投与 1~3 週、7,500 ppm 投与群で投与 2 週

^c : 30,000 ppm 投与群で投与 4 週以降、7,500 ppm 投与群で投与 3 週以降

(2) 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット)

SD ラット (主群 : 一群雌雄各 60 匹、中間と殺群 : 一群雌雄各 10 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、1,000、5,000 及び 20,000 ppm : 平均検体摂取量は表 15 参照) による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。

表 15 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラット) の平均検体摂取量

投与群		1,000 ppm	5,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	51	260	1,060
	雌	65	328	1,330

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

本試験において、いずれの投与群でも毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 20,000 ppm (雄 : 1,060 mg/kg 体重/日、雌 : 1,330 mg/kg 体重/日) であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照 4、11、40)

(3) 18 か月間発がん性試験 (マウス)

ICR マウス (一群雌雄各 60 匹) を用いた混餌投与 (原体 : 0、350、1,750 及

び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 16 参照）による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 16 18 か月間発がん性試験（マウス）の平均検体摂取量

投与群		350 ppm	1,750 ppm	7,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	51.1	251	1,020
	雌	60.4	326	1,290

検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。

7,000 ppm 投与群の雄で軽度の体重増加抑制が認められたが、一過性のものであり、毒性学的意義は低いと考えられた。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量 7,000 ppm（雄：1,020 mg/kg 体重/日、雌：1,290 mg/kg 体重/日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2～4、11、41）

1 2. 生殖発生毒性試験

(1) 2 世代繁殖試験（ラット）

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌投与（原体：0、1,000、5,000 及び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 17 参照）による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 17 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群			1,000 ppm	5,000 ppm	20,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	P 世代	雄	71.4	360	1,470
		雌	82.0	409	1,620
	F ₁ 世代	雄	100	489	2,090
		雌	108	534	2,240

本試験において、20,000 ppm 投与群の親動物の雌で体重増加抑制が認められ、児動物ではいずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は親動物の雄で本試験の最高用量 20,000 ppm（P 雄：1,470 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：2,090 mg/kg 体重/日）、雌で 5,000 ppm（P 雌：409 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：534 mg/kg 体重/日）、児動物で本試験の最高用量 20,000 ppm（P 雄：1,470 mg/kg 体重/日、P 雌：1,620 mg/kg 体重/日、F₁ 雄：2,090 mg/kg 体重/日、F₁ 雌：2,240 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 2、3、11、42）

(2) 発生毒性試験 (ラット)

SD ラット (一群雌 25 匹) の妊娠 6~15 日に強制経口投与 (原体 : 0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : コーン油) して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 2~4、11、43)

(3) 発生毒性試験 (ウサギ)

NZW ウサギ (一群雌 16 匹) の妊娠 7~19 日に強制経口投与 (原体 : 0、100、300 及び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒 : 0.5%MC 水溶液) して、発生毒性試験が実施された。

本試験において、いずれの投与群においても毒性所見は認められなかったことから、無毒性量は母動物及び胎児とも本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。(参照 2~4、11、44)

1 3. 遺伝毒性試験

ゾキサミド原体の細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来培養細胞 (CHO) を用いた遺伝子突然変異試験 (*Hgpprt*) 及び染色体異常試験並びにマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 18 に示されている。

チャイニーズハムスター卵巣由来培養細胞 (CHO) を用いた染色体異常試験において、代謝活性化系存在下及び非存在下で数的染色体異常誘発が認められたが、*in vivo* 小核試験を含む他の試験では全て陰性であったため、ゾキサミドには生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。(参照 2~4、11、45~48)

表 18 遺伝毒性試験概要（原体）

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
<i>in vitro</i>	復帰突然変異試験	<i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、TA1535 及び TA1537 株)	①50～5,000 µg/プレート(+/-S9) ②16～160 µg/プレート(-S9) 30～300 µg/プレート(+S9)	陰性
	遺伝子突然変異試験 (<i>Hgprt</i>)	チャイニーズハムスター 卵巣由来培養細胞(CHO)	①5.0～65 µg/mL(-S9) 2.0～55 µg/mL(+S9) ②20～50 µg/mL(-S9) 25～55 µg/mL(+S9) (いずれも 4 時間処理)	陰性
	染色体異常試験	チャイニーズハムスター 卵巣由来培養細胞(CHO)	①0.97～4.04 µg/mL(-S9) 1.98～16.8 µg/mL(+S9) (-S9 : 20 時間処理、+S9 : 3 時間処理、17 時間培養) ②0.97～5.77 µg/mL(-S9) 1.98～49.0 µg/mL(+S9) (-S9 : 20 時間処理、+S9 : 3 時間処理、17 時間培養) ③0.97～2.83 µg/mL(-S9) 1.98～16.8 µg/mL(+S9) (-S9 : 44 時間処理、+S9 : 3 時間処理、41 時間培養)	数的染色体異常誘発 (+/-S9)
<i>in vivo</i>	小核試験 ^a	ICR マウス(骨髄細胞) (一群雌雄各 5 匹)	200、1,000 及び 2,000 mg/kg 体重 (単回強制経口投与 24 及び 48 時間後に採取)	陰性

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

^a : 骨髄分布試験 [14. (1)] において、2,000 mg/kg 体重の経口投与により、被験物質が骨髄に分布することが確認された。投与 4、8、24 及び 48 時間後における平均放射能濃度は、雄でそれぞれ 55.5、34.1、8.9 及び 5.1 µg/g、雌でそれぞれ 39.3、25.0、8.5 及び 5.0 µg/g であった。

主として動物及び植物由来の代謝物 B 及び植物由来の代謝物 C の細菌を用いた復帰突然変異試験並びに原体混在物②のヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験が実施された。

試験結果は表 19 に示されているとおり、代謝物 B 及び C について、結果は陰性であった。原体混在物②について、染色体異常試験が代謝活性化系非存在下で陽性であった。（参照 4、11、49、50、56、60）

表 19 遺伝毒性試験概要(代謝物及び原体混在物)

試験		対象	処理濃度・投与量	結果
代謝物 B	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、 TA1535 及び TA1537 株)	50～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
代謝物 C	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、 TA1535 及び TA1537 株)	50～5,000 µg/プレート (+/-S9)	陰性
原体混 在物②	染色体異常 試験	ヒト末梢血リンパ球	① 0.2～0.6%v/v(-/+S9) (3時間処理、16時間培養) ② 0.0025～0.01%v/v(-S9) 0.2～0.6%v/v(+S9) (-S9 : 19時間連続処理、 +S9 : 3時間処理、16時 間培養)	陽性 ^a

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

^a : ①において、代謝活性化系非存在下の処理濃度 0.4%v/v 以上で、染色体異常(構造異常)出現細胞数が有意に増加した。②において、代謝活性化系非存在下の全処理濃度で、染色体異常(構造異常)出現細胞数が有意に増加した。

14. その他の試験

(1) 骨髄分布試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各4匹)に¹⁴C-ゾキサミドを2,000 mg/kg 体重(溶媒: コーン油)の用量で単回強制経口投与して、骨髄分布試験が実施された。

投与4、8、24及び48時間後における骨髄中の平均放射能濃度は、雄でそれぞれ55.5、34.1、8.9及び5.1 µg/g、雌でそれぞれ39.3、25.0、8.5及び5.0 µg/gであり、経口投与されたゾキサミドが骨髄に到達していることが確認された。(参照11、51)

Ⅲ. 食品健康影響評価

参照に挙げた資料を用いて、農薬「ゾキサミド」の食品健康影響評価を実施した。第3版の改訂に当たっては、リスク管理機関から、作物残留試験（ピーマン及びとうがらし）、28日間亜急性毒性試験（原体混在物、ラット）、遺伝毒性試験（原体混在物）の成績等が新たに提出された。

¹⁴Cで標識したゾキサミドのラットを用いた動物体内運命試験の結果、低用量単回投与後72時間の吸収率は少なくとも58.5%と算出された。投与放射能は、投与後120時間で68.2%¹⁴C-TAR~100%¹⁴C-TARが尿及び糞中へ排泄され、主に糞中に排泄された。未変化のゾキサミドは尿及び胆汁中には認められず、糞中にのみ認められた。主な代謝物として、尿及び糞中ではM8A、M8B及びM15の混合物並びにB、M10A、M10B、M16及びM18の混合物が、胆汁中ではM14A、M19及びM27の混合物並びにM18、M25及びM26が認められた。

¹⁴Cで標識したゾキサミドの泌乳ヤギを用いた体内運命試験の結果、10%¹⁴C-TRRを超える代謝物としてD、G、H及びPa+Pbが認められた。

¹⁴Cで標識したゾキサミドを用いた植物体内運命試験の結果、ばれいしょ塊茎では、主要代謝物として、B及びCが10%¹⁴C-TRR以上検出された。ほかの作物における残留放射能の主要成分は未変化のゾキサミドであった。

海外において、野菜、果実等を用いてゾキサミド並びに代謝物B及びC（たまねぎのみ）を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された結果、ゾキサミドの最大残留値はとうがらしの0.823 mg/kg、代謝物Bの最大残留値はたまねぎの0.0529 mg/kgであった。代謝物Cは全て定量限界（0.007 mg/kg）未満であった。

各種毒性試験結果から、ゾキサミド投与による影響は、主にイヌにおける体重（増加抑制）及び肝臓（重量増加、び慢性肝細胞肥大等）に認められた。神経毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。

植物体内運命試験の結果、10%¹⁴C-TRRを超える代謝物としてB及びCが認められたが、代謝物Bはラットで認められていること及び代謝物Cはラットで認められていないが、急性毒性が弱く（LD₅₀：5,000 mg/kg 体重超）、復帰突然変異試験結果が陰性であったことから、農産物中のばく露評価対象物質をゾキサミド（親化合物のみ）と設定した。

各試験における無毒性量等は表20に示されている。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の47.5 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.47 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、ゾキサミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。

ADI	0.47 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	47.5 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD 設定の必要なし

<参考>

<JMPR、2007 年>

ADI	0.5 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	48 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD 設定の必要なし

<EFSA、2017 年>

ADI	0.5 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	50 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

ARfD 設定の必要なし

<米国、2001 年>

cRfD	0.48 mg/kg 体重/日
(cRfD 設定根拠資料)	慢性毒性試験
(動物種)	イヌ
(期間)	1 年間

(投与方法)	混餌
(無毒性量)	48 mg/kg 体重/日
(不确实係数)	100

aRfD 設定なし

(参照 2、52、61)

表 20 各試験における無毒性量等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾		
			JMPR	米国	食品安全委員会
ラット	90 日間 亜急性 毒性/ 神経毒性 併合試験	0、1,000、5,000、 20,000 ppm	1,510 毒性所見なし (亜急性神経毒性は 認められない)	雄：1,510 雌：1,620 雌雄：毒性所見なし (亜急性神経毒性は 認められない)	雄：1,510 雌：1,620 雌雄：毒性所見なし (亜急性神経毒性は 認められない)
		雄：0、74、372、1,510 雌：0、80、401、1,620			
	2 年間 慢性毒性/ 発がん性 併合試験	0、1,000、5,000、 20,000 ppm	1,060 毒性所見なし (発がん性は認めら れない)	1,060 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認めら れない)	雄：1,060 雌：1,330 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認めら れない)
		雄：0、51、260、1,060 雌：0、65、328、1,330			
2 世代 繁殖試験	0、1,000、5,000、 20,000 ppm	親動物及び児動物 雄：1,470～2,090 雌：1,620～2,240 親動物及び児動物：毒性所見なし (繁殖能に対する影 響は認められない)	親動物 雄：1,470 雌：409 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制 児動物 雄：2,090 雌：2,240 雌雄：毒性所見なし (繁殖能に対する影 響は認められない)	親動物 P 雄：1,470 P 雌：409 F ₁ 雄：2,090 F ₁ 雌：534 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制 児動物 P 雄：1,470 P 雌：1,620 F ₁ 雄：2,090 F ₁ 雌：2,240 雌雄：毒性所見なし (繁殖能に対する影 響は認められない)	
	P ₁ 雄：0、71.4、360、 1,470 P ₁ 雌：0、82.0、409、 1,620 F ₁ 雄：0、100、489、 2,090 F ₁ 雌：0、108、534、 2,240				
	発生毒性 試験	0、100、300、1,000	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)
マウス	90 日間 亜急性 毒性試験	0、70、700、2,500、 7,000 ppm	雄：1,210 雌：574 雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制	1,670 雌雄：毒性所見なし	雄：1,210 雌：1,670 雌雄：毒性所見なし
		雄：0、12、123、436、 1,210 雌：0、17、174、574、 1,670			

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量(mg/kg 体重/日) ¹⁾		
			JMPR	米国	食品安全委員会
	18 か月間 発がん性 試験	0、350、1,750、7,000 ppm ----- 雄：0、51.1、251、 1,020 雌：0、60.4、326、 1,290	1,020 毒性所見なし (発がん性は認めら れない)	雄：1,020 雌：1,290 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認めら れない)	雄：1,020 雌：1,290 雌雄：毒性所見なし (発がん性は認めら れない)
ウサギ	発生毒性 試験	0、100、300、1,000	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)	母動物：1,000 胎児：1,000 母動物及び胎児：毒 性所見なし (催奇形性は認めら れない)
イヌ	90 日間 亜急性 毒性試験	0、1,500、7,500、 30,000 ppm ----- 雄：0、54.6、281、 1,140 雌：0、61.8、322、 1,050	281 体重増加抑制、 RBC 減少、甲状腺 肥大等	雄：281 雌：62 雄：Alb 減少、A/G 比低下等 雌：肝絶対及び比重 量増加	雄：281 雌：322 雌雄：体重増加抑制 等
	1 年間 慢性毒性 試験	0、1,500、7,500、 30,000 ppm ----- 雄：0、50.1、255、 1,020 雌：0、47.5、278、 994	雄：255 雌：48 雌雄：体重増加抑制	雄：50 雌：48 雌雄：体重増加抑制 等	雄：255 雌：47.5 雌雄：体重増加抑制 等
ADI(cRfD)			NOAEL：48 SF：100 ADI：0.5	NOAEL：48 UF：100 cRfD：0.48	NOAEL：47.5 SF：100 ADI：0.47
ADI(cRfD)設定根拠資料			イヌ 1 年間慢性毒 性試験	イヌ 1 年間慢性毒 性試験	イヌ 1 年間慢性毒 性試験

NOAEL：無毒性量 UF：不確実係数 SF：安全係数 cRfD：慢性参照用量 ADI：許容一日摂取量

¹⁾：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。

<別紙1 : 代謝物/分解物/原体混在物略称>

記号	化学名
B	3,5-dichloro-4-hydroxymethyl-benzoic acid
C	3,5-dichloro-terephthalic acid
D	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methylacetyl)- <i>p</i> -toluamide
E	(<i>RS</i>)-2-(3,5-dichloro- <i>p</i> -tolyl)-4-ethyl-4-methyl-4 <i>H</i> -1,3-oxazin-5-(6 <i>H</i>)-one
F	3,5-dichloro- <i>p</i> -toluamide
G	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(1-ethyl-3-hydroxy-1-methylacetyl)- <i>p</i> -toluamide
H	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methylacetyl)-4-hydroxymethyl-benzamide
I	3,5-dichloro-4-hydroxymethyl-benzamide
J	2,6-dichloro-4-carbamoylbenzoic acid
K	3-amino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-4-methyl-benzoate
L	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-hydroxymethyl- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-chloroacetyl)-benzamide
M	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -1-(1-methyl-1-hydroxy-carbonylpropyl)- <i>p</i> -toluamide
N	(<i>RS</i>)-3-methyl-3-(3,5-dichloro-4-methylbenzolyamino)-2-oxopentanoic acid
O	3,5-dichloro-4-methyl-benzoic acid
Pa、 Pb	3,5-dichloro- <i>N</i> -(3-hydroxy-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-4-hydroxy-methylbenzamide (代謝物 D のジヒドロキシ化体の位置異性体)
M5	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-methylsulfinylacetyl)- <i>p</i> -toluamide
M8A	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-hydroxymethyl- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-methylsulfonyl acetyl)benzamide
M8B	(<i>RS</i>)-1-[glycino-L-cystein- <i>S</i> -yl]-3-methyl-3-(3,5-dichloro-4-methyl-benzolyamino)-2-oxopentane
M9	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-hydroxymethyl- <i>N</i> -1-(1-methyl-1-hydroxy-carbonylpropyl)-benzamide
M10A	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-hydroxymethyl- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-hydroxy-acetyl)-benzamide
M10B	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-hydroxymethyl- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-methyl-sulfinyl acetyl)- benzamide
M12	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(1-ethyl-1-carboxyl-acetyl)- <i>p</i> -toluamide
M13	(<i>RS</i>)-1-(L-acetylcystein- <i>S</i> -yl)-3-methyl-3-(3,5-dichloro-4-methyl-benzolyamino)-2-oxopentane
M14A	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-(β-D-glucopyranos-1- <i>O</i> -yl-methyl)- <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-methylsulfinyl acetyl)- benzamide
M14B	(<i>RS</i>)-3-methyl-3-(3,5-dichloro-4-hydroxymethylbenzolyamino)-2-oxopentanoic acid
M15	(<i>RS</i>)-1-(L-acetylcystein- <i>S</i> -yl)3-methyl-3-(3,5-dichloro-4-hydroxymethyl-benzolyamino)-2-oxopentane
M16	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-carboxyl- <i>N</i> -1-(1-methyl-1-ethylacetyl)-benzamide
M18	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-(β-D-glucopyranos-1- <i>O</i> -yl-methyl) <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-acetyl)- benzamide
M19	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro-4-(β-D-glucopyranos-1- <i>O</i> -yl-methyl) <i>N</i> -(1-ethyl-1-methyl-3-hydroxyacetyl)-benzamide
M20	(<i>RS</i>)-4-(3,5-dichloro-4-hydroxymethylbenzoylamino)-4-carboxy-butanamide
M21A	(<i>RS</i>)-2-(4-carboxymethyl-amonocarbonyl-3,5-dichlorobenzoylamino)-2-hydroxymethylbutanoic acid
M21B	Hydroxylate (position unspecified) of M10A
M22	(<i>RS</i>)-3-carboxy-5-(1-methyl-1-(3,5-dichloro-4-methylbenzoylamino)-1-propyl)-1-oxo-2,3-dihydro-1,4-thiazine

記号	化学名
M24	(<i>RS</i>)-3-(3,5-dichloro-4-methyl-benzoylamino)-3-methyl-4-oxo-pentanyl) sulfinyl)-2-acetoamino-propionic acid
M25	(<i>RS</i>)-3,5-dichloro- <i>N</i> -(3-(β-D-glucopyranos-1- <i>O</i> -yl)-1-ethyl-1-methyl-acetonyl)- <i>p</i> -toluamide
M26	(<i>RS</i>)-3-(1-ethyl-1-methyl-1-(3,5-dichloro-4-methylbenzoylamino)-acetonyl) glutathione- <i>S</i> -conjugate
M27	(<i>RS</i>)-3-(1-ethyl-1-methyl-1-(3,5-dichloro-4-hydroxymethylbenzoylamino) acetonyl) glutathione- <i>S</i> -conjugate
M28	(<i>RS</i>)-3-(3,5-dichloro-4-carboxyl-benzoylamino)-3-methyl-4-oxo-pentanylsulfinyl-2-acetoamino-propionic acid
M29	(<i>RS</i>)-3-(3,5-dichloro-4-carboxyl-benzoylamino)-3-methyl-4-oxo-pentanylsulfonyl-2-acetoamino-propionic acid
原体混在物①	—
原体混在物②	—

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
A/G 比	アルブミン/グロブリン比
ai	有効成分量
Alb	アルブミン
ALP	アルカリホスファターゼ
AUC	薬物濃度曲線下面積
Ca	カルシウム
Chol	コレステロール
C _{max}	最高濃度
EFSA	欧州食品安全機関
EPA	米国環境保護庁
Hgprt	ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ
LC ₅₀	半数致死濃度
LD ₅₀	半数致死量
Lym	リンパ球数
Hb	ヘモグロビン
JMPR	FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議
MC	メチルセルロース
MCH	平均赤血球血色素量
MCHC	平均赤血球血色素濃度
PHI	最終使用から収穫までの日数
RBC	赤血球数
T _{1/2}	消失半減期
TAR	総投与（処理）放射能
TG	トリグリセリド
T _{max}	最高濃度到達時間
TRR	総残留放射能

<別紙3：作物残留試験成績（海外）>

作物名：たまねぎ

試験実施場所 (国) [実施年]	品種	試験 ほ場数	使用量/回 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	残留値(mg/kg)			
					ゾキサミド	代謝物 B	代謝物 C	合量値 ^b
米国 [2011年]	Norstar	1	1,490	7	0.166 0.158	0.0385 0.0341	<0.007 <0.007	0.205 0.192
カナダ [2011年]	Redbull	1	1,510	7	0.443 0.426	<0.007 <0.02(0.0097 1)	<0.007 <0.007	0.443 0.436
カナダ [2011年]	Hamlet	1	1,480	7	0.262 0.180	<0.02(0.0184) <0.02(0.0183)	<0.007 <0.007	0.280 0.199
米国 [2011年]	Paterson	1	1,490	3	0.344 0.334	0.0288 0.0329	<0.007 <0.007	0.373 0.367
				7	0.285 0.242	0.0241 0.0284	<0.007 <0.007	0.309 0.271
				10	0.281 0.304	<0.02(0.0141) 0.0319	<0.007 <0.007	0.296 0.336
				14	0.175 0.158	0.0264 0.0267	<0.007 <0.007	0.202 0.185
米国 [2011年]	Yellow Onions	1	1,490	7	0.245 0.119	0.0432 0.0398	<0.007 <0.007	0.288 0.159
米国 [2012年]	Yellow U.S. No.1	1	1,500	7	<0.02(0.0159) 0.0201	0.0232 0.0222	<0.007 <0.007	0.0391 0.0424
米国 [2011年]	Sweet Sunrise	1	1,480	7	0.0741 0.0671	0.0455 0.0529	<0.007 <0.007	0.120 0.120
米国 [2011年]	Texas Swet	1	1,490	6	0.0350 0.0315	<0.02(0.0145) <0.02(0.0163)	<0.007 <0.007	0.0495 0.0478
米国 [2012年]	Red Wing	1	1,510	7	0.102 0.0689	0.0260 <0.02(0.0189)	<0.007 <0.007	0.128 0.0878
米国 [2011年]	Swet Pak	1	1,490	7	0.121 0.0859	0.0331 0.0393	<0.007 <0.007	0.154 0.125
米国 [2011年]	Harmony	1	1,500	7	0.214 0.189	<0.02(0.0182) <0.02(0.0173)	<0.007 <0.007	0.232 0.206
米国 [2011年]	Vaquero	1	1,490	7	0.164 0.201	<0.02(0.0127) <0.02(0.0079)	<0.007 <0.007	0.177 0.209

()：検出限界 (0.007 mg/kg) 以上定量限界 (0.02 mg/kg) 未満の値

a：ドライフロアブル剤を7日間隔で8回散布

b：各代謝物をゾキサミド残留値に補正して算出された (ゾキサミド残留値+代謝物 B 残留値×1.52+代謝物 C 残留値×1.43)

作物名：バナナ

試験実施場所 (国) [実施年]	品種	分析 部位	試験 ほ場数	使用量 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	ゾキサミド残留値(mg/kg)	
						有袋 ^b	無袋 ^c
グアテマラ [2015年]	Grande Naine	全果	1	499,000	0	ND ND	0.0384/0.0219 ^d (平均 0.0302) 0.201/0.132 ^d (平均 0.167)
グアテマラ [2015年]	Grande Naine	全果	1	496,000	0	ND ND	0.0135 <LOQ (0.00407)
グアテマラ [2015年]	Grande Naine	全果	1	494,000	0	ND ND	<LOQ(0.00760) <LOD[0.00237]
					3	試料採取なし	0.0496 <LOQ(0.00766)
					7		<LOD[0.00128] <LOD[0.00251]
					14		<LOD[0.00258] 0.0246
コスタリカ [2015年]	Grande Naine	全果	1	482,000	0	<LOD[0.00231] ND	<LOQ(0.00486) <LOD[0.00262]
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	ND ND	<LOQ(0.00437) <LOQ(0.00409)
コスタリカ [2015年]	Williams	全果	1	481,000	0	<LOD[0.00183] ND	ND ND
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	ND ND	<LOQ(0.00351) ND
ホンジュラス [2015年]	Grande Naine	全果	1	484,000	0	ND <LOD[0.000987]	<LOQ(0.00305) 0.0278
ホンジュラス [2015年]	Grande Naine	全果	1	480,000	0	ND ND	<LOD[0.00271] <LOD[0.00276]
エクアドル [2015年]	Williams	全果	1	481,000	0	ND ND	<LOQ(0.00472) 0.0104
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	0.0130/ <LOD[0.00116] ^d (平均<LOQ(0.00708)) <LOQ(0.00539)/ <LOQ (0.00467) ^d (平均<LOQ(0.00503))	<LOQ(0.00688) <LOQ(0.00334)
エクアドル [2015年]	Cavendish	全果	1	480,000	0	ND ND	0.0156 <LOQ(0.00393)
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	ND ND	0.0161 <LOQ(0.00791)

試験実施場所 (国) [実施年]	品種	分析 部位	試験 ほ場数	使用量 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	ゾキサミド残留値(mg/kg)	
						有袋 ^b	無袋 ^c
エクアドル [2015年]	Cavendish	全果	1	481,000	0	ND ND	0.0187 0.0416
					3	試料採取なし	0.0415 0.0734
					7		0.0232 0.108
					14		0.0162 0.0260
		果実			0	ND ND	ND ND
					14	試料採取なし	<LOQ(0.00607) ND
					0	ND ND	<LOD[0.00260] <LOQ(0.00518)
					14	試料採取なし	0.0647 0.0408
果皮	0	ND ND	<LOD[0.00260] <LOQ(0.00518)				
	14	試料採取なし	0.0647 0.0408				
	0	ND ND	<LOD[0.00260] <LOQ(0.00518)				
コロンビア [2015年]	Williams	全果	1	465,000	0	<LOQ(0.00370) ND	<LOQ(0.00364) ND
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	ND ND	ND ND
コロンビア [2015年]	Cavendish Valery	全果	1	490,000	0	<LOQ(0.00353) ND	ND ND
		果実			0	ND ND	ND ND
		果皮			0	ND ND	<LOQ(0.00373) <LOQ(0.00357)
コロンビア [2015年]	Williams	全果	1	494,000	0	ND <LOQ(0.00520)	0.0627/0.0200 ^d (平均 0.0414) 0.146/0.0167 ^d (平均 0.0814)
					3	試料採取なし	0.0289 0.0214
					7		0.0190 <LOQ(0.00790)
					14		<LOQ(0.00685) 0.0137
		果実			0	ND ND	ND ND
					14	試料採取なし	ND ND
					0	ND ND	0.0667 ^d /0.0450 ^d (平均 0.0559) 0.154/0.0285 ^d (平均 0.0913)
					14	試料採取なし	ND ND
果皮	0	ND ND	0.0667 ^d /0.0450 ^d (平均 0.0559) 0.154/0.0285 ^d (平均 0.0913)				
	14	試料採取なし	ND ND				

試験実施場所 (国) [実施年]	品種	分析 部位	試験 ほ場数	使用量 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	ゾキサミド残留値(mg/kg)	
						有袋 ^b	無袋 ^c
					14	試料採取なし	0.0255 0.0364
フィリピン [2015年]	Gran Nain	全果	1	482,000	0	ND ND	ND ND
					5 ^e	ND ND	ND ND
フィリピン [2015年]	Gran Nain	全果	1	493,000	0	ND ND	ND ND
					5 ^e	ND ND	ND <LOD[0.0000259]
フィリピン [2015年]	Gran Nain	全果	1	500,000	0	ND ND	<LOD[0.00116] 0.0109
					5 ^e	ND ND	<LOQ(0.00655) <LOD[0.00193]
					3	試料採取なし	ND 0.0202
					7		<LOQ(0.00344) <LOQ(0.00957)
					14		<LOD[0.000733] <LOQ(0.00334)

<LOQ : 定量限界 (0.01 mg/kg) 未満、<LOD : 検出限界 (0.003 mg/kg) 未満、ND : 検出されず

() : 検出限界 (0.003 mg/kg) 以上定量限界 (0.01 mg/kg) 未満の値

[] : 検出限界 (0.003 mg/kg) 未満の値

a : フロアブル剤を1回散布

b : 通常の商業的習慣で採取される方法

c : 袋が破損した場合のワーストケースとして実施

d : 試料の残留レベルを確認するためにバックアップ試料の残留値が測定された。

e : 全果を散布処理当日に採取し、日本に輸出される通常の商業的習慣処理が行われた。

f : オリジナル試料及び2反復試料の平均値 (0.0568、0.0767、0.0667 mg/kg)

作物名：ピーマン (Bell pepper) 及びとうがらし (non-Bell Pepper)

試験実施場所 (国) [実施年]	作物/品種	分析 部位	試験 ほ場数	使用量/回 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	ゾキサミド残留値(mg/kg)	
						個体データ	平均値
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) California Wonder	果実	1	210~215	3	0.085 /0.115	0.100
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) 不明	果実	1	207~219	3	0.155/0.164	0.160
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) Galileo	果実	1	212~214	3	0.246/0.243	0.245
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) X3R Camelot	果実	1	211~219	3	0.297/0.209	0.253
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) Cal Wonder	果実	1	212~222	3	0.203/0.231	0.217
米国 [2016年]	ピーマン (Bell Pepper) Golden Cal Wonder	果実	1	213~215	0	0.377/0.434	0.406
					3	0.267/0.250	0.259
					7	0.166/0.236	0.201
					10	0.152/0.174	0.163
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) M Jalapeno	果実	1	210~215	3	0.231/0.347	0.289
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) Grande Jumbo Jalapeno	果実	1	212~221	3	0.233/0.226	0.230
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) Mammoth Jumbo Jalapeno	果実	1	211~219	3	0.335/0.483	0.409

試験実施場所 (国) [実施年]	作物/品種	分析 部位	試験 ほ場数	使用量/回 ^a (g ai/ha)	PHI (日)	ゾキサミド残留値(mg/kg)	
						個体データ	平均値
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) Jalapenos 7017	果実	1	208~216	3	0.277/0.314	0.296
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) Jalapeno M	果実	1	206~214	3	0.823/0.698	0.761
米国 [2016年]	とうがらし (non-Bell Pepper) Bravo Jalapeno	果実	1	213~219	0	0.109/0.100	0.105
					3	0.125/0.133	0.129
					7	0.051/0.085	0.068
					10	0.090/0.179	0.134

^a: フロアブル剤を 5~9 日間隔で 8 回散布

<参照>

- 1 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号）
- 2 U.S. EPA: Pesticide Fact Sheet, Name of Chemical: Zoxamide (2001)
- 3 U.S. EPA: Federal Register/Vol.66, No.187,49110 -49118 (2001)
- 4 California Department of Pesticide Regulation (CDPR): Summary of Toxicology Data, Zoxamide (2001)
- 5 U.S. EPA: HED Risk Assessment: Human Health Risk Assessment for Zoxamide to Support Request for New Uses on Potatoes and Grapes (2001)
- 6 U.S. EPA: ARIA Risk Assessment: Human Health Risk Assessment for Zoxamide to Support Request for New Uses on Cucurbits and Tomatoes (2001)
- 7 食品健康影響評価について(平成 19 年 1 月 12 日付け厚生労働省発食安第 0112009 号)
- 8 食品健康影響評価の結果の通知について(平成 20 年 8 月 21 日付け府食第 906 号)
- 9 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 23 年 6 月 28 日付け厚生労働省告示第 203 号）
- 10 食品健康影響評価について(平成 30 年 6 月 21 日付け厚生労働省発食 0621 第 7 号)
- 11 ゴキサミド ドシエ 試験成績一覧表・概要及び考察：ゴーワン社、一部公表
- 12 ¹⁴C-117,281 : Pharmacokinetic and Metabolism Study in Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年（未公表）
- 13 Metabolism of ¹⁴-RH-117,281 in Lactating Goats (GLP 対応) : XenoBiotic Inc.、1998 年（未公表）
- 14 [¹⁴C]RH-141,452:Rat Metabolism Study, Tier 1 Testing (GLP 対応) : XenoBiotic Inc.、1998 年（未公表）
- 15 [¹⁴C]RH-141,455:Rat Metabolism Study, Tier 1 Testing (GLP 対応) : XenoBiotic Inc.、1998 年（未公表）
- 16 ¹⁴C-RH-117,281 : Nature of the Residue in Fruiting Grape Plants (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年（未公表）
- 17 ¹⁴C-RH-117,281 : Nature of the Residue in Potato (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年（未公表）
- 18 RH-117,281 : Nature of Residue in cucurbits (Cucumber) (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1999 年（未公表）
- 19 RH-117,281 : Nature of Residue in Fruiting Tomato Plants (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1999 年（未公表）
- 20 RH-117281 Fungicide : Section J, Summary of Environmental Fate Studies : Rohm and Haas Company、1998 年（未公表）
- 21 Magnitude of the Residue of Zoxamide and its Metabolites in or on Dry Bulb

- Onion Raw Agricultural Commodities Following Eight Foliar Application of Gravel® 75DF Fungicide-2011 (GLP 対応) : The Carringers, Inc.、2013 年 (未公表)
- 22 Magnitude of the Residue of Zoxamide in/on Banana Raw Agricultural Commodities Following One Foliar Broadcast Application of GWN-9790 Fungicide (GLP 対応) : The Carringers, Inc.、2016 年 (未公表)
 - 23 RH-117,281 Technical Acute Oral Toxicity Study in Male and Female Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 24 RH-117,281 Technical Acute Oral Toxicity Study in Male and Female Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 25 RH-117,281 Technical-Acute Dermal Toxicity Study in Male and Female Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 26 RH-117,281 Technical : Acute Inhalation Study In Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 27 RH-141,452 Acute Oral Toxicity Study in Male and Female Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 28 RH-141,455 Acute Oral Toxicity Study in Male and Female Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 29 RH-117,281 Technical Acute Oral (Gavage) Neurotoxicity Study in Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 30 RH-117,281 Technical-Eye Irritation Study in Rabbits (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 31 RH-117,281 Technical-Skin Irritation Study in Rabbits (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 32 Dermal Sensitization Study of RH-117,281 Technical in Guinea Pigs-Maximization Test (GLP 対応) : Corning Hazleton Inc.、1998 年 (未公表)
 - 33 RH-117,281 Technical : Delayed Contact Hypersensitivity Study in Guinea Pigs (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 34 RH-117,281 Technical : Delayed Contact Hypersensitivity (Dilution) Study in Guinea Pigs (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 35 RH-117,281 Three-Month Dietary Toxicity Study in Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 36 RH-117,281 Technical : Three-Month Dietary Toxicity Study in Dogs (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 37 RH-117,281 : Three-Month Dietary/Neurotoxicity Study in Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
 - 38 RH-7281 Technical : Twenty-Eight Day Dermal Toxicity Study in Rats (GLP

- 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 39 RH-7281 Technical : One-Year Chronic Dietary Toxicity Study in Dogs (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 40 RH-117,281 Technical : 24-Month Dietary Chronic/Oncogenicity Study in Rats (GLP 対応) : Covance Laboratories Inc.、1998 年 (未公表)
- 41 RH-117,281 Technical : Eighteen-Month Dietary Oncogenicity Study in Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 42 RH-117,281 Technical : Two-Generation Reproductive Toxicity Study in Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 43 RH-7281 Technical : Oral (Gavage) Developmental Toxicity Study in Rats (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 44 RH-117,281 Technical : Oral (Gavage) Developmental Toxicity Study in Rabbits (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1997 年 (未公表)
- 45 RH-117,281 Technical : Salmonella typhimurium Gene Mutation Assay (Ames Test) (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 46 Test for Chemical Induction of Gene Mutation at the HGPRT Locus in Cultured Chinese Hamster Ovary (CHO) Cells with and without metabolic Activation (GLP 対応) : SITEK Research Laboratories、1998 年 (未公表)
- 47 RH-117,281 : test for chemical induction of chromosome aberrations in cultured Chinese Hamster Ovary (CHO) cells (GLP 対応) : Covance Laboratories Limited、1998 年 (未公表)
- 48 TH-117,281 Technical : Micronucleus Assay in CD-1 Mouse Bone Marrow Cells (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 49 RH-141,452 : Salmonella typhimurium Gene Mutation Assay (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 50 RH-141,455 : Salmonella typhimurium Gene Mutation Assay (Ames Test) (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 51 Distribution of ¹⁴C-RH-117,281 to the Bone Marrow of Mice (GLP 対応) : Rohm and Haas Company、1998 年 (未公表)
- 52 JMPR : Zoxamide, Pesticide residues in food-2007. Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. Evaluations Part II-Toxicological, 487-529, 2007.
- 53 食品健康影響評価の結果の通知について (平成 31 年 1 月 15 日付け府食第 9 号)
- 54 食品、添加物等の規格基準 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号) の一部を改正する件 (令和 2 年 1 月 15 日付け厚生労働省告示第 4 号)
- 55 食品健康影響評価について (令和 4 年 1 月 19 日付け厚生労働省発生食 0119 第 3 号)
- 56 ゴキサミド ドシエ 試験成績一覧表・概要及び考察 : ゴーワン社、一部公表
- 57 Magnitude of the Residue of Zoxamide in or on Bell and Non-Bell Pepper Fruit,

Representative Commodities for Crop Subgroup 8-10B Pepper/Eggplant Subgroup, Following Eight Broadcast Foliar Applications of Zing!® Fungicide (GLP 対応) : The Carringers, Inc.、2017 年 (未公表)

58 原体混在物① Technical: Dermal Sensitization Study in Guinea Pig-Maximization Test (GLP 対応) : Rohm and Haas Company.、1999 年 (未公表)

59 原体混在物②: Twenty-Eight Day Oral (Gavage) Toxicity Study in Rats (GLP 対応) : Spring House Lab.、1998 年 (未公表)

60 原体混在物② In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test in Human Lymphocytes (GLP 対応) : Huntington Life Sciences, Ltd.、1998 年 (未公表)

61 EFSA : Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zoxamide. EFSA Journal,15 (9) 4980 (2017)