

胆管がん(肝内・肝外)による死亡者数の推移(男性)

(人)

	H18(2006)		H19(2007)		H20(2008)		H21(2009)		H22(2010)	
肝内胆管がん	1,569		1,683		1,685		1,757		1,799	
	30代 6	40代 15	30代 11	40代 25	30代 6	40代 28	30代 8	40代 36	30代 8	40代 40
肝外胆管がん	4,971		4,907		5,278		5,410		5,357	
	30代 28	40代 52	30代 9	40代 47	30代 11	40代 46	30代 10	40代 46	30代 11	40代 45
計	6,540		6,590		6,963		7,167		7,156	
	30代 34	40代 67	30代 20	40代 72	30代 17	40代 74	30代 18	40代 82	30代 19	40代 85

資料: 人口動態調査


胆管がん(肝内・肝外)による死亡者数(年齢別、平成22(2010)年)

(人)

		(年代)	10代以下	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上	不詳
肝内胆管がん		3,190	-	1	18	59	241	693	1,088	1,089	1
		(%)	-	0.0	0.6	1.8	7.6	21.7	34.1	34.1	0.0
	男	1,799	-	-	8	40	168	445	651	486	1
		(%)	-	-	0.4	2.2	9.3	24.7	36.2	27.0	0.1
肝外胆管がん	女	1,391	-	1	10	19	73	248	437	603	-
		(%)	-	0.1	0.7	1.4	5.2	17.8	31.4	43.4	-
		9,904	-	2	13	71	356	1,404	2,948	5,110	-
	(%)	-	0.0	0.1	0.7	3.6	14.2	29.8	51.6	-	
合計	男	5,357	-	1	11	45	236	943	1,884	2,237	-
		(%)	-	0.0	0.2	0.8	4.4	17.6	35.2	41.8	-
	女	4,547	-	1	2	26	120	461	1,064	2,873	-
		(%)	-	0.0	0.0	0.6	2.6	10.1	23.4	63.2	-
合計		13,094	-	3	31	130	597	2,097	4,036	6,199	1
		(%)	-	0.0	0.2	1.0	4.6	16.0	30.8	47.3	0.0
	男	7,156	-	1	19	85	404	1,388	2,535	2,723	1
		(%)	-	0.0	0.3	1.2	5.6	19.4	35.4	38.1	0.0
合計	女	5,938	-	2	12	45	193	709	1,501	3,476	-
		(%)	-	0.0	0.2	0.8	3.3	11.9	25.3	58.5	-

資料:人口動態調査

肝内胆管がんの年齢階級別死亡率の推移(男性)




	粗率(全年齢)	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳
1981年	0.097	0.000	0.020	0.048	0.220	0.432
1986年	0.187	0.000	0.010	0.118	0.375	0.734
1991年	0.290	0.000	0.025	0.142	0.291	1.016
1996年	1.361	0.000	0.064	0.436	1.448	3.900
2001年	2.182	0.011	0.035	0.557	1.774	5.487
2006年	2.548	0.000	0.064	0.361	1.930	4.974
2011年	3.199	0.030	0.113	0.338	1.715	5.399

※厚生労働省「人口動態統計」より作成

※死亡診断書に「肝内胆管癌」「胆管細胞癌」と記載された悪性新生物について算出

※年齢階級別死亡率(人口10万対)
 =年齢階級Xにおける死亡者数÷年齢階級Xの人口×100000

肝外胆管がんの年齢階級別死亡率の推移(男性)




	粗率(全年齢)	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳
1981年	2.425	0.024	0.190	0.699	3.417	10.238
1986年	3.673	0.025	0.191	1.099	4.191	11.901
1991年	5.158	0.011	0.233	1.013	4.574	14.664
1996年	6.059	0.021	0.115	0.944	4.429	13.940
2001年	7.038	0.000	0.105	0.952	3.611	12.850
2006年	8.074	0.000	0.160	0.670	3.375	12.434
2011年	9.218	0.015	0.113	0.501	3.315	10.586

※厚生労働省「人口動態統計」より作成

※死亡診断書に「肝外胆管癌」「総胆管癌」「肝管癌」「胆のう管癌」と記載された悪性新生物及び「胆管癌」の他に記載がない悪性新生物について算出

※年齢階級別死亡率(人口10万対)
 =年齢階級Xにおける死亡者数÷年齢階級Xの人口×100000

胆のうがんの年齢階級別死亡率の推移(男性)




	粗率(全年齢)	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳
1981年	1.691	0.000	0.070	0.542	2.425	7.374
1986年	2.566	0.013	0.090	0.650	2.236	9.103
1991年	3.062	0.000	0.160	0.547	2.451	8.322
1996年	3.412	0.010	0.102	0.619	2.061	7.549
2001年	3.671	0.022	0.047	0.519	1.805	6.370
2006年	3.932	0.000	0.032	0.258	1.804	5.410
2011年	4.226	0.000	0.045	0.279	1.473	5.041

※厚生労働省「人口動態統計」より作成

※死亡診断書に「胆のう癌」と記載された悪性新生物について算出

※年齢階級別死亡率(人口10万対)
 = 年齢階級xにおける死亡者数 ÷ 年齢階級xの人口 × 100000

肝がんの年齢階級別死亡率の推移(男性)



	粗率(全年齢)	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳
1981年	12.121	0.183	1.636	9.382	32.740	53.025
1986年	17.743	0.125	1.716	8.415	48.768	70.947
1991年	22.779	0.161	1.350	8.356	45.957	93.167
1996年	35.811	0.209	1.302	11.460	41.877	145.321
2001年	35.824	0.134	1.198	8.027	34.596	106.728
2006年	33.764	0.144	0.735	5.528	29.522	76.243
2011年	30.461	0.045	0.654	3.132	17.958	51.047

※厚生労働省「人口動態統計」より作成

※死亡診断書に「肝癌」「肝細胞癌」「ヘパトーマ」と記載のある悪性新生物について算出

※年齢階級別死亡率(人口10万対)
 =年齢階級Xにおける死亡者数÷年齢階級Xの人口×100000