

Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験（プロモーション試験）報告書

試験番号 7508

本 文

本文目次

[項目]	[ページ]
1. 要約	1
2. 試験材料	
2-1. 被験物質	2
2-2. 陽性対照	3
2-3. 陰性(溶媒)対照	4
2-4. 使用した細胞	4
3. 試験方法	
3-1. 採用した試験方法	5
3-2. 試験構成	5
3-3. プロモーション試験	5
3-4. 觀察	6
3-5. 判定	7
4. 試験成績	
4-1. プロモーション試験	8
5. 結果の判定	9
6. 予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態 及び試験計画書に従わなかつたこと	9
7. 参考文献	10
試験結果 表 1~4	11
試験結果 図 1~3	15

1. 要約

2 - オクタノールの Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験(プロモーション試験)を実施し、*in vitro* の発がんプロモーション作用を評価した。

細胞増殖試験は、形質転換試験の用量設定のため、2 回実施した。1 回目の細胞増殖試験は 10 mM(約 1.4 mg/ml)を最高用量とし、公比 2 で 10 段階の用量で実施した。その結果、陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は 2.5、5.0、10 mM の用量でそれぞれ、88、22、0.67%を示した。2 回目の細胞増殖試験は、細胞増殖が 50% 阻害される濃度(IC_{50})を確認するために、最高用量 10 mM、公比 2 の 8 段階で実施した。その結果、陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は 3.5、5.0、7.1 mM の用量でそれぞれ、104、2.5、1.3%を示した。 IC_{50} を確認することは出来なかったが、3.5 と 5.0 mM の用量の間での細胞増殖率の著しい減少を確認した。従って、形質転換試験の用量は、公差を 0.90 に設定し、最高用量 6.3 mM で 7 段階とした。

形質転換試験を実施した結果、4.5、5.4、6.3 mM の 3 用量では、細胞毒性により細胞が死滅するか、もしくはコンフルエントより少ない細胞密度であったため、統計学的検定の評価対象から除外した。評価対象外の 3 用量を除いた被験物質処理群では、ウェルあたりの平均形質転換巣数(形質転換率)は、陰性(溶媒)対照群に対して統計学的に有意な増加を示さなかった。なお、3.6 mM の形質転換率では統計学的に有意な減少を示した。陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は、0.90、1.8、2.7、3.6、4.5、5.4、6.3 mM の用量でそれぞれ、100、99、92、72、1.3、0.27、0 %であった。

なお、試験成立の判定基準（陰性(溶媒)対照群の形質転換率が 12 個 / ウェル未満、陽性対照群の形質転換巣数が有意に高い、被験物質処理群の統計処理対象群が 4 濃度以上）は、全て満たされていた。


形質転換試験(プロモーション試験)において、細胞毒性により評価対象外とした 3 用量を除いた全ての被験物質処理群で形質転換率に統計学的に有意な増加は認められなかった。かつ、試験成立の判定基準は全て満たされており、試験は成立したものと判断した。

以上の結果より、本被験物質の Bhas 42 細胞に対する *in vitro* での発がんプロモーション作用は陰性と判定した。

2. 試験材料

2-1. 被験物質(被験物質番号: 4381)

1) 被験物質の性質

化学物質の名称 (IUPAC 命名法による)	2 - オクタノール					
別 名	オクタン - 2 - オール					
構造式又は示性式 (いずれも不明の場合 は、その製法の概要)						
試験に供した 化学物質の純度	99.3%	試験に供した化学 物質のロット番号	WDJ3730			
不純物の名称及び 濃度(含有率)	水分: 0.1%					
C A S 番 号	123-96-6	蒸 気 圧	0.242 mmHg (at 25)			
分 子 量	130.23	分 配 係 数 (1-オタノール/水分配係数)	Log Kow = 2.90			
融 点	- 31.6	常温における性状	無色透明の液体			
沸 点	179					
安 定 性	水: - 光: - 熱: -					
溶媒に対する溶解度等	溶媒	溶解度	溶媒中の 安定性	溶媒	溶解度	溶媒中の 安定性
	水	不溶: 2.8×10 mg/ml*	-	DMSO	溶解: 2.8×10^2 mg/ml*	-
	アセトン	-	-	その他()	-	-
供 試 元	富士フィルム和光純薬株式会社					

* 日本バイオアッセイ研究センターの試験による。

2) 保管及び取り扱い

被験物質は、被験物質保管区域で保管した。被験物質の取り扱いについては、黄色灯下で行った。

3) 被験物質の調製

使用溶媒

名称 : ジメチルスルホキシド(DMSO)
製造元 : 和光純薬工業株
Lot No. : AWF1092
純度 : 100.0%

溶媒選択の理由

被験物質は、DMSO に対して 2.8×10^2 mg/ml の用量で溶解し、培養液に対して 0.5 vol% の添加量で試験に用いることが可能であった。また、被験物質に DMSO を加えた際に、発色、発泡、発熱等の変化が認められなかった。以上のことから DMSO を溶媒として選択した。

被験物質溶液の調製

被験物質を秤量し、DMSO を添加したものを最高調製溶液とした。これを DMSO で段階希釈して各被験物質溶液を調製した。調製作業については、黄色灯下で行った。被験物質溶液の調製は用時調製とした。

被験物質溶液の処理

必要量の培養液を 50 ml チューブに取り、攪拌しながら被験物質溶液を添加(最終濃度 0.5 vol%)した(被験物質培養液)。細胞への処理はプレートの培養液を抜き、ただちに被験物質培養液を分注することにより行った。処理作業は、黄色灯下で行った。

純度換算

被験物質の純度が 95% 以上であるため、純度換算は実施しなかった。

2-2 . 陽性対照

1) 陽性対照物質

名称 : 12-O-テトラデカノイルフォルボール-13-アセテート(TPA)
ロット番号 : SLBS0478V
純度 : 100%
製造元 : Sigma-Aldrich 社

2) 陽性対照物質の選択理由

TPA は Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験にプロモーターとして広く使用されており、日本バイオアッセイ研究センターの背景データも豊富なため。

3) 陽性対照物質溶液の調製、保存について

所定の濃度の DMSO 溶液を調製、分注して、-30 以下で凍結保存し、調製後 2 年以内に用時解凍して用いた。保存凍結溶液は、使用直前に解凍して用いた。

使用溶媒： DMSO(和光純薬工業株、Lot No.: AWF1092、純度：100.0%)

最終濃度： 50 ng/ml

2-3 . 陰性(溶媒)対照

陰性(溶媒)対照として、DMSO を培養液に添加した。培養液への添加液量は、0.5 vol%とした。

2-4 . 使用した細胞

1) 種類

Bhas 42(マウス全胎児由来 BALB/c 3T3 A31-1-1 に v-Ha-ras 遺伝子を導入した細胞)¹⁾

2) 供給源

一般財団法人 食品薬品安全センターより入手(2017 年 3 月 3 日、入手時 17 代)

3) 保存条件

液体窒素中で保存(19 代)

4) 培養条件

ウシ胎児血清(FBS、ロット番号 : S11605S1780、Biowest 製)を 5 vol%、ペニシリソナーゼ 50 U/ml、ストレプトマイシン 50 µg/ml を含む Dulbecco's modified Eagle's medium/ Ham's F12 (Life Technologies)を培養液(DF5F)として用い、37 ℃、5%CO₂ の条件下で培養した。

5) 特性

接触阻止能を維持している。マイコプラズマの汚染は無い。

6) 選択理由

形質転換試験に常用されている²⁻⁵⁾。

7) 使用条件

凍結保存した細胞(19 代)を解凍して、細胞増殖試験では解凍してから継代数 10 代以内の細胞を用いた。形質転換試験では解凍してから継代数 2 代以内の細胞を用いた。

3. 試験方法

3-1. 採用した試験方法

「BHAS 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」(平成 26 年 7 月 4 日、厚生労働省第 3 回遺伝毒性評価ワーキンググループ合意事項)に準拠して実施した。

3-2. 試験構成

形質転換試験の用量設定のために細胞増殖試験を実施した後に、形質転換試験を実施した。形質転換試験はプロモーション試験のみ実施した。

3-3. プロモーション試験

3-3-1. 用量設定のための細胞増殖試験

細胞増殖試験(2 回実施)は、各用量 3 ウェルを用いて実施した。1 回目の細胞増殖試験は最高用量を 10 mM(約 1.4 mg/ml)として、公比 2 で 10 段階、2 回目の細胞増殖試験は最高用量を 10 mM として、公比 2 で 8 段階の用量で実施した。細胞増殖試験の対照として陰性(溶媒)対照を設け、吸光度の補正のためにブランクを設けた。

実験方法

細胞は 0.25% トリプシンを用いて剥離した後、細胞濃度 0.7×10^4 個/ml の懸濁液とした。この細胞懸濁液 2 ml(1.4×10^4 個)を 6 ウェルプレートに分注(3 ウェル/群)した。播種 4 日後に培養液を被験物質または溶媒を含む培養液 2ml に交換した。播種 7 日後に 10% ホルマリンで固定し、水洗、乾燥して 0.1% クリスタルバイオレット溶液で染色した。乾燥後、2.0 ml の色素抽出液(50% エタノール及び 0.02 N 塩酸を含む)でクリスタルバイオレットを抽出後、その抽出液 0.1 ml を 96 ウェルプレートに移し、550 nm における吸光度をマイクロプレートリーダーで測定した。次の式により各処理群での相対細胞増殖率(%)を求めた。

$$X(\%) = (T - B)/(S - B) \times 100$$

X : 被験物質処理群の相対細胞増殖率(%)

S : 陰性(溶媒)対照群の吸光度

T : 被験物質処理群の吸光度

B : ブランクの吸光度(培養液のみを入れたウェル)

3-3-2 . 形質転換試験

形質転換試験は、形質転換巣計測用に各用量 6 ウエル、細胞増殖率測定用に 3 ウエルを用いて実施した。用量設定のための細胞増殖試験の結果に基づき、形質転換試験は 6.3 mM を最高用量とし、公差 0.90 で 7 段階の用量で実施した。形質転換試験の対照として陰性(溶媒)対照及び陽性対照を設け、細胞増殖率測定の吸光度の補正のためにプランクを設けた。なお、TPA の培地における溶媒(DMSO)濃度は、被験物質の溶媒(DMSO)濃度(0.5 vol%)と一致させた。

実験方法

細胞は 0.25% トリプシンを用いて剥離した後、細胞濃度 0.7×10^4 個/ml の懸濁液とした。この細胞懸濁液 2 ml(1.4×10^4 個)を 6 ウエルプレートに分注し、それぞれ形質転換巣計測(6 ウエル / 群)及び細胞増殖率測定(3 ウエル / 群)用とした。播種 4 日後に培養液を被験物質、陽性対照物質または溶媒を含む培養液と交換した。形質転換巣計測用の細胞は、播種 7 日後、播種 11 日後に被験物質、陽性対照物質または溶媒を含む培養液と交換し、播種 14 日後に新鮮培養液に交換した。播種 21 日後にエタノールで固定した後、5 vol% ギムザ液で染色し、各ウェルの形質転換巣を数えた。細胞増殖率測定用の細胞は、播種 7 日後 10% ホルマリンで固定後、細胞増殖試験と同様の操作を行った。

3-4 . 觀察

1) 形質転換巣観察

実体顕微鏡を用いて細胞を観察し、次の基準により形質転換巣であると判定したものについて、その数を数えた。なお、プレートをコード化し、処理条件が判らない状況で観察した。

形質転換巣を構成する細胞数が 100 個以上。

紡錘形をしている(spindle-shaped)。

細胞質が塩基性(濃い紫色)に強く染まっている(basophilic)。

ランダムな配列で互いに交差している(criss-cross)。

積み重なりっている(piling-up)。

周辺部の単層の細胞へ浸潤している(invasive)。

- の所見が全部揃わなくても、一部著しければ形質転換巣と判定した。

形質転換巣の数は、それぞれのウェルごとに記録した。

2) 結果の表示

相対細胞増殖率(%)

ウェルごとの形質転換巣の数

ウェルあたりの平均形質転換巣の数（形質転換率）

3-5 . 判定

1) 統計処理対照群

以下に示す基準を満たした群について統計処理を行った。

細胞増殖試験用のプレートでは 2 ウェル以上が測定可能である。

形質転換試験用のプレートでは 5 ウェル以上が計数可能である。

2) 結果の解析

各被験物質処理群と陰性(溶媒)対照群において Dunnett 検定を行った（有意水準 $\alpha=0.05$ 、片側）。また、陽性対照群と陰性(溶媒)対照群において Student の t 検定を行った（有意水準 $\alpha=0.05$ 、片側）。

3) 試験成立の判定

以下の基準が全て満たされた場合、結果を評価できる試験が成立したと考えた。

陰性(溶媒)対照群の形質転換率が 12 個 / ウェルを越えていない。

陽性対照群の形質転換巣数が有意に高い。

被験物質処理群において以下の条件を含む統計処理対象群が 4 濃度以上ある。

ただし、大きくこの条件から外れない限り、処理濃度は適正であったと考える。

- 細胞増殖の促進が見られた場合、少なくとも、細胞毒性が認められない濃度に 1 濃度、細胞増殖の促進が認められる濃度に 2 濃度ある。
- 細胞増殖の阻害が見られた場合、少なくとも、細胞毒性が認められない濃度に 2 濃度、細胞毒性が認められない濃度から IC_{50} の間に 2 濃度ある。

4) 結果の判定

3)の「試験成立の判定」により試験が成立した場合、被験物質群の統計処理を実施した群において、以下の基準によって結果を判定した。

陰性：形質転換率の統計学的に有意な増加が、全ての群で認められない。

陽性：形質転換率の統計学的に有意な増加が、連続した 2 濃度以上で認められる。

疑陽性：形質転換率の統計学的に有意な増加が、1 濃度または不連続な 2 濃度以上で認められる。

最終的な判定は、統計学的検定、背景データ、形質転換巣の誘発率を考慮し、生物学的な観点からの判断を加味して総合的に評価した⁶⁾。

4. 試験成績

4-1. プロモーション試験

4-1-1. 用量設定のための細胞増殖試験（2回実施）

1回目の細胞増殖試験の結果を表1と図1、2回目の細胞増殖試験の結果を表2と図2に示した。1回目の細胞増殖試験は10 mMを最高用量とし、公比2で10段階の用量で実施した。その結果、陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は2.5、5.0、10 mMの用量でそれぞれ、88、22、0.67%を示した。

2回目の細胞増殖試験は、細胞増殖が50%阻害される濃度(IC₅₀)を確認するために、最高用量10 mM、公比2の8段階で実施した。その結果、陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は3.5、5.0、7.1 mMの用量でそれぞれ、104、2.5、1.3%を示した。IC₅₀を確認することは出来なかったが、3.5と5.0 mMの用量の間での細胞増殖率の著しい減少を確認した。

従って、形質転換試験は、公差を0.90に設定し、最高用量6.3 mMで7段階の用量に設定した。

4-1-2. 形質転換試験

形質転換試験の結果を表3、4と図3に示した。形質転換試験は6.3 mMを最高用量とし、公差0.90で7段階の用量で実施した。試験の結果、4.5、5.4、6.3 mMの3用量は、細胞毒性により細胞が死滅するか、もしくはコンフルエントより少ない細胞密度であったため、統計学的検定の評価対象から除外した。評価対象外の3用量を除いた被験物質処理群では、ウェルあたりの平均形質転換巣数(形質転換率)は、陰性(溶媒)対照群に対して統計学的に有意な増加を示さなかった。3.6 mMの形質転換率では統計学的に有意な減少を示した。陰性(溶媒)対照群に対する相対細胞増殖率は、0.90、1.8、2.7、3.6、4.5、5.4、6.3 mMの用量でそれぞれ、100、99、92、72、1.3、0.27、0 %であった。

なお、試験成立の判定基準（陰性(溶媒)対照群の形質転換率が12個／ウェル未満、陽性対照群の形質転換巣数が有意に高い、被験物質処理群の統計処理対象群が4濃度以上）は、全て満たされていた。

5. 結果の判定

形質転換試験(プロモーション試験)において、細胞毒性により評価対象外とした 3 用量を除いた全被験物質処理群の形質転換率に、統計学的に有意な増加は認められなかった。かつ、試験成立の判定基準は全て満たされており、試験は成立したものと判断した。

以上の結果より、本被験物質の Bhas 42 細胞に対する *in vitro* での発がんプロモーション作用は陰性と判定した。

6. 予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかつたこと

予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態は発生しなかつた。また、計画書に従わなかつた事態は発生しなかつた。

7. 参考文献

- 1) Sasaki, K. et al.: Isolation and characterization of ras-transfected BALB/3T3 clone showing morphological transformation by 12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate, Jpn. J. Cancer Res. 79 (1988) 921-930.
- 2) Ohmori, K. et al.: An assay method for the prediction of tumor promoting potential of chemicals by the use of Bhas 42 cells, Mutat. Res. 557 (2004) 191-202.
- 3) Ohmori, K. et al.: An inter-laboratory collaborative study by the non-genotoxic carcinogen study group in Japan, on a cell transformation assay for tumor promoters using Bhas 42 cells, Altern. Lab. Animal 33 (2005) 619-639.
- 4) Sakai, A. et al.: A Bhas 42 cell transformation assay on 98 chemicals: the characteristics and performance for the prediction of chemical carcinogenicity, Mutat. Res. 702 (2010) 100-122.
- 5) Sakai, A. et al.: An international validation study of a Bhas 42 cell transformation assay for the prediction of chemical carcinogenicity, Mutat. Res. 725 (2011) 57-77.
- 6) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2016 Guidance document on the in vitro Bhas 42 cell transformation assay. Series on Testing and Assessment No. 231, 08 Jan-2016. Available at [https://www.oecd.org/env/ehs/testing/ENV_JM_MONO\(2016\)1.pdf](https://www.oecd.org/env/ehs/testing/ENV_JM_MONO(2016)1.pdf) [accessed 26 Sep. 2018].

表1 2-オクタノールの細胞増殖試験(1回目)結果

用 量 (mM)	吸 光 度 (OD ₅₅₀)						相対細胞増殖率 ^{b)} (% of control)
	Well 1	Well 2	Well 3	平均値	SD	-ブランク ^{a)}	
ブランク	0.052	0.050	0.052	0.051	0.001	0.000	-
0 (0.5% DMSO)	0.360	0.334	0.351	0.348	0.013	0.297	100
0.020	0.365	0.361	0.380	0.369	0.010	0.318	107
0.039	0.393	0.373	0.390	0.385	0.011	0.334	112
0.078	0.399	0.398	0.394	0.397	0.003	0.346	116
0.16	0.383	0.382	0.395	0.387	0.007	0.336	113
0.31	0.365	0.353	0.369	0.362	0.008	0.311	105
0.63	0.376	0.354	0.375	0.368	0.012	0.317	107
1.3	0.357	0.373	0.392	0.374	0.018	0.323	109
2.5	0.284	0.310	0.340	0.311	0.028	0.260	88
5.0	0.115	0.121	0.112	0.116	0.005	0.065	22
10	0.054	0.053	0.053	0.053	0.001	0.002	0.67

a) 各群の吸光度の平均からブランクの吸光度の平均を引いた

b) それぞれの陰性(溶媒)対照群の吸光度に対する各処理群の吸光度のパーセンテージを示した

表2 2-オクタノールの細胞増殖試験(2回目)結果

用 量 (mM)	吸 光 度 (OD ₅₅₀)						相対細胞増殖率 ^{b)} (% of control)
	Well 1	Well 2	Well 3	平均値	SD	-ブランク ^{a)}	
ブランク	0.060	0.060	0.057	0.059	0.002	0.000	-
0 (0.5% DMSO)	0.450	0.440	0.465	0.452	0.013	0.393	100
0.88	0.433	0.446	0.466	0.448	0.017	0.389	99
1.3	0.426	0.431	0.464	0.440	0.021	0.381	97
1.8	0.463	0.454	0.456	0.458	0.005	0.399	102
2.5	0.472	0.443	0.459	0.458	0.015	0.399	102
3.5	0.481	0.452	0.465	0.466	0.015	0.407	104
5.0	0.069	0.070	0.068	0.069	0.001	0.010	2.5
7.1	0.065	0.061	0.065	0.064	0.002	0.005	1.3
10	0.061	0.059	0.059	0.060	0.001	0.001	0.25

a) 各群の吸光度の平均からブランクの吸光度の平均を引いた

b) それぞれの陰性(溶媒)対照群の吸光度に対する各処理群の吸光度のパーセンテージを示した

表3 2-オクタノールの形質転換試験(細胞増殖率)結果

用 量 (mM)	吸 光 度 (OD ₅₅₀)						相対細胞増殖率 ^{b)} (% of control)
	Well 1	Well 2	Well 3	平均値	SD	-ブランク ^{a)}	
ブランク	0.062	0.055	0.057	0.058	0.004	0.000	-
0 (0.5% DMSO)	0.434	0.429	0.433	0.432	0.003	0.374	100
0.90	0.419	0.420	0.456	0.432	0.021	0.374	100
1.8	0.433	0.411	0.437	0.427	0.014	0.369	99
2.7	0.389	0.405	0.410	0.401	0.011	0.343	92
3.6	0.322	0.274	0.387	0.328	0.057	0.270	72
4.5	0.063	0.061	0.065	0.063	0.002	0.005	1.3
5.4	0.060	0.059	0.059	0.059	0.001	0.001	0.27
6.3	0.055	0.050	0.055	0.053	0.003	-0.005	0*
TPA (50 ng/ml)	0.594	0.614	0.573	0.594	0.021	0.536	143

a) 各群の吸光度の平均からブランクの吸光度の平均を引いた

b) それぞれの陰性(溶媒)対照群の吸光度に対する各処理群の吸光度のパーセンテージを示した

※ 計算値が負の値の場合は、0と表記した

表4 2-オクタノールの形質転換試験結果

用 量 (mM)	形 質 転 換 巢 数								相対細胞増殖率 ^{b)} (% of control)
	Well 1	Well 2	Well 3	Well 4	Well 5	Well 6	平均値 ^{a)}	SD	
0 (0.5% DMSO)	4	5	4	5	7	4	4.8	1.2	100
0.90	6	3	5	4	6	5	4.8	1.2	100
1.8	8	3	5	8	4	4	5.3	2.2	99
2.7	8	5	4	3	6	5	5.2	1.7	92
3.6	2	1	0	2	2	2	1.5*	0.8	72
4.5	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	—	—	1.3
5.4	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	—	—	0.27
6.3	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	Tox	—	—	0 [※]
TPA (50 ng/ml)	15	13	15	16	15	14	14.7[#]	1.0	143

a) 結果の解析として、被験物質処理群ではDunnett検定、陽性対照のTPA処理群ではStudentのt検定を実施した

Dunnett検定($\alpha=0.05$ 、片側)：陰性(溶媒)対照群に対して有意差を示した場合、平均値の右上に*を付したStudentのt検定($\alpha=0.05$ 、片側)：陰性(溶媒)対照群に対して有意差を示した場合、平均値の右上に#を付した

b) それぞれの陰性(溶媒)対照群の吸光度に対する各処理群の吸光度のパーセンテージを示した

Tox: 細胞毒性により細胞が死滅するもしくはコンフルエントより少ない細胞密度を示したため、評価対象外とした

※ 計算値が負の値となった場合は、0と表記した




図1 2-オクタノールのBHAS 42細胞における細胞増殖試験(1回目)の結果




図2 2-オクタノールのBHAS 42細胞における細胞増殖試験(2回目)の結果




図3 2-オクタノールのBHAS 42細胞における形質転換試験の結果

●：相対細胞増殖率(%)、○：形質転換巣数/ウェル