# 2024 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について

## Ⅰ．趣旨

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）に基づき、実施主体である保険者は、社会保険診療報酬支払基金に年度毎の特定健康診査・特定保健指導の実施状況を報告することとされている。今般、2024 年度分の報告をとりまとめたので公表する。

集計対象の保険者数は 3,357 保険者である。

| | 市町村国保（全体）※１ | | | | 国保組合 | 健康保険組合（全体）※２ | | | 全国健康保険協会 | 船員保険 | 共済組合 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | 総合 | 単一 | | | | |
| 保険者数 | 1,738 | 13 | 646 | 1,079 | 158 | 1,374 | 254 | 1,120 | 1 | 1 | 85 | 3,357 |

※1　市町村国民健康保険のうち、「大」「中」「小」とあるのは、各市町村国保の特定健診対象者数に応じた規模別に集計したものである。
「大」･･･特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
「中」･･･特定健診対象者数が5千人以上 10 万人未満の中規模保険者
「小」･･･特定健診対象者数が5千人未満の小規模保険者

※2　健康保険組合のうち、「総合」「単一」とあるのは、健康保険組合の設立形態に応じて集計したものである。
「単一」･･･健康保険法第 11 条1項の規定に基づき設立された保険者
「総合」･･･健康保険法第 11 条2項の規定に基づき設立された保険者

## Ⅱ．実施状況の概要

### １．特定健康診査の実施率

（１）全体の実施率

2024 年度の特定健康診査の対象者数（※３）は約 5,142 万人、受診者数（※４）は約 3,161 万人であり、特定健康診査の実施率は 61.5％であった。2023 年度と比較して、1.6 ポイント向上した（表１）。

特定健康診査の実施率の保険者の分布状況は、図１のとおりである。


※3　対象者数：当該年度の4月１日における加入者であって、当該年度において 40 歳以上 74 歳以下に達する者のうち、年度途中における異動者（加入、脱退）及び平成 20 年厚生労働省告示第 3 号に規定する各項のいずれかに該当する者（妊産婦等）と保険者が確認できた者を除いた者の数。

※4　受診者数：特定健康診査における基本的な健診項目を全て実施した者の数

**表１　特定健康診査の実施率（全体）**

| | 対象者数 | 受診者数 | 特定健康診査実施率 |
|---|---|---|---|
| **2024 年度** | **51, 422, 367** | **31, 607, 341** | **61. 5%** |
| 2023 年度 | 52, 103, 341 | 31, 230, 198 | 59. 9% |
| 2022 年度 | 51, 924, 629 | 30, 166, 939 | 58. 1% |
| 2021 年度 | 53, 801, 976 | 30, 389, 789 | 56. 5% |
| 2020 年度 | 54, 183, 746 | 28, 939, 947 | 53. 4% |
| 2019 年度 | 53, 798, 756 | 29, 935, 810 | 55. 6% |
| 2018 年度 | 53, 723, 213 | 29, 396, 195 | 54. 7% |
| 2017 年度 | 53, 876, 463 | 28, 587, 618 | 53. 1% |
| 2016 年度 | 53, 597, 034 | 27, 559, 428 | 51. 4% |
| 2015 年度 | 53, 960, 721 | 27, 058, 105 | 50. 1% |
| 2014 年度 | 53, 847, 427 | 26, 163, 456 | 48. 6% |
| 2013 年度 | 53, 267, 875 | 25, 374, 874 | 47. 6% |
| 2012 年度 | 52, 806, 123 | 24, 396, 035 | 46. 2% |
| 2011 年度 | 52, 534, 157 | 23, 465, 995 | 44. 7% |
| 2010 年度 | 52, 192, 070 | 22, 546, 778 | 43. 2% |
| 2009 年度 | 52, 211, 735 | 21, 588, 883 | 41. 3% |
| 2008 年度 | 51, 919, 920 | 20, 192, 502 | 38. 9% |

**図１　特定健康診査実施率の分布（保険者の構成割合）**



（２）性・年齢階級別の実施率

年齢階級別の特定健康診査の実施率は、45～49 歳で最も高かった。

また、性別は、男性が 65.9％、女性が 57.0％で男性の方が高かった。

男性・女性ともに、60 歳未満で高く、60 歳以上で低くなる傾向が見られた。（表２）

**表２　特定健康診査の実施率（性・年齢階級別）**

| | | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2024 年度** | **全　体** | **61.5%** | **65.9%** | **66.8%** | **66.7%** | **65.7%** | **61.9%** | **52.8%** | **47.5%** |
| | **男性** | **65.9%** | **71.5%** | **71.6%** | **71.5%** | **70.6%** | **67.1%** | **55.7%** | **48.1%** |
| | **女性** | **57.0%** | **59.8%** | **61.6%** | **61.7%** | **60.6%** | **56.8%** | **50.1%** | **47.0%** |
| 2023 年度 | 全　体 | 59.9% | 64.7% | 65.5% | 65.3% | 64.4% | 60.2% | 51.0% | 46.2% |
| | 男性 | 64.6% | 70.6% | 70.9% | 70.5% | 69.8% | 65.8% | 53.8% | 46.5% |
| | 女性 | 55.2% | 58.3% | 59.8% | 59.9% | 58.9% | 54.8% | 48.3% | 46.0% |
| 2022 年度 | 全　体 | 58.1% | 63.3% | 64.1% | 63.8% | 63.0% | 57.7% | 48.4% | 44.8% |
| | 男性 | 63.1% | 69.6% | 70.0% | 69.5% | 69.1% | 63.6% | 50.9% | 44.8% |
| | 女性 | 53.0% | 56.4% | 57.6% | 57.6% | 56.7% | 51.8% | 46.2% | 44.9% |
| 2021 年度 | 全　体 | 56.5% | 62.2% | 62.8% | 62.5% | 61.9% | 55.8% | 46.4% | 43.1% |
| | 男性 | 61.5% | 68.7% | 69.1% | 68.5% | 68.3% | 61.7% | 48.5% | 42.9% |
| | 女性 | 51.5% | 55.3% | 56.2% | 56.2% | 55.4% | 50.1% | 44.4% | 43.3% |
| 2020 年度 | 全　体 | 53.4% | 59.5% | 59.9% | 59.6% | 59.1% | 52.1% | 42.8% | 40.5% |
| | 男性 | 58.9% | 66.6% | 66.8% | 66.3% | 66.1% | 58.4% | 44.9% | 40.2% |
| | 女性 | 48.0% | 51.9% | 52.5% | 52.6% | 51.8% | 45.9% | 40.9% | 40.7% |
| 2019 年度 | 全　体 | 55.6% | 60.8% | 61.2% | 61.1% | 60.6% | 53.7% | 46.2% | 45.0% |
| | 男性 | 60.8% | 67.8% | 68.0% | 67.5% | 67.3% | 59.4% | 47.5% | 44.5% |
| | 女性 | 50.6% | 53.3% | 54.0% | 54.5% | 53.8% | 48.3% | 45.0% | 45.4% |
| 2018 年度 | 全　体 | 54.7% | 59.8% | 60.1% | 60.2% | 59.6% | 52.4% | 45.4% | 44.8% |
| | 男性 | 59.8% | 66.9% | 67.0% | 66.8% | 66.4% | 57.7% | 46.1% | 44.0% |
| | 女性 | 49.7% | 52.1% | 52.7% | 53.3% | 52.7% | 47.2% | 44.7% | 45.5% |
| 2017 年度 | 全　体 | 53.1% | 58.1% | 58.3% | 58.8% | 57.7% | 50.2% | 44.0% | 43.9% |
| | 男性 | 58.1% | 65.3% | 65.4% | 65.7% | 64.6% | 55.1% | 44.2% | 43.0% |
| | 女性 | 48.1% | 50.3% | 50.7% | 51.6% | 50.7% | 45.4% | 43.7% | 44.8% |
| 2016 年度 | 全　体 | 51.4% | 56.3% | 56.5% | 57.2% | 55.6% | 47.9% | 42.9% | 43.3% |
| | 男性 | 56.4% | 63.7% | 63.8% | 64.4% | 62.6% | 52.5% | 42.8% | 42.1% |
| | 女性 | 46.5% | 48.3% | 48.7% | 49.6% | 48.4% | 43.5% | 43.0% | 44.3% |
| 2015 年度 | 全　体 | 50.1% | 54.6% | 55.0% | 55.8% | 53.9% | 46.2% | 42.3% | 43.0% |
| | 男性 | 55.1% | 62.3% | 62.7% | 63.3% | 61.0% | 50.2% | 41.8% | 41.7% |
| | 女性 | 45.3% | 46.4% | 47.0% | 48.1% | 46.8% | 42.4% | 42.8% | 44.2% |
| 2014 年度 | 全　体 | 48.6% | 52.8% | 53.4% | 54.3% | 52.2% | 44.2% | 41.1% | 42.2% |
| | 男性 | 53.6% | 60.9% | 61.5% | 62.0% | 59.4% | 47.8% | 40.5% | 40.9% |
| | 女性 | 43.6% | 44.2% | 45.0% | 46.3% | 44.9% | 40.7% | 41.7% | 43.4% |
| 2013 年度 | 全　体 | 47.6% | 52.1% | 52.9% | 53.6% | 51.1% | 42.6% | 40.0% | 41.2% |
| | 男性 | 52.8% | 60.5% | 61.3% | 61.6% | 58.4% | 45.9% | 39.2% | 40.0% |
| | 女性 | 42.6% | 43.1% | 44.1% | 45.4% | 43.7% | 39.5% | 40.7% | 42.3% |
| 2012 年度 | 全　体 | 46.2% | 50.3% | 51.6% | 51.8% | 49.1% | 40.9% | 39.3% | 40.5% |
| | 男性 | 51.4% | 58.9% | 60.3% | 59.9% | 56.4% | 43.9% | 38.4% | 39.3% |
| | 女性 | 41.1% | 41.2% | 42.4% | 43.5% | 41.8% | 38.0% | 40.1% | 41.4% |

**表２　特定健康診査の実施率（性・年齢階級別）**

| | | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 年度 | 全　体 | 44.7% | 49.0% | 50.3% | 49.9% | 47.1% | 39.1% | 38.2% | 39.1% |
| | 男性 | 49.9% | 57.8% | 59.3% | 58.0% | 54.3% | 41.9% | 37.0% | 38.0% |
| | 女性 | 39.5% | 39.7% | 41.0% | 41.5% | 39.8% | 36.5% | 39.2% | 40.1% |
| 2010 年度 | 全　体 | 43.2% | 47.4% | 48.8% | 48.1% | 45.1% | 37.7% | 37.3% | 38.0% |
| | 男性 | 48.5% | 56.5% | 58.0% | 56.4% | 52.3% | 40.2% | 35.9% | 36.9% |
| | 女性 | 38.1% | 37.9% | 39.3% | 39.7% | 37.9% | 35.3% | 38.6% | 38.9% |
| 2009 年度 | 全　体 | 41.3% | 45.4% | 46.6% | 45.6% | 42.4% | 36.1% | 36.4% | 37.0% |
| | 男性 | 46.5% | 54.4% | 55.7% | 53.7% | 49.3% | 38.4% | 34.8% | 35.9% |
| | 女性 | 36.4% | 35.8% | 37.0% | 37.2% | 35.6% | 34.0% | 37.8% | 37.9% |
| 2008 年度 | 全　体 | 38.9% | 42.0% | 43.1% | 41.9% | 39.1% | 34.3% | 35.6% | 36.3% |
| | 男性 | 43.1% | 50.2% | 51.2% | 49.0% | 44.7% | 35.6% | 33.7% | 35.0% |
| | 女性 | 34.8% | 33.3% | 34.5% | 34.7% | 33.4% | 33.1% | 37.3% | 37.4% |

（３）保険者の種類別の実施率

2024 年度の特定健康診査の実施率は、すべての保険者種類別において、2023 年度と比較して向上している。

保険者の種類別の実施率は、健康保険組合（全体)、共済組合が約８割、全国健康保険協会が約６割、国保組合や船員保険が約５割、市町村国保（全体）が約４割となっている（表３)。

保険者の種類別の性・年齢階級別の実施率では、被用者保険（健康保険組合（全体)、共済組合や全国健康保険協会）において、男性より女性の実施率が低くなっている。また、被保険者・被扶養者別の実施率では、被扶養者の実施率が低くなっている。(表４、５）

保険者の種類別（全国健康保険協会、船員保険を除く。）の特定健康診査実施率分布状況は、図５－１～図８（後掲）のとおりである。

**表３　特定健康診査の実施率（保険者の種類別）**

| | 市町村国保（全体）※１ | | | | 国保組合 | 全国健康保険協会 | 船員保険 | 健康保険組合（全体）※２ | | | 共済組合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | 総合 | 単一 | |
| **2024 年度** | **38.8%** | **30.4%** | **39.6%** | **44.7%** | **53.0%** | **60.6%** | **53.4%** | **83.8%** | **80.7%** | **85.6%** | **83.3%** |
| 2023 年度 | 38.2% | 30.3% | 39.2% | 43.9% | 51.9% | 58.7% | 52.8% | 82.9% | 79.6% | 84.8% | 82.6% |
| 2022 年度 | 37.5% | 29.5% | 38.6% | 43.6% | 51.0% | 57.1% | 52.2% | 82.0% | 78.6% | 83.9% | 81.4% |
| 2021 年度 | 36.4% | 28.2% | 37.6% | 42.5% | 49.0% | 55.9% | 52.0% | 80.5% | 76.9% | 82.5% | 80.8% |
| 2020 年度 | 33.7% | 26.7% | 34.9% | 39.0% | 45.7% | 52.3% | 51.3% | 77.9% | 74.2% | 79.9% | 79.2% |
| 2019 年度 | 38.0% | 29.2% | 39.6% | 44.4% | 49.8% | 53.7% | 52.9% | 79.0% | 75.3% | 81.0% | 79.5% |
| 2018 年度 | 37.9% | 30.0% | 39.3% | 43.9% | 49.4% | 52.2% | 49.9% | 78.2% | 73.8% | 80.7% | 79.2% |
| 2017 年度 | 37.2% | 29.1% | 38.7% | 43.1% | 48.7% | 49.3% | 45.9% | 77.3% | 73.6% | 79.4% | 77.9% |
| 2016 年度 | 36.6% | 28.9% | 38.1% | 42.4% | 47.5% | 47.4% | 48.5% | 75.2% | 71.4% | 77.4% | 76.7% |
| 2015 年度 | 36.3% | 29.1% | 37.9% | 41.9% | 46.7% | 45.6% | 46.8% | 73.9% | 69.7% | 76.2% | 75.8% |
| 2014 年度 | 35.3% | 29.1% | 36.8% | 40.8% | 45.5% | 43.4% | 40.9% | 72.5% | 68.5% | 74.7% | 74.2% |
| 2013 年度 | 34.2% | 27.9% | 35.7% | 39.9% | 44.0% | 42.6% | 40.1% | 71.8% | 67.6% | 74.1% | 73.7% |

## 表３　特定健康診査の実施率（保険者の種類別）

| | 市町村国保（全体）※１ | | | | 国保組合 | 全国健康保険協会 | 船員保険 | 健康保険組合（全体）※２ | | | 共済組合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | 総合 | 単一 | |
| 2012 年度 | 33.7% | 27.6% | 35.2% | 39.3% | 42.6% | 39.9% | 38.9% | 70.1% | 65.2% | 72.6% | 72.7% |
| 2011 年度 | 32.7% | 27.1% | 34.0% | 37.6% | 40.6% | 36.9% | 35.3% | 69.2% | 65.0% | 71.3% | 72.4% |
| 2010 年度 | 32.0% | | | | 38.6% | 34.5% | 34.7% | 67.3% | | | 70.9% |
| 2009 年度 | 31.4% | | | | 36.1% | 31.3% | 32.1% | 65.0% | | | 68.1% |
| 2008 年度 | 30.9% | | | | 31.8% | 30.1% | 22.8% | 59.5% | | | 59.9% |

## 表４　特定健康診査の実施率（保険者の種類別・性・年齢階級別）

| 保険者の種類 | 全体 | 性別 | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村国保（全体） | 38.8% | 男性 | 35.3% | 19.8% | 21.1% | 22.7% | 25.3% | 32.8% | 42.7% | 45.0% |
| | | 女性 | 41.9% | 25.8% | 26.8% | 28.9% | 32.9% | 40.7% | 47.2% | 48.2% |
| 市町村国保（大） | 30.4% | 男性 | 27.6% | 15.3% | 15.6% | 16.8% | 19.4% | 26.2% | 35.6% | 37.1% |
| | | 女性 | 32.9% | 20.7% | 20.8% | 22.6% | 26.3% | 32.6% | 38.1% | 38.2% |
| 市町村国保（中） | 39.6% | 男性 | 35.8% | 19.6% | 21.2% | 23.0% | 25.7% | 33.2% | 43.2% | 45.8% |
| | | 女性 | 43.0% | 26.2% | 27.4% | 29.7% | 33.7% | 41.8% | 48.1% | 49.4% |
| 市町村国保（小） | 44.7% | 男性 | 41.4% | 26.8% | 28.0% | 29.3% | 31.5% | 38.0% | 46.9% | 48.8% |
| | | 女性 | 47.8% | 31.6% | 33.2% | 34.4% | 38.7% | 45.7% | 52.3% | 52.7% |
| 国保組合 | 53.0% | 男性 | 57.3% | 55.1% | 56.7% | 59.1% | 60.9% | 59.2% | 55.7% | 51.3% |
| | | 女性 | 47.3% | 45.8% | 48.2% | 49.3% | 49.5% | 48.4% | 45.1% | 40.4% |
| 全国健康保険協会 | 60.6% | 男性 | 65.9% | 67.9% | 69.0% | 68.5% | 67.0% | 65.7% | 60.9% | 50.9% |
| | | 女性 | 55.1% | 55.8% | 58.0% | 58.3% | 57.3% | 55.0% | 48.2% | 39.3% |
| 船員保険 | 53.4% | 男性 | 64.1% | 68.7% | 70.2% | 69.0% | 65.1% | 63.5% | 55.9% | 46.2% |
| | | 女性 | 31.1% | 32.9% | 34.2% | 32.2% | 31.2% | 30.3% | 29.0% | 25.7% |
| 健康保険組合（全体） | 83.8% | 男性 | 92.6% | 94.0% | 94.4% | 94.5% | 94.0% | 91.9% | 82.6% | 70.6% |
| | | 女性 | 73.7% | 74.2% | 75.8% | 75.6% | 74.8% | 72.7% | 64.3% | 52.1% |
| 健保組合（総合） | 80.7% | 男性 | 89.5% | 90.9% | 91.3% | 91.2% | 90.2% | 88.4% | 81.9% | 71.9% |
| | | 女性 | 70.5% | 72.0% | 73.6% | 73.0% | 71.3% | 67.8% | 59.9% | 47.0% |
| 健保組合（単一） | 85.6% | 男性 | 94.5% | 96.0% | 96.4% | 96.5% | 96.1% | 93.9% | 83.2% | 69.8% |
| | | 女性 | 75.6% | 75.6% | 77.2% | 77.1% | 76.7% | 75.5% | 67.3% | 55.7% |
| 共済組合 | 83.3% | 男性 | 91.1% | 92.6% | 93.8% | 93.5% | 93.0% | 89.4% | 80.0% | 74.8% |
| | | 女性 | 76.8% | 75.8% | 78.2% | 79.1% | 78.8% | 75.9% | 69.4% | 57.3% |

## 表５　特定健康診査の実施率（被保険者・被扶養者別）

| | 被用者保険全体 | | | 全国健康保険協会 | | | 健康保険組合 | | | 共済組合 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 被保険者 | 被扶養者 | | 被保険者 | 被扶養者 | | 被保険者 | 被扶養者 | | 被保険者 | 被扶養者 |
| 2024 年度 | 71.6% | 79.6% | 40.3% | 60.6% | 67.6% | 28.8% | 83.8% | 93.9% | 51.6% | 83.3% | 92.8% | 45.7% |

## ２．特定保健指導の実施率

（１）全体の特定保健指導対象者の割合・実施率


2024 年度の特定保健指導の対象者数は約 524 万人、特定保健指導を終了した者は約 152 万人であり、特定保健指導の実施率は、28.9%であった。2023 年度と比較して、1.3 ポイント向上した。（表６）

特定保健指導の実施率の分布状況は、図２のとおりである。

**表６　特定保健指導の対象者の割合及び特定保健指導実施率（全体）**

| | 特定保健指導<br>対象者数（人） | 特定保健指導<br>対象者割合 | 特定保健指導<br>終了者数（人） | 特定保健指導<br>実施率 |
|---|---|---|---|---|
| **2024 年度** | **5,243,161** | **16.6%** | **1,516,041** | **28.9%** |
| 2023 年度 | 5,190,914 | 16.6% | 1,434,051 | 27.6% |
| 2022 年度 | 5,118,152 | 17.0% | 1,353,893 | 26.5% |
| 2021 年度 | 5,262,265 | 17.3% | 1,294,289 | 24.6% |
| 2020 年度 | 5,225,668 | 18.1% | 1,200,740 | 23.0% |
| 2019 年度 | 5,200,519 | 17.4% | 1,205,961 | 23.2% |
| 2018 年度 | 5,094,255 | 17.3% | 1,183,786 | 23.2% |
| 2017 年度 | 4,918,136 | 17.2% | 959,129 | 19.5% |
| 2016 年度 | 4,690,793 | 17.0% | 881,183 | 18.8% |
| 2015 年度 | 4,530,158 | 16.7% | 792,655 | 17.5% |
| 2014 年度 | 4,403,850 | 16.8% | 783,118 | 17.8% |
| 2013 年度 | 4,295,816 | 16.9% | 759,982 | 17.7% |
| 2012 年度 | 4,317,834 | 17.7% | 707,558 | 16.4% |
| 2011 年度 | 4,271,235 | 18.2% | 642,819 | 15.0% |
| 2010 年度 | 4,125,690 | 18.3% | 540,942 | 13.1% |
| 2009 年度 | 4,086,952 | 18.9% | 503,712 | 12.3% |
| 2008 年度 | 4,010,717 | 19.9% | 308,222 | 7.7% |

**図２　特定保健指導実施率の分布（保険者の構成割合）**



（２）性・年齢階級別の実施率

年齢階級別の特定保健指導実施率は、60～64 歳で 26.7％と最も低く、70 歳以上で相対的に高くなっている。

性別の実施率は、男性 29.0％、女性 28.6％であり、男性が高かった。（表７）

**表７　特定保健指導実施率（性・年齢階級別）**

| | | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2024 年度** | **全　体** | **28.9%** | **28.8%** | **29.0%** | **29.0%** | **29.3%** | **26.7%** | **29.6%** | **30.8%** |
| | **男性** | **29.0%** | **29.1%** | **29.2%** | **29.1%** | **29.6%** | **26.8%** | **28.9%** | **29.9%** |
| | **女性** | **28.6%** | **27.5%** | **28.1%** | **28.7%** | **28.4%** | **26.7%** | **31.3%** | **32.8%** |
| 2023 年度 | 全　体 | 27.6% | 25.0% | 27.3% | 28.2% | 29.0% | 27.3% | 28.0% | 30.8% |
| | 男性 | 27.9% | 25.6% | 27.8% | 28.6% | 29.6% | 27.7% | 27.4% | 29.8% |
| | 女性 | 26.7% | 22.9% | 25.2% | 27.0% | 27.1% | 26.2% | 29.3% | 32.9% |
| 2022 年度 | 全　体 | 26.5% | 23.7% | 25.9% | 27.0% | 28.1% | 25.8% | 27.1% | 30.3% |
| | 男性 | 26.8% | 24.3% | 26.5% | 27.5% | 28.9% | 26.3% | 26.4% | 29.4% |
| | 女性 | 25.3% | 21.3% | 23.7% | 25.3% | 25.7% | 24.6% | 28.9% | 32.1% |
| 2021 年度 | 全　体 | 24.6% | 21.8% | 24.0% | 25.1% | 26.1% | 23.8% | 25.4% | 29.3% |
| | 男性 | 25.0% | 22.5% | 24.7% | 25.8% | 27.0% | 24.2% | 24.7% | 28.4% |
| | 女性 | 23.3% | 19.2% | 21.5% | 23.0% | 23.5% | 22.7% | 27.2% | 31.2% |
| 2020 年度 | 全　体 | 23.0% | 19.9% | 22.2% | 23.6% | 23.9% | 22.2% | 24.9% | 29.6% |
| | 男性 | 23.3% | 20.5% | 22.8% | 24.2% | 24.6% | 22.5% | 24.0% | 28.9% |
| | 女性 | 22.0% | 17.5% | 19.9% | 21.7% | 21.5% | 21.2% | 26.9% | 31.2% |
| 2019 年度 | 全　体 | 23.2% | 20.0% | 22.3% | 23.4% | 24.1% | 21.8% | 26.0% | 31.5% |
| | 男性 | 23.5% | 20.7% | 23.0% | 24.3% | 25.0% | 21.9% | 24.8% | 30.2% |
| | 女性 | 22.1% | 17.0% | 19.5% | 20.5% | 21.1% | 21.4% | 28.5% | 34.1% |
| 2018 年度 | 全　体 | 23.2% | 19.7% | 22.4% | 23.5% | 24.3% | 22.0% | 25.9% | 32.6% |
| | 男性 | 23.5% | 20.3% | 23.0% | 24.2% | 25.1% | 21.8% | 24.7% | 31.5% |
| | 女性 | 22.5% | 16.7% | 19.9% | 20.9% | 21.6% | 22.2% | 28.5% | 34.7% |
| 2017 年度 | 全　体 | 19.5% | 16.2% | 18.7% | 19.9% | 20.1% | 18.2% | 22.5% | 28.4% |
| | 男性 | 19.7% | 16.9% | 19.4% | 20.7% | 20.9% | 18.0% | 21.3% | 27.5% |
| | 女性 | 18.7% | 13.0% | 15.9% | 16.8% | 17.5% | 18.6% | 25.3% | 30.1% |
| 2016 年度 | 全　体 | 18.8% | 15.6% | 17.9% | 19.1% | 19.3% | 17.5% | 22.3% | 28.1% |
| | 男性 | 18.9% | 16.2% | 18.6% | 19.7% | 19.8% | 17.1% | 21.1% | 27.5% |
| | 女性 | 18.3% | 12.7% | 15.2% | 16.5% | 17.4% | 18.6% | 25.0% | 29.3% |
| 2015 年度 | 全　体 | 17.5% | 14.8% | 16.8% | 17.0% | 17.3% | 16.1% | 22.1% | 26.2% |
| | 男性 | 17.5% | 15.3% | 17.3% | 17.5% | 17.7% | 15.5% | 20.8% | 25.6% |
| | 女性 | 17.5% | 12.2% | 14.4% | 15.0% | 15.9% | 17.9% | 24.9% | 27.4% |
| 2014 年度 | 全　体 | 17.8% | 15.3% | 17.2% | 17.4% | 17.4% | 16.6% | 22.6% | 25.0% |
| | 男性 | 17.7% | 15.7% | 17.7% | 17.9% | 17.7% | 15.9% | 21.2% | 24.4% |
| | 女性 | 18.0% | 12.9% | 14.8% | 15.4% | 16.6% | 18.5% | 25.5% | 26.0% |
| 2013 年度 | 全　体 | 17.7% | 14.8% | 17.0% | 17.6% | 17.5% | 16.5% | 22.5% | 25.9% |
| | 男性 | 17.7% | 15.2% | 17.5% | 18.2% | 17.9% | 15.8% | 21.4% | 25.4% |
| | 女性 | 17.7% | 12.1% | 14.4% | 15.3% | 16.1% | 18.5% | 24.9% | 26.8% |
| 2012 年度 | 全　体 | 16.4% | 13.5% | 16.0% | 16.5% | 16.4% | 15.2% | 20.3% | 22.8% |
| | 男性 | 16.4% | 13.9% | 16.6% | 17.1% | 16.8% | 14.6% | 19.4% | 22.8% |
| | 女性 | 16.2% | 11.2% | 13.3% | 13.9% | 14.9% | 17.0% | 22.1% | 22.6% |

**表７　特定保健指導実施率（性・年齢階級別）**

| | | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 年度 | 全　体 | 15.0% | 12.2% | 14.6% | 14.9% | 14.5% | 13.9% | 20.1% | 22.3% |
| | 男性 | 14.9% | 12.5% | 15.0% | 15.2% | 14.7% | 12.9% | 19.3% | 22.5% |
| | 女性 | 15.6% | 10.2% | 12.4% | 13.2% | 13.8% | 16.4% | 21.7% | 22.1% |
| 2010 年度 | 全　体 | 13.1% | 10.3% | 12.0% | 12.2% | 12.2% | 13.0% | 19.5% | 19.8% |
| | 男性 | 12.7% | 10.5% | 12.2% | 12.4% | 12.1% | 11.7% | 18.7% | 20.0% |
| | 女性 | 14.6% | 9.1% | 10.7% | 11.4% | 12.8% | 16.7% | 21.2% | 19.5% |
| 2009 年度 | 全　体 | 12.3% | 9.3% | 10.9% | 10.8% | 10.9% | 12.6% | 19.4% | 19.8% |
| | 男性 | 11.7% | 9.4% | 11.0% | 10.8% | 10.5% | 10.9% | 18.5% | 20.2% |
| | 女性 | 14.6% | 8.4% | 10.3% | 11.0% | 12.6% | 17.0% | 21.0% | 19.3% |
| 2008 年度 | 全　体 | 7.7% | 5.3% | 5.9% | 6.0% | 6.2% | 8.7% | 13.7% | 13.8% |
| | 男性 | 7.1% | 5.4% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 7.2% | 13.1% | 14.1% |
| | 女性 | 9.4% | 4.5% | 5.1% | 5.7% | 7.3% | 11.9% | 14.6% | 13.2% |

（３）　保険者の種類別の実施率

2024 年度の保険者の種類別の特定保健指導実施率は、2023 年度と比較して、船員保険を除き、全ての保険者種別において向上している。保険者の種類別の実施率は、健康保険組合（単一）で 47.3％と最も高く、次いで市町村国保（小）が 45.4％であった。（表８）

保険者種類別・性・年齢階級別の実施率は、市町村国保では、男性の実施率が女性と比較して特に低かった。一方、健康保険組合、共済組合では、40～59 歳の女性の実施率が男性と比較して特に低いなど、保険者種類間で違いが見られる。（表９）

保険者の種類別（全国健康保険協会、船員保険を除く。）の特定保健指導実施率の分布状況は図９－１～図 12（後掲）のとおりである。

**表８　特定保健指導の実施率（保険者の種類別）**

| | 市町村国保（全体） | | | | 国保組合 | 全国健康保険協会 | 船員保険 | 健康保険組合（全体） | | | 共済組合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | 総合 | 単一 | |
| **2024 年度** | **30.2%** | **15.0%** | **29.5%** | **45.4%** | **13.6%** | **20.5%** | **14.2%** | **36.8%** | **20.3%** | **47.3%** | **37.1%** |
| 2023 年度 | 29.1% | 13.9% | 28.7% | 44.9% | 13.1% | 19.0% | 15.0% | 35.4% | 19.3% | 45.5% | 35.1% |
| 2022 年度 | 28.8% | 13.9% | 28.3% | 45.9% | 13.5% | 17.5% | 14.3% | 34.0% | 18.4% | 43.6% | 34.5% |
| 2021 年度 | 27.9% | 13.9% | 27.7% | 44.9% | 13.2% | 16.5% | 13.4% | 31.1% | 17.0% | 39.7% | 31.4% |
| 2020 年度 | 27.9% | 13.3% | 27.9% | 45.9% | 11.6% | 16.0% | 11.7% | 27.0% | 14.8% | 34.1% | 30.8% |
| 2019 年度 | 29.3% | 15.0% | 29.1% | 46.6% | 10.1% | 15.6% | 10.3% | 27.4% | 15.4% | 34.4% | 30.7% |
| 2018 年度 | 28.8% | 15.1% | 29.1% | 45.1% | 10.1% | 16.8% | 8.4% | 25.9% | 14.8% | 32.3% | 30.8% |
| 2017 年度 | 25.6% | 12.3% | 25.8% | 42.4% | 9.3% | 13.2% | 7.6% | 21.4% | 12.0% | 26.8% | 25.5% |
| 2016 年度 | 24.7% | 11.7% | 25.2% | 41.1% | 9.1% | 14.2% | 7.2% | 19.2% | 10.5% | 24.2% | 23.2% |
| 2015 年度 | 23.6% | 12.2% | 24.3% | 38.3% | 8.9% | 12.6% | 6.9% | 18.2% | 10.4% | 22.5% | 19.6% |
| 2014 年度 | 23.0% | 12.9% | 23.7% | 37.4% | 9.1% | 14.8% | 5.9% | 17.7% | 10.4% | 21.5% | 18.1% |
| 2013 年度 | 22.5% | 13.0% | 23.2% | 36.0% | 9.0% | 15.3% | 7.1% | 18.0% | 10.1% | 22.1% | 15.7% |

## 表８　特定保健指導の実施率（保険者の種類別）

| | 市町村国保（全体） | | | | 国保組合 | 全国健康保険協会 | 船員保険 | 健康保険組合（全体） | | | 共済組合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | 総合 | 単一 | |
| 2012 年度 | 19.9% | 11.8% | 20.4% | 32.0% | 9.5% | 12.8% | 6.3% | 18.1% | 9.6% | 22.5% | 13.7% |
| 2011 年度 | 19.4% | 12.0% | 19.9% | 30.2% | 8.3% | 11.5% | 6.5% | 16.7% | 8.9% | 20.5% | 10.6% |
| 2010 年度 | 19.3% | | | | 7.7% | 7.4% | 6.3% | 14.5% | | | 8.7% |
| 2009 年度 | 19.5% | | | | 5.5% | 7.3% | 5.8% | 12.2% | | | 7.9% |
| 2008 年度 | 14.1% | | | | 2.4% | 3.1% | 6.6% | 6.8% | | | 4.2% |

## 表９　特定保健指導実施率（保険者の種類別・性・年齢階級別）

| 保険者の種類 | 全体 | 性別 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40～74 歳 | 40～44 歳 | 45～49 歳 | 50～54 歳 | 55～59 歳 | 60～64 歳 | 65～69 歳 | 70～74 歳 |
| 市町村国保（全体） | 30.2% | 男性 | 28.3% | 22.5% | 20.8% | 20.7% | 21.4% | 24.0% | 34.6% | 33.4% |
| | | 女性 | 33.8% | 27.4% | 27.1% | 26.8% | 28.3% | 31.9% | 38.4% | 36.3% |
| 市町村国保（大） | 15.0% | 男性 | 14.0% | 10.0% | 9.8% | 9.2% | 10.7% | 11.8% | 17.6% | 16.9% |
| | | 女性 | 17.2% | 12.3% | 13.4% | 14.2% | 15.5% | 16.4% | 19.0% | 18.9% |
| 市町村国保（中） | 29.5% | 男性 | 27.5% | 21.3% | 19.6% | 19.6% | 20.3% | 23.4% | 34.0% | 32.7% |
| | | 女性 | 33.3% | 26.6% | 26.2% | 25.9% | 27.7% | 31.3% | 38.2% | 35.9% |
| 市町村国保（小） | 45.4% | 男性 | 43.4% | 36.9% | 34.2% | 35.7% | 35.9% | 37.1% | 50.1% | 49.4% |
| | | 女性 | 49.2% | 43.5% | 41.4% | 42.1% | 43.4% | 47.3% | 53.0% | 52.2% |
| 国保組合 | 13.6% | 男性 | 13.9% | 12.7% | 13.2% | 13.5% | 13.6% | 14.5% | 16.9% | 17.6% |
| | | 女性 | 12.3% | 11.5% | 11.1% | 11.4% | 12.7% | 11.9% | 16.0% | 15.0% |
| 全国健康保険協会 | 20.5% | 男性 | 20.0% | 19.6% | 19.6% | 19.4% | 19.2% | 19.9% | 25.2% | 23.9% |
| | | 女性 | 22.1% | 22.1% | 22.4% | 22.3% | 21.9% | 21.4% | 23.5% | 20.2% |
| 船員保険 | 14.2% | 全体 | 14.2% | 15.7% | 15.3% | 13.8% | 14.1% | 11.0% | 15.0% | 11.2% |
| 健康保険組合（全体） | 36.8% | 男性 | 37.9% | 37.5% | 38.9% | 38.8% | 39.9% | 36.2% | 27.3% | 21.3% |
| | | 女性 | 32.7% | 32.4% | 33.4% | 34.1% | 33.5% | 30.3% | 25.4% | 22.8% |
| 健保組合（総合） | 20.3% | 男性 | 20.5% | 20.6% | 20.6% | 20.4% | 20.5% | 20.2% | 21.2% | 19.4% |
| | | 女性 | 19.6% | 19.8% | 19.9% | 19.9% | 19.6% | 18.5% | 18.2% | 16.6% |
| 健保組合（単一） | 47.3% | 男性 | 49.2% | 49.2% | 51.5% | 50.9% | 50.7% | 45.5% | 31.8% | 22.5% |
| | | 女性 | 40.6% | 41.2% | 42.3% | 42.4% | 40.9% | 36.3% | 29.8% | 26.5% |
| 共済組合 | 37.1% | 男性 | 38.2% | 41.6% | 41.3% | 39.9% | 39.0% | 27.7% | 28.1% | 30.7% |
| | | 女性 | 34.4% | 34.1% | 35.2% | 36.6% | 36.3% | 29.4% | 28.0% | 24.2% |

（注）船員保険の性・年齢階級別実施率については、極端に実施率が低い性・年齢階級があり、そのことによる個人の識別可能性の観点から、年齢階級別実施率のみを掲載している。

### ３．メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率※6

2024 年度のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（対 2008 年度比）は、17.2%であった。2023 年度と比較して増減はなかった。（表 10）

**表 10　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（対 2008 年度比）**

| | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 | メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 |
|---|---|---|
| 2024 年度 | 8,798,179 | ▲17.2% |
| 2023 年度 | 8,803,516 | ▲17.2% |
| 2022 年度 | 8,915,695 | ▲16.1% |
| 2021 年度 | 9,157,754 | ▲13.8% |
| 2020 年度 | 9,472,138 | ▲10.9% |
| 2019 年度 | 9,192,648 | ▲13.5% |
| 2018 年度 | 9,167,968 | ▲13.7% |
| 2017 年度 | 9,104,340 | ▲14.3% |
| 2016 年度 | 8,989,821 | ▲15.4% |
| 2008 年度 | 10,628,054 | － |

※5　推移の表記は、▲（マイナス）を含めて値を表記している。▲をとると、減少率になる。

※6　次の計算式により算出。

$$\text{計算式} = \frac{\text{2008 年度特定保健指導対象者推定数}^{※7} - \text{2024 年度特定保健指導対象者推定数}^{※7}}{\text{2008 年度特定保健指導対象者推定数}^{※7}}$$

※7　特定健康診査の実施率の変化による影響及び年齢構成の変化による影響を排除するため、性別・年齢階層別（5歳階級）に各年度の特定健診受診者に占める特定保健指導対象者の出現割合を算出し、2008 年 3 月 31 日時点の住民基本台帳人口に乗じて算出した推定数。

**図３　特定保健指導対象者の選定基準**

<table>
<tr><th rowspan="2">腹囲</th><th>追加リスク</th><th rowspan="2">④喫煙*4</th><th colspan="2">対象*5</th></tr>
<tr><th>①血糖 ②脂質 ③血圧</th><th>40-64 歳</th><th>65-74 歳</th></tr>
<tr><td rowspan="3">≧85cm(男性)<br>≧90cm(女性)</td><td>2つ以上該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="3">動機付け支援</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">上記以外で BMI<br>≧25 kg/㎡</td><td>3つ該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="4">動機付け支援</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td></td></tr>
<tr><td>1つ該当</td><td></td><td></td></tr>
</table>

(注)喫煙の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

**①血糖**　a 空腹時血糖 100mg/dl 以上又は b　HbA1c（NGSP 値）の場合 5.6 %以上
**②脂質**　空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上（やむを得ない場合は随時中性脂肪 175mg/dl 以上）又は b HDL コレステロール 40mg/dl 未満
**③血圧**　a 収縮期血圧 130mmHg 以上又は b 拡張期血圧 85mmHg 以上
**④質問票　喫煙歴あり**（①から③のリスクが 1 つ以上の場合にのみカウント）

※糖尿病、高血圧又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は、医療保険者による特定保健指導は行わない。

**図４　メタボリックシンドロームの判定基準**

| 腹囲 | 追加リスク<br>①血糖　②脂質　③血圧 | |
|---|---|---|
| ≧85cm（男性）<br>≧90cm（女性） | ２つ以上該当 | メタボリックシンドローム該当者 |
| | １つ該当 | メタボリックシンドローム予備群 |

①血糖　空腹時血糖　110 ㎎/dl　以上
②脂質　a 中性脂肪 150 ㎎/dl 以上　かつ・または　b ＨＤＬコレステロール 40 ㎎/dl 未満
③血圧　a 収縮期血圧 130mmHg 以上　かつ・または　b 拡張期血圧　85mmHg 以上

※高ＴＧ血症、低ＨＤＬ－Ｃ血症、高血圧、糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。

（３）薬剤を服用している者の割合

特定健診受診者のうち、高血圧症・糖尿病・脂質異常症の治療に係る薬剤のいずれか１種類を服用している者の割合は 19.7%、いずれか２種類を服用している者の割合は 9.3%、３種類の薬剤を服用している者の割合は 2.1%であった。(表 11)

また、メタボリックシンドローム該当者及び予備群のうち、いずれか１種類の薬剤を服用している者の割合は 30.8%、いずれか２種類を服用している者の割合は 18.8%、３種類を服用している者の割合は 5.2%であった。(表 12)

**表 11　特定健診受診者のうち、薬剤を服用している者の割合**

| | １種類以上の薬剤を服用している者の割合 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | いずれか１種類の薬剤を服用している者の割合 | いずれか２種類の薬剤を服用している者の割合 | ３種類の薬剤を服用している者の割合 |
| **2024 年度** | **31.1%** | **19.7%** | **9.3%** | **2.1%** |
| 2023 年度 | 30.9% | 19.7% | 9.1% | 2.0% |
| 2022 年度 | 30.7% | 19.7% | 9.0% | 1.9% |
| 2021 年度 | 30.2% | 19.5% | 8.8% | 1.8% |
| 2020 年度 | 29.5% | 19.2% | 8.6% | 1.8% |
| 2019 年度 | 28.9% | 19.0% | 8.3% | 1.7% |
| 2018 年度 | 28.5% | 18.8% | 8.1% | 1.6% |
| 2017 年度 | 28.1% | 18.8% | 7.8% | 1.5% |
| 2016 年度 | 28.1% | 18.8% | 7.8% | 1.4% |
| 2015 年度 | 28.1% | 18.9% | 7.8% | 1.4% |
| 2014 年度 | 28.1% | 19.0% | 7.7% | 1.3% |

**表 12　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群のうち、薬剤を服用している者の割合**

| | 1 種類以上の薬剤を服用している者の割合 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | いずれか１種類の薬剤を服用している者の割合 | いずれか２種類の薬剤を服用している者の割合 | ３種類の薬剤を服用している者の割合 |
| **2024 年度** | **54.8%** | **30.8%** | **18.8%** | **5.2%** |
| 2023 年度 | 54.5% | 31.1% | 18.5% | 5.0% |
| 2022 年度 | 53.8% | 30.9% | 18.1% | 4.8% |
| 2021 年度 | 52.9% | 30.8% | 17.6% | 4.6% |
| 2020 年度 | 51.4% | 30.2% | 16.9% | 4.3% |
| 2019 年度 | 51.5% | 30.6% | 16.7% | 4.2% |
| 2018 年度 | 50.7% | 30.4% | 16.3% | 4.1% |
| 2017 年度 | 49.8% | 30.3% | 15.7% | 3.8% |
| 2016 年度 | 49.7% | 30.3% | 15.7% | 3.7% |
| 2015 年度 | 49.5% | 30.4% | 15.5% | 3.6% |
| 2014 年度 | 49.2% | 30.4% | 15.3% | 3.4% |

**（参考）特定健診・保健指導の実施状況に係る留意事項**

特定健診・保健指導の実施状況については、国において、レセプト情報・特定健診等情報データベースに保有している特定健診・保健指導の実績データを集計し、公表しているところである。

2015 年度には、2008 年度～2012 年度までの特定健診・保健指導データを対象に、当該実績データの精度の向上等を目的として、例えば、検査結果に異常な値が格納されている項目をエラーとして処理するなど、いわゆるデータクリーニングを実施した。

## Ⅲ．実施状況の詳細（集計表・分布図）


（１）　保険者別・性別・年齢階級別・資格区分別　実施状況結果　別表 1～25 参照

（２）　保険者種類別　特定健康診査実施率の分布　　図５－１～図８

　　保険者種類別　特定保健指導実施率の分布　　図９－１～図 12

# 保険者種類別　特定健康診査実施率の分布

## 図５－１　特定健康診査実施率の分布（市町村国保（全体）の構成割合）




## 図５－２　特定健康診査実施率の分布（市町村国保（大）の構成割合）




図５－３　特定健康診査実施率の分布（市町村国保（中）の構成割合）





図５－４　特定健康診査実施率の分布（市町村国保（小）の構成割合）




図６　特定健康診査実施率の分布（国保組合の構成割合）





図７－１　特定健康診査実施率の分布（健保組合（全体）の構成割合）




図７－２　特定健康診査実施率の分布（健保組合（総合）の構成割合）







図７－３　特定健康診査実施率の分布（健保組合（単一）の構成割合）




## 図８　特定健康診査実施率の分布（共済組合の構成割合）



# 保険者種類別　特定保健指導実施率の分布

## 図９－１　特定保健指導実施率の分布（市町村国保（全体）の構成割合）




## 図９－２　特定保健指導実施率の分布（市町村国保（大）の構成割合）




図９－３　特定保健指導実施率の分布（市町村国保（中）の構成割合）





図９－４　特定保健指導実施率の分布（市町村国保（小）の構成割合）




図 10　特定保健指導実施率の分布（国保組合の構成割合）





図 11－１　特定保健指導実施率の分布（健保組合（全体）の構成割合）




図 11－２　特定保健指導実施率の分布（健保組合（総合）の構成割合）





図 11－３　特定保健指導実施率の分布（健保組合（単一）の構成割合）




図 12　特定保健指導実施率の分布（共済組合の構成割合）

