

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報一覧

資料6-2

医薬・生活衛生局食品基準審査課
令和2年11月25日時点

1. コレウス・フォルスコリーを含む食品(93件)

No.	健康被害情報受理日	性別	年齢	主な症状 (自己申告を含む)	摂取開始日	症状発現日	症状発現後の 使用状況・症 状	他のいわゆる 健康食品 の摂取状況	医薬品の 摂取状況	重篤度 (保健所使用欄)	備考
1	令和2年6月29日	女性	70代	摂取3日目からお腹が緩くなり、本品の摂取量を1粒に減らしたが症状は悪化し、水様便となった。	令和2年5月18日	摂取3日頃	減量後症状改善なし	あり	なし	軽微	
2	令和2年6月29日	女性	40代	摂取時だけ眠れなくなる	不明(摂取期間は3週間)	不明	中止後症状改善あり	あり	あり	軽微	
3	令和2年6月29日	男性	40代	頭痛	不明(摂取回数は2回)	摂取1日頃	中止後症状不明	あり	なし	軽微	
4	令和2年6月29日	女性	40代	下痢	不明	元々便秘であったが摂取後3,4日後便通がよくなったが、1週間後くらいから水様便になった。	継続摂取	なし	あり	軽微	
5	令和2年6月29日	男性	60代	下痢	不明(摂取期間は40日間)	不明	継続摂取	あり	あり	軽微	
6	令和2年6月29日	男性	不明	下痢	不明	不明	中止後症状不明	不明	不明	軽微	
7	令和2年6月29日	女性	30代	摂取後30分後から動悸、手足のしびれ、軟便の症状が出たが、その後症状は徐々に治まった。	不明(摂取回数は1回)	摂取30分後(1回のみ摂取)	中止後症状改善あり	なし	不明	軽微	

8	令和2年7月15日	女性	50代	下痢	令和2年6月初旬	摂取開始後すぐ	継続摂取	あり	なし	軽微	
9	令和2年7月15日	女性	50代	腹痛	不明	不明	継続摂取	なし	なし	軽微	
10	令和2年7月15日	女性	50代	下痢	不明(摂取期間は2~3か月)	摂取開始2日後	減量後症状改善なし	なし	なし	軽微	
11	令和2年7月15日	女性	60代	腹痛、下痢	不明(摂取期間は約1か月間)	4粒/日(上限量)にして飲んだ日	継続摂取	なし	あり	軽微	
12	令和2年7月15日	女性	70代	下痢	不明	不明	減量継続	不明	なし	軽微	
13	令和2年7月15日	女性	60代	下痢の一步手前、しぶり腹のようになった。	不明(摂取回数は1回のみ)	1粒/日(最小量)摂取後すぐ	中止後症状不明	なし	なし	軽微	
14	令和2年7月15日	女性	30代	下痢	不明(摂取期間は2~3週間)	摂取約1時間後	減量後症状改善なし	あり	なし	軽微	
15	令和2年7月15日	女性	40代	下痢	不明	不明	継続摂取	あり	なし	軽微	
16	令和2年7月15日	女性	50代	血液検査で中性脂肪が上昇	不明(摂取期間は約6か月間)	令和2年6月24日の血液検査で判明	継続摂取	なし	あり	軽微	

17	令和2年7月15日	女性	50代	屁が臭くなり、量も増えた	不明(摂取期間は約2週間)	摂取開始1週間後くらい	継続摂取	なし	あり	軽微	
18	令和2年7月15日	女性	50代	下痢、便秘、発疹	不明(摂取期間は約半月間)	下痢は本品摂取前から発症、便秘と発疹は下痢を我慢したら2日間便秘になり、顔に発疹ができた(詳細な時期不明)。	中止後症状改善なし	あり	なし	軽微	
19	令和2年7月15日	女性	70代	軟便	不明(摂取期間は約1週間)	摂取開始約1週間後	中止後症状改善あり	なし	なし	軽微	
20	令和2年8月3日	男性	60代	飲用後7時間後にふらつきがあらわれた	不明	摂取1日頃	中止後症状改善あり	不明	あり	軽微	
21	令和2年8月3日	不明	不明	かゆみ(接触性蕁麻疹)	不明	摂取1か月頃	不明	不明	不明	不明	
22	令和2年8月5日	女性	60代	下痢	不明(摂取期間は約1週間)	令和2年7月2日	継続摂取	あり	あり	軽微	
23	令和2年8月5日	女性	70代	下痢	不明	摂取し始めた頃から	継続摂取	あり	あり	軽微	
24	令和2年8月5日	女性	50代	下痢	①不明(摂取期間は2か月間)、②不明(摂取期間は3年間)	①摂取後翌朝、②摂取3日後	①中止後症状不明、②減量後症状改善あり	なし	あり	軽微	コレウス・フォルスコリーを含む食品①から同様の食品②に切り替え摂取。
25	令和2年8月5日	男性	70代	下痢	不明(摂取期間は約1か月間)	摂取し始めた頃から	継続摂取	あり	あり	軽微	

26	令和2年8月5日	女性	40代	以前より便の量が増えた	①令和2年7月4～6日の内1回のみ、②令和2年7月4日	不明	①中止後症状不明、②継続摂取	なし	あり	軽微	コレウス・フォルスコリーを含む食品①及び②を併用摂取したのは1回のみ。
27	令和2年8月5日	女性	40代	胃痛	不明(摂取期間は約1か月間)	摂取開始4～5日後	再使用で症状再発あり	なし	なし	軽微	
28	令和2年8月5日	男性	40代	下痢	不明(摂取期間は1年以上)	摂取し始めた頃から	継続摂取	なし	あり	軽微	
29	令和2年8月5日	女性	50代	下痢	不明(摂取期間は2か月間)	摂取後すぐ	減量後症状不明	なし	なし	不明	
30	令和2年8月5日	女性	不明	軟便、ガスが頻繁となり、徐々に強い悪臭を帯びるようになった。	不明(摂取期間は約2週間)	摂取翌日から	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
31	令和2年8月5日	女性	70代	下痢	不明(摂取期間は1～2週間)	摂取翌日から	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
32	令和2年8月5日	女性	70代	下痢	不明(摂取期間は2か月間)	摂取数時間後	減量後症状改善あり	あり	あり	軽微	
33	令和2年8月5日	女性	70代	お腹がゆるくなった	不明(摂取期間は6～7か月間)	摂取約3か月後	減量後症状改善あり	あり	あり	軽微	
34	令和2年8月5日	女性	70代	下痢	不明(①の摂取期間は2日間、②の摂取期間は約2年間)	2種類のコレウス・フォルスコリーを含む食品を併用摂取した2日目くらい	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	コレウス・フォルスコリーを含む食品①及び②を併用摂取した。

35	令和2年8月5日	女性	60代	便が緩くなる、排便回数増加、飲んだ後に口から食道にかけて熱感(食べ物を食べれば治まる)	不明(摂取期間は1週間弱)	摂取数時間後	中止後症状改善あり	なし	あり	軽微	
36	令和2年8月5日	女性	50代	肝機能若干上昇(GOT:30、GPT:46、 γ GTP:47)	不明(摂取期間は1年以上)	不明	継続摂取	あり	なし	不明	
37	令和2年8月5日	男性	60代	我慢できないほどではないが、便が緩くなる。	不明(摂取期間は約3か月間)	不明	中止後症状不明	なし	なし	軽微	
38	令和2年8月5日	女性	不明	かゆみ・発疹	不明	不明	中止後症状改善あり	不明	不明	軽度	転帰不明
39	令和2年9月2日	女性	50代	かゆみ・発疹	不明	令和2年7月24日の朝、他のいわゆる「健康食品」とともに摂取30分後	継続摂取	あり	なし	軽微	
40	令和2年9月2日	女性	60代	頭痛、かゆみ・発疹(膝裏のかゆみ)	不明(摂取期間は2日間)	頭痛は摂取1時間後、膝裏のかゆみは摂取後2、3時間	継続摂取	なし	あり	軽微	
41	令和2年9月2日	女性	50代	軟便、胃痛	不明(摂取期間は約1ヶ月間)	不明(ただし、軟便は摂取を開始し少しずつ症状が発言し、胃痛は摂取すると発症する)	減量後症状改善なし	あり	なし	軽微	
42	令和2年9月2日	女性	10代	頭痛、嘔気・嘔吐	不明(摂取期間は約1週間)	摂取直後に発症するが、すぐに症状は消失する。	継続摂取	なし	なし	軽微	
43	令和2年9月2日	女性	40代	軟便	不明	不明	継続摂取	あり	なし	軽微	

44	令和2年9月2日	女性	不明	排便回数が増えた。複数回に分けて 少しずつ出る。	不明	不明	不明	不明	不明	不明	軽微	
45	令和2年9月2日	女性	70代	便秘	不明(摂取期間は2~3 年間)	医薬品服用により便秘 になっていたため、漢方 を処方されていた。今年の春 過ぎから漢方が効かなくなっ てきたように感じる。	中止後症状改 善あり	なし	あり	あり	軽微	
46	令和2年9月4日	女性	不明	他のいわゆる「健康食品」と同時に 飲用すると胃のむかつきがあった	不明	摂取2~3ヶ月頃	継続摂取	あり	不明	不明	軽微	
47	令和2年9月4日	女性	50代	昼食後2粒飲んだ後30分おかずムカ ムカと吐き気が酷く嘔吐。昼食は自 身が持っている食物アレルギーのな いものを食べた。	令和2年7月25日	令和2年7月25日	中止後症状改 善あり	あり	あり	あり	軽微	
48	令和2年9月4日	女性	30代	腹痛、下痢	不明	摂取2日目	不明	不明	不明	不明	不明	
49	令和2年9月4日	女性	40代	朝食前に2粒飲用。飲用後1週間で 酷い下痢が続いた。	不明	摂取7日目	不明	あり	不明	不明	不明	
50	令和2年9月10日	男性	70代	下痢	令和2年8月1日	令和2年8月2日	中止後症状改 善あり	あり	あり	あり	軽微	
51	令和2年9月16日	女性	40代	かゆみ・発疹	令和2年8月9日	朝、昼と摂取したとこ ろ、夕食前にかゆみが生じ、夕 食後に摂取30分後に全身に湿 疹が生じた。	中止後症状改 善あり	あり	あり	あり	軽度	外来治療で治癒
52	令和2年9月16日	女性	40代	かゆみ・発疹	不明	不明	再使用で症状 再発あり	なし	なし	なし	軽微	

53	令和2年9月16日	女性	60代	元々便秘がちだったが、軟便になった。	令和2年3~4月頃から	就寝2時間前にまとめて3粒摂取するようになってから(詳細な日付は不明)	継続摂取	あり	なし	軽微
54	令和2年9月16日	女性	40代	3錠/日でめまい、胃の痛み、4錠/日で気分の不調、軟便	令和2年8月14日	摂取直後	継続摂取	あり	あり	軽微
55	令和2年9月16日	女性	60代	かゆみ・発疹	不明	令和2年8月14日	継続摂取	なし	あり	軽微
56	令和2年9月16日	女性	50代	下痢	不明(摂取期間は約1か月間)	摂取開始翌日から	中止後症状改善なし	なし	なし	軽微
57	令和2年9月16日	女性	50代	便がゆるくなった	令和2年8月7日	令和2年8月7日	中止後症状改善なし	あり	なし	軽微
58	令和2年9月16日	女性	40代	お腹がゆるくなった	令和2年8月18日	令和2年8月20日	中止後症状改善なし	あり	あり	軽微
59	令和2年9月16日	女性	30代	下痢	令和2年8月18日	令和2年8月19日	継続摂取	なし	あり	軽微
60	令和2年9月16日	女性	40代	下痢	不明(摂取期間は2~3週間)	不明	中止後症状不明	なし	あり	軽微
61	令和2年9月16日	女性	40代	便がゆるくなり、排便リズムが一定でなくなった	不明	摂取し始めた頃から	継続摂取	不明	不明	軽微

62	令和2年9月16日	女性	20代	腹痛、下痢	不明	症状発現日は不明だが、夜に2粒摂取すると翌日12~15時くらいに発現する。	中止後症状不明	不明	不明	軽微	
63	令和2年9月30日	男性	50代	下痢	不明	摂取当日から	継続摂取	なし	あり	軽微	
64	令和2年9月30日	女性	50代	下痢	不明(報告時点の摂取期間は約10日間)	摂取2日目	継続摂取	あり	なし	軽微	
65	令和2年9月30日	女性	50代	軟便並びに髪が抜けるようになった。	不明(摂取期間は40日間)	不明(脱毛については摂取前後のいずれか不明。軟便は摂取後発現)	中止後症状改善あり	なし	あり	軽微	
66	令和2年9月30日	女性	不明	下痢	不明(摂取期間は3週間)	摂取2~3日後	中止後症状改善あり	あり	あり	軽微	
67	令和2年9月30日	女性	20代	元々生理前に不眠傾向はあったが、本品を摂取し始めてから、眠れなくなった気がする。	令和2年8月末	摂取7日目	継続摂取	あり	あり	軽微	
68	令和2年9月30日	女性	60代	元々便秘体質だったが、軟便になった。	不明(摂取期間は2か月程度)	摂取2~3日後	継続摂取	なし	あり	軽微	
69	令和2年10月9日	女性	40代	腹痛	不明	令和2年9月9日	中止後症状改善あり	不明	不明	軽微	
70	令和2年10月12日	女性	20代	便が軟らかくなった。	令和2年5月	摂取開始3週間経過した頃	継続摂取	あり	あり	軽微	

71	令和2年10月12日	女性	40代	お腹がゆるくなることもある。	令和2年8月上旬	摂取後すぐ	継続摂取	あり	なし	軽微	
72	令和2年10月12日	女性	70代	かゆみ・発疹	不明	不明	不明	不明	不明	軽度	転帰不明
73	令和2年10月12日	女性	40代	他のいわゆる「健康食品」を摂取後に急激な下痢となり、その翌日以降に本品を摂取。下痢からの回復が完全ではなく、緩い状態が続いている。全身の掻痒感が続き(赤いが蕁麻疹はない)、横になると眠くなってしまふ。発熱の有無が確認していないが、体が熱い。	不明	掻痒感及び眠気は摂取2~3日目から。	継続摂取	なし	あり	軽微	
74	令和2年10月12日	女性	50代	γ-GTPの数値が上がって、医師より脂肪肝と言われた。	不明(摂取期間は約3年間)	摂取開始約3年後	継続摂取	あり	なし	軽微	
75	令和2年10月12日	女性	60代	足首、左手、鼻の頭の辺りがかゆくなってきた。	令和2年9月8日	令和2年9月16日	継続摂取	なし	あり	軽微	
76	令和2年10月12日	女性	20代	お腹が緩くなった。	不明	不明	継続摂取	不明	不明	軽微	
77	令和2年10月12日	女性	50代	本品摂取後すぐに胃が痛くなった。	不明	摂取後すぐ	再使用で症状再発あり	あり	なし	軽微	
78	令和2年10月28日	女性	50代	軟便	不明	摂取1時間後	継続摂取	あり	なし	軽微	

79	令和2年10月28日	女性	40代	下痢	不明(摂取期間は2週間)	本品摂取した翌朝	継続摂取	あり	なし	軽微	
80	令和2年10月28日	女性	60代	下痢	不明(摂取期間は現在2か月目)	摂取後すぐ	継続摂取	不明	なし	軽微	
81	令和2年10月28日	男性	70代	倦怠感	不明~R2.9月中旬	摂取し始めた頃(本品を年単位で摂取している)	中止後症状改善あり	あり	あり	軽微	
82	令和2年11月11日	女性	20代	下痢、腹部膨満感、消化不良、便秘	不明	不明	継続摂取	不明	不明	不明	
83	令和2年11月11日	不明	不明	下痢	不明	摂取1日目	不明	不明	不明	不明	
84	令和2年11月11日	女性	不明	下痢	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
85	令和2年11月11日	不明	不明	下痢、お腹が緩くなった。	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
86	令和2年11月16日	女性	30代	下痢、胃が痛くなる。	不明	2粒/日:摂取当日、1粒/日:摂取3,4日後	継続摂取	あり	なし	軽微	
87	令和2年11月16日	女性	50代	軟便	不明(摂取期間は1か月間)	摂取当日	減量後症状改善あり	あり	あり	軽微	

88	令和2年11月24日	女性	60代	本品を寝る前に摂取すると2~3時間くらい眠れないことがある。	不明(ただし、長年摂取しているとのこと)	不明	継続摂取	あり	あり	軽微	
89	令和2年11月24日	女性	60代	膝の力が抜ける感じがした。	令和2年10月9日	本品摂取開始初日だけ症状発現	継続摂取	なし	あり	軽微	
90	令和2年11月24日	女性	60代	腹痛	不明(摂取期間は薬3か月)	摂取開始後すぐ	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
91	令和2年11月24日	女性	70代	下痢	不明(摂取期間は数年単位)	摂取開始直後から	継続摂取	あり	なし	軽微	
92	令和2年11月24日	男性	60代	軟便	令和2年10月22日	摂取後約30分	継続摂取	あり	あり	軽微	
93	令和2年11月24日	女性	60代	便秘気味になり、2kg太った。	不明(摂取期間は2, 3週間)	摂取開始2日後ぐらいから	継続摂取	なし	あり	軽微	

2. ドオウレンを含む食品(0件)

No.	健康被害情報受理日	性別	年齢	主な症状 (自己申告を含む)	摂取開始日	症状発現日	症状発現後の 使用状況・症状	他のいわゆる健康食品の 摂取状況	医薬品の 摂取状況	重篤度 (保健所使用欄)	備考
健康被害情報なし											

3. プエラリア・ミリフィカを含む食品(13件)

No.	健康被害情報受理日	性別	年齢	主な症状 (自己申告を含む)	摂取開始日	症状発現日	症状発現後の 使用状況・症状	他のいわゆる健康食品の 摂取状況	医薬品の 摂取状況	重篤度 (保健所使用欄)	備考
1	令和2年6月29日	女性	70代	1ヶ月程度摂取した時期から、やや黄色味をおびた帯下が少しでるようになった。	令和元年12月	令和2年1月頃	継続摂取	あり	あり	軽微	
2	令和2年7月10日	女性	不明	下痢、腹痛	令和2年6月9日	令和2年6月9日	中止後症状改善あり	なし	なし	軽微	
3	令和2年8月3日	男性	不明	「脳にきている」とのことが、その他詳細は不明	不明	不明	不明	不明	不明	軽度	症状の詳細及び転帰不明
4	令和2年8月3日	女性	40代	性器不正出血	平成26年7月1日	平成27年6月頃	中止後症状改善なし	あり	不明	軽度	転帰不明
5	令和2年8月3日	女性	40代	かゆみ・発疹	令和2年7月22日	令和2年7月22日	中止後症状改善なし	なし	なし	軽微	
6	令和2年9月3日	女性	50代	蕁麻疹が全身に広がり8/7-13まで入院。医療機関では血液検査をしたが原因不明。現在は退院し、引き続き治療中。	令和2年7月10日	令和2年7月17日	中止後症状改善なし	あり	なし	中等度	調査会座長をはじめとする専門家への聴取の結果、明らかな因果関係は認めず、引き続き注視しながら、必要な対応を行う。
7	令和2年9月3日	男性	10代	かゆみ・発疹	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
8	令和2年10月12日	女性	30代	生理痛緩和の実感があったが、途中から生理が重くなり、痛みが強くなってきた。	不明(摂取期間は4～5年間)	摂取数年後	中止後症状改善なし	あり	あり	軽微	

9	令和2年10月30日	不明	不明	摂取後に胸やけがした。	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
10	令和2年11月11日	女性	不明	不正性器出血、月経不順	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
11	令和2年11月11日	女性	50代	不正性器出血、月経不順、胸の張り	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
12	令和2年11月11日	女性	不明	胸の張り、生理時の出血過多	不明	不明	中止後症状不明	不明	不明	不明	
13	令和2年11月16日	女性	30代	腹痛	令和2年10月2日	令和2年10月4日	中止後症状改善あり	なし	なし	軽微	

4. ブラックコホシユを含む食品 (54件)

No.	健康被害情報受理日	性別	年齢	主な症状 (自己申告を含む)	摂取開始日	症状発現日	症状発現後の 使用状況・症状	他のいわゆる健康食品の 摂取状況	医薬品の 摂取状況	重篤度 (保健所使用欄)	備考
1	令和2年7月2日	女性	50代	動悸が激しくなった	不明	不明	中止後症状改善あり	不明	あり	軽度	転帰不明
2	令和2年7月2日	女性	50代	胸の張り、むくみ(顔、手指、膝から下)、月経不順(3月以降生理がきてない)	令和2年5月	胸の張り→摂取10日頃、むくみ→摂取2週間後、月経不順→不明	中止後症状改善あり	あり	あり	軽微	
3	令和2年7月2日	女性	40代	手足の冷え	令和2年4月	不明	継続摂取	不明	不明	軽微	

4	令和2年7月14日	女性	70代	腹痛、胃腸の張り・痛み	不明	2回摂取後	中止後症状改善あり	あり	不明	軽度	転帰不明
5	令和2年7月14日	女性	80代	かゆみ・発疹(顔に湿疹(湿疹の中に芯のようなものがある))	令和2年1月6日	令和2年2月頃	中止後症状改善なし	あり	不明	軽度	転帰不明
6	令和2年7月14日	女性	60代	脂汗が脇、顔に出た(じわーっと気持ち悪い汗の出方)	不明	摂取後すぐ	中止後症状改善あり	不明	なし	軽微	
7	令和2年7月14日	女性	不明	眠気(いつもより眠かった、寝つきが良かった)	令和2年6月16日	令和2年6月16日	継続摂取	不明	不明	軽微	
8	令和2年7月14日	女性	50代	胃不快感	令和2年5月20日	令和2年5月27日	継続摂取	不明	不明	軽微	
9	令和2年7月14日	女性	50代	かゆみ・発疹(肘の内側、上腕の内側に湿疹、かゆみ)	令和2年2月7日	令和2年2月10日	摂取中止後の症状不明	不明	不明	軽度	転帰不明
10	令和2年7月14日	女性	60代	かゆみ・発疹(胸の下にぶつぶつができた(かゆみ、赤み無し))、食欲不振(胃がすっきりしない、食欲がない)	平成30年5月	かゆみ・発疹(胸の下にぶつぶつができた(かゆみ、赤み無し)):令和2年6月、食欲不振(胃がすっきりしない、食欲がない):令和元年8月～	中止後再使用により症状再発(胃部不快感は令和元年8月から半年間有り、本製品の摂取中止期間は症状改善し、摂取再開時に胃部不快感再発)	不明	不明	軽微	

11	令和2年7月14日	女性	不明	胃痛、めまい、ふらつき	不明	摂取3～4日	中止後症状改善あり	不明	不明	軽微	
12	令和2年7月14日	女性	50代	便秘	令和2年5月20日	令和2年5月23日	中止後症状改善あり	不明	不明	軽微	
13	令和2年7月14日	女性	不明	胃痛、胃不快感	令和2年3月	摂取2週間目	中止後症状改善あり	不明	不明	軽度	転帰不明
14	令和2年7月21日	女性	50代	月経不順(生理が止まる)	令和元年5、6月頃	不明	中止後症状改善あり、再使用症状再発。	なし	なし	軽微	
15	令和2年7月21日	女性	60代	体重増加(59kg-61kg)、ウエスト周りが太ってきた	令和2年4月4日	不明	不明	あり	なし	軽微	
16	令和2年7月22日	女性	30代	バスのポリウムが出てきた(心配になり摂取を中止した。)	令和2年6月4日	令和2年6月18日	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
17	令和2年7月27日	女性	50代	肩、首筋が重くてだるい	令和2年6月27日	令和2年6月27日	継続摂取	あり	あり	軽微	
18	令和2年7月27日	女性	50代	時々お腹がじくじくする、違和感がある感じ。	令和2年6月27日	令和2年6月28日	継続摂取	あり	あり	軽微	
19	令和2年7月27日	女性	80代	頭がフワツとして、ふらつきがある。	令和2年6月27日	不明	継続摂取	不明	不明	軽微	

20	令和2年7月27日	女性	不明	お通じの出方が変わった。おならが出る。尿の度に便が混ざる(詳細不明)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	軽微	
21	令和2年8月4日	女性	60代	胃の痛み	令和2年6月16日	不明	中止後症状改善あり	あり	不明	不明	軽度	転帰不明
22	令和2年8月4日	女性	不明	頭痛の頻度が増えた	不明	不明	継続摂取	不明	不明	不明	軽微	
23	令和2年8月18日	女性	70代	かゆみ・発疹(左右眼下に赤い湿疹(特に左側が酷い))	令和2年1月8日	不明	中止後症状改善あり	不明	あり	不明	軽微	
24	令和2年8月18日	女性	50代	下痢(お腹が緩くなった)	不明	不明	継続摂取	不明	不明	不明	軽微	
25	令和2年8月18日	女性	不明	イライラが酷くなった	令和2年6月23日	不明	継続摂取	あり	あり	不明	軽微	
26	令和2年8月18日	女性	不明	胃がもたれてムカムカした	令和2年7月1日	令和2年7月8日	中止後症状不明	不明	不明	不明	軽微	
27	令和2年8月18日	女性	60代	片頭痛、めまい、吐き気	令和元年12月12日	不明	中止後症状改善あり	不明	不明	不明	軽度	転帰不明
28	令和2年8月24日	女性	70代	手、足、腿、あごの下に湿疹、赤み	令和2年6月30日	摂取2日後	中止後症状改善あり	あり	あり	不明	軽度	転帰不明

29	令和2年8月24日	女性	不明	胃がムカムカした	令和2年7月11日	令和2年7月頃	中止後症状改善あり	不明	あり	軽微	
30	令和2年8月24日	女性	60代	下痢	令和2年5月1日	摂取2～3日頃	中止後症状改善あり	不明	不明	軽微	
31	令和2年8月24日	女性	70代	顔、喉、腕の内側に赤い湿疹	不明	不明	中止後症状改善あり	あり	あり	軽度	転帰不明
32	令和2年9月1日	女性	60代	お腹周りの脂肪が増えた	不明	不明	不明	あり	あり	軽微	
33	令和2年9月1日	女性	60代	柔らかい便が続いている	不明	不明	継続摂取	不明	あり	軽微	
34	令和2年9月1日	女性	60代	体に湿疹ができた	不明	摂取1週間後	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
35	令和2年9月1日	女性	50代	閉経しているのに生理がきた	不明(摂取期間は約8ヶ月)	令和2年7月25日	中止後症状改善あり	なし	なし	軽微	
36	令和2年9月1日	女性	70代	胃がムカムカする	不明	令和2年6月初旬	中止後症状改善なし	なし	あり	軽微	
37	令和2年9月1日	女性	50代	胃が張ったような感じがする	令和2年7月30日	令和2年7月30日	中止後症状不明	なし	あり	軽微	

38	令和2年9月1日	男性	30代	体が火照る	不明	令和2年8月3日	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
39	令和2年9月1日	女性	不明	蕁麻疹	不明	不明	不明	不明	不明	軽微	
40	令和2年9月1日	女性	50代	お腹が緩くなる	不明	不明	中止後症状改善あり	なし	なし	軽微	
41	令和2年9月18日	女性	50代	消化不良	不明	摂取翌日	中止後症状改善あり	不明	不明	軽微	
42	令和2年9月18日	女性	60代	肝機能の数値が上がった(数値不明)	令和2年7月8日	令和2年8月21日	不明	不明	あり	軽度	転帰不明
43	令和2年9月18日	女性	60代	かゆみ・発疹(左臀部下、腹部、右大腿部に発疹、肛門にかゆみ)	令和2年7月30日	かゆみ: 令和2年8月6日 発疹: 令和2年8月14日	中止後症状改善あり	なし	あり	軽度	転帰不明
44	令和2年9月18日	女性	50代	お腹が緩くなる	平成30年1月20日	不明	中止後症状改善あり	あり	なし	軽微	
45	令和2年9月18日	女性	60代	胃不快感、吐き気、片方の脇の下が臭うようになった	令和2年6月下旬	胃不快感: 令和2年8月、吐き気: 摂取1カ月後、脇の下の臭い: 不明	中止後症状改善あり	不明	あり	軽微	
46	令和2年9月18日	女性	40代	便秘	不明	摂取2~3日頃	不明	不明	不明	軽微	

47	令和2年9月18日	女性	60代	腹部(子宮の辺り)の張り、閉経後はなかったおりもののができるようになった	令和2年7月	摂取21日頃	継続摂取	不明	不明	軽微	
48	令和2年10月6日	女性	40代	胃がムカムカする、上がってくる感じ	不明	令和2年8月13日	継続摂取	あり	不明	軽微	
49	令和2年10月6日	女性	50代	指の関節に腫れ、痛み	平成29年12月30日	不明	中止後症状改善あり	不明	不明	軽度	未回復
50	令和2年10月12日	女性	60代	臨床検査値の異常 検査日不明: γ -GTP:244、GOT:48、GPT:80、総コレステロール値:基準値から約50高かった 令和2年9月14日再検査: γ -GTP:189、GOT:23、GPT:38、LDH:210、ALP:590、その他肝機能数値は基準値内、腫瘍マーカー異常なし	令和2年7月9日	不明	中止後症状不明	あり	あり	軽度	転帰不明
51	令和2年10月12日	女性	不明	かゆみ・発疹(赤い発疹ようなものが時々出たり治まったりした。)、体重増加	不明	不明	中止後症状不明	あり	不明	軽度	転帰不明
52	令和2年10月30日	女性	50代	臨床検査値の異常(肝機能の数値が高くなった(検査項目、数値不明))	不明	不明	継続摂取	不明	不明	軽微	摂取前から肝機能の数値が高い時がある。
53	令和2年10月30日	女性	50代	おりものに混じって少し出血がある	令和2年9月25日	令和2年10月3日	不明	不明	不明	軽微	
54	令和2年10月30日	女性	40代	月経不順(生理周期が短くなった。10月7日予定が10月2日に来た。)	令和2年8月上旬	令和2年10月2日	不明	不明	なし	軽微	

5. プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュを含む食品(5件)

No.	健康被害 情報受理日	性別	年齢	主な症状 (自己申告を含む)	摂取開始日	症状発現日	症状発現後の 使用状況・症 状	他のいわゆる 健康食品 の摂取状況	医薬品の 摂取状況	重篤度 (保健所使用欄)	備考
1	令和2年6月8日	女性	60代	2年位前に1度だけ不正出血(2~3日間、出血多量)があった。その後、摂取量を1粒に減らし、継続摂取しているが同症状はない。	不明(長年使用している)	平成30年頃(2年前と同じ申告)	3粒/1日→1粒に減らして継続摂取	なし	なし	軽微	
2	令和2年6月8日	女性	40代	胸がどンドンしぼんでいき、生理も1週間早くきた。	令和2年5月4日	不明	不明	あり	あり	軽微	
3	令和2年6月29日	女性	50代	不正性器出血(摂取2~3日でトイレトペーパーで拭くときにわずかにつく程度)	令和2年5月20日	令和2年5月21日	継続摂取	あり	なし	軽微	
4	令和2年7月15日	女性	50代	腹痛	不明	不明	不明	不明	不明	軽微	
5	令和2年9月2日	女性	50代	蕁麻疹	不明(摂取期間は2週間)	令和2年8月2日の昼頃	中止後症状改善なし	あり	なし	軽微	