

(2) 指定成分等含有食品の健康被害情報について

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	(製品数)	9月	10月	11月	12月	累計
コレウス・フォルスコリー	(6)	5	11	5	1	22
ドオウレン	(0)	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	(0)	0	0	0	0	0
ブラックコホシュ	(2)	0	0	2	0	2
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	(0)	0	0	0	0	0
合計	(8)	5	11	7	1	24

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	3	17	2	22
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0
ブラックコホシュ	0	2	0	2
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	3	19	2	24

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	0	3	2	4	4	7	0	0	2	22
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブラックコホシュ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	3	4	4	4	7	0	0	2	24

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		ブラックコホシュ	
下痢	8	不正性器出血	1
かゆみ・発疹	4	その他	※
腹痛	2		
倦怠感	2		
発熱	1		
頭痛	1		
その他	※		

※その他の内容

【コレウス・フォルスコリー】軟便/お腹の張り/胃の不快感等

【ブラックコホシュ】血尿等

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	13	4	5	22
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0
ブラックコホシュ	1	0	1	2
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	14	4	6	24

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	6	10	6	22
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0
ブラックコホシュ	0	1	1	2
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	6	11	7	24

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年9月1日～令和6年12月31日)

【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度以上	死亡	未回答・不明	累計
コレウス・フォルスコリー	21	1	0	0	0	22
ドオウレン	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	0	0	0
ブラックコホシュ	1	1	0	0	0	2
プエラリア・ミリフィカ＋ ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0
合計	22	2	0	0	0	24

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度以上: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合