

D P Cにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%ileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和3年3月23日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品並びに令和3年5月19日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的な費用		包括範囲薬剤の84%ile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	ベネクレクタ錠10mg ベネクレクタ錠50mg ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラ ス	10mg1錠 50mg1錠 100mg1錠	872.8円 3,956.6円 7,585.9円	急性骨髄性白血病	アザシチジン併用の場合： 通常、成人にはベネトクラクスとして、用量漸増期は1日目に100mg、2日目に200mg、3日目に400mgをそれぞれ1日1回、食後に経口投与する。その後の維持投与期は、400mgを1日1回、食後に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 シタラビン少量療法併用の場合： 通常、成人にはベネトクラクスとして、用量漸増期は1日目に100mg、2日目に200mg、3日目に400mg、4日目に600mgをそれぞれ1日1回、食後に経口投与する。その後の維持投与期は、600mgを1日1回、食後に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	シタラビン少量療法併用の場合 1日目：7,585.9円/回 2日目：15,171.8円/回 3日目：30,343.6円/回 4日目：45,515.4円/回 維持期：45,515.4円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130010 急性白血病				
								130010xx99x2xx	3513	12.00回	468,860円	312,736円
								130010xx97x2xx	3523	44.00回	1,931,473円	906,738円
一変	レンビマカプセル4mg レンビマカプセル10mg	レンバチニブ メシル酸塩	4mg1カプセル 10mg1カプセル	4,029.7円 9,527.4円	切除不能な胸腺癌	通常、成人にはレンバチニブとして1日1回24mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	23,084.5円/回	040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍				
								040010xx99x2xx	1920	30.00回	692,535円	108,748円
								040010xx99x30x	1921	10.00回	230,845円	147,982円
								040010xx99x31x	1922	23.00回	530,944円	275,246円
								040010xx97x2xx	1924	54.00回	1,246,563円	462,980円
								040010xx97x3xx	1925	29.00回	669,451円	417,061円
一変	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg1瓶	42,296円	急性骨髄性白血病	通常、成人にはアザシチジンとして75mg/m ² （体表面積）を1日1回7日間皮下投与又は10分かけて点滴静注し、3週間休薬する。これを1サイクルとし、投与を繰り返し、なお、患者の状態により適宜減量する。	84,592円/回	130010 急性白血病				
								130010xx99x2xx	3513	7.00回	592,144円	312,736円
								130010xx97x2xx	3523	14.00回	1,184,288円	906,738円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値			
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)				
新薬(1)	イソツリサ錠1mg イソツリサ錠5mg	オシロドロスタットリン酸塩	1mg1錠 5mg1錠	3,335.9円 13,249.0円	クッシング症候群(外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合)	通常、成人にはオシロドロスタットとして1回1mgを1日2回経口投与から開始するが、開始用量は患者の状態に応じて適宜減量する。その後は、患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1回30mgを1日2回とする。	3,335.9円/回	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	14.00回	46,703円	14,950円			
								100260	下垂体機能亢進症				20.00回	66,718円	43,368円
								100180xx990x0x	3163				8.00回	26,687円	13,499円
								100180xx990x1x	3164				30.00回	100,077円	33,891円
								100180xx991xxx	3165				22.00回	73,390円	13,050円
								100180xx97x0xx	3166				16.00回	53,374円	20,219円
								100180xx02xxxx	3168				24.00回	80,062円	59,420円
								100180xx01xxxx	3169				36.00回	120,092円	40,182円
								100260xx9900xx	3187				40.00回	133,436円	87,676円
								100260xx9911xx	3190						
100260xx9700xx	3191														
100260xx9710xx	3192														
新薬(2)	ヴァイトラックピカブセル25mg ヴァイトラックピカブセル100mg ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	ラロトレクチニブ硫酸塩	25mg1カプセル 100mg1カプセル 2%1mL	4,042.5円 14,542.9円 2,908.6円	NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	通常、成人にはラロトレクチニブとして1回100mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 通常、小児にはラロトレクチニブとして1回100mg/m ² (体表面積)を1日2回経口投与する。ただし、1回100mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。	14,542.9円/回	010010	脳腫瘍	62.00回	901,660円	250,869円			
								02001x	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍				8.00回	116,343円	8,050円
								03001x	頭頸部悪性腫瘍				1769	465,373円	119,421円
								040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍				1842	1,018,003円	204,492円
								040040	肺の悪性腫瘍				1843	1,483,376円	259,844円
								040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍				1844	378,115円	142,737円
								050010	心臓の悪性腫瘍				1845	552,630円	194,178円
								060010	食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)						
								060020	胃の悪性腫瘍						
								060030	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍						
								060035	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍						
								060040	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍						
								060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)						
								060060	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍						
								06007x	膵臓、脾臓の腫瘍						
								070030	脊椎・脊髄腫瘍						
								070040	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)						
								070041	軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)						
								080006	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)						
								090010	乳房の悪性腫瘍						
								100020	甲状腺の悪性腫瘍						
								100030	内分泌腺及び関連組織の腫瘍						
								11001x	腎腫瘍						
								11002x	性器の悪性腫瘍						
								110070	膀胱腫瘍						
								110080	前立腺の悪性腫瘍						
								110100	精巣腫瘍						
								120010	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍						
								12002x	子宮頸・体部の悪性腫瘍						
								130010	急性白血病						
130030	非ホジキンリンパ腫														
010010xx9904xx	5														
010010xx9906xx	6														
02001xxx99x1xx	1769														
03001xxx99x30x	1842														
03001xxx99x31x	1843														
03001xxx99x40x	1844														
03001xxx99x41x	1845														

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
								040010xx99x2xx	1920	60.00回	872,574円	108,748円
								040010xx99x30x	1921	20.00回	290,858円	147,982円
								040010xx99x31x	1922	46.00回	668,973円	275,246円
								040040xx99060x	1940	34.00回	494,459円	406,090円
								040040xx99061x	1941	54.00回	785,317円	610,051円
								040040xx9916xx	1953	72.00回	1,047,089円	744,917円
								040050xx99x2xx	1969	52.00回	756,231円	158,500円
								040050xx99x3xx	1970	44.00回	639,888円	106,644円
								050010xxxxxxxx	2234	38.00回	552,630円	230,337円
								060010xx99x30x	2463	42.00回	610,802円	109,796円
								060010xx99x31x	2464	88.00回	1,279,775円	272,342円
								060010xx99x40x	2465	20.00回	290,858円	82,170円
								060010xx99x41x	2466	34.00回	494,459円	195,629円
								060020xx99x2xx	2480	50.00回	727,145円	116,871円
								060020xx99x3xx	2481	14.00回	203,601円	55,582円
								060030xx99x2xx	2500	54.00回	785,317円	113,939円
								060030xx99x31x	2502	32.00回	465,373円	366,470円
								060035xx99x2xx	2519	52.00回	756,231円	105,368円
								060035xx99x3xx	2520	16.00回	232,686円	72,366円
								060040xx99x2xx	2552	54.00回	785,317円	95,566円
								060040xx99x30x	2553	18.00回	261,772円	101,307円
								060040xx99x31x	2554	40.00回	581,716円	228,015円
								060050xx9903xx	2596	58.00回	843,488円	295,843円
								060050xx99040x	2597	24.00回	349,030円	152,723円
								060050xx99041x	2598	46.00回	668,973円	205,447円
								060060xx99030x	2612	16.00回	232,686円	60,113円
								060060xx99031x	2613	42.00回	610,802円	124,524円
								06007xx9903xx	2631	60.00回	872,574円	109,722円
								06007xx9904xx	2632	22.00回	319,944円	73,030円
								06007xx9914xx	2637	42.00回	610,802円	77,010円
								070030xx9901xx	2860	34.00回	494,459円	269,194円
								070040xx99x2xx	2868	48.00回	698,059円	120,369円
								070040xx99x4xx	2869	38.00回	552,630円	207,274円
								070041xx99x2xx	2879	62.00回	901,660円	123,972円
								070041xx99x3xx	2880	22.00回	319,944円	222,131円
								080006xx99x2xx	3046	66.00回	959,831円	72,096円
								080006xx99x3xx	3047	20.00回	290,858円	89,789円
								090010xx99x2xx	3098	62.00回	901,660円	74,192円
								090010xx99x30x	3099	18.00回	261,772円	135,402円
								090010xx99x31x	3100	40.00回	581,716円	189,814円

2ページ
の続き

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
3ページの続き								100020xx99x1xx	3121	52.00回	756,231円	126,950円
								100030xx99x1xx	3131	30.00回	436,287円	196,203円
								11001xxx99x10x	3223	28.00回	407,201円	90,195円
								11001xxx99x11x	3224	52.00回	756,231円	111,816円
								11002xxx99x1xx	3234	28.00回	407,201円	146,576円
								110070xx99x20x	3258	24.00回	349,030円	76,740円
								110070xx99x21x	3259	44.00回	639,888円	131,088円
								110080xx9903xx	3275	32.00回	465,373円	111,411円
								110100xx99x10x	3290	26.00回	378,115円	191,458円
								110100xx99x11x	3291	60.00回	872,574円	400,513円
								120010xx99x40x	3381	12.00回	174,515円	82,731円
								120010xx99x41x	3382	26.00回	378,115円	150,017円
								12002xxx99x40x	3404	10.00回	145,429円	78,480円
								12002xxx99x41x	3405	18.00回	261,772円	156,298円
								130010xx99x2xx	3513	24.00回	349,030円	312,736円
								130030xx99x2xx	3539	62.00回	901,660円	129,703円
130030xx99x3xx	3540	36.00回	523,544円	248,480円								
新薬(3)	ペマジール錠4.5mg	ベミガチニブ	4.5mg1錠	25,631.2円	がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌	通常、成人には、ベミガチニブとして1日1回13.5mgを14日間経口投与した後、7日間休業する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	76,893.6円/回	060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)				
								060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍				
								060050xx9903xx	2596	22.00回	1,691,659円	295,843円
								060050xx99040x	2597	12.00回	922,723円	152,723円
								060050xx99041x	2598	16.00回	1,230,298円	205,447円
								060050xx97x3xx	2603	31.00回	2,383,702円	341,056円
								060050xx97x4xx	2604	15.00回	1,153,404円	208,944円
								060060xx99030x	2612	8.00回	615,149円	60,113円
								060060xx99031x	2613	14.00回	1,076,510円	124,524円
060060xx9703xx	2617	14.00回	1,076,510円	115,598円								
060060xx9713xx	2621	21.00回	1,614,766円	157,002円								
新薬(4)	ケシンプタ皮下注20mgペン	オファツムマブ(遺伝子組換え)	20mg0.4mL1ｷｯｯ	230,860円	再発寛解型多発性硬化症患者及び疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制	通常、成人にはオファツムマブ(遺伝子組換え)として1回20mgを初回、1週後、2週後、4週後に皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。	230,860円/回	010090 多発性硬化症				
								010090xxxx4xx	1706	3.00回	692,580円	321,105円
新薬(7)	ボライビー点滴静注用30mg ボライビー点滴静注用140mg	ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶 140mg1瓶	298,825円 1,364,330円	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ベンダムスチン塩酸塩及びリツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人には、ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)として1回1.8mg/kg(体重)を3週間間隔で6回点滴静注する。初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。	896,475円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx97x8xx	3561	3.00回	3,948,336円	2,810,723円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬(8)	レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)	300μg1瓶	85,610円	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫および再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫	通常、成人にはデニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)として1日1回9μg/kgを1時間かけて5日間点滴静注した後、16日間休薬する。この21日間を1サイクルとして、最大8サイクル投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	171,220円/回	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx97x70x	3559	15.00回	2,568,300円	1,920,114円
								130030xx97x71x	3560	21.00回	3,595,620円	3,556,370円
新薬(9)	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	15mL1瓶	434,209円	多発性骨髄腫	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には本剤1回15mL(ダラツムマブ(遺伝子組換え)として1,800mg及びボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)として30,000単位(2,000単位/mL))を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で皮下投与する。 A法：1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。 B法：1週間間隔、3週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。	434,209円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物				
								130040xx97x6xx	3575	7.00回	4,260,483円	3,140,326円
新薬(11)	ユプリズナ点滴静注100mg	イネビリズマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	3,495,304円	視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防	通常、成人には、イネビリズマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを初回、2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6ヵ月後に、以降6ヵ月に1回の間隔で点滴静注する。	10,485,912円/回	010090 多発性硬化症				
								010090xxxx0xx	1703	2.00回	20,971,824円	71,543円
								010090xxxx2xx	1704	2.00回	20,971,824円	765,780円
								010090xxxx3xx	1705	2.00回	20,971,824円	144,170円
								010090xxxx4xx	1706	2.00回	20,971,824円	321,105円
新薬(13)	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	590mg8.4mL1瓶	42,408.4円	適応菌種：アミカシンに感性的マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC) 適応症：マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症	通常、成人にはアミカシンとして590mg(力価)を1日1回ネブライザを用いて吸入投与する。	42,408.4円/回	040170 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)				
								040170xxxxx0x	2185	11.00回	466,492円	21,545円
								040170xxxxx1x	2186	23.00回	975,393円	86,078円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬	ブレヤンジ静注	リソカブタゲンマラルユーセル	1患者あたり	32,647,761円	以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫 ・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、形質転換低悪性度非ホジキンリンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	投与直前に本品を解凍する。通常、成人には、CAR発現生T細胞としてCD8陽性細胞(20×10 ⁶ ~50×10 ⁶ 個)及びCD4陽性細胞(20×10 ⁶ ~50×10 ⁶ 個)を、合計細胞数が体重を問わず100×10 ⁶ 個を目標(範囲:44×10 ⁶ ~100×10 ⁶ 個)に、CD8陽性細胞及びCD4陽性細胞の細胞数の比が1(範囲:0.8~1.2)となるよう、CD8陽性細胞を静脈内投与した後にCD4陽性細胞を静脈内投与する。なお、本品の再投与はしないこと。	32,647,761円/回	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx99x2xx	3539	1.00回	32,647,761円	129,703円
								130030xx99x3xx	3540	1.00回	32,647,761円	248,480円
								130030xx99x4xx	3541	1.00回	32,647,761円	348,909円
								130030xx99x5xx	3542	1.00回	32,647,761円	354,590円
								130030xx99x6xx	3543	1.00回	32,647,761円	612,948円
								130030xx99x7xx	3544	1.00回	32,647,761円	1,038,667円
								130030xx99x8xx	3545	1.00回	32,647,761円	1,432,430円
								130030xx99x9xx	3546	1.00回	32,647,761円	1,759,077円
								130030xx99xAxx	3547	1.00回	32,647,761円	4,843,155円
								130030xx97x2xx	3551	1.00回	32,647,761円	873,624円
								130030xx97x3xx	3552	1.00回	32,647,761円	597,086円
								130030xx97x40x	3553	1.00回	32,647,761円	616,110円
								130030xx97x41x	3554	1.00回	32,647,761円	1,072,037円
								130030xx97x50x	3555	1.00回	32,647,761円	807,313円
								130030xx97x51x	3556	1.00回	32,647,761円	1,630,081円
								130030xx97x60x	3557	1.00回	32,647,761円	1,080,564円
								130030xx97x61x	3558	1.00回	32,647,761円	2,256,203円
								130030xx97x70x	3559	1.00回	32,647,761円	1,920,114円
								130030xx97x71x	3560	1.00回	32,647,761円	3,556,370円
130030xx97x8xx	3561	1.00回	32,647,761円	2,810,723円								
130030xx97x9xx	3562	1.00回	32,647,761円	2,069,679円								

3 令和3年5月19日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	反映させる診断群分類
新薬(2)	ヴァイトラックピカブセル25mg ヴァイトラックピカブセル100mg ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	ラロトレクチニブ硫酸塩	25mg1カプセル 100mg1カプセル 2%1mL	4,042.5円 14,542.9円 2,908.6円	NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	通常、成人にはラロトレクチニブとして1回100mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 通常、小児にはラロトレクチニブとして1回100mg/m ² (体表面積)を1日2回経口投与する。ただし、1回100mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。	14,542.9円/回	040040 肺の悪性腫瘍 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「エヌトレクチニブ」であったことから、040040 肺の悪性腫瘍の「エヌトレクチニブ」による分岐に反映させる。
新薬(4)	ケシンブタ皮下注20mgペン	オファツムマブ(遺伝子組換え)	20mg0.4mL1キット	230,860円	再発寛解型多発性硬化症患者及び疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制	通常、成人にはオファツムマブ(遺伝子組換え)として1回20mgを初回、1週後、2週後、4週後に皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。	230,860円/回	010090 多発性硬化症 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ナタリズマブ」であったことから、010090 多発性硬化症の「ナタリズマブ」による分岐に反映させる。
新薬(7)	ポライビー点滴静注用30mg ポライビー点滴静注用140mg	ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶 140mg1瓶	298,825円 1,364,330円	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ベンダムスチン塩酸塩及びリツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人には、ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)として1回1.8mg/kg(体重)を3週間隔で6回点滴静注する。初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。	896,475円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130030 非ホジキンリンパ腫 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ブレンツキシマブベドチン」であったことから、130030 非ホジキンリンパ腫の「ブレンツキシマブベドチン」による分岐に反映させる。
新薬(8)	レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)	300μg1瓶	85,610円	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫および再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫	通常、成人にはデニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)として1日1回9μg/kgを1時間かけて5日間点滴静注した後、16日間休薬する。この21日間を1サイクルとして、最大8サイクル投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	171,220円/回	130030 非ホジキンリンパ腫 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「モガムリズマブ」であったことから、130030 非ホジキンリンパ腫の「モガムリズマブ」による分岐に反映させる。
新薬(9)	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	15mL1瓶	434,209円	多発性骨髄腫	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には本剤1回15mL(ダラツムマブ(遺伝子組換え)として1,800mg及びボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)として30,000単位(2,000単位/mL))を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で皮下投与する。 A法:1週間隔、2週間隔及び4週間隔の順で投与する。 B法:1週間隔、3週間隔及び4週間隔の順で投与する。	434,209円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ダラツムマブ」であったことから、130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の「ダラツムマブ」による分岐に反映させる。