

資料 1

トラネキサム酸配合剤のリスク区分について

一般用医薬品(無機薬品及び有機薬品)のリスク区分

No.	薬効群	投与経路	配合成分	現在のリスク区分	検討する理由
1	その他の女性用薬	内服	トラネキサム酸 アスコルビン酸 L-システイン パントテン酸カルシウム 塩酸ピリドキシン	第1類医薬品	トラネキサム酸配合剤の再審査の終了

(参考)

- ・本剤は、「しみ(肝斑に限る。)」を新効能とする新一般用医薬品として再審査が終了したもの
- ・トラネキサム酸配合剤に含まれるトラネキサム酸、アスコルビン酸、L-システイン、パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシンは第3類医薬品として区分されている。

販売名	製造販売業者	効能・効果
トランシーノ	ダイト株式会社	しみ(肝斑に限る。)

様式2

新一般用医薬品製造販売後調査報告書

販 売 名	トランシーノ	承 認 番 号	21900APZ00047000
		・年 月 日	2007年6月21日
		薬 効 分 類	87319
調 査 期 間	2007年6月21日～ 2011年6月20日	報 告 次 数	第1～4次
調 査 施 設 数	718 施設	調 査 症 例 数	3,186 例
出 荷 数 量			
調査結果の概要	アンケート形式で実施した特別調査では、第1～4次調査期間中にモニター薬局718軒から3,186例のアンケートが入手され、この中の副作用発現症例は76例(2.4%)で発現件数は110件であった。副作用の程度はすべて非重篤であった。5件以上あった副作用は、消化不良、下痢各11件(0.3%)、頭痛8件(0.3%)、発疹6件(0.2%)、恶心、そう痒症各5件(0.2%)であった。一般調査においては、第1～4次調査期間中に1,039例(1,639件)の副作用発現症例が情報収集され、スティーブンス・ジョンソン症候群、肺塞栓症、気胸各1例の計3例が重篤で、他はすべて非重篤であった。種類別で多かったのは、発疹171件、そう痒症151件、恶心139件、下痢135件、頭痛94件、紅斑63件、消化不良54件などであった。		
副作用の種類別 発 現 状 況	特別調査：別紙(1)のとおり 一般調査：別紙(3)のとおり 製造販売後臨床試験：別紙(5)のとおり		
副作用の発現症例 一 覧 表	特別調査：別紙(2)のとおり 一般調査：別紙(4)のとおり 製造販売後臨床試験：別紙(6)のとおり		
調査結果に関する 見解と今後の 安 全 対 策	別紙(7)のとおり		
備 考	・新一般用医薬品 区分(3) 所属：安全管理室 担当者名： 連絡先：		

上記により製造販売後調査の調査結果を報告します。

2011年9月13日

富山県富山市八日町326番地
ダイト株式会社
代表取締役社長 笹山 真治郎

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 近藤 達也 殿

目 次

I. 特別調査	1
1) 副作用の種類別発現状況	1
2) 副作用の要因別解析	3
3) 副作用症例一覧表	10
4) 有効性	19
5) 有効性の要因別解析	19
II. 一般調査	21
1) 副作用の種類別発現状況	21
2) 副作用症例一覧表	26
III. 製造販売後臨床試験	26
1) 副作用の種類別発現状況	127
2) 副作用症例一覧表	127
IV. 調査結果に関する見解と今後の安全対策	129

別紙（1）

I. 特別調査

1) 副作用の種類別発現状況

製造販売後の使用実態下における安全性および有効性を検討するため、トランシーノを使用した15歳以上の女性を対象に、承認された平成19年6月21日からの4年間で安全性解析対象症例3,000例以上を収集することを目標として、アンケート形式での特別調査を実施した。第1次（平成19年6月21日～平成20年6月20日）、第2次調査期間（平成20年6月21日～平成21年6月20日）、第3次調査期間（平成21年6月21日～平成22年6月20日）及び第4次調査期間（平成22年6月21日～平成23年6月20日）における副作用発現症例率2.3%、2.0%、2.7%、2.8%と同程度であり、第1次から第4次調査期間での累計では、3,186例中副作用発現症例は76例(110件)で、副作用発現症例率は2.4%であった。副作用の種類および件数を表1に示したが、副作用の程度はすべて非重篤であり、また累計で5件以上あったのは、消化不良11件(0.3%)、下痢11件(0.3%)、頭痛8件(0.3%)、発疹6件(0.2%)、恶心5件(0.2%)、そう痒症5件(0.2%)で、それらの中で添付文書に記載されていない副作用は頭痛であった。

表1 副作用の種類別発現状況（特別調査）

時 期	承認時迄の調査	承認時以降の累計
①調査施設数	8	718
②調査症例数	189	3,186
③副作用発現症例数	2	76
④副作用発現件数	2	110
⑤副作用発現症例率 (③÷②×100)	1.1%	2.4%
⑥出荷数量(錠)		
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)	
心臓障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 動悸	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	0例(0.0)	1例(0.0)
* 眼瞼浮腫	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	1例(0.5)	34例(1.1)
* 腹部膨満	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	0(0.0)	2(0.1)
* 便秘	0(0.0)	4(0.1)
下痢	0(0.0)	11(0.3)
消化不良	1(0.5)	11(0.3)
恶心	0(0.0)	5(0.2)
* 口内炎	0(0.0)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	1(0.0)
* 口唇障害	0(0.0)	1(0.0)
* 口の感覺鈍麻	0(0.0)	2(0.1)
一般：全身障害および投与部位の状態	0例(0.0)	8例(0.3)
* 無力症	0(0.0)	1(0.0)
* 胸部不快感	0(0.0)	1(0.0)
* 胸痛	0(0.0)	1(0.0)
* 浮腫	0(0.0)	4(0.1)
* 末梢性浮腫	0(0.0)	1(0.0)
* 口渴	0(0.0)	1(0.0)
臨床検査	1例(0.5)	0例(0.0)
* 白血球数増加	1(0.5)	0(0.0)
代謝および栄養障害	0例(0.0)	5例(0.2)
* 代謝障害	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	0(0.0)	4(0.1)
筋骨格系および結合組織障害	0例(0.0)	6例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	0(0.0)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	0例(0.0)	9例(0.3)
* 頭痛	0(0.0)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	4(0.1)
生殖系および乳房障害	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 呼吸困難	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表1 副作用の種類別発現状況（特別調査）

時 期	承認時迄の調査	承認時以降の累計
副作用の種類		副作用発現例数及び件数 (%)
皮膚および皮下組織障害	0 例 (0.0)	11 例 (0.3)
* 紅斑	0 (0.0)	1 (0.0)
* 毛髪変色	0 (0.0)	1 (0.0)
そう痒症	0 (0.0)	5 (0.2)
発疹	0 (0.0)	6 (0.2)
* 皮膚剥脱	0 (0.0)	1 (0.0)
血管障害	0 例 (0.0)	2 例 (0.1)
* 末梢冷感	0 (0.0)	1 (0.0)
* ほてり	0 (0.0)	1 (0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

2)副作用の要因別解析

第1次から第4次調査期間での累計3,186例の背景要因別（年齢別、服用期間別、併用薬の有無別）分布は下記のようになつた。

		例数	%
年齢	15～25歳	114	3.6%
	26～35歳	627	19.7%
	36～45歳	1344	42.2%
	46～55歳	866	27.2%
	56歳以上	214	6.7%
	不明	21	0.7%
服用期間	～15日	141	4.4%
	16～30日	1541	48.4%
	31～60日	1224	38.4%
	61日以上	190	6.0%
	不明	90	2.8%
併用薬	有	360	11.3%
	無	2788	87.5%
	不明	38	1.2%

安全性に関してさらに検討するため、これら要因別に解析を行つた。各要因別での副作用発現症例率について下記に示したが、特に安全性に影響を与えるような要因は見出されなかつた。

①年齢別（表2）

副作用発現症例率は、15～25歳が0.0%（0/114例）、26～35歳が1.4%（9/627例）、36～45歳が3.3%（44/1,344例）、46～55歳が2.3%（20/866例）、56歳以上が0.5%（1/214例）、不明が9.5%（2/21例）であり、不明以外では36～45歳が最も高かつた。36～45歳で他の年齢層に比べて皮膚および皮下組織障害の副作用が多かつたが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

②服用期間別（表3）

副作用発現症例率は、15日以下が8.5%（12/141例）、16～30日が2.1%（33/1,541例）、31～60日が2.1%（26/1,224例）、61日以上が1.1%（2/190例）、不明が3.3%（3/90例）で、15日以下が最も高かった。15日以下で他の服用期間層に比べて胃腸障害の副作用が多かったが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

③併用薬の有無別（表4）

副作用発現症例率は、併用薬有例が4.7%（17/360例）、併用薬無例が2.1%（58/2,788例）、不明が2.6%（1/38例）で、有例が無例より高かった。有例で無例に比べて胃腸障害と皮膚および皮下組織障害の副作用が多かったが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

表3 服用期間別副作用発現状況（特別調査）

服用期間区分	～15日	16～30日	31～60日	61日以上	不明	計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)					
筋骨格系および結合組織障害	1例(0.7)	3例(0.2)	2例(0.2)	0例(0.0)	0例(0.0)	6例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	1(0.7)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	2例(1.4)	3例(0.2)	4例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	9例(0.3)
* 頭痛	2(1.4)	3(0.2)	3(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	0(0.0)	4(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
生殖系および乳房障害	0例(0.0)	3例(0.2)	4例(0.3)	1例(0.5)	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	1(0.1)	2(0.2)	1(0.5)	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および綻隔障害	1例(0.7)	2例(0.1)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 呼吸困難	1(0.7)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
皮膚および皮下組織障害	0例(0.0)	8例(0.5)	2例(0.2)	0例(0.0)	1例(1.1)	11例(0.3)
* 紅斑	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	0(0.0)	4(0.3)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	5(0.2)
発疹	0(0.0)	5(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.1)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	1例(0.7)	0例(0.0)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	2例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表4 併用薬有無別副作用発現状況（特別調査）

併用薬	有	無	不明	計
調査症例数	360	2,788	38	3,186
副作用発現症例数 (%)	17(4.7)	58(2.1)	1(2.6)	76(2.4)
副作用発現件数	19	85	6	110
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)			
心臓障害	0例(0.0)	4例(0.1)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 動悸	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	1例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	1例(0.0)
* 眼瞼浮腫	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	8例(2.2)	26例(0.9)	0例(0.0)	34例(1.1)
* 腹部膨満	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	2(0.6)	2(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	0(0.0)	2(0.1)	0(0.0)	2(0.1)
* 便秘	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
下痢	3(0.8)	8(0.3)	0(0.0)	11(0.3)
消化不良	2(0.6)	9(0.3)	0(0.0)	11(0.3)
恶心	0(0.0)	5(0.2)	0(0.0)	5(0.2)
* 口内炎	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口唇障害	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口の感覺鈍麻	0(0.0)	2(0.1)	0(0.0)	2(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態	0例(0.0)	7例(0.3)	1例(2.6)	8例(0.3)
* 無力症	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸部不快感	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸痛	0(0.0)	0(0.0)	1(2.6)	1(0.0)
* 浮腫	0(0.0)	3(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
* 末梢性浮腫	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口渴	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
代謝および栄養障害	0例(0.0)	5例(0.2)	0例(0.0)	5例(0.2)
* 代謝障害	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
筋骨格系および結合組織障害	1例(0.3)	4例(0.1)	1例(2.6)	6例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	1(0.3)	2(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	1例(0.3)	7例(0.3)	1例(2.6)	9例(0.3)
* 頭痛	1(0.3)	6(0.2)	1(2.6)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	0(0.0)	1(2.6)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	4例(0.1)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表4 併用薬有無別副作用発現状況（特別調査）

併用薬	有	無	不明	計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数(%)			
生殖系および乳房障害	2例(0.6)	6例(0.2)	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	0例(0.0)	3例(0.1)	1例(2.6)	4例(0.1)
* 呼吸困難	0(0.0)	3(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
皮膚および皮下組織障害	5例(1.4)	6例(0.2)	0例(0.0)	11例(0.3)
* 紅斑	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	2(0.6)	3(0.1)	0(0.0)	5(0.2)
発疹	2(0.6)	4(0.1)	0(0.0)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	0例(0.0)	2例(0.1)	0例(0.0)	2例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

3)副作用症例一覧表

第1～4次特別調査での副作用発現症例76例における副作用の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、副作用症状・程度・転帰、医師または薬剤師の見解、因果関係等を記載した副作用症例一覧表を別紙（2）に示した。

別紙2 副作用発現症例一覧表(特別調査)

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
下痢	DS07-1059 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	31日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復 トランキサム酸が体に合わなかったため下痢をしたと思われます	可能性大	第1次
発疹 モラции症	DS07-1114 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	28日間	しみ(肝斑)	発疹・かゆみ	非重篤	回復 可能性大と思われるものは他の薬はその前から服用していたため。他の薬との併用であり他の薬の可能性もあります。アレルギー反応についても可能性も有ります。	可能性大	第1次
		オメブランソール、ボリカルボフィルカルシウム、ロスマスタチンカルシウム、ナテクリニド	2回	不明						
	DS07-1213 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善のため	激しい頭痛、舌のもつれ、片方の足の意識な痛み、むくみ、持続的な胸の痛み、突然の呼吸困難、息切れ	非重篤	不明 不明		第1次
頭痛 会話障害 四肢痛 浮腫 胸痛 呼吸困難	DS07-1301 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	悪心・嘔吐 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
悪心 嘔吐 上腹部痛 消化不良	DS07-1336 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	悪心 胃痛・腹やけ	非重篤 非重篤	以前コラーゲン錠剤を飲んでムカムカと気持ちが悪くなったことがあります。	不明	第1次
脹満	DS08-0055 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	脹満	非重篤	すぐには発疹は消失しているので因果関係の可能性は低いと思われます。	不明	第1次
頭痛 四肢痛	DS08-0056 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛 足の痛み	非重篤 非重篤	回復 回復 3/11当時本人体調が悪くこの様な症状が出たと思われる	不明	第1次
呼吸困難	DS08-0068 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	息切れ	非重篤	体調が少し悪かったようなので、息切れが出たのかもしれません	不明	第1次
腹痛	DS08-0069 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	28日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	生理前だったので、トランシーノによるものかは不明	不明	第1次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			使用期間 1日 使用量	使用理由	症状	程度	軽快	得られたコメント	
悪心	DS08-0102 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 30日間	しみ(肝斑)	恶心	非重篤	回復	服用期間30日後、そういう状況は確認時はでないかかった為副作用の可能性も考えられる。	可能性小 第2次
頭痛 動悸	DS08-0103 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 20日間	しみ(肝斑)	頭痛 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用を中止後、頭痛・動悸の症状が改善された為、副作用の可能性が考えられる。	可能性大 第2次
動悸 呼吸困難	DS08-0112 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 2日間	しみ(肝斑)	動悸 息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復	翌日の服用にて3回とも同様の症状がでた為、副作用の可能性が考えられる。	可能性大 第2次
消化不良	DS08-0209 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 40日間	しみ(肝斑)	むねやけ	非重篤	不明	わかりません。	不明 第1次
便秘 筋肉痛 感覚鋭敏 代謝障害	DS08-0218 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝斑と診断されたので	便祕 ふくらはぎのつり、左手のしひれ、代謝の低下	非重篤 非重篤	軽快 軽快	トランシーノとの因果関係はほとんど無いと思われる。ストレスの他の方が大きい様にお見受けしました。	不明 第2次
消化不良	DS08-0262 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~1回 不明	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復		不明 第1次
毛髪変色	DS08-0277 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ(肝斑)	白髪が増えた	非重篤	不明	不変化がメラニンの欠如によつて発生することを考えると絶対にありえないとは言いかねないとも考えられる。しかし、本剤の服用だけで今回の事象が発生したと考えるには、判断材料が少なすぎると考えられる。	不明 第1次
動悸 胸部不快感	DS08-0337 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 30日間	しみ(肝斑)	軽い動悸 胸が重ぐるい感じ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	1月中に2回程度であるので、本剤との因果関係はわからない。	不明 第1次
発疹 そう痒症	DS08-0339 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 24日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用を中止して2、3日後症状が治まつたのでトランシーノの影響が少なからずある様に思いました。	可能性大 第1次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用 期間	使用理由	症状	程度	転帰		
乳房不快感	DS08-0417 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	胸の辺り	非重篤	回復		不明 第1次
頻尿	DS08-0418 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなった	非重篤	回復	因果関係も不明で、効果が大変あつたので、ご本人は、大変、満足されております。	不明 第2次
下痢	DS08-0447 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	不明	その日の体調、食事なども考えられる。トランシーノとの因果関係については不明。	不明 第2次
下痢	DS08-0492 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	不明		第2次
浮腫	DS08-0524 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	不明	むくみが生じたなどのことでしたが、続けて服用していくといふことの本への申し出があり。その後、むくみ等、副作用としては報告がない為不明ではあるが、副作用としては経度もしくは、本品との因果関係は少ないものと思われる。	不明 第2次
眼瞼浮腫	DS08-0560 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	飲み始めた時、目・まぶたがむくんでいた(2~3回続いた)と記載があるが、「トランシーノにむくみを生じる成分は含まれていないので、関連性はない」のではと思われる。	可能性小 第2次
末梢性浮腫	DS08-0631 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	服用中止後むくみがされたので副作用の可能性あり。	可能性大 第2次
下痢	DS08-0681 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	下痢を発症した時期直前にトランシーノ服用していたが、因果関係は不明と思われる。	不明 第2次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		備考 (医師又は製剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	
消化不良	DS08-0697 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	御本人さんも軽度の症状であるため、あまり気にしていなかったとのこと。服用終了後に良くなったので、原因としては考えられますが、限定はできないと思う。御本人さんも丁解の上、2本目購入でしたので、あまり副作用も気にならないのではないかと思います。	不明 第2次
		ビタミンC剤	不明	不明					
皮膚剥脱	DS08-0765 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	37日間	しみ(肝斑)	頬の皮が薄く剥れる	非重篤	最初、可能性があると思ったが、よく話しか聞くと不明だと判断した為。	不明 第2次
		DS08-0769 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	22日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	
消化不良	DS08-0827 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	軟便	非重篤		不明 第2次
		DS08-0946 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	肝斑	赤み	赤みはあるが、気にならぬものではなかつた。	
下痢		その他の痉挛強壮薬	不明	不明					不明 第2次
		DS08-1177 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	
紅斑								体調によるものが大きのではないかと思います。	可能性小 第2次
浮腫									
腹部膨脹	DS08-1456 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	お腹の張り	非重篤	通常の生理期においても、腹部の張り感は起こるごとから、概めて因果関係は少ないと思われるが、血液の凝固に影響を与えるであろうトラネキサム酸製剤の為、完全には否定出来ない。	可能性小 第2次
		乳酸菌整腸剤	3回	5日間					

有害事象の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰			
ぼてり 無力感	DS08-1514 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	顔のはれり 手の肌力感	非重篤 非重篤	回復 回復	添付文書に記載されている様な症状ではない が、お客様の体質や服用状況を考慮しても、ト ランシーノによる副作用だとと考えられます。	確実	第2次
口唇障害	DS08-1536 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	唇が紫色になった	非重篤	回復	当作用はこの薬によるものと思われます。止め た時点で直った様です。	可能性大	第2次
消化不良	DS08-1537 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	回復	服用後すぐなので可能性大と思われる。	可能性大	第2次
頭痛	DS09-0076 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	頭痛などの症状はカゼやストレスなどでも起こ るので、トランシーノとの因果関係は不明です。	不明	第2次
恶心 食欲減退	DS09-0106 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃が重い	非重篤	不明			第2次
腹痛 下痢	DS09-0107 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
頭痛	DS09-0357 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	軽度の頭痛	非重篤	回復			第3次
食欲減退 消化不良	DS09-0388 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	食欲不振 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第3次
恶心 食欲減退 消化不良	DS09-0389 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	悪心 食欲不振、胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第3次
消化不良	DS09-0390 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	60日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	特になし	不明	第3次
便秘	DS09-0391 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	54日間	しみ(肝斑)	便秘	非重篤	回復	特になし	不明	第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
頻尿	DS09-0392 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレの回数が増えた	非重篤	回復	特記事項なし	不明 第3次
頻尿	DS09-0393 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなつた	非重篤	回復	特記事項なし	不明 第3次
浮腫	DS09-0394 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	不明	特記事項なし	不明 第3次
頭痛	DS09-0395 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	服用初期に強い頭痛	非重篤	回復 なし		不明 第3次
過少月経	DS09-0396 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理の出血量が少なく終わるのも早かつた	非重篤	回復 なし		不明 第3次
過少月経	DS09-0397 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理中の血液の量が少なくなつた	非重篤	回復 なし		不明 第3次
子宮内膜増殖症	DS09-0398 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	使用後、1ヶ月くらいから不正出血があり、使用を止めてからひどくなつた	非重篤	回復 不明(医師にはこの件を相談しなかった。)		不明 第3次
食欲減退 消化不良	DS09-0448 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	60日間	しみ(肝斑)	食欲不振 胸焼け	非重篤 非重篤	回復 回復		不明 第3次
四肢 口渴	DS09-0473 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	片足の痛み だるさ、口渴	非重篤 非重篤	回復 回復	発売当初に服用された事があり、今回と同様の症状があつたそでするので本品との因果関係についてでは可能性大と思われます。	可能性大 第3次

有害事象の種類	番号 (生) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象			(医師又は薬剤師の見解)	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント
腹痛	DS09-0494 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	販売時、箱田薬剤師より(当時接客)ビル服用中のためおすすめできなかった旨)があつたそうですが、試してみたかったので服用したそうです。服用して開始まもないころは何も異常がなかったのですが、6月中旬から夕方だけ痛んだそうです。現在はとくに気になることもなく、しかも改善し、体調も良いとのこと。しみもよくなったので、トランシーノはもうやめるとのこと。ビルも服用は今現在していません。トランシーノには満足しているそうです。
そう痒症	DS09-0512 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	症状(かゆみ)は程度で、2、3日で消失したため因果関係は小さいと判断した。
腹痛	DS09-0513 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	25日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	抗アレルギーと、降圧剤と一緒に服用していたため、飲み合わせとしては問題ないが、何らかの関係があったのかもしれない。
過少月経	DS09-0516 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	120日間	しみ(肝斑)	生理の量が少なくなった	非重篤	回復	本品はトランシーノにより副作用かどうかは、分からないと考える。
月経過多	DS09-0517 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理が月2回あつたり期間が長かった。普段は月1回一週間。	非重篤	回復	不明です。(なんらかの因果関係があつたのかもしれないが、詳細は不明です。ホルモンバランスの崩れややすい年代でもあり、季節の影響があつたのかもしれない、
発疹	DS09-0531 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	4/30体温がよくなかつたのです?
									不明
									第3次

有害事象の種類	番号 (生) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法	使用理由	有害事象			(医師又は薬剤師の見解)		
					使用期間	程度	転帰	得られたコメント	年次	
発疹	DS09-0546 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1日 使用量 3回	30日間	しみ(肝斑)	顔に吹出物	非重篤	未回復	健康食品のコラーゲンも同時期に飲んでいたのでそちらによる可能性もあるため、因果関係は不明と考える。	不明 第3次
動悸	DS09-0575 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	40日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	因果関係はないと思われる。	不明 第3次
うず症	DS09-0576 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	可能性は否定できないが、本品とは特定できない。	不明 第3次
頭痛 呼吸困難 末梢冷感	DS09-0580 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頭痛 呼吸困難、血液の流れが悪くなる感じ。冷え性に似た症状	非重篤 非重篤	不明 不明		第3次
筋骨格硬直 発疹 うず症	DS09-0640 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	首すじ、後のこわばり(重い)	非重篤	回復	服用1ヶ月後の症状の発現であり、体調や乗以外などの原因も考えられるが服用中止後には、可能性小と考える。	可能性小 第3次
月経遅延	DS09-0719 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	生理が10日ほど遅れた	非重篤	回復		不明 第3次
崩漏	DS09-0900 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	32日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなった感覚(頻尿)	非重篤	不明	トイレが近くなったことに本人自身が日常の不安や治療の必要もなく、服用は継続しているが、及び他の要因として薬湯の飲料の摂取によるものかもしれないとの話もあり、因果関係は不明である。	不明 第3次
口内炎 便秘 下痢	DS09-1212 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	口内炎 便秘、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	薬に対してはきちんと理解しておられ、副作用にれて特に、悪い感情を持った様には感じませんでした。	不明 第3次
下利	DS09-1279 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	50日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	本品と副作用の因果関係はうすい。	不明 第3次
下痢	DS09-1351 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	90日間	しみ(肝斑)	軟便	非重篤	回復	トランシーノによるものかどうかは不明	不明 第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
口の感覺鈍麻 四肢痺	DS09-1409 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	46日間	しみ(肝斑)	舌先のビリビリとした違和感 片足の急激な痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	(5)、(7)より関係性は薄いと思われます。	不明
上腹部灼痛	DS10-0048 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	60日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復		可能性大 第3次
過少月経	DS10-0222 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理量の減少	非重篤	不明		第3次
頭痛	DS10-0432 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)の改善	頭痛	非重篤	不明	不明	第4次
便秘 下痢	DS10-0433 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ(肝斑)の改善	便秘 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明	不明	第4次
下痢	DS10-0434 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)の改善	下痢	非重篤	不明		第4次
口の感覺鈍麻	DS10-0589 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	舌のしづれ	非重篤	不明	ただし、これ以外の要因も思いたらない	不明

4) 有効性

特別調査において、効果に関する評価を、「効いた」、「やや効いた」、「効かなかった」の3区分で行った。第1次から第4次調査期間中に収集された3,186例における有効性評価を表5に示したが、「効いた」が24.0%（765/3,186例）、「やや効いた」が59.5%（1,896/3,186例）、「効かなかった」が13.5%（431/3,186例）、「不明・未記載」が3.0%（94/3,186例）で、「効いた」と「やや効いた」を合わせると83.5%（2,661/3,186例）となり、高い有効率が示された。

表5 有効性評価

時 期	承認時以降の累計
調査症例数	3,186例
(1) 効いた	765例(24.0%)
(2) やや効いた	1,896例(59.5%)
(3) 効かなかった	431例(13.5%)
(4) 不明・未記載	94例(3.0%)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

5) 有効性の要因別解析

有効性に関してさらに検討するため、要因別（年齢別、服用期間別、併用薬の有無別）で「効いた」と「やや効いた」を合わせた有効率の解析を行った。

①年齢別（表6）

有効率は、15～25歳が78.1%（89/114例）、26～35歳が83.3%（522/627例）、36～45歳が85.3%（1,147/1,344例）、46～55歳が82.7%（716/866例）、56歳以上が78.5%（168/214例）、不明が90.5%（19/21例）であり、不明以外では36～45歳が最も高く、15～25歳と56歳以上の年齢層は他の年齢層に比べて低めであった。

②服用期間別（表7）

有効率は、15日以下が63.1%（89/141例）、16～30日が82.7%（1,274/1,541例）、31～60日が86.8%（1,063/1,224例）、61日以上が87.9%（167/190例）、不明が75.6%（68/90例）で、不明以外では16日以上服用した3層での有効性に大きな差はなく、15日以下の服用期間層は他の層に比べて低めであった。

③併用薬の有無別（表8）

有効率は、併用薬有例が78.6%（283/360例）、併用薬無例が84.3%（2,350/2,788例）、不明が73.7%（28/38例）で、無例が有例より高かった。

表6 年齢別有効率（特別調査）

判定	15～25歳	26～35歳	36～45歳	46～55歳	56歳以上	不明	計
調査症例数	114	627	1,344	866	214	21	3,186
(1)効いた	21(18.4)	150(23.9)	339(25.2)	201(23.2)	49(22.9)	5(23.8)	765(24.0)
(2)やや効いた	68(59.6)	372(59.3)	808(60.1)	515(59.5)	119(55.6)	14(66.7)	1,896(59.5)
(3)効かなかった	23(20.2)	87(13.9)	163(12.1)	124(14.3)	33(15.4)	1(4.8)	431(13.5)
(4)不明・未記載	2(1.8)	18(2.9)	34(2.5)	26(3.0)	13(6.1)	1(4.8)	94(3.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

表7 服用期間別有効率（特別調査）

判定	～15日	16～30日	31～60日	61日以上	不明	計
調査症例数	141(100.0)	1,541(100.0)	1,224(100.0)	190(100.0)	90(100.0)	3,186(100.0)
(1)効いた	15(10.6)	296(19.2)	354(28.9)	79(41.6)	21(23.3)	765(24.0)
(2)やや効いた	74(52.5)	978(63.5)	709(57.9)	88(46.3)	47(52.2)	1,896(59.5)
(3)効かなかった	41(29.1)	222(14.4)	138(11.3)	20(10.5)	10(11.1)	431(13.5)
(4)不明・未記載	11(7.8)	45(2.9)	23(1.9)	3(1.6)	12(13.3)	94(3.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

表8 併用薬有無別有効率（特別調査）

判定	有	無	不明	計
調査症例数	360(100.0)	2,788(100.0)	38(100.0)	3,186(100.0)
(1)効いた	72(20.0)	683(24.5)	10(26.3)	765(24.0)
(2)やや効いた	211(58.6)	1,667(59.8)	18(47.4)	1,896(59.5)
(3)効かなかった	67(18.6)	356(12.8)	8(21.1)	431(13.5)
(4)不明・未記載	10(2.8)	82(2.9)	2(5.3)	94(3.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

別紙（3）

II. 一般調査

1) 副作用の種類別発現状況

モニター薬局以外の薬局または直接消費者から副作用情報が収集される一般調査において、第1次から第4次調査期間中に情報収集された副作用症例は1,039例(1,639件)となり、これらの副作用の種類および件数を表9に示した。第1~4次調査期間中に収集された副作用症例のうち、自己免疫疾患患者でのスティーブンス・ジョンソン症候群1例、女性器悪性新生物患者での肺塞栓1例と、気胸で入院した医療機関先の勤務者が本剤服用を医師に伝えたものの特段の指示等を受けなかったとの本人からの電話連絡により医学的確認ありとして報告したもののが重篤であった以外、非重篤であった。

第1~4次で集積された副作用の種類別で20件以上あったのは、発疹171件、そう痒症151件、恶心139件、下痢135件、頭痛94件、紅斑63件、消化不良54件、湿疹47件、浮動性めまい46例、腹痛44件、動悸43件、腹部不快感34件、上腹部痛28件、食欲減退26件、倦怠感25件、嘔吐24件、感覺鈍麻22件、四肢痛22件、浮腫21件、末梢性浮腫20件で、これらの中で添付文書に記載されていない副作用は、頭痛、紅斑、浮動性めまい、動悸、腹部不快感、倦怠感、感覺鈍麻、四肢痛、浮腫および末梢浮腫であった。

表9 副作用の種類別発現状況(1) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
①調査施設数	-
②調査症例数	-
③副作用発現症例数	1,039
④副作用発現件数	1,639
⑤出荷数量(錠)	
副作用の種類	副作用発現例数及び件数
心臓障害	45例
* 不整脈	3
* 動悸	43
耳および迷路障害	3例
* 耳鳴	3
眼障害	30例
* 眼の異常感	1
* 眼瞼炎	2
* 眼瞼紅斑	1
* 眼痛	1
* 眼瞼浮腫	10
* 眼瞼下垂	1
* 眼充血	3
* 眼窩周囲浮腫	4
* 光視症	2
* 霧視	3
* 視力障害	2
* 硝子体浮遊物	1
* 眼の異物感	1
眼瞼そゝ痒症	4
胃腸障害	388例
* 腹部不快感	34
* 腹部膨満	5
腹痛	44
下腹部痛	2
上腹部痛	28
* 口唇炎	5
* 便秘	12
下痢	135
消化不良	54
* おくび	3
* 硬便	1
* 鼓腸	2
* 排便回数増加	1
* 齒肉腫脹	2
* 舌痛	1
* 血便排泄	2
* 口唇痛	1
恶心	139
* 口内炎	4
嘔吐	24
* 口唇障害	1
* 口唇のひび割れ	2
* 歯不快感	1
* 口の感覺鈍麻	6
* 口腔粘膜紅斑	1
* 齒肉紅斑	1

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(2) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
一般・全身障害および投与部位の状態	135 例
* 無力感	1
* 胸部不快感	8
* 胸痛	13
* 悪寒	2
* 隨伴疾患悪化	1
* 顔面浮腫	16
* 顔面痛	2
* 疲労	1
* 異常感	8
* 熱感	5
* 全身性浮腫	2
* 倦怠感	25
* 浮腫	21
* 末梢性浮腫	20
* 痛痛	3
* 発熱	5
* 口渴	8
* 限局性浮腫	1
* 異物感	1
肝胆道系障害	1 例
* 肝機能異常	1
感染症および寄生虫症	4 例
* 乳腺炎	2
* 腫瘍性皮疹	1
* 化膿	1
傷害、中毒および処置合併症	1 例
* 転倒	1
臨床検査	9 例
* アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
* アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
* 血中コレステロール増加	1
* ギーグルタミルトランスフェラーゼ増加	2
* 肝機能検査異常	2
* 脈圧上昇	1
* 尿量減少	1
代謝および栄養障害	26 例
食欲減退	26
筋骨格系および結合組織障害	43 例
* 関節痛	4
* 背部痛	4
* 筋痙攣	2
* 筋肉痛	1
* 四肢痛	22
* 重感	1
* 筋骨格硬直	10
* 筋骨格不快感	1
* 四肢不快感	2

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(3) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
神経系障害	167例
* 味覚消失	1
* 浮動性めまい	46
* 体位性めまい	1
* 頭部不快感	7
* 頭痛	94
* 感覚鈍麻	22
* 片頭痛	2
* 錯覚	1
* 傾眠	5
* 振戦	4
* 第7脳神経麻痺	1
精神障害	3例
* 不眠症	2
* 中期不眠症	1
腎および尿路障害	9例
* 排尿困難	6
* 頻尿	2
* 尿閉	4
* 尿臭異常	1
生殖系および乳房障害	70例
* 無月経	2
* 乳房痛	1
* 月経困難症	4
* 過少月経	11
* 月経過多	10
* 月経障害	2
* 月経遅延	9
* 不規則月経	9
* 不正子宮出血	10
* 希発月経	6
* 頻発月経	9
* 乳房不快感	2
* 性器分泌物	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	20例
* 息詰まり感	1
* 発声障害	1
* 呼吸困難	7
* 過換気	1
* 鼻閉	3
* 気胸	1
* 肺塞栓症	1
* 鼻漏	4
* くしゃみ	4
* 咽喉絞扼感	1
* 口腔咽頭痛	1

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(4)（一般調査）

時 期	承認時以降の累計
皮膚および皮下組織障害	356 例
* ざ瘡	1
* 脱毛症	5
* 皮膚炎	4
蕁疹	1
* 皮膚乾燥	7
湿疹	47
* 紅斑	63
* 多汗症	1
* 白斑	1
* 爪変色	1
* 皮膚疼痛	3
そう痒症	151
* 紫斑	2
癩疹	171
全身性皮疹	2
* 皮膚変色	2
* 皮膚障害	1
* 皮膚剥脱	6
* 皮膚色素過剰	1
* 皮膚刺激	2
* 皮膚線条	1
* スティーブンス・ジョンソン症候群	1
* 顔面腫脹	1
* 莖麻疹	6
* 黄色皮膚	2
* 全身紅斑	1
* 皮膚のべとつき感	1
全身性そう痒症	7
* 顔面感覺鈍麻	1
血管障害	16 例
* 潮紅	2
* 末梢冷感	5
* 血管収縮	1
* ほてり	8

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

*添付文書に記載されていない副作用

2)副作用症例一覧表

第1～4次調査期間において一般調査で収集された副作用発現症例 1,039 例における副作用の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、副作用の症状・程度・転帰、医師または薬剤師の見解、因果関係等を記載した副作用症例一覧表を別紙(4)に示した。

別紙4 副作用の発現症例一覧表(一般調査)

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考	
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント
腹部不快感	DS07-0378 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胃部不快感	非重篤 軽快	
下痢 腹痛	DS07-0385 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2.5日間	しみ(肝斑)	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	飲み始めて3日目に反応している。少し遅い様な気がするので本品との因果関係は不明にしました。
消化不良	DS07-0389 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤 回復	特になし
熱感	DS07-0390 (女) (65)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	のぼせ	非重篤 回復	可能大 第1次
発疹	DS07-0394 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ症状	発疹	非重篤 未回復	
発疹 紅斑	DS07-0395 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	不明	発疹 赤くなつた	非重篤 非重篤 未回復 未回復	可能大 第1次
下痢	DS07-0397 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤 軽快	
頭痛	DS07-0403 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤 回復	
紅斑	DS07-0406 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	発赤	非重篤 軽快	
悪心	DS07-0408 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	ムカムカして気持ち悪くなつた	非重篤 回復	
腹部不快感	DS07-0409 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	腫もたれ	非重篤 未回復	可能大 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	程度	軽度	得られたコメント	因果関係	年次
発疹 皮膚刺激	DS07-0410 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	水ぶくれ	非重篤 不明	受診をすすめて、最初は行くと言つたのですが、電話で来て下さいとことわられました。返品には住所氏名を書いて下さいと言いましたが、ことわられました。	不明	第1次
眼瞼浮腫 そり痒症	DS07-0416 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	その他	片方のまぶたの腫れ	非重篤 不明	トランシーノでの副作用とは考えにくいですが、服用中の降圧剤との飲み合わせや、添付物による副作用の可能性は否定できないかと思います。	不明	第1次
発疹 上腹部痛	DS07-0417 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	腕の発疹 胃痛	非重篤 不明			第1次
呼吸困難 感覚鈍昧 眼窩周囲浮腫 尿量減少	DS07-0419 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	手足のしびれ、呼吸困難	非重篤 不明	今までどんなビタミン剤を服用されてもこのような症状が出来たことがなかったというこだ。トランシーノの添付文書に載っていない症状も出ていたことから、お客様の体調も関係してこのような症状が出来てしまったのではないかと思う。	不明	第1次
下痢	DS07-0420 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	下痢	非重篤 不明	回復		第1次
発疹	DS07-0421 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発疹	非重篤 不明			第1次
発疹・ そり痒症 紅斑	DS07-0422 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の改善	ミズベシ 痒み、発赤	非重篤 不明	回復		第1次
湿疹 恶心	DS07-0424 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	湿疹(お腹、口元、背中) 胃のむかつき	非重篤 不明	軽快 回復		第1次
発疹 そり痒症	DS07-0425 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 不明	回復	特にない	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
消化不良 腹部不快感 頭痛	DS07-0426 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	胃が重く、もだれたり、脇焼け 脇、頭痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
異常感 異常感	DS07-0427 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	気分が悪いや 頭がボーッとする	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
下痢 腹痛	DS07-0428 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢 腹筋がくしゃくしゃ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0434 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	脇部に発疹 脇部にかゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	おそらく、「ランシーノ」の服用により発生したもの と思われます。ビタミン剤に崩して、すべて副作用がな いとは思えないと思います。(体調、寝不足等)	可能性大 第1次
恶心	DS07-0435 (女) (7X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気、だるさ 胃が気持ち悪くなつた。	非重篤 非重篤	回復 回復	体調不良等が重なつた為と思われる。	不明 第1次
湿疹	DS07-0438 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	湿疹	非重篤	不明		第1次
消化不良 食欲減退	DS07-0439 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸がムカムカする 食欲不振	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
消化不良	DS07-0441 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	未回復		第1次
頭部不快感 悪心 浮動性めまい 四肢痛	DS07-0444 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	腹部に違和感 めまい、右半身(下半 身)に痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	腹部異和感、吐き気等に關しては他のビタミン剤 でも同様の症状がある事から、本品との関係は 少なからず有ると思われます。また、「下半身の 痛みに關しては、精神的な不安(飲み慣れた薬 からの変更)もあつたかとは思いますが、不明な 点が多いので、調査願います。	可能性大 第1次
浮腫	DS07-0445 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	ほほの腫れ	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
発疹 悪心 消化不良	DS07-0446 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹が悪くなる 気分が悪くなる	非重篤 非重篤	軽快 軽快	副作用の症状はトランシーノサム酸の副作用例に あるものだといふことで因果関係は予想される が、消費者より詳しい説明が行きたいといふこと でお薬相談室に説明を依頼。	可能性大 第1次
下痢 腹痛	DS07-0449 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
下痢	DS07-0450 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑らしい)	下痢	非重篤 非重篤	回復 なし	不明	第1次
背部痛 倦怠感	DS07-0453 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	背中の痛み 倦怠感	非重篤 非重篤	軽快 軽快	トランシーノ服用とは考えにくいが、服用を中止 したら腫瘍されたので因果関係は100%否定で きないと考えられます。	不明 第1次
全身性こうず症 ほてり 全身紅斑 全身性浮腫	DS07-0455 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	全身のかゆみ 全身のほてり、赤み、ほれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	なし	不明 第1次
下痢 発疹 そう痒症	DS07-0457 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	下痢 発疹(首筋、二の腕、ふともも)	非重篤 非重篤	回復 回復	私がご本人から副作用らしき症状をお聞きした のは、服用を中止されて数日たった時だったの で発疹もピーケーを過ぎ跡になっている所がほと んどで、いくつか痛みがある程度でした。服用 を中止してからは新たな発疹はできませんでした といふ点からやはりトランシーノの副作用の可 能性が高いと考えます。	可能性大 第1次
発疹	DS07-0459 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発疹	非重篤	軽快		第1次
発疹	DS07-0464 (女) (29)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	発疹(部位:頭)	非重篤	回復		第1次
下痢	DS07-0465 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	軟便	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
発疹	DS07-0468 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝班	発疹	非重篤	不明		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0470 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)改善	筋腕・二頭筋・頸・肩・腹部の発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
顔面浮腫 眼瞼周囲浮腫	DS07-0474 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝班)	瞼の腫れ、目じりの腫れ、頬 の辺りの肌が少し腫れている 様な感じ	非重篤 非重篤	回復 回復	他にアレルギーはない事から体調も影響が あったと想われる。	可能性大 第1次
胸痛	DS07-0475 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝班)	胸の痛み	非重篤	回復 回復	お客様は痛みがでもいいがそれのを置いて 服用していただきたいとのことで、この商品に対する希 望も大きいと思います。	可能性小 第1次
悪心 浮動性めまい 腹痛	DS07-0476 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝班)	嘔吐、めまい、腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復		不明 第1次
悪寒 そう痒症	DS07-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝班らしきしみ	湿疹(足の太もの内側) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0478 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝班)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	不明 軽快	トランシーノによる副作用ではないと思つた?	不明 第1次
浮動性めまい 悪心 耳鳴	DS07-0480 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	めまい、 吐き気、耳鳴り	非重篤 非重篤	特になし		不明 第1次
腹痛 嘔吐 下痢	DS07-0481 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	老人性のしみ	腹痛 嘔吐、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
口の感覺鈍麻	DS07-0482 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝班	舌の痺れ	非重篤	未回復		第1次
悪心	DS07-0488 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝班)	吐き気	非重篤	回復	本人の体調も良いので問題ないと思います。	不明 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
動悸	DS07-0490 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ(肝斑)	軽度	回復			第1次
嘔吐 下痢	DS07-0493 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	腫吐 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
ほてり 動悸	DS07-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	身体が熱くなつた 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0497 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	16日間	しみ(肝斑)	両腕の内側ならびに腹部に 温疹 同部にかゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	原因は不明ですが、何らかの本人の体质によ るところが大きいかと思ひます。	不明
下痢 おくび 恶心	DS07-0498 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 げっぷ、吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
四肢痛	DS07-0500 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	ふくらはぎがチクチクする	非重篤	未回復		第1次
くしゃみ そう痒症	DS07-0501 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	クシャミ かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用を中止して4日以上経過しているので、薬 の成分は体から完全に排泄されています。本 剤の偶発性は低いと思われます。	可能性小 第1次
悪心	DS07-0503 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	胃がムカムカする	非重篤	回復		第1次
下痢 浮動性めまい	DS07-0504 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	下痢 ふらつき	非重篤 非重篤	不明 不明		第1次
末梢性浮腫 腱筋痛	DS07-0505 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ	手のむくみ ひじ・ひざ・手指の鴨卵痛	非重篤 非重篤	回復 回復	不明	第1次
悪心 肢痛 下痢	DS07-0506 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	気持ちが悪くなつた 脛痛、下痢	非重篤 非重篤	軽快 未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間		症状	程度	転帰	得られたコメント		
荨麻疹	DS07-0508 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の改善	尋麻疹(両腕・背中・胸)	非重篤	回復			第1次
末梢性浮腫 関節痛	DS07-0510 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	右足ふくらはぎのむくみ 膝の痛み	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢	DS07-0513 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	下痢気味	非重篤	未回復			第1次
頭痛 悪心 胸痛	DS07-0516 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみ(肝斑)	後頭部の重い痛み 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復	薬との因果関係は不明です。		不明 第1次
湿疹	DS07-0519 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	心臓のまわりが締め付けられる感じ	非重篤	回復			第1次
腹痛	DS07-0520 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	顔に湿疹が出た	非重篤	未回復			第1次
関節痛	DS07-0521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復			第1次
そう痒症	DS07-0524 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	シミ	膝の後ろの痛み	非重篤	回復			第1次
浮動性めまい	DS07-0525 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	痺み	非重篤	軽快			第1次
過換気	DS07-0526 (女) (71)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	目が回る	非重篤	回復			第1次
	DS07-0528 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	1日間	しみ	過呼吸	非重篤	回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間 、 使用量	使用理由	症状	程度	軽躁	得られたコメント	因果関係
下痢	DS07-0529 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	肝班	下痢	非重篤	未回復		第1次
温疹	DS07-0530 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	シミ	湿疹	非重篤	未回復		第1次
嘔吐 下痢	DS07-0531 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝班	嘔吐 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
下痢 皮膚炎 頭面腫脹 面部痛	DS07-0532 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝班)	頭の荒れ、腫れ、痛み 下痢	非重篤 非重篤	回復 未回復	使用年齢がこえられているのでやはりそれにど もない副作用が出てしまつたのではないかと思 います	第1次
頭部不快感 恶心	DS07-0533 (女) (SX)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝班)	頭重	非重篤	回復	不明	第1次
温疹	DS07-0535 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	シミ	温疹(腕の内側、背中)	非重篤	軽快		第1次
食欲減退 倦怠感	DS07-0536 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	食欲不振 倦怠感	非重篤 非重篤	回復 回復	お客様は神経質な方で薬を飲むと下痢になると 事がよくあるそうです。トランシーノとの因果関 係は不明であると思います。	第1次
下痢	DS07-0539 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝班)	下痢氣味	非重篤	軽快		第1次
発疹	DS07-0540 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝班	お腹の周り、二の腕にボツボツ	非重篤	不明	赤疹に対するお客様のご意見のみで見た際 ではないのですか?トランシーノが原因とは思 われず、その日の食事内容又は夏の暑さがつ づいて体調が悪くなっていたどちら考えられま す。	第1次
発疹	DS07-0541 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝班)	発疹	非重篤	回復	不明	第1次
下痢 嘔吐 食欲減退	DS07-0543 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	シミ	下痢氣味 嘔吐・食欲不振	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用	備考 (医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			使用量	使用期間		症状	程度		
発疹 そう痒症	DS07-0544 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	可能性大 第1次
荨麻疹	DS07-0545 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	荨麻疹の上りになつた	非重篤	軽快	なし 不明 第1次
悪心	DS07-0546 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	胃のむかせか	非重篤	回復	原因は不明ですけど必ずしも因果関係がないとは分からないです。 不明 第1次
そう痒症 紅斑	DS07-0548 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復	なし 不明 第1次
悪心	DS07-0549 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	悪心	非重篤	未回復	なし 第1次
四肢痛 頭痛	DS07-0550 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	頭痛 足先のつっぱるような痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	服用されていたご本人様が体格的に小柄な方で、体重も40kg前後とお見受けした為、断定できないが多少トランシーノの効果が強く出てしまったのではないかと考えられます。 可能性大 第1次
発疹	DS07-0554 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹	非重篤	回復	なし 第1次
悪心 下痢 湿疹	DS07-0557 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	気持ち悪い 下痢、湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復	なし 第1次
荨麻疹	DS07-0558 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	荨麻疹(首のあたり)	非重篤	軽快	因果関係は不明だがトランシーノの可能性も考慮される。 不明 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間		症状	程度	転用得 得られたコマント			
下痢	DS07-0559 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)が気 にばかり使用	下痢	非重篤	回復			第1次
上腹部痛 発疹 悪寒 ぞう痒症	DS07-0560 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	しみ(肝斑)	胃痛 発疹、悪寒	非重篤 非重篤	回復 回復	できるだけ副作用が少なく効能効果の高い商 品があればよい。メーカーの応応は迅速で適切 だったのはさすが大企業だと思いました。	可能性大	第1次
紅斑	DS07-0563 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤	非重篤	未回復			第1次
頭部不快感 筋骨格感 呼吸困難	DS07-0564 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	頭重 肩こり、息苦しい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
そう痒症	DS07-0569 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2~3日間	その他(しみ)	痒み 湿疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快	購入後服用に至るまで期間があいていたのは、 医師内科のかかりつけ)に相談していた為。又、 服用後、痒みがでたので服用は中止したが、 痒みが残つても、忙しいのと懶く考えていつ い相談が出来なかったとの事。ただこちらとしては 痒みがいつもくり返したり皮膚にかかっている為医師 にかかる事をおおすすめしたが結果時間がない という事でかかっていないからいい。	可能性大	第1次
感覺鈍麻 頭痛	DS07-0572 (女) (64)	便秘薬(医)、整腸剤(市販)	1回	不明							第1次
発疹	DS07-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	腕の痺れ 頭痛	非重篤 非重篤	不明 不明	たった1日のんでそんなになるのかと不思議に 思いましたが、本当のことにはわかりません。	不明	第1次
口の感覺鈍麻	DS07-0578 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	口のしびれ	非重篤	軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	度	症状	程度	軽帰 得られたコメント	因果関係	年次
口唇炎 紅斑 湿疹	DS07-0581 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	口の周りのざらつき 発赤、温疹	非重篤 非重篤	未回復		第1次
頭痛	DS07-0588 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	激しい頭痛	非重篤	回復		第1次
浮動性めまい 異常感	DS07-0590 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	肝斑	めまい、 気分が悪くなる	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
恶心	DS07-0591 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	恶心	非重篤	回復	体調不良でないかと思われます。	不明
浮動性めまい	DS07-0593 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	眩暈	非重篤	回復	特になし	不明
顔面浮腫 発疹	DS07-0594 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	顔の腫れ 首の発疹	非重篤 非重篤	回復	特になし	不明
発疹	DS07-0596 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ症状	吹き出物	非重篤	堅快		第1次
発疹	DS07-0598 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	発赤(臉の上下、頬) かゆみ(臉の上下、頬)	非重篤 非重篤	堅快 堅快	トランシーノによるアレルギーと思われる	可能性大
そり痒症	DS07-0602 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復		第1次
そり痒症 紅斑	DS07-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	発赤(腕、肩甲骨下、頸の下) かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
過少月経	DS07-0605 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	月経量減少	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽快		
そう痒症	DS07-0607 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	5日間	肝班	痒み	非重篤	堅快		第1次
腹痛 筋張痛	DS07-0610 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	腹痛 薬指の痙攣	非重篤 非重篤	回復 堅快		第1次
発疹	DS07-0611 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	37日間	しみ(肝班)	発疹、部位:足、腕、背中。	非重篤	堅快 なし	可能性大	第1次
腹部不快感	DS07-0616 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝班	胃がもたれる	非重篤	未回復		第1次
浮動性めまい 振戦 感覚障害	DS07-0617 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝班改善のため	立ってられない位の貧血の様な症状 ・目の前が明るくなる・目がかすむ・手の震え、しびれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
不眠症	DS07-0619 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝班	眠れなくなつた	非重篤	不明		第1次
感覺知覚	DS07-0623 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	手のしびれ	非重篤	回復 なし	不明	第1次
ざ瘡 頭痛	DS07-0624 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	頭を締め付ける感じ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
発疹	DS07-0625 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	39日間	肝班	発疹	非重篤	未回復		第1次
嘔吐 腹部不快感 消化不良	DS07-0627 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班の改善	胃がむかつき吐いた 胃が重い、胸焼け	非重篤 非重篤	堅快 堅快		第1次
頭痛	DS07-0630 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみの改善	頭痛	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)				
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽快	得られたコメント	因果関係	年次
発疹 そう痒症	DS07-0631 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹(腕の内側) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	なし	不明	第1次
多汗症 倦怠感	DS07-0632 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみの改善	発汗 だるい、	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
湿疹 下痢 頭痛	DS07-0635 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	湿疹、下痢、頭痛	非重篤	回復			第1次
四肢痛	DS07-0637 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	足にある静脈瘤の悪化(痛み)	非重篤	軽快	今後、販売時に静脈瘤の有無を確認した方がいいと思われます。	不明	第1次
筋肉痛	DS07-0638 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	太ももが痛い(内転筋)	非重篤	未回復			第1次
口内炎 口渴	DS07-0640 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	口内炎 口の渇き	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
そば痒症 眼瞼周囲浮腫	DS07-0642 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	額がかゆい、 目の下が腫れた	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
消化不良	DS07-0644 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胸焼け	非重篤	回復			第1次
食欲減退 下痢	DS07-0645 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	食欲不振、下痢	非重篤	回復			第1次
発疹 動悸 浮動性めまい	DS07-0646 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	肝斑	心臓の動悸、めまい、	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰			
胸痛	DS07-0650 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胸の辺りのしきくした痛み	非重篤	回復	私がお客様と直接接客したわけではないので、なんとも言えませんが第一三共ヘルスケア(株)の社員から薬のせいではないなぜそういうごとの対応がなのだと思いません。新しい商品といふこともあり、今後もお客様の話をしっかりと聞いて販売してまいります。	不明	第1次
そう痒症	DS07-0651 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	痒み	非重篤	未回復	特になし	不明	第1次
恶心	DS07-0652 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	悪心	非重篤	回復	特別ありません	不明	第1次
葉疹	DS07-0656 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	葉疹	非重篤	未回復			第1次
感覺覚 末梢性浮腫	DS07-0657 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	手足のしづくみ 手足のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復	原因を調べてほしい。	不明	第1次
湿疹	DS07-0660 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	湿疹	非重篤	軽快			第1次
皮膚乾燥	DS07-0661 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	肌の乾燥	非重篤	軽快			第1次
皮膚乾燥	DS07-0662 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	皮膚がカサカサになつた	非重篤	未回復			第1次
恶心 呼吸困難	DS07-0664 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみの改善	悪心 息苦しさ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
傾眠	DS07-0665 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	3日間	しみの改善	眠気	非重篤	回復		第1次
顔面浮腫 末梢性浮腫	DS07-0666 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	顔・手足のむくみ	非重篤	回復		第1次
頭痛 筋骨格硬直	DS07-0669 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭が締め付けられる 肩が張る	非重篤 非重篤	未回復		第1次
胸痛	DS07-0670 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸の痛み	非重篤	未回復		第1次
皮膚乾燥	DS07-0678 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	肌の乾燥	非重篤	軽快		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0681 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	手首・首元の発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	「接触性皮膚炎(金属アレルギー)・薬の内服による体質の変化(体がびくんになつた)以上のことことが疑われます。」	不明
消化不良 腹部不快感 食欲減退 下痢 鼓腸	DS07-0683 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	不明	胃のむたれ、食欲不振、下痢 のような軟便、腹内ガスのつまり	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
下痢	DS07-0685 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	回復		第1次
発疹 そう痒症	DS07-0686 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	回復 特になし		不明
発疹 そう痒症	DS07-0687 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	顔の湿疹	非重篤	回復	実際に発疹を確認することができなかつたので 正直なんとも言えません。	不明 第1次
悪心 頭痛 浮動性めまい	DS07-0688 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	はきけ 頭痛、めまい	非重篤 非重篤	軽快 軽快	なし	不明 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法	副作用				備考 (医師又は薬剤師の見解)		
				使用期間 1日 使用量	使用理由 使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
発疹 ぞう洋症	DS07-0689 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	なし	可能性大 第1次
上腹部痛 悪心	DS07-0691 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復	初回時は空腹時に服用したが、その後後に不快な おもてなし感が現れたということで本剤があんなかった と予想される。	可能性大 第1次
湿疹	DS07-0692 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	27日間	しみの改善	湿疹	非重篤	未回復		第1次
動悸 感覺鈍麻 恶心 消化不良	DS07-0693 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	手足のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復	特に無し	不明 第1次
紅斑	DS07-0697 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑の緩和	両腕・胸に赤いほんのり	非重篤	回復 回復	手足のしびれ	不明 第1次
ぞう痒症 熱感	DS07-0698 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	痛み(のど) 熱感(頭面)	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明 第1次
ぞう痒症 発疹	DS07-0699 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快	本人も体調を崩していたようなので本品(トラン シーノ)が原因かは不明です。	不明 第1次
下痢 恶心 腹痛	DS07-0701 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	軽快 軽快	本品(トランシーノ)が原因かは不明です。	不明 第1次
黄色皮膚	DS07-0703 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔が全体に黄色になってきた	非重篤	回復		第1次
歯不快感 恶心 悪心	DS07-0705 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	歯が浮くような感じ むかつき、吐き気	非重篤 非重篤	不明 不明	詳細不明のため特になし。	不明 第1次
下痢 末梢性浮腫	DS07-0706 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	10日間	しみ(肝斑)	下痢 足のむくみ	非重篤 非重篤	不明 不明	服用以前は何も舞わなかったことと思います。	可能性大 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
発疹	DS07-0707 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	顎、首、腕などのボンボツ	非重篤	不明		第1次
頭痛	DS07-0708 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第1次
頭痛	DS07-0709 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛	非重篤	未回復		第1次
悪心 浮動性めまい	DS07-0710 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	悪心 めまい	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
排尿困難 尿閉	DS07-0711 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	尿が出来なくなった	非重篤	回復		第1次
口唇のひび割れ 全身性そば痒症	DS07-0715 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	唇のあれかれた、全身の痒み	非重篤 非重篤	未回復 未回復	本品と副作用との関係はなさそうに思えます (10/25から服用して20日たつてからというの が…)	不明
顔面浮腫	DS07-0716 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	顔のむくみ	非重篤	未回復		第1次
背部痛 発熱 倦怠感	DS07-0717 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみを取りたい	背中が痛い 微熱、体のだるさ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
上腹部痛	DS07-0718 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	胃痛	非重篤	回復		第1次
湿疹 悪心	DS07-0724 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹 吐き気	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
悪心	DS07-0726 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなる	非重篤	軽快	特になし	不明

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
下痢	DS07-0732 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	軟便	非重篤	未回復		第1次
湿疹	DS07-0733 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	未回復		第1次
消化不良	DS07-0738 (女) (62)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	回復		第1次
腹痛	DS07-0742 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	腹痛	非重篤	不明		第1次
浮動性めまい	DS07-0743 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	めまい	非重篤	回復		第1次
消化不良	DS07-0744 (女) (63)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	不明。	第1次
発疹	DS07-0745 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	顔にぱっボツ	非重篤	回復		可能性大 第1次
消化不良 食欲減退	DS07-0746 (女) (70)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胸焼け 食欲不振	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
異常感 口のしびれ 頭痛	DS07-0747 (男) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	舌のしびれ、頭痛	非重篤 非重篤	不明 不明		不明 第1次
悪心 消化不良	DS07-0748 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	吐気 胸焼け	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
うずき	DS07-0749 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	7日間	肝斑	- 潤み(口の辺り)	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
湿疹	DS07-0752 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	湿疹	非重篤	軽快		第1次
恶心 背部痛 咽喉炎 消化不良	DS07-0755 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝班)	みぞおちのあたりが気持ちが悪く、	非重篤	回復	特に無い	可能性大 第1次
腹痛	DS07-0756 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝班)	腹痛	非重篤	回復	かぜ薬などでも同じような症状が起るごとに起こります。 使用者自身、胃肠の弱い方と想われます。	可能性大 第1次
そう serialVersionUID 悪心 紅斑	DS07-0758 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班改善	はきけ 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
紅斑	DS07-0761 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝班	発赤(左右のほっぺた)	非重篤	回復		第1次
発疹	DS07-0763 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	肝班の改善	ブツブツ	非重篤	未回復		第1次
過少月経	DS07-0765 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	月経量が減少	非重篤	不明		第1次
不規則月経	DS07-0766 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝班)	服用中生理がなかった	非重篤	回復 なし	不明	第1次
四肢痛 頭痛 浮動性めまい 下痢	DS07-0769 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝班)	片足のかかとの激痛 頭痛、ふらつき	非重篤 非重篤	不明 不明	因果関係は不明。2瓶目のみ返品しました。	不明 第1次
恶心	DS07-0770 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	吐き気 下痢	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
紅斑	DS07-0771 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班	発赤	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用 程度	軽帰 回復 未回復	(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			使用量	使用期間			得られたコメント		
食欲減退 恶心 倦怠感	DS07-0772 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1日間 2回	1日間 しみ(肝斑)	体がだるくなつた 気分が悪くなつた	非重篤 非重篤	ある種のビタミン剤があわなかつたのだろう。	確実	第1次
頭痛	DS07-0773 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明 しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復 特にない。	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS07-0774 (女) (70)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間 血圧降下剤、コレステロール低下剤	しみ(肝斑)	非重篤 非重篤	発赤(熱) かゆみ	発赤と飲みはじめた日にちがほぼ一致するので服用の可能性はかなり大きいかと思われます。	可能性大 第1次
浮動性めまい、 恶心 性器分泌物	DS07-0777 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明 不明	しみ(肝斑)	非重篤 非重篤	眩暈 吐き気	回復 回復 なし	不明 第1次
下痢	DS07-0779 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間 しみ(肝斑)	下痢	非重篤	軽快	不明	第1次
下痢 消化不良	DS07-0780 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間 しみ(肝斑)	下痢 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復 なし	不明	第1次
恶心	DS07-0781 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間 肝斑	気持ち悪くなつた	非重篤	回復		第1次
頭痛	DS07-0782 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明 肝斑	頭痛	非重篤	軽快		第1次
動悸 恶心	DS07-0783 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明 しみ	動悸 恶心	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	年次
胸痛	DS07-0784 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	胸の痛み	非重篤	回復		第1次
口唇炎	DS07-0785 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	口の荒れ	非重篤	未回復		第1次
限局性浮腫 その障症	DS07-0790 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	5日間	しみ(肝斑)	両耳が腫れた。 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	特になし	不明
発疹	DS07-0791 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	63日間	しみ(肝斑)	吹き出物	非重篤	回復	食べ物からくるアレルギーのようなものとも思われます。	可能性小 第1次
眼充血	DS07-0796 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	片目が充血	非重篤	回復		第1次
恶心 不正子宮出血	DS07-0800 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	吐き気 不正出血	非重篤 非重篤	軽快 軽快	特になし	不明
下痢	DS07-0801 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	8日間	肝斑	下痢	非重篤	未回復		第1次
恶心 頭痛	DS07-0802 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	悪心 頭痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
浮動性めまい	DS07-0803 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	めまい	非重篤	回復		第1次
嘔吐 発熱	DS07-0806 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	嘔吐 発熱	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
悪心 腹部不快感	DS07-0807 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	吐気 脣のゴロゴロ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	使用理由 使用期間	副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		
					症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係 年次
恶心	DS07-0808 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 23日間	しみ	悪心	非重篤	軽快		第1次
頭痛 恶心 動悸 呼吸困難	DS07-0814 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回 3日間	しみ(肝斑)	頭痛 気分が悪くなったり、動悸、息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復	これまでこの様な症状が出た事は全くない。薬を中止した所症状もなかなか戻らない。	確実 第1次
倦怠感 頭痛	DS07-0817 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 4日間	肝斑の改善	体のだるさ 頭が痛付けられたり、頭が痛くなったり	非重篤 非重篤	不明 軽快		第1次
恶心	DS07-0820 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	肝斑	吐き気	非重篤	回復		第1次
発疹	DS07-0821 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 6日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	特になし	不明
湿疹	DS07-0823 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 2日間	しみ	湿疹	非重篤	未回復		第1次
消化不良	DS07-0831 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝斑	胸やけ	非重篤	回復		第1次
発疹 眼痛 疼痛	DS07-0833 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 60日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	赤いしつしんは、トランシーノのSEと考えられるが、目の痛み体の痛みはそれによるものかわからぬ。	不明 第1次
発疹 そう痒症	DS07-0839 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 2日間	しみ(肝斑)	全身に発疹	非重篤	回復	他のサブリメント等でこのような状態になつたことはなく、成分によるアレルギー(トランシーノの特徴成分)の可能性は否定できませんと想われます。がよく見られる副作用症状であり本医薬品を否定するよううなものではありません。	可能性大 第1次
腹部不快感	DS07-0840 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回 不明	しみ	胃部不快感	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用		(医師又は薬剤師の見解) 備考		年次
			1日 使用量	使用期間		症状	程度	軽減	得られたコメント	
紅斑 発疹	DS07-0842 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝班	発赤 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
下痢	DS07-0846 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア) (第1回)	3回	不明	肝班	下痢(便) 下痢(便)	非重篤	未回復		第1次
呼吸困難 恶心	DS07-0847 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	呼吸が苦しい 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
そろばん症 湿疹	DS07-0849 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	かゆみ オデコの湿疹	非重篤 非重篤	不明 不明		第1次
紅斑 そろばん症	DS07-0851 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝班)	赤くなつた かゆみ	非重篤 非重篤	不明 不明	しみは少しよくなつたとの事 したかったとの事	第1次
発疹	DS07-0854 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	発疹(両頬)	非重篤	回復	特になし	不明
腹部不快感 口渴	DS07-0857 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班	胃部不快感 の悪さ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
発疹	DS07-0858 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班	首周りや頸にポツポツ	非重篤	不明		第1次
上腹部痛	DS07-0864 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班	胃が差し込むように痛い	非重篤	回復		第1次
頭痛 動悸	DS07-0870 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	頭痛、動悸	非重篤	回復	不明	第1次
四肢痛	DS07-0871 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	足の痛み	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰			
発疹	DS07-0872 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	軽快	可能性大	第1次	
		サプリメント(ロエンザイムQ10、コラーゲン、ビタミンC)	不明	不明							
尿閉 頻尿	DS07-0874 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	排尿障害	非重篤	回復	不明	第1次	
		DS07-0880 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	しみ	下痢 動悸	回復 回復			
下痢 動悸	DS07-0882 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	下痢	非重篤 非重篤	未回復	第1次	第1次	
		DS07-0884 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤			
悪心	DS07-0887 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃がむかむかする	非重篤	不明	第1次	第1次	
		DS07-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹(お腹の周り)	非重篤	未回復		
搔痒症 湿疹	DS07-0892 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	22日間	しみ(肝斑)	むくみ かゆみ、湿疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快	可能性大	第1次	
		DS07-0893 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	4日間	しみ(肝斑)	かゆみ(額を含めて全身)	非重篤	未回復		
全身性うっ滯症										第1次	
胸部不快感									今回のケースは本品以外他剤服用しておらず、本品による軽度な副作用と考えられる。本人は本品の為に今後血栓が出来る恐れがないか?と不安がつておられた。本品オーラルの服用である心配ない旨話す。メーカーにも連絡し特に今後何らかの影響がある時は連絡する旨話した解す	可能性大	第1次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)			因果関係 年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント		
発疹 視力障害	DS07-0894 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	顔に温疹 目が白く濁った	非重篤 非重篤	回復 回復	特に原因はわかりません	不明 第1次	
うっかり症	DS07-0895 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	かゆみ	非重篤	軽快		第1次	
下痢	DS07-0896 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	8日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復 お客様と何らかの成分があわなかつたために 下痢が生じた。	不明 第1次		
発疹	DS07-0898 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復		第1次	
腹部不快感 毒作用	DS07-0904 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胃部不快感 じんましん	非重篤 非重篤	不明 不明		第1次	
腹部不快感 排尿困難	DS07-0906 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	胃の不快感 排尿困難	非重篤 非重篤	回復 回復	トランシーノ内容成分から、排尿時違和感との 因果関係は考えにくく、ただし、他どどの薬剤と の併用による尿中ビタミンDによる影響を感じ ることもあるので、不明である。服用をやめたこ とで症状はなくなったので、症状はなくなりました。 この内容接客の必要性を感じました。	不明 第1次	
四肢痛	DS07-0909 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	肝斑	ふくらはぎの痛み	非重篤	未回復		第1次	
発疹 うっかり症	DS07-0910 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	発疹 痒み	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次	
頭発月経	DS07-0915 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理の周期が早まる	非重篤	未回復		第1次	
下痢 嘔吐	DS07-0916 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝斑	下痢 嘔吐	非重篤 非重篤	未回復 回復		第1次	

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	副作用		(医師又は薬剤師の見解)			備考 因果関係	年次
				使用理由 使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
悪心	DS07-0917 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 8日間	しみ	吐き気	非重篤	未回復			第1次
消化不良	DS07-0919 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3日間	肝斑	胸焼け	非重篤	不明			第1次
悪心	DS07-0920 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	胃が気持ち悪くなつた	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS07-0923 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	発疹	非重篤	未回復			第1次
月経遅延	DS07-0925 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 7日間	しみ(肝斑)	生理が来なかつた	非重篤	回復	49才という年令が気になります	不明	第1次
		レボチロキシンナトリウム	不明回	不明						
発疹	DS07-0926 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明 不明	しみ	全身発疹	非重篤	不明			第1次
鼓腸 排便回数増加	DS07-0933 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	お腹がゴロゴロして、ガスがたま まるような感じ 下痢までしかないが、トイレ の回数が多くなつた	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹	DS07-0937 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回 不明	しみ	発疹(全身)	非重篤	軽快	特になし	不明	第1次
脚部不快感 吐気	DS07-0940 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝斑の改善	心臓に何か引っかかる様な 感じ 手・足が突っ張り時々倒れる	非重篤 非重篤	不明 未回復			第1次
月経過多	DS07-0942 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 30日間	しみ(肝斑)	生理不順(生理期間が通常 の倍長引いた)	非重篤	不明	注意して販売に心掛ける	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント		
頭痛 浮動感めまい	DS07-0943 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	頭痛、めまい	非重篤	回復	特になし	不明	第1次
月経遅延	DS07-0944 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理が来なかつた(2ヶ月間)	非重篤	回復			第1次
恶心 悪心	DS07-0946 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	恶心 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
悪心	DS07-0948 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	恶心	非重篤	軽快			第1次
そり痒症	DS07-0951 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	販売する際に今迄以上に相手の声を良く聞きました。	不明	第1次
悪心 頭痛 消化不良	DS07-0952 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	吐き気、頭痛	非重篤	回復	購入者に対し副作用発現に対して継続して注意する	可能性大	第1次
発疹 紅斑 そう痒症	DS07-0953 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	体に発疹・発赤有り	非重篤	回復		不明	第1次
		混合ビタミン剤	不明	不明							
月経過多	DS07-0954 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	経血量が増えた	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS07-0955 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔にきびのような発赤が出来た	非重篤	未回復			第1次
顔面浮腫 発疹	DS07-0960 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	顔が腫れてきた	非重篤 非重篤	不明 不明	服用中止後8日経つても症状が回復しないとの事ですでので東との因果関係は低いと思います。	可能性小	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
恶心 食欲減退 発疹	DS07-0963 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹(顔面) 悪心、食欲不振	非重篤 非重篤	回復 回復	特にありません。本人の体調不良など	不明
下痢 恶心	DS07-0968 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	3日間	しみ	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
下痢 発疹 紅斑 搔痒症	DS07-0975 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	発疹、発赤、痒み	非重篤 非重篤	軽快 不明		第1次
搔痒症 発疹	DS07-0979 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	症状が発現した時点から時間が経過してしまったことと、確認した部位(腹部)が既に内側のみであったため、症状の程度や因果関係についても、判断が困難である。また、最初の服用から時間も経過しているため、(3日間以上)因果関係の可能性についても不明者では判断しかねる状況。	不明
恶心	DS07-0980 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	悪心	非重篤	軽快		第1次
浮動性めまい	DS07-0990 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	目のかすみ・目まい	非重篤	不明		不明
湿疹	DS07-0991 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	顔に湿疹	非重篤	未回復		第1次
ほてり	DS07-0993 (女) (70)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	顔のほてり	非重篤	不明	購入時5才以上の方で相談を受けましたが、本人の希望により本剤を購入しました。今後も55才以上の方に相談していきます。	不明
熱感 発疹	DS07-1000 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	ふきでもものほせ	非重篤 非重篤	回復 回復	本人の意志は健続を希望しておりますが一時服用を中止して様子をみるとの事です	可能性大

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽快	得られたコメント	
末梢冷感 皮膚色紫黒刺	DS07-1001 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	手が黒くなる 手が冷たがる	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
湿疹	DS07-1004 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑改善	湿疹	非重篤	回復		第1次
不規則月経	DS07-1006 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	生理不順	非重篤	軽快		第1次
筋骨格硬直 頭痛	DS07-1007 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	回復 未回復		第1次
発疹 そり痒症	DS07-1008 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	渾身 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
発疹 そり痒症	DS07-1015 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	吹出物(左側ほっぺたの下) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
頻発月経	DS07-1017 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理が早くなれた	非重篤	未回復		第1次
下痢	DS07-1022 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	トランシーノ服用前後に他剤の服用はないこと からトランシーノの副作用と考えられる。	確実 第1次
異常感 頭痛	DS07-1026 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛 気分が悪い	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
発熱	DS07-1029 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	発熱	非重篤	回復		第1次
四肢不快感	DS07-1033 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	ふくらはぎが重い(両足、特に 左側)	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)			備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント			
併眠	DS07-1034 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	3日間	しみ(肝斑)	眼気	非重篤	回復	特にありません	不明	第1次
顔面浮腫 そう痒症	DS07-1037 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	肝斑部立の腫れ	非重篤 非重篤	回復 回復	他に併用薬はめつたとのことで、トランシーノによる副作用が考えられる。	可能性大	第1次
頭痛	DS07-1041 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	もども頭痛症かお聞できません	不明	第1次
感覚鈍昧 四肢痛	DS07-1048 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	両足の指先の痺れ 両太ももの後ろの痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
錯覚	DS07-1051 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	ビリビリ感(左目の下)	非重篤	回復			第1次
月経障害	DS07-1052 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	経血量が減った	非重篤	不明			第1次
悪心 腹痛	DS07-1055 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	腹痛 吐き気	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
悪心 下痢 食欲不振 不整脈	DS07-1058 (女) (61)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	不整脈 食欲不振、下痢、気持ちが悪い	非重篤 非重篤	軽快 回復			第1次
浮動性めまい そう痒症	DS07-1063 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	しみ(肝斑)	使用後、めまいとかゆみが発現しました。	非重篤	回復 なし		不明	第1次
発疹	DS07-1064 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹	非重篤	回復			第1次

副作用の種類	番号 (生年) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
腹部不快感 下痢	DS07-1075 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝班	胃もたれ 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
下痢 腹痛	DS07-1077 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
腹部不快感 下痢 消化不良	DS07-1080 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	胸やけ、胃もたれ 下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快	一過性と思考する。	不明
湿疹		ビタミンC、カルシウム	1回	1日間						
湿疹	DS07-1081 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ	湿疹	非重篤	未回復		第1次
頭痛	DS07-1083 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝班	頭痛	非重篤	回復		第1次
四肢痛	DS07-1090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	ふくろはぎの痛み	非重篤	未回復	服用中止して3、4日しても痛みが消えない事が、断定はできなかったため不明。	不明
悪心	DS07-1096 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝班の改善	気持ちが悪くなつた	非重篤	回復	服用したため、食事の影響とも考えられる。服用回数が1回のみのため、因果関係については判断できかねる。	可能性小
悪心	DS07-1100 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝班)	悪心	非重篤	回復	服用を中止したら、症状が改善したため、何らかの因果関係があると想われる。	可能性小
湿疹 動悸 そう痒症	DS07-1104 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝班)	湿疹(全身) どうき	非重篤 非重篤	不明 不明	飲んですぐの発疹が有(体全体)、副作用のうたがい有。発疹の原因は特に無いとのごどなので返品受け取りお客様の連らく先書いでもらったが、連らく先ま違いでその後の車らくとれずその後の経過不明。	不明

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	症状	副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間			程度	転帰	得られたコメント			
恶心 上腹部痛 頭痛 そう痒症	DS07-1105 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	胃の痛みやむずかつき 腹痛・皮膚の痒み	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第1次	
下痢 腹痛	DS07-1107 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
発疹 そう痒症	DS07-1111 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次	
筋骨格硬直 頭痛	DS07-1113 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次	
悪心 頭痛	DS07-1120 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 悪心	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
頭痛	DS07-1127 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復			第1次	
月経過多	DS07-1131 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	月経量が増加	非重篤	不明			第1次	
希発月経	DS07-1139 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理周期の延長	非重篤	不明			第1次	
恶心 頭痛 浮動性めまい	DS07-1144 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	4日間	肝斑	頭痛 吐き気、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
消化不良 運動障	DS07-1148 (女) (73)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	今までのサプリメントの服用では異常なかったが、トランシーノを夕食後1回だけ服用しているので、トランシーノが疑がわるると思います。	確実	第1次	
		サプリメント にんにく	不明	不明								

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	使用理由 肝斑	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)			
					程度 軽度	症状 発疹	得られたコメント	因果関係	年次		
発疹	DS07-1150 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	21日間	非重篤	未回復			第1次		
四肢不快感 筋痙攣	DS07-1151 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	ふくらはぎの痛み	この方の場合美容整形外科で「肝斑」と診断された方に市販薬トランシーノで治療した方が良いと判断され、服用されていました。少しでも楽しく若々ありたいという女性の願望にこたえたる弊社あることは思う。が、店頭で、より丁寧なカウンセリングが必要な薬であると思つた。口唇ヘルペスのOTC薬のようにお客様ご自身でチェックできるシートが必要などと考える。(現在あるシートの見直し、外箱に添付する等で必ずチェックする等。)副作用が発現するリスクをよりなくす為に購入時のカウンセリングの強化をしたい。	非重篤	回復	不明	第1次
そ5痒症 発疹	DS07-1158 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	かゆみ	服用を中止した時点から症状が回復しているので、トランシーノとの因果関係の可能性が大きいのです。但し、当社3週間も服用しており、体調不良とも考えられますとコメント。	非重篤	回復	可能大	第1次
発疹	DS07-1160 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	赤いほつぼつ			第1次		
頭痛 肢端不快感	DS07-1161 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	頭痛 胃のもたれ	非重篤 非重篤	軽快	第1次		
悪心 嘔吐 下痢	DS07-1166 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	吐気 嘔吐、下痢	服用開始から副作用発現までに時間が経過していることもありトランシーノとの因果関係は不明	非重篤 非重篤	回復 回復	不明	第1次
眼瞼浮腫	DS07-1173 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	まぶたのむくみ		非重篤	未回復	第1次	

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
頭痛 悪心	DS07-1175 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭痛 胃がムカムカした	非重篤 非重篤	軽快		第1次
胸部不快感	DS07-1177 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	胸が苦しくなった	非重篤	回復		第1次
顔面浮腫	DS07-1189 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔の浮腫み	非重篤	回復	・浮腫になるような原因は他には考えられない トランシーノに関係する文献を調べた結果浮腫の原因とは思わないが…学術へ問合せ、 血栓等の症状及び、その後の体調の変化がな いのでしばらく服用し、再び同じような症状があ れば休薬して連絡してもらうよう指示	不明 第1次
胸痛	DS07-1194 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸の痛み	非重篤	軽快		第1次
紅斑 そり病	DS07-1200 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	顔が赤くならつた 顔がかゆくなつた	非重篤 非重篤	軽快		第1次
そり病 紅斑	DS07-1207 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復	医薬品ではござまれにおこる(体質に合わない などで症状であり、トランシーノ特有の副作用 とは考えづらい。	不明 第1次
		(サプリメント), コラーゲン 、ゼラチン、鉄	1回	1,825日間						
倦怠感	DS07-1210 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	足がだるくなる	非重篤	回復	製剤の添加物の可能性と考えたが、明らかに 根拠もないでの、判断に迷所有。	不明 第1次
		レボチロキシンナトリウム								
頭痛	DS07-1215 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	頭がジーン痛くなつた	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
発疹 腹痛	DS07-1219 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吹き出物 腹痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
紅斑 眼瞼浮腫 眼瞼そばかす 皮膚乾燥	DS07-1221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	発赤 瞼の腫れ、かゆみ、カサカサ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
腹部不快感 食欲減退 倦怠感	DS07-1222 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胃もたれ 食欲不振、倦怠感	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
紅斑 湿疹	DS07-1224 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	発赤 湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
悪心	DS07-1225 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなる	非重篤	回復	特にない	不明
浮動性めまい 恶心 異常感	DS07-1226 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	めまい、頭がぼーっとした	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
紅斑	DS07-1230 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	眼の周りが赤くなつた	非重篤	未回復		第1次
下痢 便抑制	DS07-1235 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	顔のしみ	下痢 便	非重篤 非重篤	回復 未回復		第1次
不整脈	DS07-1237 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	不整脈みたいなもの	非重篤	未回復		第1次
悪心	DS07-1240 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	吐き気	非重篤	回復		第1次
歯肉腫脹 歯肉紅斑	DS07-1241 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	歯茎が真赤に腫れた	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		参考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
動悸	DS07-1242 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	動悸	非重篤	回復		第1次
異常感	DS07-1244 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝班)	気分が悪い	非重篤	回復	不明	第1次
悪心	DS07-1250 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃がムカムカする	非重篤	回復		第1次
腹部不快感 悪心	DS07-1251 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃のいたれ 悪心	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
悪心	DS07-1262 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	しみ	悪心	非重篤	回復		第1次
脱毛症 そう痒症	DS07-1263 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	抜け毛が酷くなつた 頭皮の地肌が痒くなつた	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
無月経	DS07-1265 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	生理が無い	非重篤	不明		第1次
頭痛	DS07-1266 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	2日間	しみ(肝班)	頭痛	非重篤	回復 なし	不明	第1次
そう痒症	DS07-1269 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	かゆみ	非重篤	軽快		第1次
胸部不快感	DS07-1270 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	胸が苦しい	非重篤	未回復		第1次
そう痒症 皮膚炎	DS07-1285 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班	肌がザラついた	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
発疹	DS07-1287 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	16日間	肝斑	発疹(上半身)	非重篤	未回復		第1次
浮動性めまい 下痢	DS07-1294 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	頭がクラクする 下痢	非重篤 非重篤	軽快 回復		第1次
頭痛	DS07-1304 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復		第1次
脱毛症	DS07-1305 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	抜け毛が増えた	非重篤	不明		第1次
発疹 皮膚炎	DS07-1306 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	頭に赤い斑点 顔面の肌荒れ	非重篤 非重篤	不明 特になし	不明	第1次
腹部不快感	DS07-1315 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	胃の迫りが不快になる	非重篤	軽快		第1次
頭痛	DS07-1316 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	頭痛	非重篤	未回復		第1次
下痢	DS07-1317 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ	下痢	非重篤	未回復		第1次
動悸 頭痛	DS07-1320 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	動悸 頭の圧迫感	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
不規則月経	DS07-1321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理不順	非重篤	不明		第1次
皮膚剥脱	DS07-1322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	手の平の皮膚が剥けた	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	既発 得られたコメント
眼瞼浮腫 紅斑	DS07-1324 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	瞼の腫れ 発赤	非重篤 非重篤	堅快 不明
口渴	DS07-1329 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	喉の渇き	非重篤	回復
浮動性めまい 嘔吐	DS07-1331 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	頭がフラフラする 嘔吐	非重篤 非重篤	堅快 回復
頭痛	DS07-1334 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復
湿疹	DS07-1340 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑以外)	湿疹	非重篤	回復
食欲減退 恶心 下痢	DS07-1341 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑	食欲不振 吐気、下痢	非重篤 非重篤	堅快 堅快
全身性皮疹	DS07-1345 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明
浮動性めまい 頭痛 恶心 下痢	DS08-0002 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	眩暈 頭痛、吐き気、下痢	非重篤 非重篤	堅快 堅快
眼瞼うっ血症 その伴症 口唇のひび割れ 眼瞼炎	DS08-0003 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	11日間	肝斑	荒れた(目の際、唇) 痒くなつた。(目の際、唇)	非重篤 非重篤	堅快 堅快
動悸	DS08-0006 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復
上腹部痛	DS08-0008 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃痛	非重篤	未回復

副作用の種類	番号 (生年) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		（医師又は薬剤師の見解）		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント			
下痢	DS08-0010 (女) (80)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	服用中下痢が続き、止めると下痢が止まるので 服用をやめさせていただけ。	不明	第1次
悪心	DS08-0011 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	気分が悪くなる	非重篤	軽快			第1次
紅斑 眼瞼浮腫 末梢性浮腫	DS08-0013 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔の赤み またたのむくびみ、手の指のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
アスピラキシン酸アミノトランヌ フェラニン・アミノトランヌフェ ラーーゼ増加	DS08-0014 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	GOT、GPTの上昇	非重篤	未回復			第1次
下痢	DS08-0020 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	・他院併用薬やサプリメント等の服用なし。服用 中止後症状が治まったことから、トランシーノが 原因である可能性が高いと想われる。	不明	第1次
頭痛	DS08-0025 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	軽快			第1次
異常感 浮動感めまい、 浮腫	DS08-0026 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	9日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなつた	非重篤	回復	商品を購入、服用後気分が悪くなり服用中止。 すぐに回復。その後2～3日服用中止し、再度 一回量服用、同様の症状が出る。以上からトランシーノが影響している可能性があると考える。	可能性大	第1次
発疹 紅斑 その痒症	DS08-0028 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)の為 発赤、かゆみ	発疹 発赤、かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		不明	第1次
動悸 胸部不快感	DS08-0034 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	動悸 胸が苦しい	非重篤 非重篤	回復 回復	お仕事をされていて疲れもあったかもしれな い。	不明	第1次
全身性瘙痒症	DS08-0041 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	全身のかゆみ	非重篤	軽快	初めて美白目的の薬を使用され、トランシーノ を飲み始めて二日という直後に全身的痒みが 発症した所からトランシーノが原因と考えまし た。中止後回復されております。	可能性大	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント		
動悸 浮動性めまい 異常感	DS08-0042 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝班)	眩暈、気分が悪くなる	非重篤 非重篤	不明 不明	併用薬、当時の体調は不明だが、服用の都度同じ症状が出ているのでトランシーノが原因と考えられる。	可能大	第1次
皮膚炎 皮膚変色	DS08-0046 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)			不明	シミの改善	左の親指の付け根が白くなつた				第1次
便秘	DS08-0050 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	便秘	非重篤	回復			第1次
末梢冷感 四肢痛	DS08-0051 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2・3回	不明	肝班	手足が冷える ふくらはぎの鈍痛	非重篤 非重篤	未回復 軽快			第1次
月経過多 頻発月経	DS08-0054 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)			不明	しみ	生理期間がいつより長引く 生理周期が早くなつた	非重篤 非重篤	回復 未回復		第1次
恶心	DS08-0059 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	吐き気	非重篤				第1次
発疹	DS08-0062 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	発疹(顔にぶつぶつ)	非重篤	軽快			第1次
紅斑	DS08-0072 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝班治療	発赤(赤班)	非重篤	回復			第1次
胸痛	DS08-0082 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝班	胸が痛くなつた	非重篤	軽快			第1次
そう痒症 そう痒症	DS08-0086 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝班	かゆみ	非重篤	回復			第1次
感覺鈍麻 四肢痛	DS08-0089 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	左足のしびれ、痛み	非重篤	回復	トランシーノの副作用用には、余り見受けられない。本邦との因果関係はうすいと思われる お客様ご自身も、トランシーノが原因かは、良く わからぬとの事。	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
もう洋症 紅斑 顔面浮腫	DS08-0090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	赤くなつた、顔のせくみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
頭痛 動悸	DS08-0092 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	激しい頭痛 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
頭痛 排尿困難	DS08-0093 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	頭痛 排尿困難	非重篤 非重篤	回復 回復	因果関係については、不明だと思います。	不明 第1次
皮膚障害 皮膚のべつつき感	DS08-0094 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	肝斑	頭皮のべつつき	非重篤	未回復		第1次
浮腫 便秘	DS08-0100 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	むくみ 便秘	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
浮腫 感覺鈍麻	DS08-0101 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	手のむくみ 手ひびれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
発疹	DS08-0110 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑	顔にばつぱつ	非重篤	回復		第1次
下痢 動悸	DS08-0117 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
腹部不快感	DS08-0118 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	胃もたれ	非重篤	回復		第1次
下痢	DS08-0122 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	下痢	非重篤	回復		第1次
下痢 便潜血	DS08-0123 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 潜血	非重篤 非重篤	軽快 回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
腹痛 下痢	DS08-0124 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	第1次
倦怠感	DS08-0128 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	腕がだるい	非重篤	不明	第1次
動悸	DS08-0135 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班	動悸	非重篤	軽快	第1次
湿疹 嘔吐 下痢 発熱	DS08-0142 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝班	嘔吐、下痢、発熱	非重篤 非重篤	回復 回復	不明 第1次
発疹	DS08-0144 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝班)	発疹(両腕の内側)	非重篤	回復	因果関係は不明 第1次
		コンドロイチン	不明	不明					不明 第1次
上腹部痛	DS08-0145 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	胃が痛い	非重篤	回復	第1次
そう痒症	DS08-0146 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	かゆみ	非重篤	未回復	第1次
発疹	DS08-0152 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝班)		非重篤	回復	1月頃よりトランシーノを服用し始めたところ 右ふくらはぎ付近に広範囲に紫斑が発生した のでございました。私は医者ではないので断定的な事は 申し上げませんが確かに青紫色で径20cm 以上の紫斑(血管腫)らしい異常と判断したの で、大阪府医療センター心臓血管外科で受診さ れるよう紹介しました。又急な服用中止による 副作用を防止するためビタミンC剤を服用する 様にして頂きました 可能性大 第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
下痢 頭面浮腫	DS08-0153 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下面右側の腫れ	非重篤 非重篤	回復 回復	医師の見解と同様、因果関係は不明と思われます。	不明
頭痛	DS08-0154 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	頭が痛い	非重篤	回復	服用中止後、症状が治まった為、お客様は返金処理で納得して頂いた。	不明
関節痛 筋骨格硬直	DS08-0155 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	膝が痛い 肩こり	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
倦怠感 動悸	DS08-0156 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体がだるくなる 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
発疹 紅斑 搔痒症	DS08-0157 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑	発疹 発赤、かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
動悸	DS08-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復		第1次
腹部不快感 発疹	DS08-0159 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃部不快感 吹出物	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
口唇障害 口唇痛 口の感覺鈍麻	DS08-0160 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	唇が紫 色	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
発疹	DS08-0161 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹(顔、臀部)	非重篤	軽快	服用を中止した後に発疹が治まつてしまつたり、トランシーノとの因果関係は否定できない。	不明
胸痛	DS08-0162 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸の辺りがチクチクする	非重篤	不明		第1次
眼瞼浮腫	DS08-0164 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	まぶたに浮み	非重篤	回復 なし	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽湯 得られたコメント		
下痢	DS08-0165 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	下痢	非重篤	不明		第1次
皮膚乾燥	DS08-0167 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	顔の右側の耳の前の肌がザラサラになった	非重篤	不明	特になし。	第1次
口内炎 口腔咽喉 歯肉腫脹	DS08-0168 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	喉の痛み、舌ぐきの腫れ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
頭痛	DS08-0175 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第1次
過少月経	DS08-0176 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	月経量の減少	非重篤	未回復		第1次
末梢性浮腫	DS08-0178 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	足のむくみ	非重篤	回復		第1次
そり痒症 紅斑	DS08-0179 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	皮膚の痒み 皮膚が少し赤くなつた	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
発疹	DS08-0184 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	軽快	御本人様の体質に合わなかつたかと思われます。	第1次
紅斑	DS08-0187 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	肝斑の部分に赤み	非重篤	未回復		第1次
頭痛 恶心	DS08-0189 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 吐き気	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第1次
倦怠感	DS08-0192 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体がだるい	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	程度	転帰	得られたコメント	
感覺鈍麻	DS08-0193 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	手のしひれ	非重篤	特になし	不明 第1次
そう痒症	DS08-0194 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	痒み(腕の内側、太腿)	非重篤	服用後、すぐに症状が出ていた点、服用中止後、何ら症状がない点等からみて、トランシーノの成分による、軽い副作用(アレルギー症状)だったと思います。	可能性大 第1次
下痢 上腹部痛	DS08-0195 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	8日間	しみ	下痢 胃痛	非重篤 非重篤	回復 回復	第1次
片頭痛 月経困難症 過少月経	DS08-0197 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	片頭痛 生理痛	非重篤 非重篤	回復 回復	第1次
悪心 腹痛	DS08-0201 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	吐き気 腹痛	非重篤 非重篤	胃腸風邪の流行していた時ですので、本当に薬の副作用かは不明	不明 第1次
そう痒症	DS08-0202 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	体質に合わなかつたと考えられます。	可能性大 第1次
頭痛 食欲減退 消化不良 腹痛	DS08-0204 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	しみ(肝斑)	頭痛 食欲不振、胸やけ、腹痛	非重篤 非重篤	因果関係は不明だが、上記の副作用と疑われ る症状が出た為、服用の中止を勧めました。	不明 第1次
下痢 腹痛	DS08-0206 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	軟便 下痢、腹痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快	第1次
頭部不快感	DS08-0208 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭が重い	非重篤	不明	第1次
紅斑	DS08-0210 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	発赤	非重篤	不明	第1次
食欲減退 末梢性浮腫 四肢痛	DS08-0220 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	食欲不振 足のむくみ、足の痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
希発月経	DS08-0222 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が遅れる	非重篤	未回復		第1次
発疹 そう痒症	DS08-0226 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
浮動性めまい	DS08-0231 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	体力が低下していたため、症状がでたかもしれない い	不明 第1次
末梢性浮腫	DS08-0244 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	足のむくみ	非重篤	軽快	特になし	不明 第1次
そう痒症	DS08-0236 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	かゆみ	非重篤	未回復		第1次
そう痒症 発疹	DS08-0238 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	赤み 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復	その方の母親もトランシーノを飲まれて、かゆみ が出来たという先入観で服用されているので、起 こりやすい状況にあったと考えられる。	不明 第1次
末梢性浮腫 感覺鈍麻	DS08-0240 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	右足のむくみ 右足のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復		第1次
発疹	DS08-0244 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ緩和	発疹	非重篤	回復	年令が50才以上という事もあり、また本人が神 経質、またアレルギーがあつたのででは何が弱 い為。とにかく色々好みすぎ!	確実 第1次
末梢性浮腫 便秘	DS08-0246 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	かゆみ 便秘	非重篤 非重篤	不明 不明	春はいろんな意味でストレスを感じる季節だと 聞いています。その場合最初に胃腸に影響を受 けると予想しているのでそんな影響もあるのでは ないかと感じた。	可能性小 第1次
消化不良	DS08-0248 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	胸やけ	非重篤	回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
四肢痛	DS08-0252 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	足の痛み	非重篤	未回復		第1次
発疹	DS08-0253 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	発疹	非重篤	軽快		第1次
下痢	DS08-0256 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復		第1次
腹痛	DS08-0257 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	6日間	しみ(肝斑)	胃がムカムカし吐き気	非重篤	回復	多少神経質などころが理間見えるお客様で、目立った肝斑でもなく胃腸も弱いところまで一度お断わりしたが、どうしても服用したいたいところでお断りしたが、胃腸が結構ムカつくところまで販売した。因果関係は無いとはいえないが、別の要因もあるのではないか、	可能性小
		血圧低下剤、糖尿病用剤			不明	不明				
顔面浮腫 紅斑	DS08-0258 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔半分腫れた	非重篤	回復		第1次
乳腺炎	DS08-0267 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	乳腺が腫れてきた	非重篤	未回復		第1次
頭痛	DS08-0274 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復		第1次
動悸	DS08-0275 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	しみ	胸がドキドキした感じ	非重篤	回復		第1次
頭部不快感	DS08-0276 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭重	非重篤	未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	使用理由 使用期間	副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
					症状	程度	転帰	得られたコメント		
浮動性めまい 重感 血管収縮	DS08-0273 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	足が重い、足の血管が浮き出ている	非重篤 非重篤	回復 未回復		第1次
上腹部痛	DS08-0284 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	不明	しみ	胃痛	非重篤	未回復		第1次
そり等症 眼充血 鼻閉	DS08-0286 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	かゆみ 目の黒目の周りが赤く充血、 鼻が詰まる	非重篤 非重篤	回復 回復	アレルギー体質が原因ではないかと思われます。	不明 第1次
頭痛	DS08-0289 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	不明	トランシーノ(トランキサム)服用後の頭痛と 困ります。(他の商品に関しててもクレームの 多い方)	不明 第1次
浮腫 動悸	DS08-0292 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	むくみ 動悸	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第1次
熱感 下痢 頭痛	DS08-0294 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4~5日間	しみ(肝斑)	頭のぼせ 軽便	非重篤 非重篤	回復 回復	服用以前より、頭痛をお持ちの方なので、副作 用に関する腹部に至るまでは、わかりかねま す。又、ご家族の方や心筋梗塞を患つた方もい ると聞きました。遺伝性にによるものかどうかの判断もつ きかねます。店側の対応としましては、やはり使 用を中止して頂き、症状が解く、もしくは発現の 場合は、医療機関の どちらかを待ません。	不明 第1次
光視症 動悸 頭部不快感	DS08-0296 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	目がチカチカ 動悸、頭が重い	非重篤 非重篤	回復 未回復		第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽快		
発疹 その辺症	DS08-0303 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	荨麻疹	非重篤	不明	ご本人に当日の体調についてお伺ったところ、生理の終わり頃)でした。とのこと。女性はその時によつて体調が変化しているため、説明の際に必要であると聞いてください。ナリ、納得の上たつたので大らやんと開いてください。ナリ、納得の上たつたと思ひますが、販売できる事にならずよかったです。個人の体調にまで路を広げて接客できると顧客も減るかもしません。	可能性大 第1次
			DS08-0310 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	めまい		
浮動性めまい	DS08-0312 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	下痢	非重篤	回復		第1次
			DS08-0321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	さくみ		
下痢	DS08-0322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	下痢	非重篤	回復		第1次
			DS08-0325 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃痛		
浮腫	DS08-0329 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	顔の腫が化膿	非重篤	回復	服用した時期が偶然重なってしまったのだと思ひます。	可能性小 第1次
			DS08-0330 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	痒み 発疹		
化膿 発疹	DS08-0335 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	急にお腹が痛くなつた	非重篤	回復	トランシーノ服用後に胃もたれの症状が出たことなので、服用を中止してもらつた。 不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)	
			1日 使用量	使用期附	使用理由	症状	程度	軽減 得られたコメント
頭痛	DS08-0336 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	頭痛	非重篤	未回復
発疹	DS08-0338 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	25日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明
四肢痛	DS08-0342 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	痛み(足首)	非重篤	不明
湿疹 そう痒症	DS08-0343 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明日間	しみ(肝斑)	首周りの湿疹	非重篤	⑨の中に書いています。
疲労	DS08-0347 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	21日間	肝斑	疲れやすくなつた	非重篤	軽快
末梢性浮腫 顔面浮腫	DS08-0349 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	26日間	肝斑	顎がヒリヒリする 足のむくみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復
頭痛	DS08-0355 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頭痛	非重篤	未回復
発疹 そう痒症	DS08-0358 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復
下痢	DS08-0361 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	下痢	非重篤	未回復
下痢 食欲不振 腹痛	DS08-0362 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	軟便 食欲不振、腹痛	非重篤 非重篤	回復 軽快
下痢	DS08-0364 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑治癒	軟便	非重篤	未回復

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間		症状	程度	軽減	得られたコメント		
湿疹 下痢 腋正子宮出血 浮腫 頭痛	DS08-0373 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹 下痢、ふくらはぎとこめかみ の脈動感、不正出血、むくみ	非重篤 非重篤	不明 不明	不明ではあるが因果関係はないものと思われる。	不明	第1次
月経過多 皮膚剥脱 そり痒症	DS08-0384 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	月経量が増えた 鼻の頭の皮が赤くなった、体がかゆくなつた	非重篤 非重篤	回復 回復	副作用が現れたのか服用されて、直後でない ので本品か副作用かどうか疑わしいと思われます。	不明	第1次
紅斑 湿疹	DS08-0385 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	発赤 湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復	副作用としては、胃腸障害が多く、皮膚湿疹 は、当店では、始めです。	不明	第1次
紅斑	DS08-0390 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	赤い点々	非重篤	不明	副作用としては、胃腸障害が多く、皮膚湿疹 は、当店では、始めです。	不明	第1次
下痢 腹部不快感 悪心	DS08-0391 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	下痢 胃もたれ、むかつき	非重篤 非重篤	回復 回復	一々	一々	第1次
不正子宮出血	DS08-0393 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	出血	非重篤	不明	不明	不明	第1次
発疹	DS08-0394 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	吹き出物が増えた	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS08-0399 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	口の周辺及び頬の上に発疹	非重篤	回復	アレルギー体質の為。	可能性大	第1次
下痢	DS08-0421 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	軟便	非重篤	未回復			第2次
そり痒症 発疹	DS08-0425 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
不正子宮出血	DS08-0426 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	不正月経血	非重篤	回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		（医師又は薬剤師の見解）		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
消化不良	DS08-0431 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胃もたれ	非重篤	回復		第2次
発疹	DS08-0438 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	眼の周りがカサカサ かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第2次
上腹部痛	DS08-0439 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃痛	非重篤	回復		第2次
悪心	DS08-0440 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	気分が悪くなる めまいがする	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
発疹	DS08-0442 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	5日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	服用後1日経過後の発現なので、可能性が低い が、皆無ではない。	可能性小
消化不良 悪心	DS08-0449 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	心臓が苦しい 吐氣	非重篤 非重篤	不明 不明		第2次
発疹	DS08-0451 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	頭の腫れ	非重篤	不明	カウンセリングをしっかりと行い、販売・納得して 購入頂きました。	不明
上腹部痛	DS08-0452 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃痛	非重篤	回復		第2次
下痢	DS08-0453 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	服用中に下痢が発生したが、ビタミンC剤服用 で下痢の発生はないとの話から、本剤との因果 関係は不明と考える。	不明
下痢 恶心	DS08-0458 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	軟便 吐き気	非重篤 非重篤	回復 未回復		第2次
発疹	DS08-0465 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	脇の下や胸にボンボン	非重篤	不明		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)	
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント
恶心	DS08-0469 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	吐気	非重篤	一度限りの服用で本品による頭痛がおこるとは考えにくく、ただし、吐気に關しては様々な薬でおこりうるものなので不明とした。
頭面感覺鈍昧 感覺鈍昧 癡呆	DS08-0473 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	左半身のしびれ、 左目のかすみ	非重篤 非重篤	服用中に副作用の症状が発現し、服用を中止すると回復されたことから、同品との因果関係の可能性もあるかと考える。(他に併用薬もないことも合わせて)
恶心 倦怠感	DS08-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	胃のむかつき 体がだるい、	非重篤 非重篤	可能性小
そう痒症 浮腫 排尿困難	DS08-0481 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	鼻が赤く腫れた、尿の出が悪くなり、 なくなつた、むくみ	回復 回復	特になし
恶心	DS08-0488 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	吐き気	非重篤 非重篤	不明
発疹	DS08-0489 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	顔にほっぽつ	回復	特になし
湿疹	DS08-0491 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	腕に湿疹	非重篤 非重篤	可能性大
そう痒症	DS08-0495 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔全体のかゆみ	非重篤	特になし
下痢	DS08-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	特になし
耳鳴 恶心	DS08-0508 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	耳鳴り 恶心	非重篤 非重篤	医師の診断がないため、不明
随伴疾患悪化 口腔粘膜紅斑 消化不良 上腹部痛	DS08-0510 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	歯痛(歯肉内うつ血による痛 み) 口内炎(発赤、脣に絆め付 けられるような痛み)	非重篤 非重篤	不明

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
嘔吐 下痢	DS08-0515 (女) (2X~3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	嘔吐 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明	先にメークーのお客様センターに連絡、その後当店に連絡。第一三共ヘルスケア(もり上鍵担当者)より販取店舗を伝えられ、返金した。 不明 第2次
感覚純麻 頭痛	DS08-0516 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	しみれ(指先) 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復	不明 第2次
発疹	DS08-0517 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	不明 第2次
下痢	DS08-0519 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	未回復	不明 第2次
悪心 上腹部痛 腹痛 下痢	DS08-0521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝斑	吐き気 胃痛、腹痛、下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快	不明 第2次
下痢	DS08-0523 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	未回復	不明 第2次
無月経	DS08-0527 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	46日間	しみ(肝斑)	生理がなくなった	非重篤	不明	トランサンは、生理の出血量を低下させるためにもちろんいることがある。そのためトランサンを服用すると生理の量は低下することだが、生理性stopときでは行動しないと思う。でも、肝斑は女性ホルモン…と商品が云っている以上、生理がどうなるとなるとがれで女性ホルモンヒトトランシーノの関係を考えてしまう。相互作用や、生活的ななごともも考慮して、トランサンの服用注意を考えるべきだと思う。 可能性小 第2次
発疹 ぞう洋症 紅斑	DS08-0532 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	発疹 痒み、赤み	非重篤 非重篤	未回復 未回復	不明 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰			
倦怠感 熱感 食欲減退 嘔吐	DS08-0536 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	体がだるくなつた、食欲不振、嘔吐 熱くなつた。	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次	
湿疹	DS08-0540 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	32日間	肝斑	全身に湿疹	非重篤	軽快		第2次	
下痢 腹痛	DS08-0544 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次	
発疹 そう痒症 浮腫	DS08-0546 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 痒み、せくみ 浮み	非重篤 非重篤	回復 不明		第2次	
そう痒症 希発月経	DS08-0547 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	1年振りの生理	非重篤 非重篤	回復 未回復		第2次	
下痢	DS08-0553 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	お腹が張った 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次	
紅斑 そう痒症	DS08-0555 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ	赤み かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 回復		第2次	
下痢	DS08-0559 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	他の薬剤との併用はないが、トランシーノ服用後に起る下痢症状は服用中止により改善される。トランシーノ成分が直接受けているかどうかは不明であるが、疑い余地はある。	不明	第2次
頭痛	DS08-0561 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	特に問題ありません。	可能性小	第2次
そう痒症 腹部不快感 発赤	DS08-0564 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	腹部不快感、発赤	非重篤 非重篤	不明 不明	他剤との併用をしているため、直接同品と因果関係があるとは断定できない。	可能性小	第2次
		その他のビタミン剤	不明	不明							

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	
下痢	DS08-0567 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢	非重篤	不明	第2次
腹痛	DS08-0568 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	腹痛	非重篤	回復	第2次
下痢	DS08-0569 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	お腹がゆるくなつた	非重篤	未回復	第2次
発疹	DS08-0570 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	回復	服用後すぐに湿疹が発現、中止すると回復した事から因果関係は大きいと思われる。 可能性大
湿疹 そう痒症	DS08-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 回復	第2次
浮動性めまい 倦怠感 傾眠	DS08-0580 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	6日間	肝斑	ふらつき 倦怠感、眼気	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第2次
そう痒症	DS08-0581 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	軽快	因果関係は不明であるが、一因中止が良いと思われる。
発疹	DS08-0585 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	発疹	非重篤	未回復	第2次
恶心 動悸	DS08-0588 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	吐き気 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	お客様の体調に適さず、副作用の症状が発現されたと考えられます。 不明
下痢	DS08-0590 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復	第2次
湿疹 下痢	DS08-0594 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	41日間	肝斑	湿しん、下痢	非重篤	回復	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
無力症 浮動性めまい、	DS08-0595 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	力が入らない めまい、	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
発疹	DS08-0603 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ改善	発疹	非重篤	未回復		第2次
消化不良 恶心	DS08-0612 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	胸焼け 胃がムカムカ	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
胸部不快感	DS08-0615 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	胸の圧迫感	非重篤	回復 回復	されでもその薬剤にアレルギーがあることありと想 います。	不明 第2次
下痢 頭痛	DS08-0616 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	軟便 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
恶心	DS08-0617 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胃がムカムカする	非重篤	回復	因果関係は不明ですがお客様の体质に合わ なかつた為、症状が発現したものと思われま す。	不明 第2次
悪心	DS08-0625 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)改善	胃のむかつき	非重篤	回復		第2次
食欲減退 下痢 腹痛	DS08-0629 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	食欲不振 軟便、下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用直後の副作用であることを考え、使用中止直後 に軽快に向かつたことを考え、本品との因果関 係を可能性大といします。ただし、体調不良等の 原因も十分に考えられます。	可能性大 第2次
潮紅	DS08-0633 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭のむくみ 頭全体の赤み	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
全身性そう痒症	DS08-0634 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	全身にかゆみ	非重篤	回復		第2次
恶心	DS08-0638 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	気持ちが悪くなつた	非重篤	回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
発疹	DS08-0641 (男) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	水疱瘡のような温疹	非重篤	回復		第2次
不正子宮出血	DS08-0642 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	不正出血	非重篤	未回復		第2次
過少月経 頭痛 月経過多	DS08-0652 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	生理際の出血量が減った	非重篤	回復	今夏、クーラーによる冷えなどの症状も強かつたという訴などから((体調も崩れていた様子)、今回の月経異常が発現したと思われる。	不明 第2次
発疹	DS08-0654 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	吹き出物	非重篤	未回復		第2次
頭痛	DS08-0655 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第2次
腹痛	DS08-0659 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	特になし	不明 第2次
下痢	DS08-0660 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ	下痢	非重篤	未回復		第2次
便祕 腹部不快感	DS08-0665 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃の調子が悪い 便秘	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
紅斑	DS08-0671 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	34日間	しみ(肝斑)	発赤	非重篤	未回復		第2次
紅斑 そう痒症 悪心 嘔吐	DS08-0675 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	赤くなつた、かゆみ、気持ち悪くなつた	非重篤 非重篤	回復 回復	服用中に発疹とかゆみ、嘔吐の症状から同品との因果関係が考えられる。	可能性小 第2次
そう痒症	DS08-0684 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔の痒み	非重篤	未回復		第2次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコドト		
発疹	DS08-0695 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の緩和	吹き出物	非重篤	未回復		第2次
下痢	DS08-0698 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	下痢	非重篤	回復	因果関係は不明です。夏場の体力低下がかなりで、お薬が合わなかつたとも考えられますので、服用中止をおねがいしました。	不明 第2次
発疹 そう痒症	DS08-0700 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	荨麻疹(首から胸)	非重篤	未回復		第2次
下痢	DS08-0704 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝班)	下痢	非重篤	回復	トランシーノのいづれかの成分がお客様に合わない、為、発現したと思われます。	可能性大 第2次
発疹 そう痒症	DS08-0716 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝班)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	私が何つたお話を、お食事の後もまんさんの様な症状がでるという事ですが、本品(トランシーノ)との因果関係は不明です。	不明 第2次
恶心 食欲減退	DS08-0720 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が重い感じ	非重篤	未回復		第2次
消化不良 便秘	DS08-0721 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班	便が硬くなつた	非重篤 非重篤	回復 未回復		第2次
下痢	DS08-0725 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	お腹がゆくなる	非重篤	不明		第2次
下腹部痛 下痢	DS08-0729 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班	下腹部痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
発疹	DS08-0734 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復		第2次
発疹 そう痒症 浮腫	DS08-0744 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	毒麻疹 むくみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		参考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
過少月経	DS08-0761 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	月経量が少なめ	非重篤	未回復		第2次
発疹 そう痒症	DS08-0766 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3または1 回	16日間	肝斑	痒い ブツツ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
全身性そう痒症	DS08-0771 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
悪心 食欲減退	DS08-0775 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃もたれ	非重篤	未回復		第2次
悪心 食欲減退 嘔吐	DS08-0777 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	24日間	しみ(肝斑)	悪心 食欲不振	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
恶心	DS08-0781 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	気分が悪い	非重篤	回復		第2次
頭部不快感 消化不良 下痢	DS08-0800 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭が重い感じ 胸焼け、お腹が緩くなつた	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
頭痛 温疹 そう痒症	DS08-0801 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑	温疹、かゆみ(両手の甲)	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
発疹 そう痒症	DS08-0802 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	本 お客様のご様子から、断言は出来ないが、本 薬の副作用とは思われない。添付文書を読 み、副作用を疑われたのではないか…その後、 受診されたこの情報もない、	不明
上腹部痛	DS08-0804 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復	もどもと胃が弱い方だったのでかもしれません。	可能性小
下痢	DS08-0813 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	今回発現した下痢の症状は体質にあわなかつ るものと思われる。	不明

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			使用期間 1日 使用量	使用期間 1日間	使用理由 しみ(肝斑)	症状 ムカムカ 吐き気	程度 非重篤 非重篤	転帰 回復 回復	得られたコメント	
悪心	DS08-0816 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	ムカムカ 吐き気	2度とも服用後30分ほどしてから症状が発現し、その後も症状がでていません。	可能性大 第2次		
消化不良	DS08-0822 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胸がキューんと痛くなるような感じ	非重篤	回復		第2次
発疹	DS08-0823 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	しみ(肝斑)	発疹(背中、胸)	非重篤	不明	本症例においては、口答で確認したが、本剤が原因であるとは思えない。しかしこのようない発疹ケースがどれ位あるか、不明であったので、御社に連絡した。	不明 第2次
消化不良	DS08-0826 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸焼け	非重篤	不明		第2次
頭痛	DS08-0829 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第2次
悪心	DS08-0830 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	胃のむかつき	非重篤	未回復		第2次
湿疹	DS08-0831 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹(首から頸に)	非重篤	未回復		第2次
悪心	DS08-0833 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	恶心	非重篤	回復		第2次
下痢	DS08-0843 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復		第2次
上腹部痛 消化不良	DS08-0850 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胃の調子が悪くなつた	非重篤	不明	この方は、元々胃が弱い方です。少しの胃痛ながら服用しようと思ったら、脳やけがガマランできなかつたこと。精神的な原因も考えられるでは…	可能性大 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽解	
消化不良	DS08-0857 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	胸焼け	非重篤	回復	第2次
嘔吐	DS08-0878 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	吐いた	非重篤	回復	第2次
紅斑 搔痒症	DS08-0888 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復	第2次
発疹	DS08-0889 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹	非重篤	不明	第2次
悪心	DS08-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	吐気	非重篤	回復	第2次
そう痒症	DS08-0894 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	かゆみ(発症部位不明)	非重篤	軽快	第2次
腹部不快感 口内炎	DS08-0910 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	肝斑	胃重 口内炎	非重篤 非重篤	未回復	第2次
希発熱	DS08-0919 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が予定より遅れた	非重篤	不明	第2次
発疹 搔痒症	DS08-0922 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	可能性小 第2次
白斑	DS08-0926 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	肌の色が抜けで白くなった	非重篤	未回復	第2次
不正子宮出血	DS08-0930 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	不正出血	非重篤	未回復	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
食欲減退	DS08-0931 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	食欲不振	非重篤	回復	第2次
恶心	DS08-0937 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	気分が悪くなつた	非重篤	回復	第2次
感觉鈍昧 末梢冷感	DS08-0957 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	その他(美白)	手足のしづれ 手足の冷え	非重篤 非重篤	回復 回復	エバコーポワイトを以前、服用の際は、問題なかった事をを考えると、トランシーノによる可能性あるが、何か他のお薬を併用にならぬで、上記の症状が出ていたとも考えられます。 不明 第2次
下痢	DS08-0973 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	軽快	今まで"その他"ビタミン剤"服用時には下痢がなく、トランシーノ服用後に強い下痢になつたことがあります。原因は不明であるがトランシーノ含有成分のビタミン剤かトランシーノ錠である可能性が高いです。 可能性大 第2次
浮動性めまい	DS08-0978 (女) (66)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	めまい	非重篤	未回復	第2次
便秘	DS08-0985 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	便秘	非重篤	未回復	第2次
上腹部痛	DS08-0986 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃痛	非重篤 非重篤	回復 回復	第2次
頭痛 恶心	DS08-0991 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頭痛 胃がきかづく	非重篤 非重篤	回復 回復	第2次
発疹 搔痒症	DS08-0993 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹 痒み	非重篤 非重篤	不明 不明	服用4回目で発現していることからみて本剤による副作用の可能性が大と考えます。また他の原因とした薬剤もなく、既往症や合併症もない、というのです。 可能性大 第2次
消化不良	DS08-0999 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	物が胸につかえる感じ	非重篤	未回復	第2次

副作用の種類	番号 (生年) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽躁	得られたコメント	
動悸	DS08-1001 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	歎息	非重篤	回復		第2次
下痢	DS08-1003 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤	未回復		第2次
発疹 そり样症	DS08-1007 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	尋麻疹が顔に出た	非重篤	軽快		第2次
口渴	DS08-1008 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	口渴	非重篤	回復	口渴なので人によつては有りうる	不明 第2次
嘔吐	DS08-1015 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑	嘔吐	非重篤	回復		第2次
浮腫 感覚障害 疼痛	DS08-1021 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	肩が重痛い	非重篤	不明	患者様、ご来店時のご相談内容が、更年期の漢方製剤などとて考えてみたが、へビーな方ではなく、顔の脂肪が腫瘍だつたため、OTC唯一の肝斑治療薬との併用をお勧めした。副作用とは言えず、もともとくみなつておられた方が四物湯で水分を過度に摂取されたため、水分代謝がバランスをくずしたと考えられる。	不明 第2次
消化不良	DS08-1023 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑	胸焼け	非重篤	未回復		第2次
頭痛 眼充血	DS08-1030 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	頭痛 目の充血	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第2次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)	
			使用期間 1日 使用量	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント
そう痒症 発疹	DS08-1031 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 30日間	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快	不明
頭痛 胸痛 消化不良	DS08-1034 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回 1日間	肝斑	頭痛 胸の痛み、胸焼け	非重篤 非重篤	軽快 回復	第2次
紅斑	DS08-1040 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	目の周りが赤くなつた	非重篤	未回復	第2次
爪変色 月経困難症	DS08-1044 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明 不明	しみ	足の爪の色が青くなつた 生理が重くなつた	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第2次
腹痛	DS08-1051 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3日間	肝斑	腹痛	非重篤	未回復	第2次
腹痛 便秘 腹部膨脹	DS08-1055 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回 不明	肝斑	お腹の張り 腹痛、便秘気味	非重篤 非重篤	不明 不明	第2次
頭痛	DS08-1069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明 不明	不明	頭痛	非重篤	不明	第2次
上腹部痛	DS08-1071 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	胃が痛い	非重篤	回復	第2次
腹部不快感	DS08-1077 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝斑	胃もたれ	非重篤	未回復	第2次
第7脳神経麻痺 眼瞼下垂	DS08-1086 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 2日間	肝斑の改善	顔面(右半分)の痺れ 瞼が垂れてきた	非重篤 非重篤	軽快 軽快	第2次
頭痛 筋骨格痛	DS08-1094 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 2日間	しみ(肝斑)	頭痛 肩が重い	非重篤 非重篤	回復 回復	可能性小 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
肝機能異常	DS08-1105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	肝機能悪化	非重篤	不明		第2次
下痢	DS08-1106 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢	非重篤	回復		第2次
頭痛	DS08-1110 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛のような症状	非重篤	回復		第2次
便秘 不眠症	DS08-1117 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	便秘 不眠、肌荒れ	非重篤 非重篤	回復 未回復		第2次
消化不良	DS08-1126 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	胸やけ	非重篤	回復		第2次
倦怠感	DS08-1130 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝班)	だるい	非重篤	回復	50才前後と思われるので薬が合わなかつたものと考えられる。	可能性小 第2次
上腹部痛	DS08-1162 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ改善	胃痛	非重篤	回復		第2次
胸痛	DS08-1167 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胸が締め付けられるような感じ	非重篤	回復		第2次
頭部不快感	DS08-1168 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	頭が重い	非重篤	未回復		第2次
恶心	DS08-1172 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	吐き気	非重篤	回復		第2次
発声障害	DS08-1181 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	声が嗄れる	非重篤	未回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係
浮動性めまい、 下痢	DS08-1184 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	ふらつき	非重篤	未回復		第2次
嘔吐 腹痛	DS08-1191 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	嘔吐、腹痛、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	第2次
紫斑	DS08-1198 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	右腕の紫斑	非重篤	回復		第2次
悪心 消化不良	DS08-1202 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	吐き気 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	使用一週間後の、副作用発現であり、体調など の原因も考えられます。因果関係は、可能性と して低いと、思います。	可能性小 第2次
うずき症 肝斑	DS08-1203 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	しみ(肝斑)	搔痒感 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
頭痛	DS08-1204 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛	非重篤	回復		第2次
消化不良	DS08-1220 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	胸が締め付けられる感じ	非重篤	回復		第2次
浮腫	DS08-1222 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	右足のむくみ 首周りの張り	非重篤 非重篤	回復 回復	もどもとも、血行も悪い方で、むくみやすい体质で あるという点や他のビタミン等も服用されてい る事から、トランシーノとの因果関係は可能性 小と考えられます	可能性小 第2次
浮腫 動悸	DS08-1223 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	さくみ 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用後の翌日に発現した症状ではありますかが、 体調などの原因も否定はできませんので、トラン シーノとの因果関係は可能性小と考えられます す。	可能性小 第2次
動悸	DS08-1253 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	心臓が痛くなつた	非重篤	回復	服用2日後の症状という事ですが、その日の体 調やどの程度の動悸かは不明であり、当薬との 関係は不明です。	不明 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
発疹	DS08-1270 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	堅快	2回服用して発疹が発現しているので、トランシーノの可能性も疑われるが、原因として確認しやすい。 お客様日々のハレがあつた様子で、その際も、両症状の発現時に共通するのと、お客様に自身が接している時期(?)に使用、若しくは服用されたとの事で、本剤との因果関係は不明と捉えています。
眼瞼浮腫	DS08-1275 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	まぶたの腫れ	非重篤	回復	不明 第2次
		コレステロール低下剤	不明回	不明回					
アーチルミルトランシファエラー	DS08-1283 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	γ-GTP上界	非重篤	未回復	第2次
浮動性めまい	DS08-1284 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	めまいは不安やストレスによつても起るので 様々な原因が考えられるが丁度服用1週間前にめまいが起き服用を中止するとおつたと思われます 不明 第2次
眼瞼炎	DS08-1290 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	まぶたのヒリヒリ感	非重篤	未回復	めまいが起きる可能性は否定出来ないと思われます 不明 第2次
ほてり	DS08-1302 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頬のほてり	非重篤	回復	第2次
発疹	DS08-1305 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発疹	非重篤	回復	第2次
湿疹	DS08-1312 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	未回復	第2次
消化不良 感覚鈍麻	DS08-1342 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	脚洗け 手のしづれ	非重篤 非重篤	回復 回復	初めての服用であり、また服用後に症状が現われている事より因果関係について可能性大 と考へる。 可能大 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間 使用量	使用理由	症状	程度	転帰		
湿疹	DS08-1360 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹	非重篤	回復		第2次
嘔吐 腹痛 下痢	DS08-1368 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	悪心、嘔吐 腹痛、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	本人様もおっしゃつていたが、トランシーノによる副作用かどうかは分からない。体調が悪かっただけかかもしれないが、2度症状が出たので、そななのかもしれない。	不明 第2次
頭痛 筋骨格頭直	DS08-1401 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	不明 不明		第2次
消化不良	DS08-1418 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸の痛み	非重篤	回復		第2次
悪心	DS08-1423 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	むかつき	非重篤	回復		第2次
浮動性めまい、 恶心	DS08-1461 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	27日間	不明	めまい、 恶心	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
恶心 下痢	DS08-1482 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	気持ち悪い、 下痢	非重篤 非重篤	未回復		第2次
食欲減退	DS08-1483 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が重くなる	非重篤	回復		第2次
動悸	DS08-1500 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	心悸亢進	非重篤	回復		第2次
発疹	DS08-1521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	発疹	非重篤	未回復		第2次
不規則月経	DS08-1527 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理が止まつた	非重篤	未回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		参考 (医師又は薬剤師の見解)	
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント
発疹 頭痛	DS08-1535 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	発疹 頭痛	不明 不明	因果関係 第2次
倦怠感	DS09-0005 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体のだるさ	非重篤 未回復	因果関係 第2次
顔面浮腫	DS09-0006 (女) (69)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔のむくみ	非重篤 未回復	因果関係 第2次
消化不良 下痢	DS09-0007 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸やけ 下痢	非重篤 非重篤	因果関係 第2次
頭痛	DS09-0026 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	頭痛	軽快 軽快	因果関係 第2次
下痢	DS09-0034 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤 未回復	因果関係 第2次
不正子宮出血	DS09-0046 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理周期の乱れ	非重篤 未回復	因果関係 第2次
食欲減退	DS09-0069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	食欲不振 苦味を感じる	非重篤 非重篤 未回復 不明	因果関係 第2次
恶心 食欲減退	DS09-0079 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	恶心 食欲不振	非重篤 非重篤 回復 回復	因果関係 第2次
下痢	DS09-0091 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	下痢	非重篤 不明	因果関係 第2次
上腹部痛	DS09-0108 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	胃痛	非重篤 回復	因果関係 第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
不正子宮出血	DS09-0127 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	不正出血	非重篤	未回復		第2次
そう痒症 発疹	DS09-0128 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復	可能性大	第2次
胸部不快感	DS09-0129 (女) (66)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	胸が苦しい	非重篤	回復		第2次
アスピリン アスピリン錠 (休眠)										
下痢 腹痛	DS09-0132 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	軟便 腹痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
不規則月経	DS09-0133 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理不順	非重篤	未回復		第2次
倦怠感 頭脳混迷 食欲不振 胸痛	DS09-0141 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	眠気、食欲不振、胸の痛み	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第2次
そり痒症 紅斑	DS09-0142 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ	かゆみ 発赤	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第2次
そり痒症	DS09-0143 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復		第2次
頭痛 消化不良	DS09-0151 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	3日間	肝斑	頭痛 やけ	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
頭痛 腰痛 そり痒症	DS09-0155 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 吐氣、皮膚の痒み	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
そり痒症 紅斑	DS09-0156 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	かゆみ、発赤	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
腹痛 下痢	DS09-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
顔面浮腫	DS09-0173 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	顔面のむくみ	非重篤	回復	服用後症状が出て、服用を止めると症状が治まり、再度服用した所、同じ症状が出た為。	可能性小 第2次
発疹 そり痒症	DS09-0184 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
倦怠感 末梢性浮腫	DS09-0194 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	17日間	しみ	体がだるい、 両足のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
月経過多	DS09-0199 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理が続く	非重篤	未回復		第2次
末梢性浮腫	DS09-0204 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	手のむくみ	非重篤	回復		第2次
発疹 そり痒症	DS09-0208 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	肌が乾燥	非重篤	未回復		第2次
発疹	DS09-0209 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復		第2次
頭痛 倦怠感	DS09-0213 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 体がだるい、	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
湿疹 そり痒症	DS09-0218 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用 期間	使用理由	症状	程度	軽度	得られたコメント	
下痢 上腹部痛	DS09-0221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	下痢 胃痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第2次
恶心 下腹部痛	DS09-0223 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	気分が悪くなる 下腹が痛い	非重篤 非重篤	回復 回復		第2次
紅斑 皮膚疹痛	DS09-0227 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頻の発赤	非重篤	不明	季節的な事もあり、急な紫外線の増加による皮 のダメージが考えられます。また、お肌が乾燥 肌を見せていた際は敏感肌としてかなりの乾燥 肌でいらっしゃるようですがシカ不足も重なっ ていると思ひます。	不明 第2次
恶心	DS09-0235 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	恶心	非重篤	回復		第2次
浮腫 排尿困難	DS09-0236 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	むくみ 尿の出が悪い	非重篤 非重篤	不明 不明		第2次
そう痒症 発疹	DS09-0237 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	痛み 発疹	非重篤 非重篤	不明 不明	トラネキサムサンのアレルギーのようです。	可能性大 第2次
不正子宮出血 月経困難症	DS09-0241 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	11日間	しみ	不出血のようない感じ	非重篤 非重篤	未回復 回復		第2次
頻発月経	DS09-0259 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理痛	非重篤	未回復		第2次
発疹 そう痒症	DS09-0267 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	かゆみ(部位不明)	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第2次
紅斑	DS09-0268 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	発赤	非重篤	回復		第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
そう痒症 発疹	DS09-0285 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	かゆみ(両足のふくらはぎの辺り、両腕、お腹の辺り)	非重篤	回復	ご本人様は細身な方で、特に他薬剤の服用もありませんでした。飲酒も特にされないので、今は本製品の影響が大きいのでないかと思われます。来店時にほほんほほん等はありませんでした。	可能性大 第2次
そう痒症 湿疹	DS09-0292 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	かゆみ(背中) 湿疹(背中)	非重篤 非重篤	未回復		第2次
舌痛	DS09-0297 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	舌の縁の痛み	非重篤	軽快		第2次
アーグルタルミルトランスペラーゼ増加	DS09-0312 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	検査値の上昇	非重篤	不明		第2次
そう痒症	DS09-0314 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	しみのかゆみ	非重篤	未回復		第2次
そき病 湿疹	DS09-0332 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痒み 湿疹	非重篤 非重篤	未回復		第3次
腹痛	DS09-0342 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	不明	トランシーノ服用による副作用かどうかは、分からなかったが、念のため病院でエコー検査することをおすすめました。	可能性小 第3次
眼瞼紅斑 眼瞼そばれ症	DS09-0360 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	瞼の発赤 瞼の痒み	非重篤 非重篤	未回復		第3次
顔面浮腫 そばれ症 発疹	DS09-0370 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑の改善	顔の腫れ、痒み、発疹	非重篤 非重篤	回復 不明		第3次
倦怠感	DS09-0374 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	体のだるさ	非重篤	未回復		第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
上腹部痛	DS09-0375 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃の痛み	非重篤	回復		第3次
そう痒症	DS09-0376 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	痒み	非重篤	回復	今回は因果関係は可能性は少と思われます。	不明 第3次
紅斑 そう痒症	DS09-0386 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤、脚の痛み、かゆみ(首から上、特に耳・鼻)	非重篤			第3次
そう痒症	DS09-0414 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	痒み	非重篤	軽快		第3次
発疹 紅斑 そう痒症	DS09-0420 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頸のツブツ 赤み、痒み	非重篤 非重篤	未回復 不明		第3次
アスピラギン酸アミノテナンス アラニン・アミノテナンス ラーゼ増加	DS09-0423 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	GOT、GPTの上昇	非重篤	未回復		第3次
発疹	DS09-0435 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頸の腫れ、腹部のツブツ 湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
頭痛	DS09-0437 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第3次
悪心	DS09-0449 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	恶心	非重篤	回復		第3次
悪心	DS09-0455 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	気分が悪くなつた	非重篤	不明		第3次
悪心	DS09-0458 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	むかつき	非重篤	回復		第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
中期不眠症	DS09-0475 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	夜、目が覚める	非重篤	回復		第3次
紅斑 搔痒症	DS09-0483 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	発赤 痒み	非重篤 非重篤	軽快 回復		第3次
湿疹	DS09-0489 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	60日間	しみ	湿疹	非重篤	回復		第3次
消化不良	DS09-0508 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	回復		第3次
消化不良	DS09-0509 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胸やけ	非重篤	軽快		第3次
頭痛 恶心 振戻 浮動性めまい	DS09-0511 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気、手のふるえ、めまい、 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復	お客様の体調によるものかもしません。	不明
発疹	DS09-0526 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吹き出物	非重篤	未回復		第3次
悪心 食欲減退	DS09-0532 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	服用後、気分が悪くなつた	非重篤	回復	服用中止後(回復しているから、因果関係につ いては可能性小と考えられます。	可能性小 第3次
発疹	DS09-0570 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	にきび	非重篤	不明	・2錠から1錠に減らされたら症状が消えたとい う事なので本品と全く因果関係が無いとは言 い切れないと私は思う。	不明 第3次
頭痛 恶心	DS09-0573 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	しみ	頭痛 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
下痢	DS09-0578 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
浮腫 動悸	DS09-0579 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	むくみ 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用直後にはむくみ、動悸が発生したため、トランシーノ内の成分により発生した可能性が大。 可能性大
		コレステロール低下剤	不明	不明					第3次
悪心	DS09-0592 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1-3回	不明	しみ	気分が悪くなる 気が遠くなる	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第3次
		トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑改善	唇の内側に腫れ感	非重篤	回復	
口の感覺鈍昧	DS09-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹(足)	非重篤	不明	第3次
	DS09-0613 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明					
発疹	DS09-0623 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	胃のもたれ	非重篤	軽快	第3次
	DS09-0627 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	皮膚のかゆみ	非重篤	回復	
そう痒症	DS09-0633 (女) (66)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑	発疹	非重篤	未回復	第3次
	DS09-0645 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	胃部不快感	非重篤	未回復	
腹部不快感	DS09-0659 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤	非重篤	未回復	第3次
	DS09-0683 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	14日間	肝斑	胃の痛み、吐き気、下痢	非重篤 非重篤	不明 不明	第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
乳房不快感 発疹	DS09-0684 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸の張り 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復	第3次
発疹 そり痒症	DS09-0697 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	ボツボツ かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第3次
湿疹 そり痒症	DS09-0718 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	第3次
下痢	DS09-0728 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	可能性大 第3次
下痢	DS09-0741 (男) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	目の下のま	軟便	非重篤	軽快	第3次
浮動性めまい	DS09-0744 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	めまい	非重篤	回復	第3次
顔面浮腫 発疹	DS09-0763 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔のむくみ	非重篤	不明	ご本人様も体調によるものかもしれないとは感じているようで、私自身もトランシーノ服用によるものである可能性は少ないと思います。
そり痒症 発疹	DS09-0775 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	かゆみ(耳の後から首の周り、 口の周り) 腫れ(口の周り)	非重篤 非重篤	未回復 未回復	可能性小 第3次
消化不良 悪心 感覺鋭敏	DS09-0776 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	肝斑の改善	胸やけ 悪心、腕の痺れ	非重篤 非重篤	回復 回復	第3次
頭痛 嘔吐	DS09-0818 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頭痛 嘔吐	非重篤 非重篤	回復 回復	第3次
下痢 月経遅延	DS09-0830 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理の遅れ(3週間) 下痢	非重篤 非重篤	回復 未回復	第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
発熱 潮紅	DS09-0845 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発熱 顔が赤くなる	非重篤 非重篤	不明 不明		第3次
全身性皮疹 全身性蕁麻疹	DS09-0855 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班	癰疹 痒み	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
発疹	DS09-0858 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班の改善	吹き出物	非重篤	軽快		第3次
悪心 嘔吐	DS09-0861 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝班	気分が悪くなつた もどした	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
悪心	DS09-0876 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	吐氣	非重篤	回復		第3次
月経遅延	DS09-0886 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	生理が遅れた	非重篤	回復		第3次
下痢 腹痛 末梢冷感	DS09-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	腹痛、冷えが酷くなつた	非重篤 非重篤	不明 不明		第3次
口唇炎	DS09-0901 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝班)	服用後、唇が荒れる事象があつたとの事	非重篤	回復	服用との関連性は、低いと思われます。製品そのものの品質について、お客様から調査依頼がありましたので、ご報告致しました。	不明 第3次
四肢痛	DS09-0908 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	19日間	肝班	膝から下の痛み	非重篤	不明		第3次
筋骨格硬直 感覚障害	DS09-0910 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	こり(肩と首筋) 筋肉の強ばり(胸の上から背 の上)、手指のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
振戄 頭痛	DS09-0935 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	体の震え 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復	本剤の為であるとは確信できないです。	不明 第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
腹痛 下痢	DS09-0936 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝班	腹痛 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
消化不良 動悸	DS09-0942 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胸やけ 動悸	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
不規則月経	DS09-0946 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝班	再度生理が始まつた	非重篤	未回復		第3次
光棍症	DS09-0951 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	目がチラチラする	非重篤	回復		第3次
発疹	DS09-0959 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の改善	吹き出物(鼻と口のまわり)	非重篤	不明		第3次
頭痛	DS09-0975 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復		第3次
悪心	DS09-0977 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	吐き気	非重篤	回復		第3次
不規則月経	DS09-1069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	終わつたばかりの生理がまた始まつた	非重篤	未回復		第3次
上腹部痛	DS09-1070 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝班の改善	胃痛	非重篤	回復		第3次
肝塞栓症	DS09-1073 (女) (68)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	肝塞栓症	重篤	回復		第3次
悪心	DS09-1109 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝班	吐き気	非重篤	未回復		第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
恶心 頭痛	DS09-1117 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	吐き気 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
発疹 そう痒症	DS09-1132 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝班)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	不明 不明	首から下に赤み(発疹のあとがかなり強く見られた。顔に腫れ、むくみはない様子。トランシーノを服用してすぐ発疹が出たとおっしゃいました。	可能性大 第3次
発疹	DS09-1145 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔全体にブチブチができる	非重篤	未回復		第3次
眼窩周囲浮腫 下痢	DS09-1173 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	目の腫れ 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	本品服用後すぐに副作用がでているため本品による可能性大と思われる。本品中止後すぐに副作用はおさまっています。	可能性大 第3次
片頭痛 恶心	DS09-1195 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝班)	偏頭痛の悪化 胃のむかつき	非重篤 非重篤	回復 回復		可能性小 第3次
便秘 恶心	DS09-1205 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	便秘 嘔気	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
頭痛 便通 浮動性めまい 浮動性めまい	DS09-1225 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	頭痛、気持ち悪い、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
悪寒	DS09-1229 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝班	悪寒	非重篤	未回復		第3次
紅斑 発疹	DS09-1230 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班の改善	発赤 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
感覺鈍麻	DS09-1239 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	肝班の改善	手足のしびれ	非重篤	回復		第3次
そう痒症 発疹	DS09-1263 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝班	痒み(首から下、太もも、お腹) 吹出物(顔)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次

副作用の種類	番号(性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次	
			1日 使用量	使用 期間	使用理由	症状	程度	軽帰	得られたコメント	
下痢	DS09-1297 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝臓の改善	下痢	非重篤	回復	お話を伺った限りでは、トランシーノが原因とは考えにくいました。せっかく購入したものだからお薬係の方がもう一度飲まれたい様子をみたいたいとはおっしゃっていました。	不明 第3次
月経過多	DS09-1299 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	生理期間の延長	非重篤	未回復		第3次
消化不良	DS09-1325 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	逆流性食道炎が悪化	非重篤	未回復		第3次
そう痒症	DS09-1359 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	かゆみ	非重篤	回復		第3次
ほてり 皮膚刺激	DS09-1373 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	ほてり(頸) 刺激感(頸)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
そら涙症 發疹浮腫 眼瞼浮腫	DS09-1375 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝臓の改善	かゆみ(全身) 発疹(頸、腋、胸、臉)はれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
動悸 呼吸困難	DS09-1407 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	動悸 息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復		第3次
発疹 紅斑	DS10-0008 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	54日間	肝斑	頻のザラつき 発赤(頸)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
湿疹 そり病	DS10-0010 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	湿疹(頸、腕、肩、首の裏) 発赤(頸、額など)、かゆみ (頸、額など)	非重篤 非重篤	不明 不明	併用薬による下痢発現の可能性は少ないと思われる。初めはVC過剰により下痢症が発現の可能性を疑つたが止まらない下痢と腹泻なのでその可能性も少ないと想つれる。トランシーノが原因の可能性が大だと考えられる。	可能性大 第3次
下痢	DS10-0033 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	可能性大 第3次	

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	使用理由	副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		
					症状	程度	軽快	得られたコメント	因果関係
そう痒症	DS10-0041 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回 1日間	肝班の改善	渾み	非重篤	軽快		第3次
発疹	DS10-0042 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝班	顔に赤いブツブツができるた	非重篤	未回復		第3次
肝機能検査異常 腹部膨満	DS10-0052 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	しみ	肝機能異常 肝臓が腫れた感じ	非重篤 非重篤	未回復 回復		第3次
下痢	DS10-0056 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明 不明	肝班	下痢	非重篤	回復		第3次
動悸	DS10-0069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回 1日間	しみ	胸がドキドキし汗を失いそ うな感じがした	非重篤	回復		第3次
下痢	DS10-0070 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝班の改善	下痢	非重篤	回復		第3次
末梢性浮腫	DS10-0075 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝班の改善	むくみ(両足)	非重篤	未回復		第3次
紅斑 皮膚剥脱	DS10-0082 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 不明	肝班	発赤(顔、手足の先端の甲の 部分)皮が剥けた顔、手足の先端 の甲の部分	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第3次
発疹 そう痒症 浮腫	DS10-0090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3日間	肝班	発疹(背中、腕)、足の浮腫み 浮み(背中、腕)、足の浮腫み (左足)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第3次
そう痒症 発疹	DS10-0092 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 1日間	しみ(肝班)	かゆみ 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復	以前より外用剤に関するご相談をうけており、 皮フは、もともとかゆみが出やすい方だと考え ていますので因果関係は不明と思われます。	可能性小 第3次
		ビタミンB剤	不明	不明					

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法 1日 使用量	使用理由	副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
					症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	年次
発疹 そう痒症	DS10-0093 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3日間	しみ(肝斑)	赤い発疹	非重篤	回復	特にありません	不明	第3次
便秘	DS10-0105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3回	不明 肝斑	便秘	非重篤	回復			第3次
口唇炎	DS10-0130 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3回	不明 肝斑の改善	口角が引れる	非重篤	未回復			第3次
月経遅延	DS10-0131 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明 不明	肝斑の改善	しみ	非重篤	未回復			第3次
頭痛 倦怠感	DS10-0144 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 12日間	肝斑	痛み(頭、首の後ろ) 腋下が重い、	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
湿疹	DS10-0156 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3回	不明 肝斑	赤い湿疹(腹のまわり)	非重篤	回復			第3次
発疹	DS10-0161 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3回	不明 肝斑の改善	発疹(頬)	非重篤	未回復			第3次
頭痛	DS10-0165 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	服用直後の症状発現で、体調や薬以外の食品などの原因も考えられるが、服用中止後に回復していることから因果関係については可能性小と考へる。	可能性小、 可能性小、 考へる。	第3次
紅斑 そう痒症	DS10-0186 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 10日間	肝斑	赤み(首) 痒み(首)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
そう痒症	DS10-0193 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回 20日間	肝斑	痒み(両頬)	非重篤	未回復			第3次
倦怠感	DS10-0212 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回 1回	不明 しみ	倦怠感	非重篤	未回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
息詰まり感 動悸	DS10-0215 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝臓の改善	胸の締め付け 息苦しさ、動悸	非重篤 非重篤	未回復		第3次
頭痛	DS10-0233 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝臓の改善	頭痛	非重篤	回復		第3次
月経過多	DS10-0239 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	生理がいつも長引く	非重篤	回復			第3次
腹部不快感 消化不良	DS10-0247 (女) (SX)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	胃もたれ 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	用中の主な症状は胃もたれと胸やけとのことで それが重った可能性もあります。	可能性大 第3次
悪心	DS10-0298 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気	非重篤	回復	胃腸障害の副作用はどうの薬剤でも発現しうるものだと思われます。以前よりV.Cを大量に摂るとお腹の調子が良くないと話されているのでこの患者様の場合は胃腸がそれ以外のかなかの印象を受けていました。服用直後ではなく数日後に発現しているので薬の服用による胃粘膜の荒れの可能性もあると思います。	可能性大 第3次
発疹 紅斑 恶心	DS10-0314 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	水泡(口角) 発赤(口角)、痛み(口角)	非重篤 非重篤	不明 不明	トランキサム酸のアレルギーでは無さそうな感じ	不明 第3次
黄色皮膚	DS10-0342 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	皮膚の色が黄色い感じにな る(両手の平の付け根)	非重篤	未回復		第4次
発疹 そう痒症 口渴	DS10-0368 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	荨麻疹(頬、首の周り) などの湿き	非重篤 非重篤	回復 回復	副作用発現も1日目からで、併用薬もないことから副作用であると考えられる。又、重篤に至らなかつたのは、販売時の説明や注意することを伝えておらず、本人も理解をし、対応が早かつたことが幸いしたと思つ。	可能性大 第4次
そう痒症	DS10-0369 (女) (40~45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ(二の腕、胸)	非重篤	回復	原因は不明ですが、トランキサム酸を服用した	不明 第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
尿閉 不正子官出血	DS10-0370 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	残尿感 出血	非重篤 非重篤	未回復 回復		第4次
紅斑 蕁瘡 そう痒症	DS10-0372 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	真っ赤になつて腫れた顔 ツツツと膨れた(首、両胸、 かゆみ(首、両腕、頭)	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第4次
末梢冷感 脱毛症	DS10-0373 (女) (74)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	脚のつっぱり 脚の冷え、髪が抜けたる	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
湿疹 紅斑	DS10-0374 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹(左ふくらはぎ) 発赤(左ふくらはぎ)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
くしゃみ 鼻漏 鼻閉	DS10-0379 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	不明	くしゃみ 鼻水、鼻づまり	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第4次
紅斑 発疹	DS10-0393 (女) (2X~3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	50日間	しみ(肝斑)	赤み(目元、口元、頬) ブツブツ(目元、口元、頬)	非重篤 非重篤	不明 不明	服用後しばらくたつてからもの発現であり、体調 や薬以外などの原因も考えられる。	不明
四肢痛 末梢性浮腫	DS10-0394 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑治療	痛み(左もものづけね、前も も) 腫れ(左もものづけね、前も も)	非重篤 非重篤	軽快 軽快		第4次
下痢	DS10-0398 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	下痢	非重篤	回復		第4次
腹痛	DS10-0405 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	みぞおちの痛み	非重篤	不明		第4次
そう痒症	DS10-0406 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明		皮膚のかゆみ(眼の下側、目 尻あたり)	非重篤	軽快		第4次
末梢性浮腫	DS10-0407 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明		脚のむくみ	非重篤	未回復		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	程度	軽減 回復	得られたコメント	
頭痛 腹部不快感 浮動生めまい、	DS10-0409 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝炎の治療	胃のむたれ、重いような頭痛 眩暈	非重篤 非重篤	回復 回復	第4次
胸痛	DS10-0421 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班改善	胸の痛み	非重篤	回復	第4次
末梢性浮腫	DS10-0427 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	まくみ(片足のふくらはぎ)	非重篤	回復	第4次
発疹	DS10-0435 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝班	発疹(耳)	非重篤	不明	不明
下痢	DS10-0442 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝班)	下痢	非重篤	回復	体調不良や食品などの原因も考えられるが服用中止後に回復していることから因果関係については可能性は小さいと考えられる。
発疹 紅斑	DS10-0454 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみの改善	赤み(頭、腰(頸)	非重篤 非重篤	軽快 軽快	可能性小 第4次
湿疹	DS10-0456 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	パツボツとした赤い湿疹(顔)	非重篤	未回復	第4次
乳腺炎	DS10-0461 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	乳腺炎	非重篤	不明	作年の症状を聞いただけなので因果関係については不明。
腹痛 下痢	DS10-0474 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	胃痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	もともと胃腸が弱いという方が多かったので胃肠障害の副作用が現れやすかったと考えられる。 可能性大 第4次
くしゃみ 鼻漏	DS10-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	くしゃみ 鼻水	非重篤 非重篤	回復 回復	第4次
感觉鉗麻	DS10-0480 (女) (30~40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア) サプリメントコラーゲン ^a リガ酸アミノ酸剤	1回	1日間	しみ(肝班)	手のしびれ(左手)	非重篤	回復	併用のサプリメントトランシーノのSEではない、可能性が高いと思われる。医療用でも報告なし。 不明 第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	年次
異物感	DS10-0484 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	喉の異物感	非重篤	未回復		第4次
動悸	DS10-0485 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復		第4次
湿疹	DS10-0488 (女) (65)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	回復		第4次
味覚消失	DS10-0490 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	不明	味を感じない	非重篤	未回復		第4次
腹部膨満	DS10-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	パンパンに張る(おなか)	非重篤	未回復		第4次
月経困難症	DS10-0507 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理痛がいつもよりひどい	非重篤	未回復		第4次
乳房痛	DS10-0513 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	生理のときにおこるような胸の痛み	非重篤	未回復		第4次
腹痛	DS10-0517 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	8日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	堅快	お客様は胃が弱い・体質だとおっしゃっているが、体質が今回の件に関係しているかは不明。	不明 第4次
紫斑	DS10-0527 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	あざ(腕)	非重篤	未回復		第4次
四肢痛	DS10-0543 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	18日間	肝斑	ふくらはぎ痛み(左足)	非重篤	回復		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
発疹	DS10-0549 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝臓の治療	発疹(両頬)	非重篤	未回復		第4次
ほてり 下痢	DS10-0565 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝臓の改善	ほり 下痢、頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
胸部不快感	DS10-0572 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	3日間	肝斑	みぞおち上部のしみつけ	非重篤	未回復		第4次
顔面浮腫	DS10-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	浮腫み(頬)	非重篤	未回復		第4次
倦怠感	DS10-0578 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	身体がだるくなる	非重篤	回復		第4次
発疹	DS10-0579 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の改善	発疹(両腕内側・腹部)	非重篤	軽快		第4次
気胸	DS10-0581 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	28日間	しみ	気胸	重篤	回復		第4次
月経遅延	DS10-0593 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のた め	生理が遅れた	非重篤	未回復		第4次
下痢	DS10-0602 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	お腹が緩くなる	非重篤	不明		第4次
そり痒症 蕁麻疹	DS10-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の治療のた め	痒み(首、胸、背中の盛あ り) 蕁麻疹(首、胸、背中の盛あ り)	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
頻繁月経	DS10-0613 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	生理が早く来た	非重篤	不明			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
動悸 月経障害	DS10-0619 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑の改善	生理の出血の色が黒っぽい 動悸	非重篤 非重篤	未回復 不明	
紅斑	DS10-0623 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	左腕上腕部内側に赤い斑点 (内出血のよがなもの)	非重篤	回復	本人様、生理前で、体調が悪いくらいだ ので、因果関係については可能性小と考えら れる。
そう痒症	DS10-0635 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭皮のかゆみ	非重篤	回復	
発疹	DS10-0636 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	服用中止後に症状が改善されたため何らかの 関係があると思われるから
皮膚剥脱 そう痒症	DS10-0663 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	目の下の皮膚がボロボロ剥け た かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	可能性小
浮動性めまい	DS10-0668 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑治療	眩暈	非重篤	未回復	
紅斑	DS10-0670 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発赤(足・腰・脛・脚)	非重篤	回復	
腹痛 下痢	DS10-0683 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	未回復 未回復	
そう痒症	DS10-0690 (女) (62)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	痒み(顔、手、背中)	非重篤	未回復	
皮膚変色 皮膚剥脱	DS10-0702 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	61日間	肝斑の改善	皮膚の変色(目の下、口元) 皮が剥けた(目の下、口元)	非重篤 非重篤	軽快 軽快	
動悸	DS10-0705 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復	

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
発疹	DS10-0722 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝班の改善	発疹(顔)	非重篤	堅快		第4次
そう痒症 尋常性 動悸	DS10-0723 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝班)	かゆみ 尋常疹、動悸	非重篤 非重篤	堅快 回復		第4次
動悸	DS10-0732 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	心臓がドキドキする	非重篤	回復		第4次
四肢痛 倦怠感	DS10-0737 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝班の改善	痛み(片足のふくらはぎ) だるさ(片足のふくらはぎ)	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
血中コレステロール増加	DS10-0754 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の改善	コレステロール値上昇	非重篤	不明		第4次
上腹部痛	DS10-0763 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝班の改善	胃痛	非重篤	回復		第4次
頭面浮腫 腹部膨満	DS10-0773 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班の改善	腫れた(顔) お腹の膨れ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
消化不良 腹痛 筋骨格不快感	DS10-0779 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	腹痛、背中の違和感	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
口渴	DS10-0833 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班ケアのため	乾きを感じた(舌、喉)	非重篤	未回復		第4次
動悸 不整脈 消化不良	DS10-0850 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝班のケアのため	脈の乱れ、胸焼け	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
発疹 紅斑 そう痒症	DS10-0897 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	発疹(ウエスト部分と腕の付け根)、かゆみ(ウエスト部分と腕の付け根)	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用	(医師又は薬剤師の見解)					
			1日 使用量	使用期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	年次
下痢 胸痛	DS10-0898 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	下痢 痛み(胸)	非重篤 非重篤	未回復 回復			第4次
浮腫 ぼてり	DS10-0907 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	服用するとからだが温かくなる。	非重篤 非重篤	回復 回復	服用1ヶ月後の発現であり、副用中止後に回復していることから、トランシーノが原因と思いま す。	確実	第4次
過少月経	DS10-0934 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑のケア	生理の経血量が減った	非重篤	未回復			第4次
そう痒症	DS10-0972 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹(部位不明)	非重篤	回復	服用日数は少なく症状消えた日数短い為。	可能性小	第4次
便秘	DS10-0993 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	便秘	非重篤	回復			第4次
浮動性めまい 嘔吐	DS10-1000 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑の改善	ふらつき めまい、嘔吐	非重篤 非重篤	回復 軽快			第4次
月経遅延	DS10-1014 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理の遅れ	非重篤	不明			第4次
紅斑	DS10-1023 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤(眼の下のみ)	非重篤	未回復			第4次
脱毛症	DS10-1046 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑の改善	抜け毛の増加	非重篤	未回復			第4次
眼瞼浮腫 皮膚乾燥	DS10-1049 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	腫れ(瞼) かさつき(口、目の周り)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
発疹 そう痒症	DS10-1052 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	ぶつぶつ(お腹、お尻、脚) かゆみ、痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		備考 (医師又は薬剤師の見解)			
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	年次
頭痛	DS10-1065 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭痛	非重篤	未回復		第4次
便秘 全身性浮腫	DS10-1093 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	便秘 むくみ(全身)	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
悪心、 腹部不快感	DS10-1108 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	胃のむかつき 胃が重い	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
頭痛 筋骨格硬直	DS10-1110 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2~3日間	しみ(肝斑)	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	回復 回復	中国人で30歳代の女性で会話に難があり、判断が難しい。症状もかなり軽度で因果関係は可能性小	第4次
発疹	DS10-1138 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	じんましん	非重篤 非重篤	軽快	本人と詳しく話し合いをしていないし、日常の商品に対する考え方や飲むののんでもわからないので、本品との因果関係は不明と判断する。	第4次
末梢性浮腫	DS10-1172 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	さくみ(両脚)	非重篤	回復	服用1ヶ月後の症状の発現であり、体調や薬以外(食品などの原因も考えられるが服用中止後に回復していることから因果関係についてでは、可能性小)と考へる。	第4次
おくび 腹部不快感	DS10-1187 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	グッズ 胃もたれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
発疹	DS10-1199 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑治療のため	赤い発疹(お腹、両手)	非重篤	軽快		第4次
過少月経	DS10-1221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ	生理経血量の減少	非重篤	不明		第4次
月経遅延	DS10-1249 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	12日間	不明	生理が遅れている	非重篤	未回復		第4次
下痢	DS10-1273 (女) (62)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	軽快		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
感覚鈍昧	DS10-1283 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痺れ【手の先、足の先】	非重篤	軽快		第4次
消化不良 口渴	DS10-1304 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	胸やけ 喉が鳴く	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
頻発月経	DS10-1333 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理周期が早くなる	非重篤	未回復		第4次
頭痛	DS10-1357 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復		第4次
悪心 上腹部痛	DS10-1359 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気 胃痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快	本品との因果関係は不明であるが、本人の体調に起因した可能性有り。	不明
浮腫	DS10-1368 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	浮腫(顔、足)	非重篤	未回復		第4次
感覚鈍昧	DS10-1369 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	痺れ(右手小指の先)	非重篤	未回復		第4次
鼻漏	DS10-1372 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	不明	鼻水が出る	非重篤	未回復		第4次
動悸	DS11-0029 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	軽快		第4次
皮膚疹瘡	DS11-0041 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	ヒリヒリ感	非重篤	回復		第4次
嘔吐 頭痛 紅斑 眼浮腫 浮腫 悪心	DS11-0062 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ	嘔吐 頭痛、赤み、腫れ、むくみ、 むかつき	非重篤 非重篤	回復 軽快		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次	
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰			
動悸	DS11-0081 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	動悸 気分が悪く、 口が渇く	非重篤 非重篤	回復 軽快	判りません。ご本人様は、薬に期待を持たれていたので、残念ながら副作用で薬を飲みたくないとのことでした。	不明	第4次
浮腫 口渴	DS11-0088 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の治療のため	むくみ 口が渇く	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
恶心	DS11-0093 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑改善	胃がムカムカする	非重篤	未回復			第4次
頭痛	DS11-0102 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	頭痛	非重篤	軽快			第4次
下痢 腹痛 恶心 月経過多	DS11-0105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑の改善	下痢 腹痛、吐き気、生理の量が多くなった	非重篤 非重篤	軽快 未回復			第4次
恶心	DS11-0122 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	気分が悪くなつた	非重篤	回復			第4次
発疹	DS11-0123 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	症状が専だけなのでトランシーノの副作用ではないと思います。化粧品や日光過敏症の可能性では?	可能性小	第4次
皮膚乾燥	DS11-0124 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	肌がザラザラになつた	非重篤	未回復			第4次
四肢痛	DS11-0125 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	26日間	肝斑	ふくらはぎの痛み	非重篤	未回復			第4次
頭痛	DS11-0134 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の治療のため	頭痛	非重篤	回復			第4次
浮動性めまい 嘔吐	DS11-0154 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	5日間	肝斑の治療のため	めまい、 嘔吐	非重篤 非重篤	未回復 軽快			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	得られたコメント	
四肢痛	DS11-0155 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の治療のため	痛み	非重篤	軽快		第4次
恶心 下痢	DS11-0156 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	12日間	しみ	むかつき 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
便秘	DS11-0157 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	便秘	非重篤	回復		第4次
恶心	DS11-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝班の改善	吐き気	非重篤	回復		第4次
体位性めまい	DS11-0159 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝班	立ちくらみ	非重篤	回復		第4次
発疹 ほてり	DS11-0161 (女) (73)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝班)	湿疹 火照り	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用後7日～10日目で症状発現、皮膚科での診察を受けられたとの事ですが中止された後回復にむかっていけるとの事で、可能性はあるのではないかと想っております。	可能性大 第4次
発疹	DS11-0163 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ(肝班)	発疹	非重篤	回復	本品以外に思ひもたらる原因がないことで本品との因果関係があると思われます。	可能性大 第4次
頻発月経過少月経	DS11-0166 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の治療のため	生理が早くきた 生理の期間が短くなった	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
尿異常 尿閉 排尿困難	DS11-0177 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の治療のため	尿のにおいに変化 尿閉感、排尿痛	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
頭痛	DS11-0180 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝班)	頭痛	非重篤	回復		可能性大 第4次
浮動性めまい	DS11-0185 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝班の治療のため	めまい	非重篤	未回復		第4次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係 年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰	
皮膚剥脱 紅斑	DS11-0194 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	顔の皮膚がむける 赤くなる	非重篤 非重篤	未回復	第4次
悪心	DS11-0197 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班の改善	吐き気	非重篤	未回復	第4次
不規則月経	DS11-0199 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	生理が止まった	生理が止まった	非重篤	回復	第4次
発発月経	DS11-0204 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理周期が短くなった	非重篤	未回復	第4次
腹部不快感 上腹前痛	DS11-0207 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	胃の不快感 胃が痛い	非重篤 非重篤	回復 回復	第4次
下痢	DS11-0208 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の治療のため	下痢	非重篤	軽快	第4次
下痢	DS11-0216 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	しみ(肝班)	下痢	非重篤	不明	特になし
コンドロイチンの薬(名前 不明)		不明	不明						不明
うつ病症 筋骨格硬直	DS11-0223 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	かゆみ 首の凝り	非重篤 非重篤	未回復 不明	第4次
下痢 消化不良	DS11-0224 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	下痢 脚焼け	非重篤 非重篤	回復 回復	第4次
発発月経	DS11-0227 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班改善	生理周期の乱れ	非重篤	未回復	第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
浮腫	DS11-0229 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝班の治療のため	むくみ	非重篤	回復		第4次
硝子体浮遊物 眼の異常感	DS11-0230 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	黒い点々が見える 目の違和感	非重篤 非重篤	未回復	未回復		第4次
腹痛 四肢痛 背部痛	DS11-0232 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班改善	腰の付け根の痛み 腹痛、背中の痛み	非重篤 非重篤	回復 未回復		第4次
そう痒症	DS11-0238 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	痒い	非重篤	未回復		第4次
皮膚疹癩	DS11-0243 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	ヒリヒリ痛い、	非重篤	未回復		第4次
肝機能検査異常	DS11-0244 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝班)	肝機能の数値が悪化	非重篤	不明	他剤の服用もなく飲酒も全くしないが、本剤による副作用と考えられる。また、報告時の足の裏のしみについては、脛から来るものと思われるが、本剤によるものと考えられない。	不明
乳房不快感	DS11-0246 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	不明	胸の張り	非重篤	不明	本剤との因果関係は分らない。	不明
疼痛	DS11-0249 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	痛み	非重篤	回復		第4次
腹部不快感 腹部膨満	DS11-0259 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	みぞおちが重苦しい みぞおちが腫れる	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
希発月経	DS11-0263 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	シミのケアのため	生理が遅れた	非重篤	回復		第4次
腰包性皮疹	DS11-0269 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝班	出来物	非重篤	未回復		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
下痢 食欲減退	DS11-0273 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	軟便 食欲不振	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
動悸	DS11-0275 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝班改善	動悸	非重篤	回復		第4次
消化不良 おくび 振戦 呼吸困難	DS11-0276 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	げっぷ、手の震え、息切れ	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
発疹	DS11-0277 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班	発疹	非重篤	不明		第4次
頭痛 浮動性めまい 過少月経 不規則月經	DS11-0279 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	41日間	肝班の治療のため	頭痛 頭痛、生理の経血減少、生 理不順	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
下痢	DS11-0280 (女) (78)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝班)	下痢	非重篤	回復		第4次
皮膚線条	DS11-0287 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班改善	太ももの凹み下がり硬い	非重篤 非重篤	未回復 未回復		第4次
そう痒症	DS11-0288 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班改善	体が痒い	非重篤	回復		第4次
過少月經	DS11-0289 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	経血量の減少	非重篤	未回復		第4次
そう痒症 発疹	DS11-0293 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	かゆみ 赤い発疹	非重篤 非重篤	略快 略快		第4次
頻尿 口の感覚地獄	DS11-0300 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	舌がしひれたような違和感	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次

副作用の種類	番号 (性別) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	軽減	得られたコメント	
月経遅延	DS11-0308 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝機能改善	生理の遅れ	非重篤	回復		第4次
脱毛症 鼻漏 鼻閉 くしゃみ 眼の異物感	DS11-0310 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝機能改善	鼻水、鼻づまりくしゃみ、目 がコロコロする	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
倦怠感	DS11-0313 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	だるい	非重篤	未回復		第4次
うう音症 浮動性めまい 動悸	DS11-0315 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班のケアのため	嘔吐、動悸	非重篤 非重篤	軽快 回復		第4次
浮動性めまい	DS11-0319 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝班の治療のため	眩暈	非重篤	回復		第4次
下痢 恶心	DS11-0321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
頭痛	DS11-0322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	頭痛	非重篤	軽快		第4次
うう音症 発疹	DS11-0323 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の治療のため	嘔吐 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復		第4次
口内炎	DS11-0324 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝班の治療のため	口内炎	非重篤	未回復		第4次
耳鳴	DS11-0376 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	25日間	肝班の治療のため	耳鳴り	非重篤	軽快		第4次
悪心	DS11-0380 (女) (71)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	シミの改善	気持ち悪い	非重篤	回復		第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		副作用		(医師又は薬剤師の見解)		備考 因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	使用理由	症状	程度	転帰		
消化不良	DS11-0384 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班のため	胸焼け	非重篤	回復		第4次
悪心	DS11-0395 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の治療のため	恶心	非重篤	回復		第4次
そう痒症 発疹	DS11-0398 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の治療のため	痒み 発疹	非重篤 非重篤	回復 軽快		第4次
希発月経	DS11-0399 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班	生理の遅れ	非重篤	回復		第4次
浮腫	DS11-0400 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝班の治療のため	むくみ	非重篤	未回復		第4次
末梢性浮腫	DS11-0401 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝班の改善	両脚がむくむ	非重篤	未回復		第4次
浮動性めまい	DS11-0408 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝班改善	めまい	非重篤	未回復		第4次

別紙（5）

III. 製造販売後臨床試験

1) 副作用の種類別発現状況

肝斑に対するトランシーノの有効性および安全性について検討するため、2009年1月から15歳以上の肝斑を有する患者（目標症例数：100症例）を対象とし、トランシーノの8週間服用と最低8週間の観察期間を1クールとし、観察期間中に肝斑の再発が認められた場合は、最大3クールまで行う製造販売後臨床試験が開始された。1クール目にエントリーされた118例が、効果なし・再発なし等の理由による中止・脱落で、2クール目は94例、3クール目は33例がエントリーされ、全ての服薬・検査・観察等は終了し、調査期間中に報告された有害事象50例80件のうち、副作用は表10の通り7例（5.9%）11件（同一症例での別クールでの同一事象を重複集計）であった。

表10 副作用の種類別発現状況（製造販売後臨床試験）

終了した製造販売後臨床試験における副作用発現状況	
①調査施設数	6
②調査症例数	118
③副作用発現症例数	7
④副作用発現件数	11 ※
⑤副作用発現症例率 (③÷②×100)	5.9%
副作用の種類	発現例数（%）及び件数
胃腸障害	5例(4.2)
* 腹部不快感	4件 ※
上腹部痛	1件
下痢	3件 ※
* 胃腸の炎症	1件
臨床検査	2例(1.7)
* アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1件
* 尿中ブドウ糖陽性	1件

※ 同一症例で同一事象を別クールで再発したものも重複集計した

* 添付文書に記載されていない副作用

2) 副作用症例一覧表

製造販売後臨床試験で収集された上記の副作用症例7例11件の有害事象の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、有害事象の症状・程度・転帰、医師の見解、因果関係等を記載した有害事象症例一覧表を別紙(6)に示した。

別紙(6) 副作用の発現症例一覧表(製造販売後臨床試験)

有害事象の種類	番号 (性) (年齢) <EM-103> (女)(52)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		有害事象		(医師又は薬剤師の見解)		因果関係	年次
			1日 使用量	使用期間	症状	程度	転帰	得られたコメント		
腹部不快感	DS08-1502 <EM-111> (女)(26)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	製造販売後臨床試験	胃部不快感	非重篤	回復	関連あり	第2次
腹部不快感 下痢	DS08-1504 <EM-113> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床試験	胃部不快感 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復	可能性あり 可能性あり	第2次
腹部不快感 (鼻咽頭炎) (浮動性めまい) (白眼球数増加)	DS08-1505 <EM-113> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	58日間	製造販売後臨床試験	胃部不快感 感冒 めまいの悪化 白眼球増加	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	関連あり 関連なし 関連なし 関連なし	第2次
下痢	DS09-0043 <EM-115> (女)(51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床試験	軟便	非重篤	回復	可能性あり	第2次
アスピラギン酸アミノ トランスクエラーゼ増加	DS09-0362 <IB-112> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	58日間	製造販売後臨床試験	ASTの上昇	非重篤	回復	可能性あり	第2次
胃腸の炎症	DS09-0655 <GN-118> (女)(61)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床試験	急性胃腸炎	非重篤	回復	可能性あり	第3次
腹部不快感	DS09-0692 <EM-103> (女)(53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	53日間	製造販売後臨床試験	胃部不快感	非重篤	回復	可能性あり	第3次
尿中ドウ糖陽性	DS09-0857 <HR-117> (女)(44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床試験	尿糖陽性	非重篤	回復	可能性あり	第3次
上腹部痛	DS09-1107 <EM-113> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	53日間	製造販売後臨床試験	胃痛	非重篤	回復	可能性あり	第3次
下痢	DS09-1108 <EM-115> (女)(51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	56日間	製造販売後臨床試験	軟便	非重篤	回復	可能性あり	第3次

別紙（7）

IV. 調査結果に関する見解と今後の安全対策

特別調査では、第1次から第4次調査期間において収集症例3,186例中副作用発現症例は76例(2.4%)であり、副作用発現症例率が特に高いという傾向は見られず、また副作用の程度がすべて非重篤であったことから、特に問題はないと考えられた。

一般調査では、第1次から第4次調査期間において1,039例(1,639件)の副作用発現症例が収集され、副作用の種類別で多かったものは、発疹171件、そう痒症151件、恶心139件、下痢135件、頭痛94件、紅斑63件、消化不良54件、湿疹47件、浮動性めまい46例、腹痛44件、動悸43件、腹部不快感34件、上腹部痛28件、食欲減退26件、倦怠感25件、嘔吐24件、感覺鈍麻22件、四肢痛22件、浮腫21件、末梢性浮腫20件などであった。副作用の程度では、自己免疫疾患患者でのスティーブンス・ジョンソン症候群1例、女性器悪性新生物患者での肺塞栓1例と前述の評価不能の気胸入院1例が重篤であった他は、すべて非重篤であった。

重篤3症例の詳細は以下の通り再掲する。スティーブンス・ジョンソン症候群症例は自己免疫疾患(全身性エリテマトーデス)でプレドニゾロン及びアスピリン服薬治療中の患者が本剤服用後に発症したもので、自己免疫疾患やNSAIDの長期使用により重篤な薬疹の発症頻度が高くなっていた可能性がある。肺塞栓症例は論文発表されたもので、子宮筋腫・卵巣新生物を合併する患者で、1週間で服薬中止の約21ヶ月後に肺塞栓の診断がなされた事例で、症状発現から診断までの経過が不明であることや生殖器疾患を有していることから、因果関係の評価は困難と考えている。気胸入院症例は医療機関先の勤務者である患者本人が本剤服用を医師に伝えたものの特段の指示等を受けなかつたとの本人からの電話連絡により医学的確認ありとして報告したものの、担当医師からの情報提供等を患者本人から拒否された事例で、事象の存在を確認するものの因果関係は認めがたく、その評価は極めて困難である。これらから、本剤との因果関係を断定できる情報が得られていないと考え、直ちに添付文書改訂等の措置が必要とは思われない。引き続き、販売時の服薬指導・情報提供を徹底し、今後の状況・推移を注視していきたい。

製造販売後臨床試験(3ケール:最大延べ168日服用)118例において、7例(5.9%)9件の副作用が報告され、その内訳は腹部不快感3件、下痢2件、上腹部痛1件、胃腸の炎症1件、アスペラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加1件、尿中ブドウ糖陽性1件で、すべて非重篤であり、特に問題はないと考えられた。副作用発生頻度も特別調査と大差ないものと考える。

特別調査および一般調査から収集された副作用で、先に述べたスティーブンス・ジョンソン症候群1例、肺塞栓1例、気胸1例の重篤副作用症例3例を除く未知非重篤副作用症例定期報告対象となった638例862件のうち、医師・薬剤師から「関連あり・可能性大・確実」等の評価があった症例は補足資料(1)に示す43例62件であった。これらの内訳は、浮腫等8例9件、動悸7例7件、頭痛6例6件、浮動性めまい4例4件、四肢痛3例3件、ほてり3例3件、紅斑3例3件などである。なお、全ての未知の副作用症例を補足資料(2)に示した。

報告された未知の事象の多くは、本剤の使用が原則として成人女性に限定され1ヶ月を超える長期使用されることより、月経前後や更年期の生理的変動・愁訴(例えば、月経周期・経血量の変化、


ほてり、頭痛、めまい、浮腫、筋肉痛、動悸、息切れ、しびれ・知覚異常、疲労感など) 等が副作用・有害事象として報告されている可能性も想定される。実際に使用者からだけではなく、販売店薬剤師からも問合せとして連絡されてきた事象もかなりあった。その様な状況からマスコミ等による種々情報の影響や、本来安全に服用してもらうことを目的とし記載した「使用上の注意」の内容を読み、逆に過度な不安を感じてしまうことなど解消し、また特別調査と一般調査で入手された相談とも捉えられる女性特有の症状をより詳細・正確に聞き取り、より正確な情報を伝えるため、販売業者の協力で平成 20 年 11 月 17 日に「トランシーノ相談室」を設置し、情報収集対応能力を向上した結果、発売当初から比べてもより詳細な情報が入手されるようになり、現在ではトランシーノ全体の 74% の情報を対応するまでに至った。しかしながら報告を受ける有害事象の殆どが製造販売後臨床試験では報告されていない事象や配合成分の医療用添付文書には記載されていない事象であることから、未だにより正確な因果関係の評価判断に苦慮している現状であり、以前と比較し格段に上がったとはいえ、依然として女性特有の症状に対し評価・検討するのに十分な情報を入手することは困難である。これら全てを軽視することはできないが、多くは十分な判定根拠となる発現時及び経過の情報が不足している症例であるため、継続して詳細な情報入手に努めるよう販売店に協力を求める必要があると考える。また、引き続き販売店に対して販売時服薬指導の徹底に、販売業者共々、一層働きかけていく所存である。

以上のことから、現時点では添付文書の改訂による予測できる副作用の追加の必要性はないと考えられるが、なお一層、高質な副作用情報の収集・検討に努め、トランシーノの適正使用を推進していく所存である。

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

しみ(肝斑に限る)改善薬

第1類医薬品



トランシーノ®
TRANSINO®

肝斑に
トラネキサム酸配合

使用前にこの説明文書
を必ずお読み下さい

肝斑に
トラネキサム酸配合



特徴

トランシーノ®は、肝斑に効くトラネキサム酸を、肝斑改善成分として配合した医薬品です。

- 1 -



使用上の注意



してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります）

次の人は服用しないで下さい

トランキサン酸を含有する内服薬を服用している人



相談すること

① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 授乳中の人は

(3) 55歳以上の人

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) 血栓症のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺塞栓症等）

(7) 血栓症を起こすおそれのある人（以前に血栓症にかかったことがある人、家族が血栓症を起こした人、医師から先天性の凝固異常症を指摘されたことがある人、経口避妊薬・ホルモン補充療法などの血栓症を起こすおそれのある薬を服用している人）

(8) 次の診断を受けた人

腎臓病

② 服用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹、かゆみ
消化器	恶心、嘔吐、腹痛、食欲不振、胸やけ

③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

下痢

④ ご自分のしみが、本剤の効能効果である肝斑かどうかの識別が難しい場合、また、色が黒ずんでおり、色調が不均一で、表面が隆起したようなしみ状のものがある場合は専門の皮膚科医に相談して下さい。

その他の注意

① 本剤は、血栓（血液が固まったもの）を溶けにくくする作用があります。そのため、血栓症の初期症状（激しい頭痛・舌のもつれ、10分以上続く締め付けられるような胸の痛み・突然の息切れ、片足のふくらはぎの痛み・むくみ、原因不明の突然の呼吸困難・胸の痛みを伴う一過性の意識消失等）に注意して下さい。

② 2ヵ月間を超えて続けて服用しないで下さい。

③ 服用中止後に再発した場合は、また服用を始めてもよいですが、再開までに最低2ヵ月はあけて下さい。また、服用を再開してからも2ヵ月を超えて続けて服用しないで下さい。

④ しみの改善の程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。また、効果があった場合も、しみが完全に消えるわけではありません。

効能・効果
しみ(肝斑に限る)

用法・用量
次の量を食後に服用して下さい

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
15歳未満	服用しないで下さい	

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量
1日量(6錠)中

成 分	分 量
トランキサム酸	750mg
L-システイン	240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	6mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：乳酸Ca、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、使用期限内であっても内袋(アルミ袋)開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
6. 内袋(アルミ袋)の中に活性炭シートを入れてありますので、間違って食べないよう注意して下さい。

しみを効果的に改善するために

- お薬の効果がわかるようになるまで、少なくとも1カ月間は服用しましょう。
- 紫外線を慢性的に浴びることはしみ、しわ等の皮膚の老化につながります。夏でも長袖のシャツを着たり、帽子やサングラス、日傘を利用しましょう。また、日焼け止めクリームを使用する等、紫外線に注意しましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 トランシーノ相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 0120-013-416(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

肝斑とは


肝斑(かんばん)とは、女性の顔面に多く生じるしみで、妊娠、経口避妊薬などにより誘発あるいは悪化するので、女性ホルモンが関連して発症するといわれています。

紫外線で少し悪化します。薄い褐色でやや大きく、ほほ骨に沿って左右対称にできるのが特徴的です。高齢者ではほとんど見られないといわれています。また、レーザー治療で悪化するといわれています。

かんばん
肝斑



典型的な例



広範囲に出た例

そばかす(雀卵斑)



子どものころからある
小さい色素斑です。
肝斑ではありません。

対称性真皮メラノサイトーシス



典型的な例

肝斑ではありません。



軽症例1

小さな丸い色素斑が散在性に見えます。
季節によって薄くなったり
濃くなったり等の変動が少ない
色素斑です。そばかすに似ています。
肝斑ではありません。



軽症例2

小さな丸い色素斑が
集まって見えます。
季節による変動は少なく
加齢により悪化します。
肝斑ではありません。

※その他、肝斑に似ているしみとして、リール黒皮症といわれる、化粧品のくり返し使用ができる色素沈着等もありますが、肝斑ではありません。

トランシーノについて詳しくは www.transino.jp

03⑥登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

- 4 -

製造販売元

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地

