

インフルエンザワクチンの 副反応報告状況について

副反応報告数

(平成25年10月1日から平成26年7月31日報告分まで：報告日での集計)

(単位:例(人))

接種日	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告		
	報告数		報告数	うち重篤	
		うち死亡数			うち死亡数
10/1-10/31	9	1	47	13	1
11/1-11/30	33	1	145	48	5
12/1-12/31	12	0	59	15	2
1/1-1/31	0	0	16	7	1
2/1-2/28	0	0	1	1	0
3/1-3/31	0	0	0	0	0
4月以降	0	0	0	0	0
不明	9	0	1	0	0
合計	63	2	269	84	9
報告頻度	0.0001%	0.000004%	0.0005%	0.0002%	0.00002%

(注意点)

※ 報告頻度(%)は、平成25年10月1日～平成26年7月31日までの期間において、医療機関へのワクチン納入数量から算出した推定接種可能人数(回分)51,731,811人を基に算出した(平成26年7月31日現在)。

※ 接種との因果関係の有無に関わらず、「接種後の死亡、臨床症状の重篤なもの、後遺症を残す可能性のあるもの」に該当すると判断されるものを報告対象としている。

※ 重篤とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものをいうが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、薬事法第77条の4の2に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

1.医療機関からの副反応報告のうち、関連性についての内訳

①医療機関から「関連有り」として報告されたもの

(単位:例(人))

接種日	報告数	うち重篤	
			うち死亡数
10/1-10/31	28	5	0
11/1-11/30	90	32	1
12/1-12/31	35	9	0
1/1-1/31	7	3	0
2/1-2/28	0	0	0
3/1-3/31	0	0	0
4月以降	0	0	0
不明	1	0	0
合計	161	49	1
報告頻度	0.0003%	0.00009%	0.000002%

②医療機関から「関連無し」、「評価不能」として報告されたもの(記載なしを含む)

(単位:例(人))

	報告数	うち重篤	
			うち死亡数
10/1-10/31	19	8	1
11/1-11/30	55	16	4
12/1-12/31	24	6	2
1/1-1/31	9	4	1
2/1-2/28	1	1	0
3/1-3/31	0	0	0
4月以降	0	0	0
不明	0	0	0
合計	108	35	8
報告頻度	0.0002%	0.00007%	0.00002%

2.性別内訳

性別	製造販売業者からの報告数		医療機関からの報告数	
男	27	43%	127	47%
女	31	49%	142	52%
不明	5	8%	0	0%

3.年齢別内訳

年齢	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告		
	報告数		報告数	うち重篤	
		うち死亡数			うち死亡数
0～9歳	19	0	81	27	1
10歳～19歳	5	0	25	6	0
20歳～29歳	8	0	16	1	0
30歳～39歳	6	0	35	11	0
40歳～49歳	5	0	24	8	0
50歳～59歳	4	0	14	3	0
60歳～69歳	0	0	20	5	0
70歳～79歳	6	0	30	12	1
80歳以上	7	2	23	11	7
不明	3	0	1	0	0
合計	63	2	269	84	9

(参考)

インフルエンザワクチンの実績

シーズン	推定接種者数	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告		
		報告数		報告数	うち重篤	
			うち死亡数			うち死亡数
2012/2013 (平成25年6月14日調査会 資料より)	5024万人	86 (0.00017%)	5 (0.000012%)	301 (0.0006%)	53 (0.0001%)	4 (0.000008%)
2011/2012 (平成24年5月25日調査会 資料より)	5033万人	83 (0.00016%)	1 (0.000002%)	556 (0.0011%)	96 (0.00019%)	7 (0.000014%)

インフルエンザワクチン 重篤症例一覧 (平成25年10月1日から平成26年7月31日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
1	1	男	平成25年10月10日	ビケンHA(HA127C)	なし		発育遅延、食物アレルギー	痙攣	平成25年10月10日	重篤	平成25年10月10日	回復
2	4	女	平成25年10月18日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FM025A)	なし		上気道の炎症、低身長症	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	平成25年10月20日	重篤	平成25年11月8日	軽快
3	不明	不明	平成25年10月23日	インフルエンザHAワクチン「チンカ生研」(483-A)	なし		なし	突発性聴覚障害	平成25年10月23日	重篤	不明	不明
4	84	男	平成25年10月24日	フルービックHAシリンジ(HK12A)	なし		血清反応陰性関節炎、倦怠感、高血圧、脂質異常症、糖尿病、関節リウマチ、そう痒症、睡眠障害	急性腎不全、ネフローゼ症候群	平成25年10月25日	重篤	平成25年12月30日	死亡
5	27	女	平成25年10月24日	ビケンHA(HA130A)	なし		なし	激越、精神症状	平成25年11月2日	重篤	平成25年12月11日	軽快
6	28	女	平成25年10月24日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		なし	薬疹	平成25年10月24日	重篤	平成25年11月16日	回復
7	1	女	平成25年10月28日	インフルエンザHAワクチン「チンカ生研」(488-A)	なし		喘息	アナフィラキシーショック	平成25年10月28日	重篤	平成25年10月29日	軽快
8	25	女	平成25年10月29日	フルービックHAシリンジ(HK13B)	なし		なし	肝障害	平成25年11月1日	重篤	平成25年11月22日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
9	35	女	平成25年10月31日	インフルエンザHAワクチン*北里研(352A)	なし		アトピー性皮膚炎、季節性アレルギー、家庭アレルギー	髄膜炎、急性熱性好中球性皮膚症	平成25年11月1日	重篤	平成25年11月16日	軽快
10	79	男	平成25年11月3日	インフルエンザHAワクチン*北里第一三共(JFB066G)	なし		高血圧、胃炎、過敏症	ステイプン・ス・ジョンソン症候群	平成25年11月4日	重篤	平成25年12月25日	回復
11	24	男	平成25年11月5日	フルービックHAシリンジ(HK12C)	なし		季節性アレルギー	全身紅斑	平成25年11月10日	重篤	平成25年11月17日	回復
12	83	女	平成25年11月5日	ビケンHA(HA130E)	なし		シェーグレン症候群、大動脈弁置換、骨髄異形成症候群、下肢切断	ステイプン・ス・ジョンソン症候群	平成25年11月10日	重篤	平成26年1月7日	軽快
13	37	女	平成25年11月5日	インフルエンザHAワクチン*デシカ生研(483-A)	なし		なし	多形紅斑	平成25年11月6日	重篤	平成25年12月19日	軽快
14※※	16	男	平成25年11月5日	ビケンHA(HA131A)	なし		糸球体腎炎、腸炎、小児喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	成人発症スチル病	平成25年11月6日	重篤	平成26年1月7日	軽快
15※※	41	女	平成25年11月6日	ビケンHA(HA130A)	なし		なし	ギラン・バレー症候群	平成25年11月18日	重篤	平成26年3月	回復
16	83	男	平成25年11月6日	インフルエンザHAワクチン*デシカ生研(491-B)	なし		慢性心不全、肺気腫、高血圧、甲状腺機能低下症	そう痒症、肝機能異常、腎機能障害、心不全、死亡	平成25年11月8日	重篤	平成25年11月20日	死亡

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
17	80年代	男	平成25年11月6日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		なし	肝機能異常	不明	重篤	不明	不明
18	56	女	平成25年11月8日	インフルエンザHAワクチン*化血研(351B)	あり	乾燥弱毒生風しんワクチン 乾燥弱毒生麻しんワクチン 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	なし	ギラン・バレー症候群	平成25年11月30日	重篤	不明	不明
19	31	男	平成25年11月9日	インフルエンザHAワクチン*デンカ生研(480-A)	なし		なし	失神、注射部位知覚消失	平成25年11月9日	重篤	平成25年11月9日	回復
20※※	13	女	平成25年11月9日	フルービックHAシリンジ(HK13B)	なし		なし	意識消失、痙攣	平成25年11月9日	重篤	不明	不明
21	11	男	平成25年11月11日	インフルエンザHAワクチン*化血研(357A)	なし		喘息	ショック	平成25年11月11日	重篤	平成25年11月11日	回復
22	1	男	平成25年11月11日 平成25年12月11日	インフルエンザHAワクチン*化血研(357B、363B)	なし		なし	発熱、リンパ節症、注射部位腫脹、好酸球数増加	平成25年11月11日	重篤	平成25年	軽快
23	79	男	平成25年11月11日	インフルエンザHAワクチン*デンカ生研	なし		糖尿病	間質性肺炎患	平成25年11月15日	重篤	平成25年12月12日	軽快
24	37	男	平成25年11月11日	インフルエンザHAワクチン*デンカ生研(484-B)	なし		なし	味覚異常、第7脳神経麻痺	平成25年11月12日	重篤	不明	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
25	6	男	平成25年11月12日	ピケンHA(HA128A)	なし		なし	ヘルペス・エンジェルライン 紫斑病	平成25年11月12日	重篤	平成25年12月17日	軽快
26	47	女	平成25年11月13日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FM024C)	なし		食物アレルギー	アナフィラキシーショック	平成25年11月13日	重篤	平成25年11月15日	軽快
27※※	21	女	平成25年11月14日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(483-A)	なし		なし	咽頭炎	平成25年11月15日	重篤	平成25年11月20日	回復
28	40	女	平成25年11月16日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FB065C)	なし		なし	ショック	平成25年11月16日	重篤	平成25年11月16日	回復
29	8	女	平成25年11月19日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FB065B)	なし		食物アレルギー	アナフィラキシーショック	平成25年11月19日	重篤	平成25年11月20日	回復
30	80	男	平成25年11月19日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(488-A)	なし		脳出血、視床出血、高血圧	筋炎	平成25年11月26日	重篤	平成25年12月16日	軽快
31	36	不明	平成25年11月19日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(480-A)	なし		なし	急性糸球体腎炎	平成25年12月9日	重篤	平成25年12月19日	軽快
32	70	男	平成25年11月21日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(485-A)	なし		なし	発熱、膿疱性皮膚疹	平成25年11月21日	重篤	平成25年11月28日	軽快
33	58	女	平成25年11月21日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(485-A)	なし		慢性腎不全、高血圧	ステイプレン・ス・ジョンソン症候群	平成25年11月23日	重篤	不明	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種 ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
34	2	男	平成25年11月23日	ビケンHA(HA130B)	なし		なし	蜂巣炎	平成25年11月23日	重篤	不明	不明
35	22	女	平成25年11月25日	インフルエンザHAワクチン*化血研(359B)	なし		過敏症	注射部位腫脹、熱感、悪寒	平成25年11月27日	重篤	平成25年11月28日	回復
36	1	女	平成25年11月26日	インフルエンザHAワクチン*化血研(356C)	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン*武田薬品(Y167)	食物アレルギー、アトピー性皮膚炎	麻疹疹	平成25年11月26日	重篤	平成25年11月27日	回復
37※	52	女	平成25年11月26日	インフルエンザHAワクチン*化血研(365B)	なし		なし	発熱、発疹、血管浮腫	平成25年11月26日	重篤	平成25年12月	回復
38	18	男	平成25年11月29日	ビケンHA(HA133D)	なし		なし	意識消失、注射部位疼痛	平成25年11月29日	重篤	平成25年11月29日	回復
39※	39	女	平成25年11月	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FB063A)	なし		アレルギー性鼻炎	複視、ミラール・フィッシュヤー症候群	平成25年12月12日	重篤	平成26年2月13日	軽快
40※	80	女	平成25年12月3日	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」(FM023C)	なし		大腸手術	背部痛	平成25年12月4日	重篤	平成25年12月12日	回復
41	71	男	平成25年12月9日	インフルエンザHAワクチン*デンカ生研(500-B)	あり	ニューモバックスNP	高血圧、高脂血症、高尿酸血症	発熱、白血球数増加	平成25年12月9日	重篤	平成25年12月11日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
42※※	7	男	平成25年12月16日	ビケンHA(HA135E)	なし		ムンプス、水痘	ウイルス性髄膜炎	平成25年12月17日	重篤	平成25年12月21日	回復
43※※	3	男	平成25年12月19日	インフルエンザHA7 クチン*化血研 (363A)	なし		ネフローゼ症候群	ネフローゼ症候群	平成25年12月23日	重篤	平成25年12月31日	軽快
44	11	女	平成25年11月25日	インフルエンザHA7 クチン*化血研 (343C)	なし		視力障害	ギラン・バレー症候群	平成25年12月8日	重篤	不明	未回復
45※※	2	女	平成25年11月25日 平成25年12月9日	ビケンHA(HA132A、 HA135A)	なし		食物アレルギー	水疱、丘疹	平成25年12月7日	重篤	平成26年6月27日	回復
46※※	3	男	平成25年11月27日	インフルエンザHA7 クチン*化血研	なし		なし	ネフローゼ症候群	平成25年12月7日	重篤	不明	未回復
47※※	7	女	平成25年12月2日	インフルエンザHA7 クチン*化血研 (351A)	なし		なし	てんかん	平成25年12月2日	重篤	平成25年12月4日	回復
48※※	49	女	平成25年12月3日	ビケンHA	なし		なし	感覚鈍麻、疼痛	平成25年12月5日	重篤	不明	不明
49※※	28	女	平成25年12月5日	フルービックHAシリ ンジ(HK12D)	なし		咽頭炎、マイコプラズマ性 肺炎	発熱、尋麻疹	平成25年12月5日	重篤	平成25年12月25日	回復
50※※	25	女	平成25年12月5日	インフルエンザHA7 クチン*チンカ生研 (488-B)	なし		なし	脊髓炎	平成25年12月11日	重篤	平成26年2月16日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
51※※	50	男	平成25年12月8日	インフルエンザHAワクチン*化血研	なし		胃食道逆流性疾患、尿管結石、食物アレルギー	急性散在性脳脊髄炎	平成25年12月11日	重篤	平成26年2月20日	軽快
52※※	71	男	平成25年12月9日	ニューモバックスNP	あり	インフルエンザHAワクチン	高血圧、高尿酸血症	倦怠感、白血球数増加	平成25年12月9日	重篤	平成25年12月10日	軽快
53※※	5	男	平成25年12月14日	ピケンHA(HA135E)	なし		低出生体重児、アレルギー性鼻炎	注射部位腫脹、注射部位紅斑、注射部位熱感、注射部位疼痛	平成25年12月14日	重篤	平成25年12月20日	回復
54※※	85	女	平成25年12月27日	インフルエンザHAワクチン*デシカ生研(496-B)	なし		不整脈、心房細動、バセドウ病、喘息	悪寒、発熱	平成25年12月27日	重篤	平成25年12月29日	回復
55	72	女	不明	インフルエンザHAワクチン*化血研	なし		なし	無菌性髄膜炎	不明	重篤	不明	不明
56	高齢者	男	不明	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		なし	発熱	不明	重篤	不明	回復
57	不明	不明	不明	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		なし	アナフィラキシー反応	不明	重篤	不明	回復
58※※	2男	不明	不明	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		なし	発熱、リンパ節症、紅斑	不明	重篤	不明	不明
59※※	5	不明	不明	インフルエンザHAワクチン*化血研	なし		なし	ネフローゼ症候群	不明	重篤	不明	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名/ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン/ロット番号	基礎疾患等	副反応名	発生日	重篤度	転帰日	転帰内容
60※※	5	不明	不明	インフルエンザHAワクチン*デング生研	なし		なし	ネフローゼ症候群	不明	重篤	不明	未回復
61※※	6	女	不明	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		喘息、アトピー性皮膚炎	歩行障害、視神経炎	不明	重篤	不明	不明
62※※	2	男	不明	インフルエンザHAワクチン*デング生研(485-A、498-A)	なし		なし	ネフローゼ症候群	平成25年12月	重篤	不明	不明
63※※	43	女	不明	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」	なし		シェーグレン症候群	急性散在性脳脊髄炎	不明	重篤	不明	不明

※同時接種ワクチンとして記載のある報告についても、因果関連が否定されたもの(接種部位の局所反応等)を除き集計している。

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※※前回の調査会で報告されていない症例

インフルエンザワクチン 重篤症例一覧 (平成25年10月1日から平成26年7月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	85	男	平成25年10月1日	インフルエンザ	480-A	デンカ	なし		緑内障、白内障、結核、B型肝炎、胃癌	筋炎	平成25年10月1日	関連あり	重い	平成25年10月4日	回復
2	4	男	平成25年10月8日	インフルエンザ	HK12A	阪大微研	なし		アレルギー性鼻炎、鼻漏	精神症状、注射部位紅斑、注射部位腫脹	平成25年10月8日	評価不能	重い	平成25年10月9日	不明
3	72	男	平成25年10月17日	インフルエンザ	HA130D	阪大微研	なし		膵膵リウマチ、風疹、ヘルニア、虫垂炎、糖尿病、良性前立腺肥大症、便秘、膀胱癌	腸閉塞	平成25年10月17日	評価不能	重い	平成25年11月6日	回復
4	1	男	平成25年10月17日	水痘	VZ093	阪大微研	あり	おたふくかぜ 北里第一三共 LF015A インフルエンザ 化血研 351C	なし	免疫性血小板減少性紫斑病	平成25年10月26日	評価不能	重い	不明	未回復
5	1	男	平成25年10月19日	インフルエンザ	352B	化血研	あり	水痘 阪大微研 VZ094 おたふくかぜ 武田薬品工業 G505	発熱、食物アレルギー、尿路感染	アナフィラキシー反応	平成25年10月19日	関連あり	重い	平成25年10月19日	回復
6	10	男	平成25年10月20日	インフルエンザ	HK12A	阪大微研	なし		なし	注射部位腫脹、注射部位疼痛、注射部位熱感、発熱	平成25年10月20日	関連あり	重い	平成25年10月29日	回復
7	82	男	平成25年10月21日	インフルエンザ	不明	不明	なし		インフルエンザ (2013.10.21接種)、 原疾患：合併症、 急性血小板減少性 紫斑病、髄膜炎、 急性腎不全、既往： 起立性低血圧	血栓性血小板減少性紫斑病	平成25年11月12日	記載なし	重い	平成25年12月1日	死亡
8	80	女	平成25年10月25日	インフルエンザ	484-A	デンカ	なし		高血圧、高脂血症、高尿酸血症、胃食道逆流性疾患	細菌性肺炎	平成25年10月26日	評価不能	重い	平成25年11月1日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
9	6	男	平成25年10月26日	インフルエンザ	353C	化血研	なし		なし	ヘンホ・シェーンライ ン紫斑病	平成25年11月3日	評価不能	重い	平成25年12月4日	軽快
10	35	女	平成25年10月29日	インフルエンザ	HK12A	阪大微研	なし		子宮平滑筋腫、羊 膜腔感染、胎児発 育遅延、自己免疫 性甲状腺炎、アレ ルギー性鼻炎	胎児死亡、頭痛、倦 怠感	平成25年10月29日	評価不能	重い	平成25年11月2日	回復
11	79	男	平成25年10月30日	インフルエンザ	352B	化血研	なし		交通事故	アナフィラキシー反応	平成25年10月30日	評価不能	重い	平成25年10月30日	軽快
12	72	男	平成25年10月31日	インフルエンザ	FB064A	北里第一三共	あり	ニューモバックスNP MSD 9MP12R	2型糖尿病、高血 圧、脂質異常症、て んかん、直腸癌、大 腸手術	多発性関節炎、頭 痛、嘔吐	平成25年10月31日	関連あり	重い	平成25年11月13日	軽快
13	34	女	平成25年10月31日	インフルエンザ	HK12D	阪大微研	なし		潰瘍性大腸炎	口腔浮腫、呼吸困 難、動悸、倦怠感	平成25年10月31日	関連あり	重い	平成25年11月6日	回復
14	39	女	平成25年11月1日	インフルエンザ	HA130E	阪大微研	なし		なし	第7脳神経麻痺	平成25年11月2日	評価不能	重い	平成25年11月27日	軽快
15	90	男	平成25年11月2日	インフルエンザ	HA130A	阪大微研	なし		良性前立腺肥大 症、尿経ヘルニア 不整脈、高血圧、高 尿酸血症、胃炎、高 カリウム血症、肺炎	肺炎、敗血症	平成25年11月2日	評価不能	重い	平成25年11月3日	死亡
16	9	男	平成25年11月5日	インフルエンザ	348B	化血研	なし		てんかん発作(脳形 成異常による症候 性局在関連てんか ん)、気管狭窄	呼吸停止	平成25年11月7日	評価不能	重い	平成25年11月7日	死亡
17	30	女	平成25年11月5日	インフルエンザ	FB062A	北里第一三共	なし		食物アレルギー、乳 アレルギー、アト ピー性皮膚炎、皮 膚症	筋痙攣	平成25年11月5日	関連あり	重い	平成25年11月15日	回復
18※	13	女	平成25年11月5日	インフルエンザ	HK12C	阪大微研	なし		ウイルス性胃腸炎、 先天性三尖弁閉鎖 症	免疫性血小板減少性 紫斑病	平成25年11月6日	記載なし	重い	平成25年12月3日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
19	2	女	平成25年11月5日 平成25年11月19日	インフルエンザ	481-A 486-A	デンカ	なし		なし	急性散在性脳脊髄炎	平成25年11月23日	関連あり	重い	平成26年2月5日	回復
20	30	女	平成25年11月7日	インフルエンザ	HE34A	阪大微研	なし		食物アレルギー、喘息、食道カンジダ症、高脂血症	アナフィラキシーショック	平成25年11月7日	記載なし	重い	平成25年11月14日	回復
21	78	女	平成25年11月8日	インフルエンザ	481-A	デンカ	なし		狭心症、冠動脈バイパス、糖尿病	脳炎	平成25年11月23日	関連あり	重い	平成25年12月19日	死亡
22	80	男	平成25年11月8日	インフルエンザ	480-A	デンカ	なし		高血圧、痛風	振戦、肺炎	平成25年11月9日	関連あり	重い	平成25年11月10日	不明
23	10	男	平成25年11月8日	インフルエンザ		化血研			耳下腺炎、季節性アレルギー	ネフローゼ症候群	平成25年11月17日	記載なし	重い	不明	未回復
24	48	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	HK13A	阪大微研	なし		糖尿病、脂防肝	頭痛、ほてり、熱感、霧視、悪心、倦怠感	平成25年11月9日	関連あり	重い	平成25年11月14日	回復
25	1	女	平成25年11月9日	インフルエンザ	FL001A	北里第一三共	なし		食物アレルギー、家畜アレルギー、動物アレルギー	発熱、強直性痙攣	平成25年11月9日	関連あり	重い	平成25年11月10日	回復
26	3	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	354A	化血研	なし		食物アレルギー	アレルギー性皮膚炎	平成25年11月9日	関連あり	重い	平成25年11月14日	軽快
27	52	男	平成25年11月11日	インフルエンザ	481-A	デンカ	なし		アルコール性肝疾患、雑嚥	肝機能異常	平成25年11月14日	記載なし	重い	平成25年12月2日	回復
28	2	女	平成25年11月11日	インフルエンザ	348B	化血研	なし		咳嗽、鼻淵、食物アレルギー	ネフローゼ症候群	平成25年11月16日	評価不能	重い	平成25年12月21日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
29	74	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA132A	阪大微研	なし		高血圧、高コレステロール血症、腎梗塞、聴力低下	突然聴覚	平成25年11月12日	評価不能	重い	不明	未回復
30	97	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA129C	阪大微研	なし		なし	死亡	平成25年11月13日	関連なし	重い	平成25年11月13日	死亡
31	50	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HK13D	阪大微研	なし		なし	局所反応、注射部位知覚消失、発熱	平成25年11月14日	関連あり	重い	平成25年11月18日	軽快
32※	74	男	平成25年11月13日	インフルエンザ	350B	化血研	なし		リウマチ性血管炎、骨粗鬆症、非ホジキンリンパ腫、ミクソパチ、急性肝炎	横紋筋融解症	平成25年11月14日	関連あり	重い	平成25年11月30日	回復
33	3	男	平成25年11月14日	インフルエンザ	FM023B	北里第一三共	なし		食物アレルギー、アトピー性皮膚炎	アナフィラキシー反応	平成25年11月14日	関連あり	重い	平成25年11月15日	回復
34	93	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	HA128B	阪大微研	なし		高血圧、心房細動、骨粗鬆症、圧迫骨折、狭心症、肺炎、心不全、食物アレルギー	肺炎、心不全、嘔吐、悪心、振戦、食欲減退、発熱	平成25年11月16日	記載なし	重い	平成25年11月19日	死亡
35	48	女	平成25年11月15日	インフルエンザ		阪大微研	なし		なし	咽頭浮腫、喉頭浮腫、血等浮腫、注射部位腫脹	平成25年11月16日	記載なし	重い	平成25年11月21日	軽快
36※	2	男	平成25年11月15日	インフルエンザ	FL002A	北里第一三共	なし		悪性上衣細胞腫	凝固検査異常、肝機能異常	平成25年11月17日	評価不能	重い	平成25年11月25日	軽快
37	65	男	平成25年11月16日	インフルエンザ	491-B	デンカ	なし		なし	皮膚炎、肝障害、間質性肺疾患	平成25年11月16日	関連あり	重い	平成25年11月28日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰内容
38	76	男	平成25年11月18日	インフルエンザ	496-A	デンカ	なし		統合失調症	発熱	平成25年11月19日	関連あり	重い	平成25年11月22日	軽快
39	80	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	HA133C	阪大微研	なし		大腸骨骨折	髄膜炎	平成25年11月18日	関連あり	重い	平成25年12月18日	軽快
40	6	男	平成25年11月18日	インフルエンザ	485-A	デンカ	なし		なし	痙攣、意識変容状 態、傾眠	平成25年11月28日	関連あり	重い	平成25年12月11日	軽快
41	59	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	494-B	デンカ			なし	血小板減少症	平成25年12月10日	関連あり	重い	平成26年1月9日	軽快
42※※	42	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	496-A	デンカ	なし		貧血	筋炎	平成25年12月9日	関連あり	重い	平成26年2月14日	軽快
43	6	女	平成25年11月19日	インフルエンザ	HE36A	阪大微研	なし		卵、小麦アレルギー	アナフィラキシー反応	平成25年11月19日	関連あり	重い	平成25年11月20日	回復
44	0(1ヶ月)	男	平成25年11月19日	インフルエンザ	485-A	デンカ	なし		なし	特異性血小板減少性 紫斑病	平成25年11月28日	関連あり	重い	平成25年12月4日	軽快
45※※	74	男	平成25年11月20日	インフルエンザ	483-A	デンカ	なし		免疫性血小板減少 性紫斑病、表心症	血小板数減少	平成25年12月18日	関連あり	重い	不明	未回復
46	34	男	平成25年11月21日	インフルエンザ	HA128D	阪大微研	なし		アトピー性皮膚炎、 食物アレルギー	発熱	平成25年11月21日	評価不能	重い	平成25年11月26日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
47	65	男	平成25年11月21日	インフルエンザ	358B	化血研	なし		なし	複合性局所疼痛症候群	平成25年11月21日	関連あり	重い	不明	後遺症
48※※	40	男	平成25年11月21日	インフルエンザ	484-B	デンカ	なし		なし	味覚異常、複視	平成25年11月22日	評価不能	重い	平成25年12月24日	軽快
49	3	女	平成25年11月22日	インフルエンザ	357C	化血研	なし		21トリニミー、喉頭軟化症、低酸素性虚血性脳症、甲状腺機能低下症、横紋筋融解症、理学療法、胃腸管挿入	横紋筋融解症、横紋性血管内凝固、腎不全	平成25年11月24日	評価不能	重い	平成25年12月10日	軽快
50	7	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	360C	化血研	なし		なし	蜂巣炎	平成25年11月27日	関連あり	重い	平成25年12月3日	回復
51	4	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	FB063B	北里第一三共	なし		なし	蜂巣炎	平成25年11月26日	関連あり	重い	平成25年11月29日	軽快
52	9	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	498-B	デンカ	なし		なし	四肢痛、歩行障害	平成25年11月26日	関連あり	重い	不明	不明
53	43	女	平成25年11月26日	インフルエンザ	358A	化血研	なし		シェーグレン症候群、自己免疫性甲状腺炎、季節性アレルギ、透折	急性散在性脳脊髄炎	平成25年11月30日	関連あり	重い	不明	後遺症
54※※	35	女	平成25年11月27日	インフルエンザ	362B	化血研	なし		なし	末梢性ニューロパチー	平成25年11月27日	関連あり	重い	平成26年1月24日	軽快
55※※	69	女	平成25年11月27日	インフルエンザ	FB065D	北里第一三共	なし		なし	末梢性ニューロパチー	平成25年12月1日	関連あり	重い	平成26年1月7日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
56	9	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	494-A	デンカ	なし		鼻咽頭炎	注射部位炎症、注射部位疼痛、感覚鈍麻	平成25年11月28日	関連あり	重い	不明	不明
57	31	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	HA128C	阪大微研	なし		過敏気	アナフィラキシー反応	平成25年11月28日	関連あり	重い	平成25年12月4日	回復
58※※	33	男	平成25年11月28日	インフルエンザ	HE36A	阪大微研	なし		なし	急性散在性脳脊髄炎	平成25年12月1日	関連あり	重い	不明	未回復
59※※	11	男	平成25年11月29日	インフルエンザ	FB067A	北里第一三共	なし		食物アレルギー	筋肉痛	平成25年11月30日	関連あり	重い	不明	軽快
60※※	65	男	平成25年11月29日	インフルエンザ	362A	化血研	なし		脳梗塞	末梢性ニューロパチー	平成25年11月30日	関連あり	重い	不明	未回復
61	38	男	平成25年11月30日	インフルエンザ	361A	化血研	不明		なし	関節痛	平成25年11月30日	関連あり	重い	平成25年12月5日	軽快
62	48	女	平成25年12月2日	インフルエンザ	497-A	デンカ	なし		なし	末梢性ニューロパチー	平成25年12月3日	関連あり	重い	不明	未回復
63	1	男	平成25年12月2日	インフルエンザ	HE35A	阪大微研	なし		食物アレルギー	小脳性運動失調	平成25年12月8日	関連あり	重い	平成26年1月21日	回復
64※※	72	女	平成25年12月2日	インフルエンザ	HA134E	阪大微研	なし		特発性血小板減少性紫斑病、高血圧、高脂血症、喘息	血小板減少性紫斑病	平成25年12月11日	記載なし	重い	平成25年12月25日	回復
65※※	29	女	平成25年12月2日	インフルエンザ	HA132E	阪大微研	なし		なし	精神症状、急性散在性脳脊髄炎、発熱、血尿	平成25年12月9日	関連あり	重い	不明	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
66	18	女	平成25年12月6日	インフルエンザ	FB066C	北里第一三共	なし		なし	失神寸前の状態	平成25年12月6日	関連あり	重い	平成25年12月7日	回復
67※※	82	女	平成25年12月6日	インフルエンザ	355A	化血研	なし		糖尿病、高血圧、慢性腎不全	心肺停止	平成25年12月7日	評価不能	重い	平成25年12月7日	死亡
68	8	女	平成25年12月7日	インフルエンザ	FB068C	北里第一三共	なし		なし	紅斑、腫脹	平成25年12月8日	関連あり	重い	平成25年12月19日	回復
69※※	7	男	平成25年12月9日	インフルエンザ	HK14B	阪大微研	なし		なし	ネフローゼ症候群	平成25年12月25日	評価不能	重い	平成26年2月20日	軽快
70	43	女	平成25年12月11日	インフルエンザ	FB066A	北里第一三共	なし		喘息、過敏症	アナフィラキシー反応	平成25年12月11日	関連あり	重い	平成25年12月11日	回復
71※※	70	男	平成25年12月13日	インフルエンザ	FB069B	北里第一三共	なし		高血圧	腸間膜脂肪膜炎、腎盂腎炎	平成25年12月21日	評価不能	重い	平成26年1月31日	軽快
72	65	男	平成25年12月15日	インフルエンザ	500-A	デンカ	あり	ニューモバックスNP MSD 9MP131	間質性肺疾患、冠動脈バイパス、頸動脈ステント挿入、冠動脈ステント挿入、脊椎手術、糖尿病、高血圧、高脂血症	ギラン・バレー症候群	平成25年12月15日	関連あり	重い	平成26年1月20日	軽快
73※※	34	男	平成25年12月16日	インフルエンザ	364A	化血研	なし		なし	椎間板突出	平成25年12月17日	関連あり	重い	不明	不明
74	3	男	平成25年12月20日	インフルエンザ	FM029D	北里第一三共			食物アレルギー、乳アレルギー	アナフィラキシーショック	平成25年12月20日	記載なし	重い	平成25年12月23日	回復
75※※	43	女	平成25年12月25日	インフルエンザ	499-A	デンカ	なし		副鼻腔炎、アトピー	急性散在性脳脊髓炎	平成25年12月28日	関連あり	重い	平成26年1月29日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
76※※	87	女	平成25年12月27日	インフルエンザ	491-A	デンカ	なし		なし	呼吸障害	平成25年12月27日	評価不能	重い	平成25年12月27日	死亡
77※※	2	男	平成26年1月6日 平成26年1月23日	インフルエンザ	HA136E	阪大微研	なし		なし	ギラン・バレー症候群	平成26年2月3日	評価不能	重い	平成26年3月22日	軽快
78※※	7	女	平成26年1月8日	インフルエンザ	493-A	デンカ	なし		なし	眼球クローヌスミオクローヌス	平成26年1月20日	評価不能	重い	不明	未回復
79※※	19	男	平成26年1月11日	インフルエンザ	HA135A	阪大微研	なし		ウイルス性肝炎	急性肝炎	平成26年1月12日	評価不能	重い	不明	軽快
80※※	74	男	平成26年1月22日	インフルエンザ	501-A	デンカ	なし		形質細胞性骨髓腫、高血圧	血小板減少性紫斑病	平成26年1月29日	関連あり	重い	平成26年2月26日	軽快
81※※	90	女	平成26年1月27日	インフルエンザ	HK15C	阪大微研	なし		心不全、2型糖尿病、ラクチン様毒、大動脈解離、高血圧、便秘	急性心筋梗塞、嘔吐、腹痛、発熱、下痢、ウイルス性肺炎	平成26年1月28日	記載なし	重い	平成26年1月31日	死亡
82※※	75	女	平成26年1月27日	インフルエンザ	FM024A	北里第一三共	なし		糖尿病、高血圧、脂質異常症、帝王切開	倦怠感、感覚鈍麻、疼痛	平成26年1月27日	関連あり	重い	平成26年6月18日	回復
83※※	5	女	平成26年1月29日	おたふくかぜ	LF019A	北里第一三共	あり	インフルエンザ 化血研 360C	なし	無菌性髄膜炎	平成26年2月19日	関連あり	重い	平成26年3月5日	軽快
84※※	0(6ヶ月)	男	平成26年2月7日	インフルエンザ		化血研	なし		低出生体重児	過敏症	平成26年2月7日	記載なし	重い	平成26年2月8日	回復

※同時接種ワクチンとして記載のある報告についても、因果関連が否定されたもの(接種部位の局所反応等)を除き集計している。
※接種後の経過観察者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。
※※前回の調査会で報告されていない症例

インフルエンザワクチン 非重篤症例一覧
(平成25年10月1日から平成26年7月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	67	女	平成25年10月2日	インフルエンザ	351B	化血研	なし		なし	血管炎	平成25年10月4日	関連あり	重くない	不明	不明
2	1	男	平成25年10月10日	インフルエンザ	351A	化血研	あり	水痘 阪大微研 VZ094	卵アレルギー	アナフィラキシー	平成25年10月10日	関連あり	重くない	平成25年10月10日	回復
3	47	女	平成25年10月11日	インフルエンザ	348A	化血研	なし		なし	アナフィラキシー	平成25年10月11日	関連あり	重くない	平成25年10月11日	回復
4※	65	女	平成25年10月15日	インフルエンザ	481-A	デンカ	なし		なし	注射部位紅斑、注射 部位腫脹、感覚鈍 麻、無力症	平成25年10月15日	関連あり	重くない	平成26年2月15日	軽快
5	5	女	平成25年10月16日	インフルエンザ	FB062D	北里第一三共	なし		既往(VSD) 分晩時異常	蜂巣炎	平成25年10月17日	関連あり	重くない	平成25年10月21日	回復
6	31	女	平成25年10月16日	インフルエンザ	352C	化血研	なし		なし	その他の神経障害	平成25年10月16日	評価不能	重くない	平成25年10月31日	未回復
7	4	男	平成25年10月18日	インフルエンザ	HA127E	阪大微研	なし		なし	発熱	平成25年10月19日	評価不能	重くない	平成25年10月21日	回復
8	76	男	平成25年10月19日	インフルエンザ	351B	化血研	なし		花粉症の既往あり。今までインフルエン ザ予防接種では特に副反応なし	毒麻疹	平成25年10月19日	関連あり	重くない	平成25年10月19日	回復
9	2	女	平成25年10月19日	インフルエンザ	FB063C	北里第一三共	なし		平成24年3月 鼻炎症状あり。	腫脹、発赤	平成25年10月20日	関連あり	重くない	平成25年10月25日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
10	78	男	平成25年10月19日	インフルエンザ	FB062C	北里第一三共	なし		なし	中毒疹	平成25年10月20日	関連あり	重くない	平成25年10月29日	軽快
11	25	女	平成25年10月21日	インフルエンザ	480-B	デンカ	なし		なし	左手首の脱力、運動障害	平成25年10月21日	評価不能	重くない	平成25年10月24日	軽快
12	4	男	平成25年10月21日	インフルエンザ	351C	化血研	なし		発熱	接種部位の腫脹・発赤	平成25年10月22日	関連あり	重くない	平成25年10月25日	軽快
13	37	女	平成25年10月21日	ニューモバックスNP	9MP12R	MSD	あり	インフルエンザ デンカ 483-A	なし	肝機能障害、発熱 39℃、頭痛、腹痛	平成25年10月23日	評価不能	重くない	平成25年11月13日	未回復
14	95	女	平成25年10月21日	インフルエンザ	FB062A	北里第一三共	なし		なし	発疹、発熱	平成25年10月22日	関連あり	重くない	平成25年11月11日	軽快
15	1	男	平成25年10月22日	インフルエンザ		化血研	なし		食毒アレルギー	アナフィラキシー	平成25年10月22日	記載なし	重くない	平成25年10月22日	回復
16	78	女	平成25年10月22日	インフルエンザ	FB062B	北里第一三共	なし		基礎疾患(高血圧、不整脈)	血管迷走神経反射	平成25年10月22日	評価不能	重くない	平成25年10月22日	軽快
17※3	3	女	平成25年10月23日 平成25年11月20日	インフルエンザ		北里第一三共	なし		麻疹	浮腫(左肩から左手首まで)、麻疹疹(左肩から左手首まで)、腫脹、発赤	平成25年11月21日	記載なし	重くない	平成25年11月25日	軽快
18	1	女	平成25年10月24日	インフルエンザ	488-B	デンカ	なし		10/11 Hibワクチン接種	けいれん	平成25年10月25日	関連あり	重くない	平成25年11月3日	回復
19	47	女	平成25年10月24日	インフルエンザ	487-B	デンカ	なし		なし	皮下血腫	平成25年10月24日	関連あり	重くない	平成25年10月29日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
20	5	男	平成25年10月25日	インフルエンザ	353B	化血研	なし		なし	発赤、腫脹	平成25年10月26日	関連あり	重くない	平成25年11月8日	回復
21※	76	男	平成25年10月25日	インフルエンザ	HA130E	阪大微研	なし		なし	筋肉痛	平成25年10月28日	関連あり	重くない	平成26年1月10日	未回復
22	8	男	平成25年10月26日	インフルエンザ	HA130C	阪大微研	なし		なし	意識消失、数秒間	平成25年10月26日	評価不能	重くない	平成25年10月26日	回復
23	8	女	平成25年10月26日	インフルエンザ	HE35A	阪大微研	なし		なし	肘を越える局所の異常腫脹、接種部周囲の水疱形成	平成25年10月27日	関連あり	重くない	平成25年11月1日	回復
24	28	女	平成25年10月28日	インフルエンザ	352B	化血研	なし		小児喘息の既往あり	喘息発作	平成25年10月28日	評価不能	重くない	平成25年10月31日	軽快
25	12	男	平成25年10月29日	インフルエンザ	FB064A	北里第一三共	なし		気管支喘息	発疹	平成25年10月29日	関連あり	重くない	平成25年10月30日	軽快
26	36	男	平成25年10月30日	インフルエンザ	FB064A	北里第一三共	なし		なし	発熱	平成25年10月31日	関連あり	重くない	平成25年11月1日	回復
27	4	男	平成25年10月30日	インフルエンザ	348B	化血研	なし		なし	アナフィラキシー	平成25年10月30日	関連なし	重くない	平成25年10月31日	回復
28	5	女	平成25年10月30日	インフルエンザ	487-A	デンカ	なし		なし	局所の異常腫脹、発熱	平成25年10月31日	関連あり	重くない	平成25年11月7日	未回復
29	37	男	平成25年10月30日	インフルエンザ	479-B	デンカ	なし		なし	第7脳神経麻痺	平成25年11月2日	評価不能	重くない	不明	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重症度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
30	45	女	平成25年10月30日	インフルエンザ	FB064A	北里第一三共	なし		なし	肝機能障害	平成25年11月11日	関連あり	重くない	平成25年11月30日	軽快
31	67	女	平成25年10月31日	インフルエンザ	FM025B	北里第一三共	なし		なし	接種部(左上腕伸側)を中心に熱感・発赤・腫脹	平成25年10月31日	関連あり	重くない	平成25年11月1日	軽快
32	5	男	平成25年10月31日	インフルエンザ	354A	化血研	なし		H24年インフルエンザ接種2回目のときに腫脹あり	発赤腫脹	平成25年11月1日	関連あり	重くない	平成25年11月5日	軽快
33	24	女	平成25年10月31日	インフルエンザ	353B	化血研	なし		なし	アレルギー性毒麻疹	平成25年11月1日	関連あり	重くない	平成25年11月3日	軽快
34	4	女	平成25年10月31日 平成25年11月25日	インフルエンザ	480-A 495-A	デンカ	なし		1回目:なし 2回目:インフルエンザ1回目の接種あり(H25/10/31)	けいれん	平成25年11月3日 平成25年11月25日	関連あり	重くない	平成25年11月3日 平成25年11月25日	回復
35	88	女	平成25年11月1日	インフルエンザ	HA127E	阪大衛研	なし		なし	頸部痛	平成25年11月7日	評価不能	重くない	平成25年11月11日	不明
36	10	女	平成25年11月2日	インフルエンザ	FB062C	北里第一三共	なし		なし	左上下眼瞼の発赤・腫脹、左下口唇部の軽度の腫脹、軽度の掻痒感	平成25年11月3日	関連あり	重くない	平成25年11月5日	軽快
37	45	男	平成25年11月5日	インフルエンザ	FM023A	北里第一三共	なし		なし	毒麻疹	平成25年11月5日	関連あり	重くない	平成25年11月7日	未回復
38	38	女	平成25年11月5日	インフルエンザ	490-A	デンカ	なし		なし	頭痛(軽度)、耳下腺・顎下腺腫脹	平成25年11月6日	評価不能	重くない	平成25年11月13日	回復
39	30	男	平成25年11月5日	インフルエンザ	490-A	デンカ	なし		なし	発熱、鼻炎症状	平成25年11月5日	関連あり	重くない	平成25年11月9日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重症度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
40	31	男	平成25年11月6日	インフルエンザ	491-A	デンカ	なし		なし	だるさ、どうき、吐き気	平成25年11月6日	評価不能	重くない	平成25年11月6日	軽快
41	53	女	平成25年11月6日	インフルエンザ	358A	化血研	なし		高コレステロール血症	じんま疹、口唇浮腫	平成25年11月6日	関連あり	重くない	平成25年11月6日	回復
42		男	平成25年11月6日	インフルエンザ		阪大微研	なし		高脂血症、気管支喘息	全身発赤、痒み	平成25年11月6日	記載なし	記載なし	不明	不明
43	31	女	平成25年11月6日	インフルエンザ	HK12A	阪大微研	なし		なし	頭痛、嘔気	平成25年11月6日	評価不能	重くない	平成25年11月8日	軽快
44	41	男	平成25年11月6日	インフルエンザ	HK13B	阪大微研	なし		小児喘息、抗生剤で薬疹	頭痛、嘔吐、悪寒	平成25年11月9日	評価不能	重くない	平成25年11月10日	回復
45	37	女	平成25年11月6日	インフルエンザ	HA128D	阪大微研	なし		糖尿病、精神科疾患	全身倦怠感	平成25年11月6日	評価不能	重くない	平成25年11月14日	未回復
46	7	女	平成25年11月6日	インフルエンザ	368C	化血研	なし		気管支喘息の既往あり。昨年のインフルエンザワクチンは副反応なし。	広範囲発赤	平成25年11月7日	関連あり	重くない	平成25年11月	軽快
47	19	男	平成25年11月7日	インフルエンザ	350A	化血研	なし		なし	発熱、頭痛	平成25年11月7日	関連あり	重くない	平成25年11月8日	回復
48	8	男	平成25年11月7日	インフルエンザ	353A	化血研	なし		なし	接種(左胸)部位の腫脹、発赤	平成25年11月7日	関連あり	重くない	平成25年11月9日	未回復
49	36	女	平成25年11月7日	インフルエンザ	HA129C	阪大微研	なし		ペニシリンアレルギー有り	軽度呼吸苦、皮膚発赤	平成25年11月10日	評価不能	重くない	平成25年11月10日	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
50	28	女	平成25年11月7日	インフルエンザ	HA128C	阪大微研	なし		アレルギー:犬、猫、ダニなどで痒み	痒疹、軽度発赤	平成25年11月7日	関連あり	重くない	平成25年11月7日	軽快
51	5	男	平成25年11月7日	インフルエンザ	353A	化血研	なし		なし	アレルギー	平成25年11月7日	関連あり	重くない	平成25年11月9日	軽快
52	54	女	平成25年11月7日	インフルエンザ	HA127E	阪大微研	なし		なし	左前腕部のしびれ、 痛み	平成25年11月11日	関連あり	重くない	平成25年11月14日	未回復
53	32	男	平成25年11月7日	インフルエンザ	486-B	デンカ	なし		気管支喘息治療中	39度以上の発熱	平成25年11月9日	評価不能	重くない	平成25年11月15日	軽快
54	47	男	平成25年11月8日	インフルエンザ	492-A	デンカ	なし		なし	背部～胸腹部の掻痒 感と発赤	平成25年11月8日	関連あり	重くない	平成25年11月8日	未回復
55	89	男	平成25年11月8日	インフルエンザ	HA129C	阪大微研	なし		なし	全身蕁麻疹	平成25年11月9日	評価不能	重くない	平成25年11月13日	未回復
56	62	男	平成25年11月8日	インフルエンザ	HA128A	阪大微研	なし		高脂血症、クレアチニン2.5mg服用中	発赤	平成25年11月9日	評価不能	重くない	平成25年11月9日	回復
57	12	男	平成25年11月8日	インフルエンザ	FB065D	北里第一三共	なし		アトピー	全身に皮疹	平成25年11月9日	評価不能	重くない	平成25年11月18日	回復
58	43	女	平成25年11月8日	インフルエンザ	HE36A	阪大微研	なし		過去にインフルエンザワクチン接種後、 倦怠感あり	接種後、10時間経過 後のアナフィラキシー 様症状	平成25年11月8日	関連あり	重くない	平成25年11月8日	回復
59	2	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	480-B	デンカ	なし		なし	発赤、腫脹	平成25年11月11日	関連あり	重くない	平成25年11月11日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重症度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
60	5	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	348A	化血研	なし		先天性胆道閉鎖症	じんま疹	平成25年11月9日	関連あり	重くない	平成25年11月9日	回復
61	3	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	482-A	デンカ	なし		風邪(10月23日～10月26日頃)	局所アレルギー反応	平成25年11月9日	関連あり	重くない	平成25年11月12日	未回復
62	3	女	平成25年11月9日	DPT	AM015A	北里第一三共	あり	インフルエンザ 北里第一三共 FM025A	なし	ワクチン接種部から 肘を超える腫大(腫 脹、発赤、痒み)	平成25年11月10日	関連あり	重くない	平成25年11月16日	回復
63	8	男	平成25年11月9日	インフルエンザ	FM025B	北里第一三共	あり	ヘプタバックス-II MSD 9KP04R	H25年10月12日、日脳ワクチン2回目、 異常なし	ワクチン接種部から 肘を超える腫大(腫 脹、発赤、痒み)	平成25年11月10日	関連あり	重くない	平成25年11月17日	回復
64	79	女	平成25年11月10日	インフルエンザ	DH26	デンカ	なし		高血圧、逆流性食道炎、鉄欠乏性貧血	顔のつっぱり感	平成25年11月19日	評価不能	重くない	平成25年12月14日	軽快
65	10	男	平成25年11月11日	インフルエンザ	468-A	デンカ	なし		なし	発赤、腫脹	平成25年11月11日	関連あり	重くない	平成25年11月12日	軽快
66	82	女	平成25年11月11日	インフルエンザ	485-B	デンカ	なし		なし	下痢	平成25年11月12日	関連あり	重くない	平成25年11月14日	未回復
67	80	女	平成25年11月11日	インフルエンザ	不明	不明	なし		不詳	関節炎、咳嗽	平成25年11月12日	関連あり	重くない	平成25年11月16日	回復
68	29	女	平成25年11月11日	インフルエンザ	FB064A	北里第一三共	なし		最近1ヶ月以内に風邪	じんま疹	平成25年11月11日	関連あり	重くない	平成25年11月18日	回復
69	5	女	平成25年11月11日	インフルエンザ	483A	デンカ	なし		なし	血管炎(アレルギー性 紫斑病)	平成25年11月15日	評価不能	重くない	平成25年12月10日	未回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
70	78	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA131C	阪大微研	なし		なし	嘔気、嘔吐	平成25年11月13日	評価不能	重くない	平成25年11月14日	軽快
71	31	男	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA132C	阪大微研	なし		なし	麻疹疹	平成25年11月12日	評価不能	重くない	平成25年11月14日	回復
72	2	男	平成25年11月12日	インフルエンザ	357A	化血研	なし		なし	発赤、腫脹	平成25年11月13日	関連あり	重くない	平成25年11月15日	未回復
73	7	男	平成25年11月12日	インフルエンザ	491-B	デンカ	なし		なし	胸痛	平成25年11月12日	評価不能	重くない	平成25年11月12日	回復
74	23	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HK13C	阪大微研	なし		なし	全身倦怠感、腰痛、 肩痛、胃部不快	平成25年11月13日	評価不能	重くない	不明	不明
75	39	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	352B	化血研	なし		フルーツアレルギー、インフルエンザワ クチンはH19.20.21.23.24	接種側上腕の痛み、 びれ、末梢神経障害	平成25年11月12日	関連あり	重くない	平成25年11月16日	軽快
76	38	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	FB062A	北里第一三共	なし		なし	じんましん	平成25年11月13日	関連あり	重くない	平成25年11月18日	軽快
77	5	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA127B	阪大微研	なし		なし	接種部位腫脹	平成25年11月13日	関連あり	重くない	平成25年11月14日	軽快
78	82	女	平成25年11月12日	インフルエンザ	HA128C	阪大微研	なし		なし	体幹部紅斑	平成25年11月15日	関連あり	重くない	平成25年11月25日	軽快
79	73	男	平成25年11月12日	インフルエンザ	FB063D	北里第一三共	なし		なし	発疹	平成25年11月13日	関連あり	重くない	平成25年11月28日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
80	8	男	平成25年11月13日	インフルエンザ	357B	化血研	なし		なし	接種部位の腫脹 肘をこえる	平成25年11月13日	関連あり	重くない	平成25年12月2日	回復
81	63	女	平成25年11月13日	インフルエンザ	359B	化血研	なし		甲状腺機能低下症	発熱	平成25年11月14日	評価不能	重くない	平成25年11月18日	不明
82	19	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	HA127B	阪大微研	なし		なし	毒麻疹	平成25年11月14日	評価不能	重くない	平成25年11月15日	回復
83	2	男	平成25年11月14日	インフルエンザ	FB066B	北里第一三共	なし		なし	発熱(39℃)	平成25年11月14日	関連あり	重くない	平成25年11月15日	軽快
84	46	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	482-B	デンカ	なし		腰痛のためトラムセツ内服中	皮膚粘膜眼症候群	平成25年11月14日	関連あり	重くない	平成25年11月27日	軽快
85	2	男	平成25年11月14日	インフルエンザ	358B	化血研	なし		なし	局所痛	平成25年11月14日	関連あり	重くない	平成25年11月15日	回復
86	74	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	357A	化血研	なし		既往歴:高脂血症、境界型糖尿病、 シェーグレン症候群、胃潰瘍、神経性頻 尿症、糖尿病性神経障害、非結核性抗 酸菌症、多源性期外収縮、気管支拡張 症、うつ病、抗凝薬性頭痛 内服薬:デハス(0.5)2T、ガスロンN(4) 2T、エリスロマイシン「サワイ」(200)2T 2×1 エボザック(30)3C、ユベラニコチネート カプセル3C、リズムサット3P、ミヤBM 3.0g、カマグ 10g 3×1 メハリッチ(5)1T、アジノン(150)1T、ブ タダロン1T、リフレックス(15)1T 1×1 カニ、エビアレルギーあり	アナフィラキシー	平成25年11月14日	関連あり	重くない	平成25年11月14日	回復
87	25	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	485-A	デンカ	なし		なし	じんましん	平成25年11月14日	関連あり	重くない	平成25年12月13日	回復
88	59	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	360A	化血研	なし		かき(肩)アレルギー	発疹、しびれ	平成25年11月14日	評価不能	重くない	平成25年11月19日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
89	75	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	HA128C	阪大徹研	なし		なし	両下肢針状皮下紅斑	平成25年11月18日	関連あり	重くない	平成25年11月26日	未回復
90	40	男	平成25年11月14日	インフルエンザ	FM023C	北里第一三共	なし		鼻水	39.0℃以上の発熱	平成25年11月14日	評価不能	重くない	平成25年11月16日	軽快
91	78	女	平成25年11月14日	インフルエンザ	FM024A	北里第一三共	なし		なし	多形滲出性紅斑	平成25年11月17日	関連あり	重くない	平成25年12月19日	回復
92	32	男	平成25年11月15日	インフルエンザ	HA127D	阪大徹研	なし		なし	頭痛、めまい、接種部痛	平成25年11月15日	関連あり	重くない	平成25年11月15日	未回復
93	85	女	平成25年11月15日	インフルエンザ	FB067B	北里第一三共	なし		なし	顔面けいれん	平成25年11月15日	評価不能	重くない	平成25年11月19日	回復
94	6	男	平成25年11月15日	インフルエンザ	358B	化血研	なし		なし	注射患部の発疹腫脹	平成25年11月15日	関連あり	重くない	平成25年11月18日	軽快
95	19	女	平成25年11月16日	インフルエンザ	483-B	デンカ	なし		2日前から軽度の鼻汁症状あり。月経不順あり。生理が遅れている。	嘔気、発汗、軽度下腹部痛	平成25年11月16日	評価不能	重くない	平成25年11月16日	回復
96	66	女	平成25年11月16日	インフルエンザ	481-B	デンカ	なし		サバでジンマシン	じんましん	平成25年11月17日	関連あり	重くない	平成25年11月25日	回復
97	18	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	FB065A	北里第一三共	なし		なし	血管迷走神経反射	平成25年11月18日	関連あり	重くない	平成25年11月18日	回復
98	78	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	354C	化血研	なし		正常圧水頭症、糖尿病、虚候性てんかん	けいれん発作	平成25年11月18日	関連なし	重くない	平成25年11月18日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
99	52	女	平成25年11月18日	インフルエンザ	478-A	デンカ	なし		なし	接種部位の腫脹	平成25年11月21日	関連あり	重くない	平成25年11月25日	未回復
100	69	男	平成25年11月18日	インフルエンザ	HA132C	阪大微研	なし		なし	急性じん麻疹	平成25年11月18日	関連あり	重くない	平成25年11月26日	軽快
101	2	男	平成25年11月18日、平成25年11月30日	インフルエンザ		阪大微研	なし		なし	右上胸発赤・腫脹	平成25年12月2日	記載なし	重くない	不明	回復
102	7	男	平成25年11月19日	インフルエンザ	487-B	デンカ	なし		なし	肘を超える局所の異常腫脹	平成25年11月21日	関連あり	重くない	平成25年11月22日	軽快
103	85	女	平成25年11月19日	インフルエンザ	FB065D	北里第一三共	なし		なし	皮疹(両側胸部)	平成25年11月21日	評価不能	重くない	平成25年11月29日	軽快
104	37	男	平成25年11月20日	インフルエンザ	485-A	デンカ	なし		なし	熱発	平成25年11月20日	関連あり	重くない	平成25年11月21日	回復
105	73	女	平成25年11月20日	インフルエンザ	350A	化血研	なし		強皮症、狭心症、高血圧、シェーグレン症候群、胃潰瘍、腎臓	咽喉乾燥、発声障害	平成25年11月20日	記載なし	重くない	平成25年11月20日	軽快
106	91	男	平成25年11月22日	インフルエンザ		化血研	なし		血管性認知症、高血圧、血管性パーキンソン、喘息性気管支炎	喘鳴	平成25年11月22日	記載なし	記載なし	平成25年11月23日	回復
107	1	男	平成25年11月22日	インフルエンザ	358C	化血研	なし		なし	接種部位の腫脹 発熱(39.0℃)	平成25年11月23日	関連あり	重くない	平成25年11月25日	軽快
108	57	女	平成25年11月22日	インフルエンザ	358A	化血研	なし		ピリンで薬疹	じんましん	平成25年11月22日	関連あり	重くない	平成25年11月26日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
109	74	男	平成25年11月22日	インフルエンザ		化血研	なし		進行性核上性麻痺、狭心症、慢性心不全	皮疹(大腿部～腹部)	平成25年11月22日	記載なし	重くない	平成25年11月28日	回復
110※※	61	女	平成25年11月22日	インフルエンザ	HA133C	阪大徹研	なし		なし	浮遊感、接種部硬結	平成25年11月22日	評価不能	重くない	平成25年11月30日	回復
111※※	50	女	平成25年11月24日	インフルエンザ	359A	化血研	なし		なし	左前胸痛・末梢神経障害	平成25年11月27日 ころ	評価不能	重くない	平成26年3月7日	未回復
112	34	女	平成25年11月25日	インフルエンザ	FB065D	北里第一三共	なし		なし	肘を越える局所の異常腫脹及び振戦	平成25年11月25日	関連あり	重くない	平成25年11月27日	軽快
113	5	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	434-B	デンカ	なし		H25.11.20～咳、他院にてピオフェルミン、アスベリン散、ペラチンドラインシロップ、小児用ムコソルバンDS、テルギンGトランシロップ、キプレス細胞 服用 他院主治医接種可能といわれた	接種腕の腫脹熱感	平成25年11月28日	評価不能	重くない	平成25年12月6日	回復
114	5	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	355B	化血研	なし		咳、鼻汁あり	接種部位の腫脹(肘を越える)、発熱	平成25年11月25日	関連あり	重くない	平成25年11月27日	回復
115※※	3	男	平成25年11月25日	インフルエンザ	HK14C	阪大徹研	なし		なし	肘をこえる腫脹	平成25年11月26日	記載なし	重くない	平成25年11月28日	回復
116	4	女	平成25年11月26日	インフルエンザ	361B	化血研	なし		なし	発赤・腫脹	平成25年11月26日	関連あり	重くない	平成25年12月6日	軽快
117	7	男	平成25年11月26日	インフルエンザ	484-B	デンカ	なし		なし	蜂巣炎	平成25年11月27日	関連あり	重くない	平成25年12月2日	軽快
118	35	男	平成25年11月26日	インフルエンザ	354C	化血研	なし		なし	全身性の紅斑丘疹	平成25年11月27日	関連あり	重くない	平成25年12月2日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
119	53	女	平成25年11月26日	インフルエンザ	361C	化血研	なし		なし	高熱、きんにく痛	平成25年11月27日	関連あり	重くない	平成25年11月28日	回復
120※※	44	女	平成25年11月26日	インフルエンザ		北里第一三共	なし		なし	左上腕腫脹・水疱(手掌大)	平成25年11月27日	記載なし	重くない	平成25年12月3日	軽快
121	30	女	平成25年11月27日	インフルエンザ	FB065C	北里第一三共	なし		蟹アレルギー有。去年(H24年)インフル エンザ予防接種時は異常なし	下肢の脱力疼痛、顔 面紅潮、頸部圧迫感	平成25年11月27日	評価不能	重くない	平成25年11月27日	回復
122	23	女	平成25年11月27日	インフルエンザ	HA132E	阪大微研	なし		なし	左第1第2指のしびれ	平成25年11月27日	評価不能	重くない	平成25年12月6日	未回復
123	75	男	平成25年11月27日	インフルエンザ	359B	化血研	なし		なし	左上肢湿疹	平成25年11月30日	関連あり	重くない	平成25年12月25日	軽快
124※※	66	女	平成25年11月27日	インフルエンザ	486-B	デンカ	なし		なし	知覚異常	平成25年11月下旬	評価不能	重くない	平成26年1月31日	軽快
125	33	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	HA128B	阪大微研	なし		なし	アナフィラキシー	平成25年11月28日	関連あり	重くない	平成25年11月28日	軽快
126	80	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	HA131D	阪大微研	なし		なし	毒麻疹	平成25年11月28日	関連あり	重くない	平成25年11月28日	回復
127	54	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	HK13B	阪大微研	なし		なし	じんましん	平成25年11月30日	関連あり	重くない	平成25年12月13日	回復
128	28	女	平成25年11月28日	インフルエンザ	359A	化血研	なし		なし	毒麻疹	平成25年11月28日	関連あり	重くない	平成25年11月29日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
129	45	男	平成25年11月29日	インフルエンザ	HA131D	阪大微研	なし		慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎	気管支肺炎	平成25年11月29日	記載なし	重くない	平成25年12月9日	軽快
130	18	男	平成25年11月30日	インフルエンザ	500-B	デンカ	なし		そば	迷走神経反射	平成25年11月30日	関連あり	重くない	平成25年11月30日	回復
131	33	女	平成25年11月30日	インフルエンザ	481-B	デンカ	なし		なし	口のまわりのしびれ	平成25年11月30日	関連あり	重くない	平成25年12月21日	回復
132	64	男	平成25年12月2日	インフルエンザ	355A	化血研	なし		高血圧、高脂血症、尿蛋白を抑える薬、 合計3種類	左顔面神経麻痺	平成25年12月3日	関連あり	重くない	平成25年12月9日	回復
133	21	男	平成25年12月3日	インフルエンザ	348B	化血研	なし		なし	左手掌部のしびれ	平成25年12月3日	評価不能	重くない	平成25年12月16日	未回復
134※※	72	女	平成25年12月3日	インフルエンザ	496-B	デンカ	なし		なし	全身倦怠感	平成25年12月9日	関連あり	重くない	平成26年1月14日	回復
135	19	男	平成25年12月4日	インフルエンザ	360B	化血研	なし		約1ヶ月前37.6℃の発熱、咳があった	顔面神経麻痺	平成25年12月12日	評価不能	重くない	平成25年12月29日	回復
136	59	男	平成25年12月5日	インフルエンザ	488-B	デンカ	なし		なし	冷汗、めまい	平成25年12月5日	関連あり	重くない	平成25年12月5日	軽快
137	79	女	平成25年12月5日	インフルエンザ	FB066A	北里第一三共	なし		なし	舌の発赤	平成25年12月6日	関連あり	重くない	平成25年12月12日	回復
138	2	男	平成25年12月5日	インフルエンザ	351B	化血研	なし		なし	左上肢の蜂巣炎	平成25年12月5日	関連あり	重くない	平成25年12月14日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
139	7	男	平成25年12月5日	インフルエンザ	362B	化血研	なし		なし	左上胸アレルギー性皮膚炎	平成25年12月6日	関連あり	重くない	平成25年12月9日	軽快
140※※	40	女	平成25年12月5日	インフルエンザ	360A	化血研	なし		なし	接種部位の疼痛	平成26年1月31日	関連あり	重くない	不明	不明
141※※	3	男	平成25年12月5日、平成25年12月25日	インフルエンザ	354C、354C	化血研	なし		卵アレルギー⇒除去解除されている	接種部位の著明な腫れ発熱	平成25年12月5日、平成25年12月25日	関連あり	重くない	平成25年12月9日、平成25年12月30日	軽快
142	5	男	平成25年12月6日	インフルエンザ	HA134A	阪大衛研	なし		なし	嘔気、腹痛、全身倦怠感	平成25年12月6日	関連あり	重くない	平成25年12月7日	回復
143	25	女	平成25年12月6日	インフルエンザ	361A	化血研	なし		インフルエンザワクチンを打った後、気分が悪くなることもある。	アナフィラキシーあるいは血管迷走神経反射	平成25年12月6日	関連あり	重くない	平成25年12月6日	回復
144	81	女	平成25年12月6日	インフルエンザ	495-B	デンカ	なし		なし	アナフィラキシー	平成25年12月6日	関連あり	重くない	平成25年12月10日	回復
145※※	2	男	平成25年12月6日	インフルエンザ			なし		なし	喘息発作	平成25年12月6日	評価不能	重くない	平成25年12月6日	回復
146	17	男	平成25年12月7日	インフルエンザ	361A	化血研	なし		なし	気分不良	平成25年12月7日	関連あり	重くない	平成25年12月7日	軽快
147	2	女	平成25年12月7日	インフルエンザ	499-B	デンカ	なし		以前より、熱性けいれんあり。	熱性けいれん	平成25年12月8日	評価不能	重くない	平成25年12月8日	回復
148	13	女	平成25年12月7日	インフルエンザ	478-B	デンカ	なし		なし	接種部位の腫れ、接種部位反応	平成25年12月7日	関連あり	重くない	平成25年12月12日	不明

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
149	7	男	平成25年12月9日	インフルエンザ	366B	化血研	なし		昨年インフルエンザワクチン2回目接種 后ジメチル出現。(ただし、以前よりイ ンフルエンザワクチンの接種歴があり、 2回目であった事、接種部位の発赤等も なく、ワクチンの可能性は低いと考え た。)	アナフィラキシー(軽 症)	平成25年12月9日	評価不能	重くない	平成25年12月9日	回復
150	30	女	平成25年12月9日	インフルエンザ	FB069A	北里第一三共	なし		なし	インフルエンザ様症状 (発熱、関節痛、咽頭 痛、咳)	平成25年12月10日	記載なし	重くない	平成25年12月10日	未回復
151	23	男	平成25年12月9日	インフルエンザ	FB069A	北里第一三共	なし		なし	インフルエンザ様症状 (発熱、頭痛、関節痛、 鼻汁、咳)	平成25年12月9日	記載なし	重くない	平成25年12月10日	未回復
152	3	女	平成25年12月9日	インフルエンザ	FM024C	北里第一三共	なし		体調により毒麻疹が出たり出なかったり する	接種部発赤、腫脹、 掻痒	平成25年12月10日	関連あり	重くない	不明	不明
153	3	男	平成25年12月9日	インフルエンザ	HE39A	阪大微研	なし		アトピー性皮膚炎、アレルギー服用中	広範囲の発赤、39度 の発熱	平成25年12月10日	関連あり	重くない	平成25年12月14日	回復
154※※	57	女	平成25年12月9日	インフルエンザ	499B	デンカ	なし		なし	末梢神経障害性疼痛 の疑い	平成25年12月10日	評価不能	重くない	不明	未回復
155	5	男	平成25年12月10日	インフルエンザ	361B	化血研	なし		なし	左上肢腫脹、発熱	平成25年12月11日	評価不能	重くない	平成25年12月12日	軽快
156※※	64	女	平成25年12月10日	インフルエンザ	361B	化血研	なし		psoriasisとその関節炎	胃腸の機能不全	平成25年12月10日	関連あり	重くない	平成25年12月31日	軽快
157	60	男	平成25年12月11日	インフルエンザ	360C	化血研	なし		なし	全身にかゆみを伴う 発疹あり	平成25年12月11日	関連あり	重くない	平成25年12月11日	回復
158	5	男	平成25年12月12日	インフルエンザ	363A	化血研	なし		なし	発赤、腫脹、掻痒感	平成25年12月13日	関連あり	重くない	不明	不明

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
159	26	女	平成25年12月12日	インフルエンザ	HA133D	阪大微研	なし		自己診断の風邪、内服服用なし(10日前ぐらい)	しびれ	平成25年12月12日	評価不能	重くない	平成25年12月13日	回復
160	34	男	平成25年12月12日	インフルエンザ	497-B	デンカ	なし		なし	接種部の凍結、水疱	平成25年12月15日	関連あり	重くない	平成25年12月17日	軽快
161	36	女	平成25年12月12日	インフルエンザ	499-B	デンカ	なし		なし	悪寒、発熱37.4°、両上肢脱力感	平成25年12月13日	関連あり	重くない	平成25年12月19日	未回復
162	15	女	平成25年12月13日	インフルエンザ	HA136A	阪大微研	なし		なし	めまい、冷汗、血圧低下	平成25年12月13日	評価不能	重くない	平成25年12月13日	回復
163※※	4	女	平成25年12月13日	インフルエンザ	498B	デンカ	なし		なし	発赤、腫脹、発熱(38.8℃)	平成25年12月14日	関連あり	重くない	平成25年12月20日	軽快
164※※	73	女	平成25年12月14日	インフルエンザ	FB063C	北里第一三共	なし		なし	薬疹	平成25年12月15日	関連あり	重くない	平成26年1月29日	軽快
165※※	68	男	平成25年12月16日	インフルエンザ	FB066D	北里第一三共	なし		胃癌術後、ダンピング症候群、糖尿病(セイブル(503T/3×前) HBVキャリアー、1ヶ月以内のワクチン接種はなし。過去のワクチンで副作用なし。	末梢神経障害	平成25年12月16日	関連あり	重くない	平成26年1月9日	軽快
166※※	13	女	平成25年12月16日	インフルエンザ		阪大微研	なし		なし	発赤、三叉神経痛、強い	平成25年12月18日	記載なし	重くない	発赤：平成25年12月25日、三叉神経痛：平成26年1月9日	回復
167	15	男	平成25年12月19日	インフルエンザ	364B	化血研	なし		なし	急性毒麻疹	平成25年12月19日	関連あり	重くない	平成25年12月24日	回復
168	4	女	平成25年12月20日	インフルエンザ	364B	化血研	なし		H25.12.11風邪症候群にて水薬とホクナリンテープ、(フスコジシロップ、ムコロニンシロップ)	筋肉痛	平成25年12月20日	評価不能	重くない	平成25年12月21日	回復
169※※	52	女	平成25年12月21日	インフルエンザ	503-A	デンカ	なし		喘息、反対咬合の手術、腎盂腎炎、抗生剤のオキサセフにアレルギー	じん麻疹	平成25年12月21日	関連あり	重くない	平成26年1月9日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
170	6	男	平成25年12月24日	インフルエンザ	478-B	デンカ	なし		なし	皮膚の熱感・腫脹	平成25年12月25日	関連あり	重くない	平成25年12月27日	回復
171	66	女	平成25年12月25日	インフルエンザ	FM027C	北里第一三共	なし		RA,2013年11月28日ごろに両側肺炎 (gep s/o)SMX/TMPプラステロイド 12/25の時点でMTXは中止されており レドニン漸減中(10mg)	発熱(高熱)	平成25年12月26日	評価不能	重くない	不明	不明
172※※	11	男	平成25年12月25日	インフルエンザ	FB067A	北里第一三共	なし		なし	横骨神経麻痺	平成25年12月25日	評価不能	重くない	平成25年12月27日	軽快
173	48	女	平成25年12月26日	インフルエンザ	501-B	デンカ			脂肪肝	嘔吐、下痢、意識混濁	平成25年12月26日	記載なし	記載なし	平成25年12月26日	回復
174※※	66	女	平成25年12月26日	インフルエンザ	361B	化血研	なし		甲状腺機能低下症、高血圧症、チラー チン	発熱	平成25年12月26日	評価不能	重くない	平成25年12月27日	未回復
175※※	16	男	平成25年12月26日	インフルエンザ	362B	化血研	なし		なし	アナフィラキシー	平成25年12月26日	記載なし	重くない	平成25年12月26日	回復
176※※	45	女	平成26年1月4日	インフルエンザ	363A	化血研	なし		なし	知覚異常	平成26年1月4日	関連あり	重くない	不明	不明
177※※	1	男	平成26年1月6日	インフルエンザ	HE35A	阪大薬研	なし		ばなみず、かぜ	けいれん	平成26年1月6日	評価不能	重くない	平成26年1月6日	回復
178※※	81	男	平成26年1月7日	インフルエンザ	354C	化血研	なし		12/30肺炎球菌ワクチンSC	けいれん	平成26年1月7日	評価不能	重くない	平成26年1月8日	回復
179※※	14	女	平成26年1月10日	インフルエンザ	498-A	デンカ	なし		アレルギー性鼻炎	喘息発作	平成26年1月10日	関連あり	重くない	平成26年1月11日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
180※※	49	男	平成26年1月14日	インフルエンザ	499-B	デンカ	なし		なし	39℃以上の発熱	平成26年1月16日	評価不能	重くない	平成26年1月17日	回復
181※※	41	女	平成26年1月14日	インフルエンザ	362C	化血研	なし		なし	局所疼痛	平成26年1月14日	関連あり	重くない	不明	不明
182※※	17	女	平成26年1月18日	インフルエンザ	363B	化血研	なし		なし	一過性意識消失、けいれん、血管迷走神経反射	平成26年1月18日	評価不能	重くない	平成26年1月20日	回復
183※※	27	女	平成26年1月28日	インフルエンザ	500-A	デンカ	なし		なし	発熱、嘔気、接種部位の発赤、疼痛	平成26年1月28日	関連あり	重くない	平成26年2月14日	回復
184※※	73	女	平成26年1月31日	インフルエンザ	HA128E	阪大微研	なし		胸アレルギーかもしれない。(10年前以上にアレルギー検査をしたが、食物のアレルギーはないと言われた)	発赤	平成26年1月31日	評価不能	重くない	平成26年2月3日	回復
185	29	女	不明	インフルエンザ	489A	デンカ	なし		なし	発熱38.3℃	平成25年11月21日	記載なし	記載なし	平成25年11月22日	回復

※同時接種ワクチンとして記載のある報告についても、因果関連が否定されたもの(接種部位の局所反応等)を除き集計している。

※接種の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※※前回の調査会で報告されていない症例

インフルエンザワクチンの副反応報告
アナフィラキシーの可能性のある症例についてのブライトン分類評価

	ロット番号	出荷数量(万回(接種回数))	報告数[重篤]	レベル3以上の報告数[重篤] (専門委員評価を加えたもの)	レベル3以上の報告頻度[重篤] (報告数/10万回)
北里研	FB065B	27.8	1 [1]	1 [1]	0.4 [0.4]
	FB066A	27.7	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	FM023B	13.4	1 [1]	1 [1]	0.7 [0.7]
	FM024C	14.0	1 [1]	1 [1]	0.7 [0.7]
	FM029D	12.1	1 [1]	1 [1]	0.8 [0.8]
	不明		1 [1]	0 [0]	[]
化血研	348A	11.4	1 [0]	1 [0]	0.9 [0.0]
	348B	9.5	1 [0]	1 [0]	1.1 [0.0]
	351A	15.3	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	352B	19.9	2 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	357A	19.9	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	362B	19.9	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	366B	15.9	1 [0]	1 [0]	0.6 [0.0]
	不明		2 [0]	2 [0]	[]
デンカ生研	488-A	34.4	1 [1]	1 [1]	0.3 [0.3]
	495-B	34.4	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
微研会	HA128B	28.2	1 [0]	1 [0]	0.4 [0.0]
	HA128C	28.3	1 [1]	1 [1]	0.4 [0.4]
	HE34A	16.4	1 [1]	1 [1]	0.6 [0.6]
	HE36A	16.4	2 [1]	2 [1]	1.2 [0.6]
合計		364.9	23 [11]	15 [8]	0.4※ [0.2]

※ロット番号不明の症例を含めて、頻度を算出した。

- ・2014年7月31日までに入手した情報について、ブライトン分類に基づき企業評価を実施、専門家の評価
- ・追加情報の入手や症状の評価及び解釈などにより変更される可能性がある。

過去のワクチンのアナフィラキシーの報告頻度
インフルエンザワクチン(平成24年10月～平成25年3月報告分)
(平成25年6月14日調査会資料より)

	ロット番号	出荷数量(万回(接種回数))	報告数[重篤]	レベル3以上の報告数[重篤] (専門委員評価を加えたもの)	レベル3以上の報告頻度[重篤] (報告数/10万回)
北里研	FM020C	14.2	2 [2]	2 [2]	1.4 [1.4]
	FB054C	27.8	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	不明		1 [1]	0 [0]	[]
化血研	331C	23.4	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	332C	23.4	1 [0]	1 [1]	0.4 [0.4]
	333A	36.9	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	334B	37.0	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	336A	36.9	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	337A	36.9	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	338A	36.9	2 [2]	1 [1]	0.3 [0.3]
	339B	36.8	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	341A	36.8	1 [1]	1 [1]	0.3 [0.3]
	341C	23.9	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	344C	24.3	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
デンカ生研	450-B	34	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
	454-A	34	2 [2]	0 [0]	0.0 [0.0]
	455-B	34	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	464-B	33	1 [1]	1 [1]	0.3 [0.3]
	468-A	34	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
微研会	HA120A	27.9	1 [0]	0 [0]	0.0 [0.0]
	HK10C	14.3	1 [1]	1 [1]	0.7 [0.7]
	HE32A	16.4	1 [1]	0 [0]	0.0 [0.0]
合計		622.8	25 [18]	7 [7]	0.1 [0.1]

インフルエンザHAワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる副反応症例

※【選択基準】副反応名が「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例。

平成25年10月1日～平成26年7月31日入手分まで

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライデン分類 (企業評価)	専門家の評価		事務局総合評価	
							ブライデン分類 レベル	因果関係	意見		
北里 -1	147歳・女性	アレルギー歴:イカ	ワクチン接種10分後、嘔気、息が速くなるのを自覚。 ワクチン接種15分後、乾性咳嗽が止まらなくなつた。アドレナリン0.3mg＋生理食塩液1mlの吸入施行。酸素マスク10Lで開始。 ワクチン接種39分後、症状改善が認められなかったため、アドレナリン0.3mg静注。 ワクチン接種41分後、ヒドコロチゾンコハク酸エステルナトリウム200mg静注。 ワクチン接種43分後、BP:119/56mmHg、SpO2:100%、ライン確保。 ワクチン接種49分後、症状増悪のため、アドレナリン0.1mg静注。 ワクチン接種50分後、喘鳴、努力性呼吸消失、BP:178/109mmHg、HR:93、SpO2:100%、頭痛の訴えあり、咳嗽頻回増え。 ワクチン接種1時間2分後、BP:122/85mmHg ワクチン接種1時間8分後、BP:107/77mmHg ワクチン接種1時間15分後、BP:125/82mmHg、バイタル安定。 経過観察のため、入院となる。 ワクチン接種2日後、回復するも咳は残存し、食欲が落ちている。	アナフィラキシーショック	FM024C	軽快	2	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:嘔気は消化器のMinor症状、喘鳴は呼吸器のMajor症状。 OB委員:アナフィラキシーの定義は満たさないが、ワクチンによるアレルギーと考える。 OC委員:因果関係は否定できない	ブライデン分類3以上のアナフィラキシー症例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	
北里 -2	23歳・男性	アレルギー歴:卵アレルギー (卵のスクラッチテストで卵アレルギーを指摘される。生後6か月頃まで母親も卵も卵完全除去。 1歳頃から、次第に卵摂取。3歳頃には生卵は控えるも、卵はある程度摂取。) 原疾患:アトピー性皮膚炎(生後2か月頃、乳児湿疹とアトピー性皮膚炎を指摘される。)	ワクチン接種1時間後、咳が出現。 ワクチン接種1時間10分後、尋麻疹が顔面と体幹に出現。 ワクチン接種1時間30分後、医療機関受診。SpO2:97～98%全身の発赤疹および喘鳴を認め、プロパテロール塩酸塩水和物・ブテソニドの吸入を施行する。 ワクチン接種1時間50分後、喘鳴、呼吸困難がひどくなる。 ワクチン接種1時間50分後、アドレナリン0.12mgを筋注し、救急車にて他院へ搬送となる。 ワクチン接種2時間10分後、他院到着時には喘鳴改善し、尋麻疹も軽減。SpO2:100%、BP:98/51、ルート確保し、ヒドコロチゾンコハク酸エステルナトリウム60mg点滴。数時間後には尋麻疹消失。一晩経過観察のため入院。 ワクチン接種翌日、軽快し、退院。	アナフィラキシー	FM023B	回復	2	OA委員:1 OB委員:1 OC委員:1	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	ブライデン分類3以上のアナフィラキシー症例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。 OB委員:レベル1のアナフィラキシーと考える。	ブライデン分類3以上のアナフィラキシー症例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
北里 -3	36歳・女性	アレルギー歴:卵アレルギー、牛乳アレルギー	ワクチン接種5分後、施行10分後頃より、咽頭痛、嘔声、息苦しさが出現。その後、顔面四肢にじんましんと思われる浮腫、発疹が出現。SpO2:80まで低下。アナフィラキシー(呼吸性)を考慮。生食にてルーサーキープ後、ヒドコロチゾンコハク酸エステルナトリウム100mg、アミノフィリン200mgを点滴内に注入。 ワクチン接種30分後、徐々に呼吸困難は改善し、SpO2:96まで改善。眼窩周囲の浮腫出現。他院へ連絡し救急搬送。 他院到着時には軽度喘鳴聴取するも、room airにてSpO2保たれており、笑顔も見られる。全身状態良好。その後、症状は安定。翌日、退院となる。	アナフィラキシーショック	FB065B	回復	1	OA委員:1 OB委員:1 OC委員:1	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:尋麻疹は皮膚Major症状、喘鳴は呼吸器のMajor症状。 OB委員:レベル1のアナフィラキシーと考える。	ブライデン分類3以上のアナフィラキシー症例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
北里 -4	4不明・不明	無	ワクチン接種後、アナフィラキシー(呼吸困難、喘鳴、喉頭浮腫)出現。	アナフィラキシー	不明	回復	1	OA委員:4 OB委員:4 OC委員:4	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:情報不足で評価できない	OA委員:呼吸器以外の症状が記載されていないため、十分な情報がなく、判断できない。 OB委員:アナフィラキシーの定義は満たさないが、ワクチンによるアレルギーと考える。 OC委員:情報不足。	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON 分類レベル (企業評価)	専門家の評価		
								ブライTON分類 レベル	因果関係	意見
北里 一5	54歳・女性	既往歴：気管支喘息、アレルギー歴：ヨモギ、スギ、ハンノキ	ワクチン接種5分後、体温：38.6度。接種部位（左上腕）より、左手の先にかげのしびれが広がる。右上肢のみ3分所、直後10～15mmの膨疹、発赤出現。ワクチン接種23分後、アレルギー反応3分所、直後10～15mmの膨疹、発赤出現。ワクチン接種11分所、直後10～15mmの膨疹、発赤出現。ワクチン接種35分後、全身の悪寒出現。体温：38.5度、SpO2:98%（室内）、HR:70～80/分、血圧：110/66とバイタル安定したが、全身の悪寒ひどく救急搬送。搬送後、下肢にもアレルギーと思われる発疹認められる。ワクチン接種約5時間、点滴、内服にて症状治まり、帰宅。	アナフィラキシー	FB066A	回復	4	OA委員：4 OB委員：5 OC委員：4	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：皮膚症状以外の症状が記載されていないため、十分な情報がなく、症例定義に合致するかどうか判断できない。 OB委員：アナフィラキシーの定義は満たさないが、ワクチンによるアレルギーと考ええる。 OC委員：局所の膨疹、発赤と下肢の皮疹、悪寒。
北里 一6	63歳・男性	アレルギー歴：卵アレルギー（加熱してあれば可）、牛乳アレルギー（現在飲用可）	ワクチン接種15分後、全身悪寒を認めた。診察し、悪寒、呼吸状態に異常のないことを確認し、ケチアフェンフルマシドを処方。診察室から出た後、トイレで失神。全身チアノーゼが出現した。アナフィラキシーショックと診断し、0.1%アドレナリン0.2ml皮下注射したところ悪寒状態回復し、チアノーゼも消失。劇的に改善した。動脈血酸素飽和度：97～99%、心拍数：130/分。他院へ救急搬送となる。ワクチン接種（時間49分後、他院到着）。救急室で、意識清明、全身性に掻痒を訴う膨疹を認め、経過中、嘔吐、下痢は認めなかった。ヒドロコルチゾン50mg、エピネフリン0.5mg、エピナスチン塩酸塩倍量内服にて加療実施。徐々に膨疹が改善し、アレルギーの2峰性反応出現がないことを確認。 ワクチン接種3日後、退院。退院時、エピナスチン塩酸塩1% 13mg（計7日間）処方。	アナフィラキシーショック	FM028D	回復	2	OA委員：4 OB委員：1 OC委員：2	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：全身悪寒は皮膚のMajor症状であるが、チアノーゼだけでは呼吸器病には該当しない。また、失神だけでは循環器の基準には該当しないため、皮膚症状以外の症例定義に合致しないと考えられる。 OB委員：レベルのアナフィラキシーと考える。
微研 会-1	730歳・女性	食物アレルギー（リンゴ、クワ）など数多くのアレルギーを 持っている。 既往：気管支喘息、食道カンジダ、高脂血症	ワクチン接種15分後に咳嗽、呼吸苦、悪寒、鼻汁、眼結膜充血が出現。SpO2:97%、心拍81回/分、血圧84/50mmHgに低下。アドレナリンを投与し、メチルpredニソロン50mg、エピナスチン50mg、クロルフェニラミンを点滴投与し、意識は清明だが眼紅等を認めた。いったん帰宅し、翌日に再診。症状が認められるため大事をとって入院。6日後には回復した。	アナフィラキシーショック	HE34A	回復	1	OA委員：1 OB委員：1 OC委員：1	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：尋麻疹は皮膚Major症状、咳嗽・呼吸苦は呼吸器のMajor症状とするとレベル1。 OB委員：レベル1のアナフィラキシーと考える。
微研 会-2	843歳・女性	花粉症 2月前後頃 副反応歴：インフルエンザワクチン接種後に発熱あり	ワクチン接種1時間後にそう痒、接種2時間後に5～6cmの注射部位紅斑が出現。接種10時間後、夕食後20分経過して倦怠感が著明となり、アナフィラキシー様症状（咽頭浮腫、呼吸困難、嘔吐、腹痛、下痢等）が出現。ベタメタゾン、d-クロルフェニラミン、エピナスチン50mgを内服するも症状持続したため、1時間後に救急外来を受診。診察時には症状は軽減。12 x 13cmの注射部位腫脹、注射部位紅斑を認め、ステロイド剤の内服処方にて帰宅。同日に回復した。	アナフィラキシー そう痒、アナフィラキシー様反応、倦怠感、注射部位腫脹、注射部位紅斑	HE36A	回復	4	OA委員：4 OB委員：1 OC委員：2	OA委員：因果関係は情報不足で評価できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：接種局所の反応と呼吸器症状のみで症例定義に合致するとは判断できない。 OB委員：レベル1のアナフィラキシーと考える。 OC委員：局所反応（+）、皮膚症状（major）血管浮腫（+）、呼吸器症状（minor）喉頭の浮腫
微研 会-3	96歳・女性	卵、小麦アレルギーなどの食物アレルギーあり。6ヶ月よりアナフィラキシーショック既往あり。	ワクチン接種後すぐに咳込み、気管支腫れと悪化する。呼吸器は清音が健聴傾向、血圧80/40mmHgに低下。SpO2:98%。直ちに点滴ラインを確保。アドレナリン投与し、その後は意識清明。ヒドコルチゾン50mg、エピナスチン50mgを点滴投与し、プロカチロール塩酸塩水和物吸入、2回目のアドレナリン投与を施行し救急搬送。到着時、意識清明、血圧126/76mmHg、SpO2:98～99%。経過観察のため入院。翌日には回復を確認し、退院。	アナフィラキシー	HE36A	回復	4	OA委員：4 OB委員：2 OC委員：2	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：症例定義に合致するとは判断できない。 OB委員：レベル2のアナフィラキシーと考える。
微研 会-4	1033歳・女性	副反応歴：インフルエンザワクチンで注射部位発赤、注射部位腫脹	ワクチン接種（時間）後、右大腿に掻痒を訴う尋麻疹、喉の違和感が出現。呼吸苦はなく、症状安定し、当日中に軽快した。	アナフィラキシー	HA128B	軽快	3	OA委員：3 OB委員：5 OC委員：3	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：喉の違和感と呼吸器のMinor症状、接種局所の尋麻疹は皮膚のMinor症状と考えたとレベル3。 OB委員：アナフィラキシーの定義は満たさないが、ワクチンによるアレルギーと考ええる。 OC委員：皮膚症状（minor）局所反応（+）、呼吸器

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル (企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
								ブライトン分類レベル	因果関係	意見	
化血研 研-5	11 31歳・女性	既往：過敏気症候群 20才頃	ワクチン接種3分後に動悸、喉のつまりを感じ、喉の紅潮、平腫が発現。咽頭浮腫、胸部喘鳴はない。血圧120/80mmHg、SpO ₂ 98%、脈拍110回/分。酸素吸入を行っても軽快せず。過敏気症候群を疑いエチナゾラム錠を投与したが軽快せず。発現1時間後に生食、ヒドロコルチゾン/コハク酸エステルナトリウムを点滴投与し症状軽快。ベタメゾン、d-グルコチゾン/エタゾラム錠を点滴投与し、エチナゾラム錠の内服を処方し帰宅。発現から約2時間後に同様の症状が発現し再診。生食、ヒドロコルチゾン/コハク酸エステルナトリウムを静注投与し症状軽快。プレドニゾロンを処方。その後は再燃なく、接種6日後に回復した。	アナフィラキシー	HA128C	回復	2	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：喉の詰まる感じや喉の息苦しさは呼吸器のMinor症状と考える。 OB委員：レベル2のアナフィラキシーと考える。	ブライトン分類3以上のアナフィラキシー症の例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	
化血研 研-1	12 47歳・女性	無	1回目インフルエンザH4ワクチン“化血研”接種。 ワクチン接種5分後、気分不良、呼吸苦(息苦しい感じ)。 ワクチン接種20分後、前胸部～顔面発疹(蕁麻疹様)、悪寒。 LR4500にて10分経過後、BT37.6℃。 ワクチン接種25分後、ヒドロコルチゾン/リン酸エステルナトリウム300mg静注。 ワクチン接種40分後、呼吸苦増強。点滴専用アミノフィリン注射液 1/2A静注。 ワクチン接種50分後、救急車にてA医療センターへ搬送。 転院後は、症状軽快し同日帰宅。 アナフィラキシー(の疑い)は回復。	アナフィラキシー反応	348A	回復	5	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：呼吸器は呼吸器のMinor症状、前胸部から顔面にかけての蕁麻疹は皮膚のMinor症状と考えられる。 OB委員：レベル2のアナフィラキシーと考える。 OC委員：皮膚、皮疹。	ブライトン分類3以上のアナフィラキシー症の例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	
化血研 研-2	13 1歳・男性	食事アレルギー	卵アレルギー歴あり。 食事アレルギーの既往あり。 医薬品副作用歴なし。 昨年のインフルエンザワクチンは接種されておらず、今回が出生後初めての接種。 初回インフルエンザH4ワクチン“化血研”接種。 ワクチン接種約30分後、顔面に蕁麻疹発現。 ワクチン接種約35分後、喘鳴、咳、嘔吐。 エドニファン0.1mL筋注、サルブタモール硫酸塩、プロムヘキシン塩酸塩製剤吸入にて喘鳴消失。 ワクチン接種50分後、蕁麻疹増悪。 シプロヘキサジン塩酸塩水和物処方し帰宅。 アナフィラキシーショックは回復。 アナフィラキシーショックは回復。 血圧など有害事象に係る検査値などは測定していない。 ワクチン接種翌日 12:00頃に電話で転院確認もアナフィラキシー症状もなく回復しているとの事。	アナフィラキシーショック	不明	回復	5	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：顔面の蕁麻疹は皮膚のMajor症状、喘鳴は呼吸器のMajor症状。 OB委員：レベル1のアナフィラキシーと考える。	ブライトン分類3以上のアナフィラキシー症の例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	
化血研 研-3	14 79歳・男性	無	アレルギー歴なし。過去の副作用歴なし。 昨シーズン、化血研インフルエンザワクチン接種あり。 20年接種前交通事故。現在は精神科通院中。内服あり。 毎年接種に来院しており、本年も接種しに来院。 1回目インフルエンザH4ワクチン“化血研”接種。 ワクチン接種約15分後、気分不良、血圧低下、顔色不良など(便秘禁も)症状出現。 血圧軽症で80、SpO ₂ 98～99%、HR50～60。 ルミット投与。アトロピン硫酸塩、O ₂ 投与、ヒドロコルチゾン/コハク酸エステルナトリウム使用にて症状軽快傾向。 A病院へ搬送。 A病院で回復され当日の退院も言われるが、大事を取って入院。 アナフィラキシーは軽快。	アナフィラキシー反応	352B	軽快	2	OA委員：因果関係は不明 OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない	OA委員：測定された血圧低下を循環器のMajor症状としても、それ以外の臓器症状の記載がなく、症例定義に合致するとは判断できない。 OB委員：アナフィラキシーと迷走神経反射の両者の可能性がある。	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライトン 分類レベル (企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
								ブライトン分類 レベル	因果関係	意見	
化血 研-7	19歳・男性	無	卵アレルギーあり。医薬品副作用歴不明。 昨シーズン、2回のインフルエンザワクチン（メーカー名不明）接種あり（異常なし）。 1回目 インフルエンザHAワクチン“化血研”、2回目 水痘ワクチン同時接種。 ワクチン接種5分後 後頭部発赤。他の症状は無し。 ワクチン接種15分後 機嫌不良。 ワクチン接種21分後 アドレナリン注射液0.1mL皮下注。 ワクチン接種28分後 機嫌改善。 ワクチン接種32分後 機嫌改善。 アナフィラキシーは回復。	アナフィラキシー反応	351A	回復	5	OA委員：因果関係は 否定できない OB委員：因果関係は 否定できない OC委員：因果関係は 否定できない	OA委員：同時接種例であることおよび診断の必須 条件を満たさない。 OB委員：アナフィラキシーの定義は満たさないが、 ワクチンによるアレルギーの可能性はある。 OC委員：原因ワクチンの特定は困難である。	アナフィラキシーとは 判断できない。 ワクチン接種との因 果関係は否定できな い。	
化血 研-8	20歳・男性	尿路感染症の発熱	1ヶ月以内の尿路感染症の発熱、卵アレルギーあり。 医薬品副作用歴不明。 昨シーズン、化血研インフルエンザワクチン接種なし。 1回目 インフルエンザHAワクチン“化血研”、1回目 水痘ワクチン、1回目 おたふくか ぜワクチン同時接種。 ワクチン接種15分後 顔部発赤、膨疹軽度、機嫌不良、これ以外の症状無し。 ワクチン接種21分後 アドレナリン注射液0.1ml皮下注。 ワクチン接種25分後 機嫌悪化が後頭部発赤消失。 ワクチン接種28分後 アドレナリン注射液0.1mL皮下注。 ワクチン接種38分後 機嫌改善。 ワクチン接種55分後 症状改善。 アナフィラキシーは回復。	アナフィラキシー反応	352B	回復	5	OA委員：因果関係は 否定できない OB委員：因果関係は 否定できない OC委員：因果関係は 否定できない	OA委員：同時接種例。皮膚症状以外の記載がなく、 診断の必須条件を満たさない。 OB委員：アナフィラキシーの定義は満たさないが、 ワクチンによるアレルギーの可能性はある。 OC委員：原因ワクチンの特定は困難である。華麻 疹。	アナフィラキシーとは 判断できない。 ワクチン接種との因 果関係は否定できな い。	
化血 研-9	21歳・男性	無	昨年インフルエンザHAワクチン“化血研” 2回目接種後、華麻疹出現。過去の接種 歴、2回目である事、発赤、部位の腫脹もない事等より関連性は少ないと考えてい た。 アレルギー歴不明。 日付不明 念のため今年度は1回目をインフルエンザHAワクチン“化血研”0.05mL + 0.45mLの2 回に分けて注射を要請。 この時は、特に異常なし。 2回目 インフルエンザHAワクチン“化血研”0.5mL単回で接種。 ワクチン接種5分後 不快感が生じた。全身の華麻疹、咳嗽出現。 嘔声はなし。血圧正常、意識清明、SpO2 97%。喘鳴は聴取されなかった。 外来対応可との判断で、念のためヒドロコルチゾン/コハソルエンステルナリウム注射 剤、ヒドロキシジン塩酸塩注射液の点滴静注を行った。 ワクチン接種1時間50分後 症状は完全に消失し、念のためケトチフェンブマル酸塩処 方した。 アナフィラキシー（軽症）は回復。	アナフィラキシー反応	366B	回復	2	OA委員：因果関係は 否定できない OB委員：因果関係は 否定できない OC委員：因果関係は 否定できない	OA委員：華麻疹は皮膚のMajor 症状、咳は呼吸器 のMinor症状とすれば、レベル2。 OB委員：レベル2のアナフィラキシーと考える。	ブライトン分類3以上の アナフィラキシー症 例。 ワクチン接種との因 果関係は否定できな い。	

No.	No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	ロット	転帰	ブライTON分類レベル (企業評価)	専門家の評価			事務所総合評価
									ブライTON分類レベル	因果関係	意見	
化血研-10		2216歳・男性	無	アレルギー歴なし。医薬品副作用歴なし。 昨シーズン、化血研インフルエンザワクチン接種の有無：なし。 予診票での留意点：なし 兄が重度のアトピー性皮膚病を有している。 1回目インフルエンザH1N1ワクチン“化血研”接種。 ワクチン接種10分後 接種後、椅子に座して安眠していたが、そのまま横に臥床（本人自覚有）一瞬意識喪失し母親に援助訴え、歩いて処置室へ移動（接種後10分）。 皮膚症状：無し。循環器系症状：後脈、脈拍が微弱、但しすぐに回復。呼吸器系症状：無し。消化器症状：便秘気味。臨床検査値等：SpO2は正常。 血圧：正常。心電図：異常（+）、急激な血圧低下BD70/30、後脈。 ワクチン接種13分後 BD:90/30、意識（+）。 ワクチン接種20分後 血圧確保し、点滴開始。脈拍48/min、SpO2:88% ワクチン接種40分後 BD:102/36、脈拍49/min、SpO2:90% ワクチン接種47分後 意識清明、顔色良。 ワクチン接種55分後 排尿、排便多量と数便。 ワクチン接種1時間32分後 煩躁多量と数便。 ワクチン接種1時間55分後 全身状態良好。 ワクチン接種2時間35分後 BD:110/58、脈拍56、KT:36.4℃ ワクチン接種3時間15分後 BD:110/60、帯毛。 アナフィラキシーは回復。 ワクチン接種翌日 外来受診時、全身状態良好。本人全くどうもありません。注射嫌いで接種時痛かったとの事。	アナフィラキシー反応	362B	回復	2	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない OA委員：4または5 OB委員：5 OC委員：5	OA委員：2つ以上の器管系症状がなく、診断の必須条件を満たさない。血管迷走神経反射の可能性もある。 OB委員：迷走神経反射と思われる。 OC委員：森田委員 点滴開始後のSPO2の低下だけが血管迷走神経反射に合っていないが、処置前のSPO2は正常であったことなどの血管迷走神経反射と判断する。 アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。		
デンカ-147		231歳・女性	喘息	A病院にて左上院外側にインフルエンザワクチン接種。接種後は特に問題なく帰宅。 ワクチン接種65分後 機嫌が悪いと連絡あり、再来院指示。 ワクチン接種80分後 来院時、やや顔色不良、随時呼吸あり、SpO2 93%とやや低下してアナフィラキシーショックを考へB病院に搬送。B病院到着時、SpO2 96%まで改善、身体所見上は四肢 体幹に散在する膨疹のみ。インフルエンザワクチンの副反応としてアナフィラキシーを疑ったと考へるとの女性の経過を取る可能性があり、ルーテール投与-H1N1プロテクターを投与の上、経過観察。 約1時間半後に再度SpO2の低下、顔赤呼吸やstidor認め、プレドニロン点滴及びβ刺激薬吸入を行い、呼吸状態は改善、血圧低下は認めずアドレナリンの使用なし。A病院より処方されたブランルカスト水和物は継続、β刺激薬貼付の上、明朝再度外来受診。 ワクチン接種1日後 軽快、状態安定後はA病院にてフォロー。 B病院処方：プロテクトール 0.5mg 1枚/日。	アナフィラキシーショック	488-A	軽快	1	OA委員：1 OB委員：1 OC委員：1	OA委員：因果関係は否定できない OB委員：因果関係は否定できない OC委員：因果関係は否定できない OA委員：呼吸器と皮膚のMajor症状がある。 OB委員：レベル1のアナフィラキシーと考へる。	ブライTON分類3以上のアナフィラキシー症例。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	
デンカ-2		2481歳・女性	無	ワクチン接種30分後 両大腿に発赤・かゆみが発現し徐々に増悪、体幹にも広がる。 ワクチン接種80分後 来院、ワクチンによるアレルギーと診断。オロハダジン超投与2分2、メタメタソリン、α-クロルフェニラミン、アミンピリン、ジフルレドナート投与。 ワクチン接種4日後 回復。	アナフィラキシー	485-B	回復	4	OA委員：5 OB委員：5 OC委員：4	OA委員：診断の必須条件を満たさない。 OB委員：アナフィラキシーの定義は満たさないが、ワクチンによるアレルギーと考へる。	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。	

インフルエンザワクチン接種後のGBS/ADEMの可能性のある症例まとめ

2013年10月1日～2014年7月31日入手分まで

【選択基準】

○GBS、ADEMの副反応名で報告された症例

○重篤副作用マニユアル③GBSの項に基づき、副反応名として「しびれ、脱力感、神経障害、筋力低下、物が飲み込みにくい」といったタームで報告された症例

○上記タームが経過欄に記載のある症例

報告元	症例数	専門家の評価によりGBS/ADEMとして否定できないとされた症例	
		GBS	ADEM
医療機関	9	2	5
製造販売業者	9	2※	2

※GBSの亜型であるFisher症候群として否定できないとされた症例を含む

専門家の評価によりGBS/ADEMとして否定できないとされた症例リスト

報告元	No.	年齢	性別	基礎疾患	ワクチン接種からの日数
医療機関	2	43歳	女	シェーグレン症候群、自己免疫性甲状腺炎、季節性アレルギー、透析	4日後
製造販売業者	3	11歳	女	視力障害	13日後
医療機関	6	70歳代	女	狭心症、冠動脈バイパス、糖尿病	12日後
医療機関	7	2歳	女	なし	18日後 (2回目 4日後)

医療機関	8	65歳	男	間質性肺疾患、冠動脈 バイパス、冠動脈ステ ント挿入、冠動脈ステ ント挿入、脊椎手術、糖尿 病、高血圧、高脂血症	5時間後
製造販売業者	10	50歳	男	尿管結石、胃食道逆流 性疾患、食物アレルギー	2日後
製造販売業者	11	25歳	女	なし	6日後
製造販売業者	12※	39歳	女	アレルギー性鼻炎	3週間後
医療機関	13	43歳	女	副鼻腔炎、アトピー	3日後
医療機関	15	33歳	男	なし	3日後
医療機関	16	2歳	男	なし	28日後 (2回目 11日後)

※GBSの亜型であるFisher症候群として否定できないとされた症例

50

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	重篤/非重篤	ロット	転帰	専門家の意見	ワクチンと副反応との因果関係評価 (事務局評価)
6	70歳代・女性	狭心症 交感神経ハイバース 睡眠障害	死亡報告一覧を参照	脳炎	重篤	481-A	死亡	OA委員 インフルエンザワクチン接種後、アゼレニジピンが新たに開始されており、脳炎の報告はないとされるものの、因果関係も考えられる。アゼレニジピン開始後の血圧の記載がないが(正解であった)ということか？。急激による高血圧性脳症などの可能性はないのだろうか？接種12日後の発熱は上気道症状等、他の感染徴候はなかったのか？脳液糖の低下がある等、血糖の低下(80)のもので考えようとする。アDEMとすれば、時間的関係からは十分ありうると考えられ、また、急性脳炎、脳症とすれば、インフルエンザワクチン接種から時間がやや経ち過ぎている可能性もあり、別の要因である可能性も高い。接種12日後の発熱の原因(ウイルス性等)による急性脳炎、脳症は考えやすい。 OB委員 脳脊液検査で、細胞数増加がないが、一般的なADEM診断基準は脳脊液検査を前提としておらず、診断基準上問題はない。ADEMとした事象が原因となって発生したことは経過から明らかであると判断する。 OC委員 脳脊液検査で明らか炎症性変化がないとしても、完全に偶発的に合併した脳炎の可能性を排除することは困難ではある。しかしながら、担当医の意見と同様に、可能性の順位を換算するとすれば、ワクチン接種による副反応の可能性が考えやすいと思う。死亡の原因は脳炎と考えられるが、脳炎とワクチン接種との因果関係については、確定することは困難であるものの、因果関係を否定できないと考える。	ADEMの可能性は否定できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
7	72歳・女性		接種当日 A病院にて1回目インフルエンザワクチン接種。 接種後 胸部に痒み・腫れ出現。 接種8日後 鼻汁出現。 接種10日後 鼻汁出現。 接種14日後 2回目インフルエンザワクチン接種。 接種16日後 38℃台の発熱、鼻汁、咳、急激低下。この頃より、あまりいやべらなくなってきたが元氣はあった。 接種18日後 歩行時のふらつき(向かにつきまらないうと掛けない)。手がふるえるえこップを片手でもてなく両手で持つ(書物は片手でコップを持つて飲むことができる)。夕食のうどんをフォークを替わらず手づかみで食べ、元氣もなくなってきたため、B病院緊急外来を受診。症状経過、診察所見、血液・脳液・尿検査、頭部MRIより急性散在性脳脊髄炎と診断し入院。 接種19日後 メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(160mg)パルス療法(3日間)、人免疫グロブリン大量療法を施行。 接種21日後 発熱改善傾向出現。 接種22日後 プレドニゾン入院開始。 接種25日後 つかまってい立てるようになる。 接種29日後 歩行できるようになる。 接種37日後 再発に注意しつつ、入院下でプレドニゾン減量開始し経過観察中。 接種92日後 受診前の状態に戻り、回復と判断。	急性散在性脳脊髄炎	重篤	481-A 486-A	回復	OA委員 ワクチン接種8日目の発症でワクチンとの関連性を疑わせる。MRIでも多発性の異常所見をみ、ADEMでの可能性が高い。 OB委員 ワクチンによるADEM発症は否定できない。 OC委員 担当医の意見と同様、先行する感冒症状あり、予防接種とどちらが有症に関連して発症した急性散在性脳脊髄炎であるかを断定できないものの、時間的な関係からは、予防接種との関連を否定できない。	ADEMの可能性は否定できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。

[illegible]

No.	年齢・性別	既往歴	経過	副反応名	重篤/非重篤	ロット	転帰	専門家の意見	ワクチンと副反応との因果関係評価 (事務局評価)
14	29歳・女性		接種当日、接種前の体温37.4℃であったが、特に上気道症状などなく接種可と判断し、A医院にてインフルエンザHAワクチンを接種。 接種7日後、発熱が出現。 接種14日後、腎臓病などで自宅に様子を見ていたが軽快せず。B病院へ入院。 発症日より不明な精神症状が現れ(統合失調症が疑われ、C病院へ紹介。 外来通院中に血尿が強く現れる。 接種23日後、終末末期は否定され、B病院泌尿器科を受診。症状よりD病院神経内科に紹介。 D病院にてADEMではないかと診断に至った。	精神症状 血尿 急性散在性脳脊髄炎 発熱	重篤	HAI32E	不明 不明 未回復 不明	〇A委員 ワクチン接種後7日目の発症で時間的には因果関係を認められる。ただし、精神症状の内容の記載、神経症状の有無、画像所見などなく、ADEMと診断する根拠がない。 〇B委員 判断するには情報不足である。 〇C委員 診断が妥当であれば、因果関係について否定できない。	情報不足で判断できない。
15	38歳・男性		接種当日、A病院にてインフルエンザHAワクチン1回目を接種。 接種3日後頃、倦怠、頭痛等の感冒症状が発症。 接種4日後頃、右腕の指先の痺れを認め、B病院眼科を受診。球後視神経炎の診断。 接種12日後、頭痛と視力低下を認め、A病院にて治療され1100mLの点滴を受ける。 接種13日後、排尿困難、視力低下、歩行障害の悪化を認め、C病院へ紹介され緊急入院。 入院時意識清明、視力は右光覚井、左指差井であり、上下肢屈伸肘亢進、左優位の上下肢4/5程度の筋力の筋力低下、Tn4以下の感覚障害、膀胱直腸障害を認めた。髄液検査にて細胞数、蛋白の上昇を認めた。脊髄MRIにてC3以下に長大損傷を認め、視力障害の原因として球後視神経炎によるものと考えられた。 メチルコバルトニオンロンパルス療法開始。診察にて球後視神経炎、神経因性膀胱、歩行障害、感覚障害あり。頭部MRIにて病変を認め、急性散在性脳脊髄炎の診断。 視力障害と歩行障害はステロイドパルス療法を3回施行し軽快したが、しびれと神経因性膀胱は残存している。 接種64日後、退院。	急性散在性脳脊髄炎	重篤	HE36A	未回復	〇A委員 接種後4日目に神経症状が出現し、ADEMとしてはやや発症が早い。しかし臨床症状、画像はADEMと一致し、他に原因がない、ワクチンによるADEMの可能性が高い。 〇B委員 ADEMでない。抗AQP4抗体の有無はワクチン接種による免疫介在性神経障害を否定するものではない。 〇C委員 発症時期よりワクチン接種との因果関係は否定できない。	ADEMの可能性は否定できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
16	2歳・男性		接種当日、A医院にて、インフルエンザHAワクチン2回目を接種。 接種17日後、A医院にて、インフルエンザHAワクチン2回目を接種。 接種28日後、嘔吐、腹痛、食欲不振、全身倦怠感等が発症。B病院受診し輸液を施行。 接種29日後、食欲低下、全身倦怠感増悪。全身体格にてB病院を受診し、C病院へ紹介入院。 接種30日後、水分摂取困難、徐々に攻撃的行動の悪化を認め、呼吸困難となり呼吸器科急患化。 接種31日後より、脱力状態、徐々に呼吸器科を施行開始。 接種34日後、呼吸器科下床を来し、人工呼吸器を施行開始。 接種34日後、顔面中の至白細網膜出血の所見、末梢神経伝達速度の消失の所見より、ギラン・バレー症候群と診断。 血液凝固因子減少、脳液中の至白細網膜出血の所見、末梢神経伝達速度の消失の所見より、ギラン・バレー症候群と診断。 接種35～39日後、急速クロリン補正法(乾燥スルホ化人免疫グロブリン45g/日を静注投与)を施行。 接種42日後、投与後、理学療法を開始。徐々に筋力の回復を認めた。 接種75日後、徐々に状態は改善し、退院。退院時は散歩の歩歩可能。経口摂取可能な状態で、発症前の7割程度回復。以後、定期外来通院。	ギラン・バレー症候群	重篤	HAI36E	軽快	〇A委員 接種後約10日目の発症でワクチンとの関連性は強く疑われる。髄液の蛋白も上昇しているし、電気生理学的にも異常が確認されている。ワクチンによるGBSと判断出来る。 〇B委員 妥当であろう。 〇C委員 ワクチン接種と副作用の発現状況、時間的關係、症状等の経過から、ワクチン接種とギラン・バレー症候群の因果関係は肯定できない。	GBSの可能性は否定できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
17	6歳・女性	喘息 アトピー性皮膚炎	接種当日、当該ワクチン接種。 接種7日後頃、接種直後や夜間に発熱した。 接種8日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種9日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種10日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種11日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種12日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種13日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種14日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種15日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種16日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種17日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種18日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種19日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種20日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種21日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種22日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種23日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種24日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種25日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種26日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種27日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種28日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種29日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種30日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種31日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種32日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種33日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種34日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種35日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種36日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種37日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種38日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種39日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種40日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種41日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種42日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種43日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種44日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種45日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種46日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種47日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種48日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種49日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種50日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種51日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種52日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種53日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種54日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種55日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種56日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種57日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種58日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種59日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種60日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種61日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種62日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種63日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種64日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種65日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種66日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種67日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種68日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種69日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種70日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種71日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種72日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種73日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種74日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種75日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種76日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種77日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種78日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種79日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種80日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種81日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種82日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種83日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種84日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種85日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種86日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種87日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種88日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種89日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種90日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種91日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種92日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種93日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種94日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種95日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種96日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種97日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種98日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種99日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種100日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。	歩行障害 強神経炎	重篤		不明 不明	〇A委員 情報不足で評価不能 〇B委員 記載されている情報からはワクチン接種後のADEMが妥当である。 〇C委員 ワクチン接種後3か月後に症状が出現したのであれば、時間的關係から他の要因によるADEMの可能性が高くなる。ただし情報不足で、3か月以内にウイルス感染や間接的な情報がなかったとしても、はっきりさせる必要がある。	情報不足で判断できない。
18	43歳・女性	シェーグレン症候群	接種当日、当該ワクチン接種。 接種7日後頃、接種直後や夜間に発熱した。 接種8日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種9日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種10日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種11日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種12日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種13日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種14日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種15日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種16日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種17日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種18日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種19日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種20日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種21日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種22日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種23日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種24日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種25日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種26日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種27日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種28日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種29日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種30日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種31日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種32日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種33日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種34日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種35日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種36日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種37日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種38日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種39日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種40日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種41日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種42日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種43日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種44日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種45日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種46日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種47日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種48日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種49日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種50日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種51日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種52日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種53日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種54日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種55日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種56日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種57日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種58日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種59日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種60日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種61日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種62日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種63日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種64日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種65日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種66日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種67日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種68日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種69日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種70日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種71日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種72日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種73日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種74日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種75日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種76日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種77日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種78日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種79日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種80日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種81日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種82日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種83日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種84日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種85日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種86日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種87日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種88日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種89日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種90日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種91日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種92日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種93日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種94日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種95日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種96日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種97日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種98日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種99日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。 接種100日後頃、接種直後や夜間に発熱しやすくなったが軽快していった。	急性散在性脳脊髄炎	重篤		不明	〇A委員 情報不足で評価不能 〇B委員 記載されている情報からはワクチン接種後のADEMが妥当である。 〇C委員 ワクチン接種後3か月後に症状が出現したのであれば、時間的關係から他の要因によるADEMの可能性が高くなる。ただし情報不足で、3か月以内にウイルス感染や間接的な情報がなかったとしても、はっきりさせる必要がある。	情報不足で判断できない。

平成 26 年 10 月 1 日現在

1. 症例一覧表

No.	年齢・性別	基礎疾患（持病）など	経過・死亡原因	報告医評価	製造販売業者 ロット	調査の結果	報告日 調査会評価
①	90 歳 代・男性	良性前立腺肥大症、単径ヘルニア、不整脈、高血圧、高尿酸血症、胃炎、高カリウム血症、肺炎	平成 25 年 11 月 2 日接種 同日夜、発熱し救急搬送。重症肺炎、敗血症、貧血と診断され、翌日死亡。血液培養により <i>Streptococcus bovis</i> が検出され、最終的な死因は敗血症性ショックとされた。	評価不能	阪大微研 HA130A	<i>Streptococcus bovis</i> による敗血症が死因と考えられ、ワクチン接種との因果関係は否定的である。	平成 25 年 11 月 6 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会
2	10 歳未 満・男性	染色体異常症、唇顎口蓋裂（術後）、心房中隔欠損（術後）、左主気管支狭窄、片側性巨脳症、症候性局在関連性てんかん	平成 25 年 11 月 5 日接種 接種 2 日後、起床時から様子がおかしく、かかりつけ病院到着時には心肺停止状態であった。蘇生処置にて一旦心拍再開するも、同日死亡が確認された。剖検は実施されておらず、死因は不明だが、染色体異常に伴う病態が考えられた。同時接種ワクチンなし。	評価不能	化血研 348B	基礎疾患が死亡の原因となった可能性がある。	平成 25 年 11 月 8 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会
3	90 歳 代・女性	高血圧、脂質異常症、慢性うっ血性心不全、胆石症	平成 25 年 11 月 12 日接種 接種翌朝、起床数時間後、手が冷たく、反応が無い状態で発見。救急搬送先にて死亡確認。死亡時画像診断の結果から、慢性心不全の	関連なし	阪大微研 HA129C	死亡原因は明らかではないが、ワクチン接種との因果関係は考えにくい。	平成 25 年 11 月 22 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会

				急性増悪による死亡が考えられるとされた。								
4	90 歳 代・女性	高血圧、心房細動、骨粗鬆症、圧迫骨折、狭心症、心不全、食物アレルギー、肺炎	平成 25 年 11 月 14 日接種 接種 3 日後以降に発熱、息苦しさの増悪が認められ、接種 11 日後の死亡。死因は肺炎。剖検は実施されていない。	評価不能	阪大微研 HA128B	ワクチン接種による死亡とは考えにくい。	平成 25 年 11 月 26 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会					
⑤	80 歳 代・男性	起立性低血圧、統合失調症	平成 25 年 10 月 21 日接種 本剤接種 22 日後、肺炎球菌ワクチンを接種。本剤接種 28 日後、血小板減少、腎不全及び精神神経症状から血栓性血小板減少性紫斑病と診断された。本剤接種 41 日後に死亡。死因は多臓器不全とされた。剖検が実施されたが、結果は得られなかった。	関連なし	デンカ生研 479-B	情報不足のため、血栓性血小板減少性紫斑病とは判断できず、ワクチン接種との因果関係も判断できない。	平成 25 年 12 月 9 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会					
⑥	70 歳 代・女性	糖尿病、冠動脈バイパス、狭心症	平成 25 年 11 月 8 日接種。 接種 12 日後以降に発熱、幻覚などの脳炎症状が認められ、接種 41 日後、脳炎による呼吸不全、多臓器不全にて死亡。剖検は実施されていない。	関連あり	デンカ生研 481-A	急性散在性脳脊髄炎の可能性は否定できない。ワクチン接種との因果関係は否定できない。	平成 25 年 12 月 20 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会					
⑦	80 歳 代・男性	肺炎腫、高血圧、甲状腺機能低下症、慢性心不全	平成 25 年 11 月 6 日接種 接種 5 日後、著明な肝機能障害の発現、腎機能障害増悪、心不全増悪を認め入院。その後改善し退院	評価不能	デンカ生研 491-B	死因は不明だが、ワクチン接種後の症状は改善傾向にあったため、誤嚥	平成 26 年 1 月 6 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会					

			予定となったが、接種 14 日後、心肺停止の状態で見られ、同日死亡が確認された。剖検は実施されておらず、死因は不明だが、誤嚥の可能性も考えられた。			等による死亡が疑われた。ワクチン接種との因果関係は否定的である。	
⑧	80 歳 代・女性	高血圧、糖尿病、慢性腎不全、不整脈、心房細動	平成 25 年 12 月 6 日接種。 接種翌日、呼吸をしていない状態で発見。搬送先にて、同日死亡確認。剖検は実施されておらず死因は不明だが、心血管系疾患が疑われた。	評価不能	化血研 355A	死因は不明だが、心血管系疾患が疑われ、ワクチン接種との因果関係は不明である。	平成 26 年 1 月 6 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会
⑨	80 歳 代・女性	嚥下障害、糖尿病、高血圧症、狭心症	平成 25 年 12 月 27 日接種。 接種数時間後に呼吸障害が発現し、同日死亡。死因は老衰の疑い。剖検及び死亡時画像診断は実施されていない。	評価不能	デンカ生研 491-A	原疾患や老衰の影響が考えられ、ワクチン接種との因果関係は不明である。	平成 26 年 1 月 20 日 平成 26 年 2 月 26 日調査会 (報告) 平成 26 年 10 月 29 日調査会
⑩	90 歳 代・女性	心不全、高血圧、胸部大動脈瘤、慢性大動脈解離、ラクナ梗塞、2 型糖尿病、便秘	平成 26 年 1 月 27 日接種 接種翌日より、発熱、嘔吐、下痢が出現し、ウイルス性腸炎と判断された。接種 4 日後、死亡確認。死因は急性心筋梗塞とされた。剖検は実施されていない。	評価不能	阪大微研 HK15C	情報不足であるが、死因は急性心筋梗塞とされ、ワクチン接種との因果関係は否定的である。	平成 26 年 2 月 3 日 平成 26 年 10 月 29 日調査会
⑪	80 歳 代・男性	高血圧、脂質異常症、糖尿病、関節リウマチ、掻痒症、睡眠障害、慢性閉塞性肺疾患、血清反応陰性関節炎	平成 25 年 10 月 24 日接種 接種翌日より労作時呼吸苦、浮腫等の症状が出現。微小変化型ネフローゼ症候群及びそれに伴う急	関連なし	阪大微研 HK12A	原疾患や免疫抑制剤の影響により発症した肺炎が死因と考えられ、ワク	平成 26 年 4 月 24 日 平成 26 年 10 月 29 日調査会

			性腎不全と診断。接種 65 日後に肺炎を発症し、接種 67 日後、死亡確認。死因は肺炎とされた。剖検は実施されていない。			チン接種との因果関係は否定的である。	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

※○の付いた症例：今回の調査会対象の死亡症例

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

(症例 インフル No.6)

1. 報告内容

(1) 事例

70 歳代の女性。

平成 25 年 11 月 8 日、A 病院にてインフルエンザ HA ワクチンを接種。予診票における留意点の有無は不明。ワクチン接種後異常はみられなかった。

11 月 11 日、B 病院循環器科を定期受診。収縮期血圧 161mmHg、拡張期血圧 80mmHg であり、降圧不十分のため、シルニジピン 10mg1 日 1 回からアゼルニジピン 16mg1 日 1 回に変更された。胸部症状やその他の自覚症状はなかった。HbA1c 6.4%。

11 月 20 日、発熱あり。

11 月 22 日、幻覚出現。内服薬中止。

11 月 23 日、体温 40℃、JCS200 の意識障害で発見され、B 病院に救急搬送された。頭部 CT により脳腫脹が認められ、MRI では大脳半球深部白質に拡散強調像で高信号が認められた。脳炎が疑われ、メロペネム水和物、ミカファンギンナトリウム、アシクロビルの投与が開始された。血液、髄液及び抗体検査の結果は別紙のとおり。

11月25日、JCS200、造影MRIにより大脳半球腫脹、皮質、灰白質の両側性にT2強調像で高信号が認められた。ステロイドパルス療法開始、1日あたりメチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム1000mgを3日間。血液及び抗体検査の結果は別紙のとおり。

12月2日、血液及び抗体検査の結果は別紙のとおり。

12 月 3 日、頭部単純 MRI 及び MRA では、両側後頭葉の一部を除き、ほぼすべての灰白質が、T2 強調像で高信号を示し膨化しているような所見であった。拡散強調像でも灰白質を中心に信号が高く、浮腫が示唆された。強い高信号ではないので、細胞毒性浮腫ではなく血管原性浮腫の可能性が疑われた。脳血流は不均一ながら基底核や側頭葉などで増加し、後頭葉はむしろ脳血流が比較的低下している印象であった。

MRA では、脳底部の血管が比較的細いにもかかわらず末梢まで信号がはっきりとした印象があり、やはり血流が増加している可能性が疑われた。小脳脚などは例外かもしれないが、脳全体に腫脹や血流の増加が認められるような所見で、経過とともに白質の信号よりも灰白質の信号変化が主体であった。

画像検査の結果より、脳炎及び脳症の可能性が疑われたが、臨床経過において、麻痺が主体で痙攣がない、11 月 23 日の髄液検査で脳炎などの可能性が低いなど、画像と一致していない印象もあった。

12 月 5 日、1 日あたりメチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

1000mg を 3 日間。

12月8日、1日あたりデキサメタゾンリン酸エステルナトリウム8mg開始。髄液のヘルペスPCR検査陰性のため、アシクロビルの投与は中止された。

12月9日、血液及び抗体検査の結果は別紙のとおり。

12月12日、1日あたりデキサメタゾンリン酸エステルナトリウム4mgに変更された。ミカファンギンナトリウム投与終了。

12月13日、血液及び抗体検査の結果は別紙のとおり。

12月19日、脳炎による呼吸不全、多臓器不全にて死亡。剖検及び死亡時画像診断は行われていない。

(2) 接種されたワクチンについて

インフルエンザ HA ワクチン (デンカ生研 481-A)

(3) 接種時までの治療等の状況

身長 141cm、体重 50kg。原疾患として糖尿病及び狭心症、閉塞性動脈硬化症があった。平成 12 年に冠動脈バイパス術が実施され、その後、狭心症の症状はみられていなかった。シルニジピン 10mg1 日 1 回、カンデサルタン シレキセチル 4mg1 日 1 回、スピロラクソン 12.5mg1 日 1 回、ファモチジン 20mg1 日 2 回、グリメピリド 2mg1 日 1 回、ワルファリンカリウム 2mg1 日 1 回、ピタバスタチンカルシウム 4mg1 日 1 回、センノシド 24mg1 日 1 回、アスピリン 50mg1 日 1 回を長期間服用。独居生活で、日常生活動作は自立の状態であった。過去のワクチン接種歴及び副反応歴は不明。

2. ワクチン接種と因果関係についての報告医等の意見

搬送先医師：症状の発現時期及びその間の薬剤投与歴からは、ワクチン接種との関連は否定できない。感染性の髄膜脳炎も否定はできないが、髄液所見からは明らかな炎症性悪化がないため、薬剤性の要因が考えやすいと思われる。

アゼルニジピンのみ、接種後に投与開始されているが、これまでに脳炎の報告はなく、他の併用薬剤はいずれも長期投与されているため、併用薬剤と有害事象は関連しない。

糖尿病合併例であり、HbA1c6.4%と良好であったが、易感染性はあるものと思われる、検出できないウイルス性脳炎は否定できない。

3. 専門家の意見

○A 医師：

インフルエンザ HA ワクチンによる脳炎の発症が既知の事象であること、ど

こを発症とするかによるが発症が接種後 12 日～14 日のいずれかであり、接種後発症までの期間が妥当であることから、ワクチン接種と副反応との因果関係は、否定できないと考える。記載された内容から、偶発的に合併した脳炎の可能性を排除することは困難ではあるため、因果関係を確定することも難しいと思う。

神経症候および神経学的所見が十分ではないものの、記載された中枢神経系に帰することのできる所見およびMRI所見、疾患の単相パターンから、the Brighton Collaboration Encephalomyelitis/ADEM Workingの診断確実性レベル 1 に該当すると考えられ、ADEMの診断は妥当と考える。

脳脊髄液検査で明らかな炎症性悪化がないとしても、完全に偶発的に合併した脳炎の可能性を排除することは困難ではある。しかしながら、担当医の意見と同様に、可能性の順位を検討するとすれば、ワクチン接種による副反応の可能性が考えやすいと思う。

死亡の原因は脳炎と考えられるが、脳炎とワクチン接種との因果関係については、上述したように、確定することは困難であるものの、因果関係を否定できないと考える。

○B 医師：

ワクチン接種と副反応との因果関係は否定できない。

臨床症状、MRI 画像検査から ADEM として妥当である。髄液検査で、細胞数増加がないが、一般的な ADEM 診断基準は髄液検査を前提としておらず、診断基準上問題はない。

ADEM とした事象が原因となって死亡したことは経過から明らかであると判断する。

○C 医師：

ワクチン接種と副反応との因果関係は不明である。

画像検査の結果より、脳炎及び脳症の可能性が疑われたとあり、画像所見等も踏まえて総合的に考えても、現在の情報から ADEM であると診断するのは難しい。

インフルエンザワクチン接種後、アゼルニジピンが新たに開始されており、脳炎の報告はないとされるものの、因果関係も考えられる。アゼルニジピン開始後の血圧の記載がないが（正常であったということか？）、怠薬による高血圧性脳症などの可能性はないのだろうか？11/20 の発熱は上気道症状等、他の感染徴候はなかったのか？髄液糖の低下があるが、血糖の低下（60）によるものと考えてよさそうである。

ADEM とすれば、時間的關係からは十分ありうると考えられる。また、急性

脳炎・脳症とすれば、インフルエンザワクチン接種から時間がやや経ち過ぎている可能性もあり、別の要因である可能性も高い。20日の発熱の原因（ウイルス性等）による急性脳炎・脳症は考えやすい。

臨床検査結果

検査	単位	2013/11/23	2013/11/25	2013/12/2	2013/12/9	2013/12/13
WBC	cells/mm ³	9000	9600	17300	18400	14200
RBC	cells/mm ³	3510000	2710000	3050000	2960000	2870000
Hb	g/dL	11.8	9.1	10.2	10.1	9.7
Ht	%	35.3	28.0	31.0	30.7	28.6
MCV	fL	100.6	103.3	101.6	103.7	99.7
MCH	pg	33.6	33.6	33.4	34.1	33.8
MCHC	%	33.4	32.5	32.9	32.9	33.9
PLT	cells/mm ³	172000	141000	175000	105000	39000
Stab	%				4.0	6.0
Seg	%				93.0	92.0
Neu	%	92.8	84.5	96.6		
Eos	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Baso	%	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
Lym	%	4.3	8.3	2.0	1.0	1.0
Mono	%	2.7	7.0	1.3	2.0	1.0
Neu	μL	8350	8140	16740	17780	13700
PT (SEC)	sec	23.5	19.0	12.2		11.7
PT (INR)		1.96	1.59	1.02		0.95
PT	%	35.0	47.0	96.0		109.0
APTT	sec	41.3	37.4	49.1		53.5
Fib	mg/dL	481		364		252
FDP	μg/mL	6.6		6.9		
FDP-DD	μg/mL	1.14	0.99	2.63		4.49
Na	mEq/L	141	138	143	150	147
K	mEq/L	4.0	4.8	4.0	5.4	4.9
Cl	mEq/L	107	105	109	117	116
Ca	mg/dL	8.9	8.0	7.9	8.6	7.6
IP	mg/dL	2.5	2.1	3.7	4.3	4.3
Mg	mg/dL	2.30	3.00	2.60	3.60	3.10
BUN	mg/dL	24.4	30.9	36.3	40.5	44.3
Cr	mg/dL	1.20	0.90	0.74	0.62	0.69
eGFR	mL/min/1.73m ²	33.6	46.1	57.1	69.3	61.6
UA	mg/dL	4.4	3.0	3.2	2.8	3.3
TP	g/dL	6.5	4.4	4.2	4.6	3.9
ALB	g/dL	3.8	2.3	2.0	2.6	2.0
A/G		1.4	1.0	0.9	1.3	1.0
AST	IU/L	52	107	60	40	57
ALT	IU/L	17	16	26	34	59
ALP	IU/L	191	191	239	252	283

臨床検査結果

検査	単位	2013/11/23	2013/11/25	2013/12/2	2013/12/9	2013/12/13
GGTP	IU/L	19	11	20	53	42
LDH	IU/L	391	505	777	755	805
T-Bil	mg/dL	0.67	0.62	0.76	1.22	1.53
D-Bil	mg/dL	0.11	0.09	0.18	0.32	0.48
CHE	IU/L	299	182			158
CRP	mg/dL	0.04	13.04	0.25	0.03	0.03
CPK	IU/L	620	250	83	278	1007
Amy	IU/L	65	36	123	66	47
BS	mg/dL	60	289			290
BNP	pg/mL	390.8				
pH		7.429				7.419
pCO ₂	mmHg	36.7				40.3
pO ₂	mmHg	346				122
HCO ₃ ⁻	mmol/L	23.8				25.6
BE	mmol/L	0.3				1.5
sO ₂	%	99.8				99.2
tHb	g/dL	11.6				10.5
O ₂ Hb	%	97.5				96.9
COHb	%	1.0				0.9
MetHb	%	1.3				1.4
HHb	%	0.2				0.8
Na ⁺	mEq/L	141				146
K ⁺	mEq/L	3.9				4.8
Cl ⁻	mEq/L	108				117
Ca ²⁺	mg/dL	1.09				1.16
AnGap.K ⁺	mEq/L	12.6				
Glu	mg/dL	66				
Lac	mmol/L	9				
CSF-Cell	/3/mm ³	6				
CSF-Lym	%	2				
CSF-TP	mg/dL	37				
CSF-Glu	mg/dL	28				
CSF-Cl	mmol/L	125				
CSF-LDH	IU/L	107				
CSF-HSV		(-)				
CSF-VZV		(-)				
RF	IU/mL		5.0			
β-D-GLU	pg/mL		3.0	3.0		
FT3	pg/mL		1.01			

臨床検査結果

検査	単位	2013/11/23	2013/11/25	2013/12/2	2013/12/9	2013/12/13
FT4	ng/dL		1.09			
TSH	μU/mL		1.15			
SS-DNA	U/mL		4.5			
ANA			LT40			
HOMO			LT40			
SPECKLED			LT40			
NUCLEO			LT40			
CENTRO			LT40			
PERI			LT40			
FluA/CF			16			8
FluB/CF			8			4
IG-G	mg/dL		853			
IG-A	mg/dL		137			
IG-M	mg/dL		42			
C3	mg/dL		92			
C4	mg/dL		31.6			
CH50	U/mL		36			
SIL-2R	U/mL		440			
RET	%			1.6	1.1	
RET	cells/mm ³			48000	33000	
TG	mg/dL			98	148	139
T-Cho	mg/dL			135	198	245
HDL-C	mg/dL			30	34	37
PCT				(-)		(-)
CA125	U/mL			81.6		
CA15-3	U/mL			5.0		
CEA	ng/dL			1.7		
CA19-9	U/mL			19.8		
TTT	U					4.0
ZTT	U					5.3
LDL-C	mg/dL					177
LDL-C/F	mg/dL					180

【その他検査値データ】

2013 年 11 月 23 日

髄液検査 キサントクロミー(-)、外観混濁、髄液 IgG 量不足、髄液 ADA 量不足、MBP 量不足、オリゴクロナル量不足。

2013 年 11 月 25 日

MPO-ANCA(-)/定量値 LT 0.5、核膜型 LT40、PCNA 型 LT40、PCNA 様型 LT40、細胞質型(-)、紡錘型(-)、ゴルジ体(-)、抗 ds-DNA(-)/定量値 8.2、抗 U1-RNP(-)/定量値 1.0、抗 Sm 抗体(-)/定量

臨床検査結果

値 1.2、抗 SS-A 抗体(-)/定量値 0.8、抗 SS-B 抗体(-)/定量値 LT 0.5、PR3-ANCA(-)/定量値 1.0、単純ヘルペス IgG (+) /EIA 価 66.0、単純ヘルペス IgM(-)/抗体指数 0.69、水痘帯状疱疹 IgG (+) /EIA 価 11.7、水痘帯状疱疹 IgM(-)/抗体指数 0.68、サイトメガロ IgG (+) /EIA 価 91.2、サイトメガロ IgM(-)/抗体指数 0.56。

2013 年 12 月 2 日

アスペル AG(-)/カットオフ値 0.2、カンジダ AG (+) /抗原価 2。

2013 年 12 月 9 日

形態 1 過分好中、量 1 1+。

2013 年 12 月 13 日

単純ヘルペス IgG (+) /EIA 価 56.8、単純ヘルペス IgM(-)/抗体指数 0.06、サイトメガロ IgG (+) /EIA 価 33.3、サイトメガロ IgM(-)/抗体指数 0.30、日本脳炎 LT4、形態 1 PLT 形態、量 1 凝集なし。

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

取り扱い注意：委員限り資料

(症例 インフル No.11)

1. 報告内容

(1) 事例

80歳代の男性。

バルサルタン1日80mg、エゼチミブ1日10mg、エピナスチン塩酸塩1日20mg、ゾルピデム酒石酸塩1日5mg、プレドニゾロン1日3mg、酪酸菌配合剤1日3gを内服中。

平成25年10月20日より倦怠感が見られていた。

10月24日、A病院にてインフルエンザHAワクチンを単独接種。

10月25日、口渇、倦怠感が増悪し、むくみが徐々に現れ、労作時に呼吸苦も出現。10月29日、体動時の息切れ、全身浮腫が認められ、A病院を受診。血液検査の結果、TP5.3g/dL、ALB2.1g/dL、Cr2.7mg/dL、尿検査の結果、尿蛋白3+と、ネフローゼの状態が確認された。同日、プレドニゾロンの内服中止。10月31日、B病院腎臓内科を紹介され受診。11月1日、同病院へネフローゼ症候群の精査加療目的で入院。入院時、著明な全身浮腫、労作時呼吸苦及び全身倦怠感が認められ、湿性ラ音が聴取された。TP4.7g/dL、ALB1.3g/dL、T-Cho313mg/dL、BUN64mg/dL、Cr3.6mg/dL、尿蛋白3+、Up/Ucr8.56との結果より、ネフローゼ症候群及びそれに伴う急性腎不全と診断された。同日、バルサルタン、エゼチミブ、エピナスチン塩酸塩の内服中止。その後、水分及び塩分制限を行ったが体重増加が認められたため、フロセミドの内服開始。腎生検の結果、微小変化型ネフローゼ症候群と診断された。また、非常に軽度の糖尿病性腎症の所見も認められた。11月14日、プレドニゾロン1日60mg、スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤（ST合剤）、フルコナゾールの投与開始。治療開始後も腎機能障害の進行が認められた。11月20日、ALB1.3g/dL、BUN88mg/dL、Cr4.9mg/dL、尿蛋白陽性、乏尿が認められた。11月21日、血液透析が開始された。12月2日、BUN114mg/dL、Cr7.5mg/dL。プレドニゾロン1日60mg投与、週3回の血液透析が継続された。12月19日、BUN59mg/dL、Cr3.0mg/dLとなり、腎機能改善が認められ、血液透析を離脱。ネフローゼ症候群は軽快までは至らなかったが、ステロイドへの反応性が乏しく、またステロイド精神病が強く現れたため、プレドニゾロン1日40mgに減量され、シクロホスファミド水和物1日50mgの併用が開始された。

12月23日、クロストリジウム・ディフィシルトキシンが陽性であったため、偽膜性腸炎と診断され、メトロニダゾールの内服開始。ST合剤、フルコナゾールの投与が中止された。その他の各種培養検査は陰性。個室に入院しており、周囲に偽膜性腸炎の患者はいなかった。

メトロニダゾール投与後もCRP上昇が認められ、呼吸器疾患が疑われた。12

月28日、肺炎と診断され、メロペネム水和物の投与開始。12月30日、呼吸状態及び全身状態が悪化し、死亡が確認された。死因は肺炎とされ、その原因は、ステロイド及びシクロホスファミド水和物の投与により、易感染状態であったためと考えられた。死亡時画像診断及び剖検は実施されなかった。

(2) 接種されたワクチンについて

インフルエンザ HA ワクチン（阪大微研 HK12A）

(3) 接種時までの治療等の状況

身長156cm、体重74.7kg。原疾患及び合併症として、高血圧、脂質異常症、糖尿病、関節リウマチ、掻痒症、睡眠障害、慢性閉塞性肺疾患（COPD）を有し、既往症として、平成25年5月に血清反応陰性関節炎の発症があった。糖尿病に対し、食事療法が行われていた。アレルギー歴及び医薬品副作用歴なし。インフルエンザワクチンは毎年接種されていた。

2. ワクチン接種との因果関係についての報告医等の意見

B 病院担当医：腎生検の結果、極軽度の糖尿病性腎症の所見が認められた。合併症である糖尿病とネフローゼ症候群との関連は不明。ネフローゼ症候群、急性腎不全、偽膜性大腸炎と死亡との間に、直接の関連はないと考える。COPD がベースにあるため肺炎が増悪しやすい状態であったことに加え、ステロイド及びシクロホスファミド水和物投与のため易感染状態であった。また、もともとだるさがある中でワクチンを接種した。ワクチン接種が契機であったようには感じられず、ワクチン接種と死亡との因果関係について、関連はないと思われる。

3. 専門家の意見

○A 医師：

ワクチン接種前、平成 25 年 9 月 30 日の検尿にて尿蛋白 2+であり、ワクチン接種前に腎障害が始まっていた可能性が高いと考える。また倦怠感もワクチン接種前の 10 月 20 日から出現していることを踏まえると、急性腎不全、ネフローゼ症候群とワクチン接種との因果関係はほとんどないと推測される。死亡は原疾患に加え治療薬による免疫不全状態に合併した肺炎が原因であり、インフルエンザ HA ワクチン接種との因果関係は否定的と考える。

○B 医師：

関節リウマチ、高血圧、脂質異常症、糖尿病の治療を受けている 80 歳代の男

性が、ネフローゼ症候群を発症して、その後の肺炎で死亡した症例である。ワクチン接種数日前より倦怠感があり、インフルエンザ HA ワクチンの接種翌日から倦怠感の増悪と浮腫、呼吸困難を認めている。本症例の浮腫の出現が接種翌日であるということは、担当医の意見でも指摘されている様に、症状出現が早すぎる様に感じられる。通常、著明な蛋白尿が出現したとしても、低蛋白血症を生じて下腿浮腫が出現するまでには、数日以上経過が必要である。よって、本症例において、インフルエンザ HA ワクチンが、ネフローゼ発症と因果関係があったとは判断出来ない。ネフローゼ症候群が発症しつつある状況でワクチンが投与されたのではないかと推察する事が妥当であると思われる。

高齢者におけるネフローゼ症候群の生命予後には、免疫抑制薬治療に伴う感染症が大きく関係する。本症例の死因は、重症肺炎であると考えられ、COPD や免疫抑制治療との因果関係が推察される。

以上より、本症例の死亡とインフルエンザ HA ワクチン接種は、時間的前後関係はあるが、因果関係があるとは判断できない。

〇〇医師：

#1 ネフローゼ症候群

インフルエンザ HA ワクチン接種翌日に浮腫が出現している。微小変化型ネフローゼは突然発症の発症様式であるが、少し早すぎるかもしれない。しかしワクチン接種がネフローゼを顕在させた可能性はある。因果関係不明。

#2 腎機能障害

その後の腎機能障害はネフローゼ症候群による血管内脱水にともなった腎不全の可能性が高い。因果関係不明。

#3 偽膜性腸炎、肺炎

プレドニゾロンおよびシクロホスファミドによる免疫抑制にともなった易感染性が原因である。インフルエンザ HA ワクチンとの因果関係なし。

#4 死亡原因

肺炎によるものと考えられ、インフルエンザ HA ワクチンとの直接的な因果関係はないと考える。

臨床検査結果

検査項目	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	2013/9/30	10/29	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/5	11/6	11/7	11/9	11/11	11/13
体温	℃					36.3		36.3	36.7	36.5		36.1				
HR	回/分					80	56	58	75	61		56				
収縮期血圧	mmHg					140	158	146	143	153		156				
拡張期血圧	mmHg					94	80	75	71	86		74				
TP	g/dL	6.7	8.3	7.3	5.3	4.7	4.2	4.1	4.5	3.8			3.7	4.0	3.7	3.7
ALB	g/dL	4.0	5.0	4.0	2.1	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0			1.0	1.0	1.0	1.0
A/G 比		1.40	1.90	1.21	0.66											
T-Bil	mg/dL	0.3	1.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3			0.3	0.4	0.3	0.3
D-Bil	mg/dL	0.0	0.3	0.1	0.1											
I-Bil	mg/dL	0.1	0.8	0.2												
LDH	IU/L	119	229	276	436	442	369	337	425	384			362	352	353	302
AST	IU/L	13	33	31	51	61	39	42	40	37			39	53	41	34
ALT	IU/L	8	42	34	38	41	29	33	35	30			29	46	41	29
γ-GTP	IU/L	10	47	52	120		85	84	92	74			72	80	74	70
ALP	IU/L	115	359	246	313	357	254	248	270	215			219		239	244
CK	IU/L	62	287	237		680	477	304	347	363					157	151
T-Chol	mg/dL	128	219	198	364	313										
TG	mg/dL	30	149	199	195											
HDL	mg/dL	40	96	48	72											
LDL	mg/dL	70	139	134	239											
LDL コレステロール 計算値	mg/dL			110												
BUN	mg/dL	8.0	22.0	17	51.3	64	62	53	47	43			47	42	40	52
Cr	mg/dL	0.60	1.10	0.8	2.71	3.6	3.7	3.5	3.5	3.1			3.1	3.4	3.2	3.4
検査項目	単位	正常範囲	正常範囲	2013/9/30	10/29	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/5	11/6	11/7	11/9	11/11	11/13

臨床検査結果

[illegible]

臨床検査結果

[illegible]

臨床検査結果

	低値	高値																
尿蛋白			(2+)	(3+)	(3+)													
Up/Ucr					8.56													

検査項目	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	2013/11/18	11/20	11/25	11/27	12/2	12/4	12/7	12/9	12/12	12/16	12/17	12/19
ALB	g/dL	4.0	5.0		1.3										
BUN	mg/dL	8.0	22.0	75	88	114	111	114	103	107	97	87	61		59
Cr	mg/dL	0.60	1.10	4.2	4.9	6.0	6.2	7.5	7.1	7.6	6.2	4.7	3.5	2.0	3.0
尿蛋白					(+)										

検査項目	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	2013/12/20	12/21	12/22	12/23	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30
BUN	mg/dL	8.0	22.0	51	59	68	75	82	84	80	74	73	82	83	94
Cr	mg/dL	0.60	1.10	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.1	2.6	2.3	2.2	2.5	2.4	2.8
CD トキシシン							(+)								

2013/9/30

尿色：黄褐色、尿 Hp：5.0、尿ウロビリノーゲン：±

尿混濁、尿糖、尿ビリルビン、尿ケトン体、尿潜血、尿亜硝酸塩、尿白血球反応：全て陰性

尿沈渣赤血球：<1/H、尿沈渣白血球：1~4/H、尿沈渣硝子円柱：0.5/L、尿沈渣顆粒円柱：0/L、尿沈渣扁平上皮：<1/H、尿沈渣移行上皮：<1/H

尿沈渣細菌：1+、尿沈渣粘液糸：2+、尿沈渣シユウ酸 Ca 結晶：1+、尿沈渣尿管上皮：5~9/H

2013/11

腎生検：微小変型ネフローゼ症候群と診断

2013/12/23

各種培養検査：陰性

昨シーズンのインフルエンザワクチンの副反応の報告状況との比較

昨シーズンのインフルエンザワクチン及び今シーズンのインフルエンザワクチンの副反応の種類別報告件数は以下のとおり。

医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	2012-2013シーズン※		2013-2014シーズン※※	
	3価インフルエンザワクチン (季節性2価及びH1N1)		3価インフルエンザワクチン (季節性2価及びH1N1)	
	製造販売業者 からの報告	医療機関から の報告	製造販売業者 からの報告	医療機関から の報告
副反応症例数	86	53	64	88
副反応件数	135	83	97	142
推定接種可能人数(回分)	50,240,735			
副反応の種類				
血液およびリンパ系障害				
* 好酸球増加症	1			
* リンパ節炎				1
* リンパ節症	2		2	
* 凝血異常				1
血小板減少症		1		1
血小板減少性紫斑病				3
血栓性血小板減少性紫斑病		1		1
* 特発性血小板減少性紫斑病	1	2		
* 播種性血管内凝固				1
* 免疫性血小板減少性紫斑病				3
心臓障害				
* 徐脈性不整脈	1			
* 心筋炎	1			
* 心肺停止	1	1		1
* 心不全			1	
* 心房細動				1
動悸				1
* 頻脈				1
耳および迷路障害				
* 突発難聴			1	1
眼障害				
* 結膜充血		1		
* 眼球クローヌスミオクローヌス				1
* 複視			1	1
胃腸障害				
* 嚥下障害		1		
悪心	1			2
* 急性膵炎	1			
* 口腔浮腫				1
上腹部痛	1			
* 腸閉塞				1
腹痛				1
嘔吐	2	1		1
一般・全身障害および投与部位の状態				
高熱		1		
* 状態悪化	1			
注射部位疼痛	1		2	
ワクチン接種部位腫脹				1

	ワクチン接種部位知覚異常				1
	ワクチン接種部位疼痛				1
	悪寒			2	1
*	異常感				1
*	顔面浮腫	1			
	局所腫脹		2		3
	倦怠感			1	1
*	死亡	1		1	1
	腫脹	1	2		
*	全身健康状態低下				1
	注射部位そう痒感			1	
	注射部位紅斑	7		1	2
	注射部位腫脹	8		3	
*	注射部位小水疱	1			
*	注射部位知覚低下			1	
	注射部位熱感			1	
*	突然死		1		
	熱感			1	
	発熱	12	12	8	6
*	歩行障害	1		1	1
	無力症		1		1
	疼痛	1		1	
免疫系障害					
	アナフィラキシーショック	8	4	3	1
	アナフィラキシー反応	3	5	2	7
	過敏症		1		1
感染症および寄生虫症					
*	エプスタイン・バーウイルス感染	1			
*	腹膜炎	1			
*	マイコプラズマ性肺炎				1
*	細菌性肺炎				1
*	憩室炎	1			
*	ウイルス性髄膜炎			1	
*	咽頭炎			1	
*	髄膜炎	1		1	1
	脊髄炎			1	
	脳炎				2
*	膿疱性皮疹			1	
*	敗血症				1
*	肺炎	1	1		3
	蜂巣炎	2		1	1
*	無菌性髄膜炎	1		1	1
傷害、中毒および処置合併症					
*	ワクチン接種合併症		1		
臨床検査					
	血圧低下	1			
	血小板数減少	2			1
*	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1		1
*	尿量減少	1			
*	好酸球数増加			1	
*	白血球数増加			2	
代謝および栄養障害					
*	劇症1型糖尿病	1			
*	糖尿病性ケトアシドーシス	1			
筋骨格系および結合組織障害					
*	リウマチ性多発筋痛	1			
*	横紋筋融解症	1	1		2
*	関節炎				1
	関節痛	1			2
*	筋炎			1	1
	筋肉痛				2
*	筋痙攣				1
	筋力低下	2			1
*	成人発症スチル病			1	

*	背部痛			1	
*	四肢痛				1
*	姿勢異常	1			
*	線維筋痛				2
*	椎間板突出				1
神経系障害					
*	構語障害		1		
	ギラン・バレー症候群	4	1	3	2
*	傾眠		1		
*	てんかん	1		1	
*	てんかん重積状態		1		
*	ミラー・フィッシャー症候群			1	
*	不全片麻痺		1		
	意識消失	3	2	2	
	意識変容状態		2		1
*	異常感覚		1		
*	運動機能障害	1			
	感覚鈍麻	2	1	1	5
*	間代性痙攣		1		
	急性散在性脳脊髄炎	4	5	2	5
*	群発発作	1			
*	視神経炎			1	
*	失神	3	1	1	
*	失神寸前の状態		1		
*	小脳性運動失調				1
*	振戦	1			1
*	神経痛	1			
*	全身硬直症候群	1			
	第7脳神経麻痺	1		1	1
	頭痛				1
*	熱性痙攣	1	2		
*	脳梗塞		1		
	脳症	1			1
	浮動性めまい	2			
	末梢性ニューロパチー		1		9
*	味覚異常			1	
*	味覚消失				1
	痙攣	5	4	2	4
腎および尿路障害					
*	尿閉		1		
	ネフローゼ症候群	2		6	3
*	急性糸球体腎炎	1		1	
*	急性腎不全			1	
*	腎機能障害			1	
*	失禁		1		
*	腎障害	1	1		
*	腎不全				1
呼吸器、胸郭および縦隔障害					
*	咽頭浮腫				1
	間質性肺疾患	1	1	1	2
	呼吸困難	2			1
	呼吸障害				1
*	呼吸停止				1
*	喉頭浮腫				1
	喘息	1			
*	喘鳴				1
皮膚および皮下組織障害					
*	薬疹			1	
*	アレルギー性皮膚炎				1
*	スティーブンス・ジョンソン症候群		2	3	
	そう痒症	1		1	
*	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	2		2	1
*	丘疹			1	
*	急性熱性好中球性皮膚症			1	

	血管浮腫			1	1
	紅斑	1	2	1	1
*	水疱		1	1	
	全身紅斑			1	1
	全身性皮疹		1		1
*	多汗症				1
	多形紅斑	2		1	
*	剥脱性皮膚炎	1			
	発疹	1		1	
*	皮膚炎				1
*	冷汗	1			
	蕁麻疹	2	1	2	1
妊娠、産褥および周産期の状態					
*	胎児死亡				1
血管障害					
	ショック	2	1	2	
	顕微鏡的多発血管炎	1			
肝胆道系障害					
	肝機能異常		1	2	5
	肝障害	3	1	1	1
生殖系および乳房障害					
*	骨盤痛		1		
精神障害					
*	激越			1	
*	精神症状			1	
*	神経症				1

※平成24 年10月1日から平成25 年3月31日報告分まで

※※平成25年10月1日から平成26年7月31日報告分まで

*: 未知の副反応

MedDRA/J Ver. 17.0