

## 乾燥弱毒生風しんワクチンの 副反応報告状況について

### ○乾燥弱毒生風しんワクチン

商 品 名 : ①乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」  
 ②乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」  
 ③乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」  
 製造販売業者 : ①一般財団法人 阪大微生物病研究会  
 ②北里第一三共ワクチン株式会社  
 ③武田薬品工業株式会社  
 販売開始 : ①昭和51年12月  
 ②昭和61年9月  
 ③昭和54年4月  
 効 能 ・ 効 果 : 風しんの予防

### 副反応報告数

(平成26年11月1日から平成27年6月30日報告分まで：報告日での集計)

平成26年11月1日から平成27年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例(人))

	接種可能なべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 ( ) : 接種日が左記期間内の症例		報告数 ( ) : 接種日が左記間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤	
平成26年11月1日 ～平成27年6月30日	82, 290	1 (0)	2 (2)	1 (1)	
		0.001% (0)	0.002% (0.002%)	0.001% (0.001%)	
(参考) 平成25年4月1日～ 平成27年6月30日ま での累計	349, 700	5	4	2	
		0.001%	0.001%	0.001%	

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

### 平成26年11月1日から平成27年6月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例(人))

	製造販売業者からの報告					医療機関からの報告						
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1

#### (注意点)

※ 副反応報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、薬事法第77条の4の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン 重篤症例一覧  
 (平成26年11月1日から平成27年6月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	1	女	不明	乾燥弱毒生風しんワクチン(松浦株)* 阪大微研	なし		上気道の炎症	免疫性血小板減少性紫斑病	不明	重篤	不明	回復

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン 重篤症例一覧  
 (平成26年11月1日から平成27年6月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容	受付番号	B番号
1	30	女	平成27年1月24日	風しん	RF003A	北里第一三共	なし		喘息	喘息	平成27年1月24日	関連あり	重い	平成27年1月24日	軽快	V14101104	B-14048374

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン 非重篤症例一覧  
 (平成26年11月1日から平成27年6月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	副反応名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	37	男	平成27年3月25日	風しん	RF004A	北里第一三共	なし		なし	顔・上肢・体幹の皮疹	平成27年4月5日	記載なし	重くない	平成27年4月10日	回復

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生風しんワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる副反応症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】  
副反応名が、「アナフィラキシー様ショック」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」として報告された症例。

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシー のフライトン分類評価が3以上とされ た症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	5万人
平成25年7月～平成25年12月	0	0	9万人
平成26年1月～平成26年7月	0	0	10万人
平成26年8月～平成26年10月	0	0	4万人
平成26年11月～平成27年6月	0	0	8万人

乾燥弱毒生風しんワクチンの副反応報告状況

平成  
25  
年4

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告
副反応症例数	2	5
副反応件数	2	5
副反応の種類	副反応の種類別件数	
血液およびリンパ系障害		
免疫性血小板減少性紫斑病		1
呼吸器、胸郭および縦隔障害		
* 喘息	1	
神経系障害		
* ギラン・バレー症候群		1
* 急性散在性脳脊髄炎		1
* 多発性硬化症	1	
妊娠、産褥および周産期の状態		
* 切迫流産		1
皮膚および皮下組織障害		
蕁麻疹		1

\*未知の事象