

**沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の
副反応報告状況について**

○沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

商 品 名 : プレベナー13水性懸濁注
 製 造 販 売 業 者 : ファイザー株式会社
 販 売 開 始 : 平成25年10月
 効 能 ・ 効 果 : 肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F及び23F)による侵襲性感染症の予防

**副反応報告数
(平成27年11月1日から平成28年2月29日まで報告分まで：報告日での集計)**

平成27年11月1日から平成28年2月29日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例(人))

	接種可能なべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 () :接種日が左記期間内の症例		報告数 () :接種日が左記間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤	
平成27年11月1日 ～平成28年2月29日	1,343,582	147 (19)	29 (18)	22 (12)	
		0.01% (0.001%)	0.002% (0.001%)	0.002% (0.001%)	
平成25年10月28日 ～平成28年2月29日	9,681,163	340	314	198	
		0.004%	0.003%	0.002%	

※医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とした。

平成27年11月1日から平成28年2月29日報告分の重篤例の転帰

(単位:例(人))

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	77	0	1	4 ^{注1}	65	147	18	4	0	0	0	22
うち同時接種あり	42	0	0	4	3	49	16	2	0	0	0	18

平成27年6月から平成27年11月の6ヶ月間から、平成27年9月から平成28年2月の6ヶ月間における、報告受付日をもとにした死亡例の報告頻度は、10万接種あたり0.05～0.2であり、急ぎの検討が必要とされる10万接種あたり0.5を下回っている。

(注意点)

※ 副反応報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

注1 4例の報告は同一症例であり、実際の症例数は1である(平成28年5月23日調査会当日の審議における御指摘に基づき、追記)。

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)の副反応報告状況

平成25年4月1日から平成28年2月29日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	177	190	367	22	147	169 (うち効能・効果に関連する症例(肺炎球菌感染等)96)
症状別総件数	333	351	684	31	196	227
症状名の種類	症状の種類別件数					
肩膊障害						
* メレナ	1	1	2			
* 悪心	1		1			
* 下痢	2	9	11		4	4
* 機械的イレウス		1	1			
* 血便排泄	14	32	46	1	8	9
* 消化管壊死	1		1			
* 消化管穿孔	1		1			
* 消化管浮腫	2	1	3		1	1
* 大腸穿孔	1		1			
* 腸炎	1	1	2		1	1
* 腸管虚血	1		1			
* 腸重積症	19	22	41	4	6	10
* 腸出血		1	1			
* 軟便		1	1			
* 粘液便	1	3	4			
* 白色便		4	4			
* 腹水	1		1			
* 腹部腫瘤	1	1	2			
* 腹部膨満		1	1			
* 変色便		1	1			
* 便秘		1	1			
* 裂肛		1	1			
* 嘔吐	6	8	14		2	2
* 嵌頓臍ヘルニア		1	1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
* ワクチン接種部位硬結	3		3			
* ワクチン接種部位紅斑	4	1	5			
* ワクチン接種部位腫脹	2	5	7			
* ワクチン接種部位熱感	1		1			
* ワクチン接種部位発疹	1		1			
* ワクチン接種部位反応	1		1			
* 異常感	1		1			
* 炎症	1		1			
* 泣き	4	5	9			
* 倦怠感	1	2	3	1		1
* 硬結		1	1			
* 高熱	2	1	3			
* 死亡	6		6		1	1
* 腫脹	1		1			
* 状態悪化		1	1		2	2
* 全身健康状態低下		1	1			
* 突然死	1		1		3	3
* 乳児突然死症候群	2	1	3			
* 熱感		1	1			
* 発熱	42	52	94	3	8	11
* 末梢腫脹	1		1			
* 無力症	2	1	3			
外科および内科処置						
* 腸瘻造設	1		1			
感染症および寄生虫症						
* ウイルス感染					1	1
* ウイルス性腸炎	1		1			
* サイトメガロウイルス感染		3	3			
* リンパ管炎		1	1			
* ロタウイルス胃腸炎		2	2		1	1
* ロタウイルス感染		1	1			
* ワクチン接種部位腫瘍	1		1			
* ワクチン接種部位蜂巣炎	3	2	5			
* 胃腸炎	1	4	5		1	1
* 咽頭炎	2	2	4			
* 眼窩蜂巣炎					1	1
* 気管支炎		2	2			
* 菌血症		1	1		12	12
* 細菌感染	1	2	3		1	1
* 細菌性関節炎					1	1
* 細菌性骨髄炎					2	2
* 細菌性中耳炎					1	1
* 細菌性腸炎					1	1
* 細菌性敗血症		1	1			
* 中耳炎	1	1	2			
* 乳様突起炎					1	1
* 敗血症		1	1			
* 肺炎	1	2	3		9	9
* 肺炎球菌感染		1	1		5	5
* 肺炎球菌性菌血症	1	4	5		67	67
* 肺炎球菌性髄膜炎		2	2		4	4
* 肺炎球菌性敗血症		1	1		1	1
* 肺炎球菌性肺炎		2	2		10	10
* 皮膚結核	1		1			
* 鼻咽頭炎		1	1			
* 腹膜炎	1		1			
* 蜂巣炎	6	1	7		2	2
肝胆道系障害						
* 肝炎		2	2			
* 肝機能異常	2	6	8			
* 急性肝炎		1	1			
眼障害						
* 角膜混濁		2	2			
* 角膜浮腫		1	1			
* 眼運動障害		1	1			
* 眼球回転発作		1	1			
* 結膜出血	1		1			
* 高眼圧症		1	1			
* 視力障害	1		1			
* 前房出血		1	1			
* 前房内細胞		1	1			

★
★
★
★
★

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
* 注視麻痺		1		1		
* 虹彩炎			1	1		
* 毛様充血			1	1		
* 網膜滲出斑			1	1		
* 緑内障		1		1		
筋骨格系および結合組織障害						
* 横紋筋融解症		1		1		
* 関節炎				1		1
* 筋炎				1		1
筋肉痛		1		1		
* 筋力低下	1			1		
* 腋窩腫瘍		1		1		
血液およびリンパ系障害						
血小板減少性紫斑病	7			7	2	
* 好中球減少症	1	2		3		
* 出血性障害		1		1		
* 発熱性好中球減少症		2		2		
免疫性血小板減少性紫斑病	6	9		15		
* 倉倉細胞性組織球症		1		1		
血管障害						
ショック	1			1		
ショック症状					1	1
* 血管炎	2			2		
* 出血		1		1		
* 循環虚脱	1			1		
神経原性ショック	1			1		
* 川崎病		4		4	4	4
* 蒼白	7	2		9	1	3
* 潮紅	2			2		
* 末梢冷感	2	1		3		
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
* 咽頭紅斑	3	4		7		
* 咽頭浮腫		1		1		
* 咳嗽	2	1		3		
* 減呼吸	1			1		
* 呼吸困難					1	1
* 呼吸停止	3			3		
呼吸抑制					1	1
* 上気道咳症候群	1			1		
* 上気道分泌増加	1			1		
* 窒息	1			1		
* 肺高血圧クリーゼ	1			1		
* 肺高血圧症					3	3
* 肺水腫	1			1		
* 鼻漏	1	3		4		
* 頻呼吸	1			1		
* 無呼吸	3	6		9		
* 無呼吸発作	1			1		
* 喘息発作重積		1		1		
耳および迷路障害						
* 聴力低下	1			1		
心臓障害						
* チアノーゼ	6	3		9	1	1
* 徐脈	2			2		
* 心肺停止	6			6		
* 発作性頻脈	1			1		
* 頻脈	2			2		
神経系障害						
* ギラン・バレー症候群	2			2	2	2
てんかん重積状態		1		1		
* 意識レベルの低下	4			4		
* 意識消失	1	1		2		
* 意識変容状態	2	1		3		
* 間代性痙攣	1	2		3		
* 顔面麻痺	1			1		
* 筋緊張低下-反応性低下発作	1	2		3		
* 視神経炎	1			1		
* 失神寸前の状態	2	1		3	1	1
* 小脳性運動失調	1			1		
* 振戦	1			1		
* 神経根障害	1			1		
* 全身硬直症候群	1			1		
全身性強直性間代性発作					1	1
* 第6脳神経麻痺	1			1		
* 熱性痙攣	11	5		16	2	2
* 脳症	1	1		2		
* 不全単麻痺					1	1
* 痙攣発作	14	8		22	3	1
精神障害						
気分変化	1	4		5	1	1
* 凝視		1		1		
* 選択的摂食障害	3	3		6		
* 譫妄	1			1		
代謝および栄養障害						
食欲減退	2			2	1	1
* 脱水	1			1		
* 乏湯感症	1			1		
内分泌障害						
* 下垂体低形成		1		1		
皮膚および皮下組織障害						
* ヘンツホ・シェーンライン紫斑病	1	3		4		
* 顔面腫脹	1			1		
* 結節性紅斑	1			1		
血管浮腫		2		2		
紅斑	3	2		5		
紫斑	2	3		5		1
湿疹		1		1	1	1
* 水疱					1	1
全身紅斑	1			1		
全身性皮疹					1	1
多形紅斑	4	6		10	4	4
中毒性皮疹	1			1	1	1
乳児湿疹		1		1		
発疹	2	1		3	1	1
* 皮下出血	1	2		3	3	3
* 類天疱瘡					1	1

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
蕁麻疹	2	1	3		5	5
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	4	1	5		3	3
アナフィラキシー反応	14	2	16	3		3
アナフィラキシー様反応	1		1			
過敏症	3	1	4			
* 金属アレルギー					1	1
* 薬物過敏症					1	1
臨床検査						
* C-反応性蛋白増加	2	14	16		2	2
* ノロウイルス検査陽性		1	1			
* レンサ球菌検査陽性	1	2	3			
* ロタウイルス検査陽性	1	1	2			
* 肝酵素上昇	1		1			
* 血小板数減少	1		1			
* 血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1			
* 好中球数減少		3	3			
* 酸素飽和度異常	1		1			
* 酸素飽和度低下	1		1			
* 心拍数減少	3		3			
* 全身性血管抵抗減少	1		1			
* 白血球数増加	1	7	8			

*未知の事象

★効能・効果に関連する事象(肺炎球菌感染等)

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)の副反応報告状況
 予防接種後副反応報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、副反応報告状況をもとに集計を行った。

	平成25年4月～平成27年10月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	平成27年11月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	22	6
けいれん*2	41	7
血小板減少性紫斑病*3	22	2

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

*2 間代性痙攣、全身性強直性間代性発作、熱性痙攣、痙攣発作

*3 血小板減少性紫斑病、免疫性血小板減少性紫斑病

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) 重篤症例一覧
(平成27年11月1日から平成28年2月29日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
1	5ヶ月	女	平成26年1月9日	アクトヒブ	あり	沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン プレベナー13	21トリソミー、肺高血圧 症、早産児、低出生体重 児、甲状腺機能低下 症、肺障害	肺高血圧症	平成26年1月10日	重篤	不明	軽快
2	5ヶ月	女	平成26年1月9日	クアトロバック	あり	プレベナー13 アクトヒブ	21トリソミー、肺高血圧 症、低出生体重児、早 産児	肺高血圧症、発熱	平成26年1月10日	重篤	不明	軽快
3	5ヶ月	女	平成26年1月9日	プレベナー13	あり	アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	21トリソミー、肺高血圧 症、低出生体重児、早 産児	肺高血圧症、状態悪化	平成26年1月11日	重篤	不明	回復
4	2ヶ月	男	平成26年6月13日	プレベナー13(13J05A)	なし		なし	発熱	平成26年6月14日	重篤	平成26年6月21日	回復
5	4ヶ月	男	平成26年10月21日 平成26年11月18日	ヘプタバックス	あり	ロタリックス(AROLA859AA) アクトヒブ プレベナー13	なし	血便排泄	平成26年12月19日	重篤	平成26年12月20日	回復
6	2ヶ月	男	平成27年1月13日 平成27年2月17日 平成27年3月24日	プレベナー13 (14C03A,14B01A,14C01A)	あり	アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	金属アレルギー、過敏 症	金属アレルギー、発疹	平成27年1月13日	重篤	不明	軽快
7	15週	男	平成27年2月13日	ヘプタバックス(9KP10R)	あり	ロタリックス(AROLA916AA) テトラビック(4K08B) アクトヒブ(K1379) プレベナー13(14B01A)	なし	腸重積症、消化管浮腫	平成27年2月20日	重篤	平成27年2月20日	回復
8	13週	女	平成27年2月28日 平成27年3月28日	ヘプタバックス(9KP10R)	あり	ロタリックス(AROLA918AA) アクトヒブ(K1421) プレベナー13(14C01A)	なし	腸重積症、血便排泄、嘔吐	平成27年4月2日	重篤	平成27年4月2日	軽快
9	11ヶ月	不明	平成27年5月27日	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性肺炎	平成27年12月17日	重篤	不明	不明
10	幼児	不明	平成27年6月13日	プレベナー13	なし		なし	発熱	平成27年6月14日	重篤	不明	不明
11	3ヶ月	男	平成27年6月15日	ロタテック	あり	クアトロバック(A022A) プレベナー13(14C07A) アクトヒブ	なし	紫斑	平成27年6月24日	重篤	平成27年6月27日	回復
12	14週	男	平成27年6月21日	ヘプタバックス(Y084A)	あり	ロタリックス(AROLB079AA) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(阪大微研 4K10A) アクトヒブ(K1664) プレベナー13(14L05A)	なし	腸重積症、血便排泄	平成27年6月26日	重篤	平成27年8月27日	軽快
13	16週	男	平成27年8月4日 平成27年9月8日	ロタテック	あり	アクトヒブ プレベナー13	なし	腸重積症、発熱	平成27年9月10日	重篤	平成27年10月	軽快
14	11週	男	平成27年9月11日 平成27年10月13日	プレベナー13(14C10A)	あり	アクトヒブ(K1659)	鼻漏、鼻閉	多形紅斑	平成27年9月19日	重篤	平成27年11月19日	軽快
15	2ヶ月	男	平成27年9月11日 平成27年10月13日	アクトヒブ(K1659)	あり	プレベナー13	鼻漏、鼻閉	多形紅斑、薬物過敏症、蕁麻疹、中毒性皮膚疹	平成27年9月19日	重篤	平成27年9月27日	回復
16	11週	女	平成27年9月16日 平成27年10月16日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ(K1684) プレベナー13(14G01A)	なし	血便排泄	平成27年10月3日	重篤	平成27年11月3日	回復
17	6ヶ月	男	平成27年9月30日	クアトロバック	あり	プレベナー13 アクトヒブ	なし	C-反応性蛋白増加	平成27年10月1日	重篤	平成27年10月7日	回復
18	6ヶ月	男	平成27年9月30日	アクトヒブ	あり	プレベナー13 クアトロバック	なし	細菌感染、C-反応性蛋白増加	平成27年10月1日	重篤	平成27年10月7日	不明
19	13週	女	平成27年10月2日 平成27年10月30日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ(K1697) プレベナー13(14G02A) ビームゲン(Y083A)	なし	血便排泄	平成27年10月27日	重篤	平成28年2月8日	軽快
20	13週	女	平成27年9月8日 平成27年10月6日	ロタテック(K010633)	あり	アクトヒブ(K1697) プレベナー13(14G02A)	なし	川崎病	平成27年10月31日	重篤	不明	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
21	89年	女	平成27年10月8日	プレベナー13	なし		アルツハイマー型認知症、気管切開、胃瘻、肺炎、便秘	肺炎	平成27年10月10日	重篤	平成27年11月9日	回復
22	2ヶ月	女	平成27年10月13日 平成27年11月17日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン	なし	血便排泄	平成27年10月14日	重篤	平成27年10月24日	回復
23	15週	男	平成27年10月13日 平成27年11月11日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	プレベナー13(14C10A) アクトヒブ(K1659)	多形紅斑、咽頭炎	多形紅斑	平成27年10月17日	重篤	平成27年11月19日	軽快
24	3ヶ月	男	平成27年9月11日 平成27年10月13日	アクトヒブ(K1659)	あり	プレベナー13 ロタリックス(AROLB079AA)	咽頭炎、鼻漏、紅斑、多形紅斑、入院、鼻閉	多形紅斑、湿疹	平成27年10月17日	重篤	平成27年10月22日	回復
25	14週	女	平成27年10月15日	ロタテック(K018954)	あり	アクトヒブ プレベナー13 テトラビック	なし	腸重積症、発熱	平成27年10月16日	重篤	平成27年10月19日	回復
26	1	男	平成27年10月20日	アクトヒブ(K1726)	あり	プレベナー13	胃腸炎	蜂巣炎	平成27年10月21日	重篤	平成27年10月29日	回復
27	3ヶ月	不明	平成27年10月23日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン クアトロバック	なし	血便排泄	平成27年10月25日	重篤	不明	軽快
28	3ヶ月	男	平成27年10月29日	プレベナー13(14H01A)	あり	アクトヒブ テトラビック ロタリックス	なし	蒼白、蕁麻疹、下痢	平成27年10月29日	重篤	平成27年10月30日	回復
29	3ヶ月	男	平成27年10月29日	ロタリックス	あり	プレベナー13(14H01A) アクトヒブ テトラビック	なし	蒼白、蕁麻疹、下痢	平成27年10月29日	重篤	平成27年10月30日	回復
30	3ヶ月	男	平成27年10月29日	アクトヒブ	あり	プレベナー13(14H01A) テトラビック ロタリックス	なし	蒼白、下痢、蕁麻疹	平成27年10月29日	重篤	平成27年10月30日	回復
31	12週	女	平成27年11月4日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン	RSウイルス肺炎	腸重積症、血便排泄	平成27年12月2日	重篤	平成27年12月3日	軽快
32	14週	女	平成27年11月12日 平成27年12月10日	ロタリックス(AROLB079AA)	あり	アクトヒブ プレベナー13 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン ビームゲン	新生児呼吸窮迫症候群	ロタウイルス胃腸炎	平成27年11月13日	重篤	平成27年11月26日	回復
33	3ヶ月	不明	平成27年12月3日	プレベナー13(14H03A)	あり	アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	低出生体重児	発熱	平成27年12月3日	重篤	平成27年12月6日	回復
34	3ヶ月	不明	平成27年12月3日	クアトロバック	あり	プレベナー13(14H03A) アクトヒブ	低出生体重児	発熱	平成27年12月3日	重篤	平成27年12月6日	回復
35	3ヶ月	不明	平成27年12月3日	アクトヒブ	あり	プレベナー13(14H03A) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	低出生体重児	発熱	平成27年12月3日	重篤	平成27年12月6日	回復
36	6ヶ月	男	平成27年12月28日	テトラビック	あり	プレベナー13 アクトヒブ	なし	呼吸困難	平成27年12月28日	重篤	不明	軽快
37	11週	男	平成28年1月4日	ロタリックス(AROLB087AA)	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン	新生児貧血	腸炎、下痢、ショック症状、ウイルス感染	平成28年1月14日	重篤	平成28年1月18日	軽快
38	10週	女	平成28年1月15日	ロタリックス	あり	アクトヒブ(L1205) ヘプタバックス(9KR05R) プレベナー13(14J02A)	アトピー性皮膚炎	胃腸炎、嘔吐	平成28年1月15日	重篤	平成28年1月18日	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
39	5ヶ月	女	平成28年1月28日	テトラビック(4K11C)	あり	プレベナー13 アクトヒブ	なし	川崎病	平成28年1月28日	重篤	平成28年3月10日	軽快
40	6ヶ月	女	平成28年1月28日	アクトヒブ	あり	テトラビック プレベナー13	なし	川崎病	平成28年1月28日	重篤	平成28年2月5日	回復
41	5ヶ月	女	平成28年1月28日	プレベナー13	あり	アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	なし	川崎病	平成28年1月29日	重篤	平成28年2月12日	回復
42	幼児	不明	平成28年1月29日	プレベナー13	あり	アクトヒブ 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	なし	全身性皮疹	平成28年1月29日	重篤	平成28年	回復
43	3ヶ月	女	平成28年2月3日	スクエアキッズ	あり	アクトヒブ プレベナー13 ヘプタバックス	食物アレルギー	アナフィラキシーショック	平成28年2月3日	重篤	不明	不明
44	3ヶ月	女	平成28年2月3日	アクトヒブ	あり	スクエアキッズ プレベナー13 ヘプタバックス	乳アレルギー	アナフィラキシーショック	平成28年2月3日	重篤	不明	不明
45	3ヶ月	女	平成28年2月3日	プレベナー13	あり	アクトヒブ ヘプタバックス スクエアキッズ	乳アレルギー	アナフィラキシーショック	平成28年2月3日	重篤	平成28年2月4日	回復
46	3ヶ月	女	平成28年2月5日	プレベナー13(14J03A)	あり	アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン 沈降B型肝炎ワクチン 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	なし	蕁麻疹	平成28年2月5日	重篤	平成28年2月6日	回復
47 (No.47 ~50は 同一症 例)	3ヶ月	男	平成28年2月9日	アクトヒブ(L1228)	あり	沈降B型肝炎ワクチン 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	なし	死亡	不明	重篤	平成28年2月10日	死亡
48 (No.47 ~50は 同一症 例)	3ヶ月	不明	平成28年2月9日	ヘプタバックス(9KR06R)	あり	ロタテック アクトヒブ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン プレベナー13	RSウイルス感染	突然死	平成28年2月10日	重篤	平成28年2月10日	死亡
49 (No.47 ~50は 同一症 例)	3ヶ月	男	平成28年2月9日	テトラビック(4K11B)	あり	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷 風トキソイド結合体) 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体) 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母 由来) ロタウイルスワクチン	なし	突然死	平成28年2月10日	重篤	平成28年2月10日	死亡
50 (No.47 ~50は 同一症 例)	3ヶ月	男	不明	プレベナー13(14J01A)	あり	アクトヒブ 沈降B型肝炎ワクチン 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 沈降精製百日せきジフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	なし	突然死	不明	重篤	不明	死亡
51	幼児	不明	平成27年	プレベナー13	なし		なし	痙攣発作、呼吸抑制	不明	重篤	不明	不明
52	幼児	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性髄膜炎	不明	重篤	不明	不明
53	幼児	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌感染	不明	重篤	不明	不明
54	幼児	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌感染	不明	重篤	不明	不明
55	幼児	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌感染	不明	重篤	不明	不明
56	幼児	不明	不明	プレベナー13(14C04A)	なし		なし	肺炎球菌感染	不明	重篤	平成27年11月18日	回復
57	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	細菌性関節炎	平成27年11月	重篤	不明	回復
58	2ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	頬天疱瘡、状態悪化	不明	重篤	不明	軽快
59	2ヶ月	不明	不明	アクトヒブ	あり	プレベナー13	なし	皮下出血	不明	重篤	不明	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
60	3ヶ月	不明	不明	アクトヒブ	あり	沈降精製百日せきシフテリア破傷風 不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン プレベナー13	なし	皮下出血	不明	重篤	不明	回復
61	2ヶ月	不明	不明	プレベナー13	あり	アクトヒブ クアトロバック	なし	皮下出血	不明	重篤	不明	回復
62	幼児	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌感染	不明	重篤	不明	不明
63	5ヶ月	女	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	平成27年3月	重篤	不明	回復
64	10ヶ月	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年11月	重篤	不明	回復
65	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年7月	重篤	不明	回復
66	7ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年10月	重篤	不明	不明
67	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	平成27年6月	重篤	不明	回復
68	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年12月	重篤	不明	回復
69	2	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	菌血症	平成27年5月	重篤	不明	回復
70	1	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年4月	重篤	不明	回復
71	2	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症、乳様突起炎	平成27年10月	重篤	不明	不明
72	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年3月	重篤	不明	回復
73	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性敗血症	平成27年11月	重篤	不明	回復
74	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年4月	重篤	不明	回復
75	10ヶ月	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、眼窩蜂巣炎	平成27年12月	重篤	不明	回復
76	1	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年4月	重篤	不明	回復
77	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	平成27年12月	重篤	不明	不明
78	4ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性髄膜炎	平成27年12月	重篤	不明	不明
79	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年1月	重篤	不明	回復
80	9ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性髄膜炎、肺炎球菌性菌血症	平成27年3月	重篤	不明	後遺症
81	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症、肺炎	平成27年2月	重篤	不明	回復
82	10ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年12月	重篤	不明	回復
83	8ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年2月	重篤	不明	回復
84	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、細菌性腸炎	平成27年3月	重篤	不明	不明
85	9ヶ月	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性髄膜炎	平成27年9月	重篤	不明	不明
86	3	女	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年4月	重篤	不明	不明
87	2	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年11月	重篤	不明	回復
88	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	平成27年11月	重篤	不明	不明
89	1	女	不明	プレベナー13	なし		腹膜炎	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎、肺炎	平成27年6月	重篤	不明	回復
90	11ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症、肺炎	平成27年1月	重篤	不明	回復
91	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	不明	重篤	不明	回復
92	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	不明	重篤	不明	回復
93	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	不明	重篤	不明	回復
94	1	女	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年	重篤	不明	不明
95	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年	重篤	不明	不明
96	3	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
97	2	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年10月	重篤	不明	回復
98	2	女	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	平成27年10月5日	重篤	不明	不明
99	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年12月24日	重篤	不明	不明
100	5	男	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
101	4ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
102	2	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
103	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	回復
104	11ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年5月11日	重篤	不明	不明
105	11ヶ月	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年7月1日	重篤	不明	不明
106	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	軽快
107	9ヶ月	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	軽快
108	8ヶ月	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎	不明	重篤	不明	軽快
109	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎	不明	重篤	不明	軽快
110	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	軽快

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	企業 重篤度	転帰日	転帰内容
111	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、細菌性中耳炎	平成27年5月1日	重篤	不明	不明
112	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	平成27年1月6日	重篤	不明	不明
113	2	不明	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	細菌性骨髄炎	不明	重篤	不明	不明
114	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性肺炎	平成27年11月	重篤	不明	不明
115	11ヶ月	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	細菌性骨髄炎	不明	重篤	不明	不明
116	2	不明	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
117	2	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
118	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性肺炎	不明	重篤	不明	不明
119	1	不明	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
120	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
121	2	不明	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	蜂巣炎	不明	重篤	不明	不明
122	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	平成27年7月	重篤	不明	不明
123	9ヶ月	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	平成27年5月18日	重篤	不明	不明
124	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	不明	重篤	不明	不明
125	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症、肺炎	不明	重篤	不明	不明
126	9ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
127	9ヶ月	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症、肺炎	平成26年5月22日	重篤	不明	不明
128	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	平成27年8月15日	重篤	不明	不明
129	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	菌血症	平成27年8月15日	重篤	不明	不明
130	9ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
131	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
132	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
133	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
134	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
135	2	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
136	1	女	不明	プレベナー13	なし		肝移植	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
137	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
138	3	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
139	2	女	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
140	1	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
141	1	女	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
142	9ヶ月	男	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症、肺炎	不明	重篤	不明	軽快
143	1	不明	不明	プレベナー13	なし		治療変更(プレベナー7 価の接種歴あり)	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
144	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
145	1	不明	不明	プレベナー13	なし		なし	肺炎球菌性菌血症	不明	重篤	不明	不明
146	1	男	不明	プレベナー13	なし		痙攣発作	肺炎球菌性菌血症	平成27年	重篤	不明	不明
147	高齢者	不明	不明	プレベナー13	なし		間質性肺疾患、胃癌	肺炎球菌性菌血症、肺炎球菌性肺炎	不明	重篤	不明	不明

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)重篤症例一覧
(平成27年11月1日から平成28年2月29日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	1	男	平成26年3月10日	プレベナー13	13E03A	ファイザー	あり	アクトヒブ MR	メタニューモウイルス感染	熱性痙攣	平成26年3月15日	関連なし	重い	不明	軽快
2	15週	女	平成27年7月8日	ロタリックス	AROLB072 AA	GSK	あり	アクトヒブ プレベナー13 4種混合	なし	腸重積症	平成27年7月13日	記載なし	重い	平成27年7月13日	回復
3	66	女	平成27年7月9日	プレベナー13	14C09A	ファイザー	なし		なし	筋炎	平成27年7月9日	関連あり	重い	不明	未回復
4	11週	女	平成27年9月14日	ロタテック	K010006	MSD	あり	アクトヒブ プレベナー13 B型肝炎	過敏症	腸重積症、発熱、食欲減退	平成27年9月29日	記載なし	重い	平成27年10月4日	回復
5	2ヶ月	男	平成27年10月7日	アクトヒブ	K1680	サノフィ	あり	プレベナー13	なし	不全麻痺	平成27年10月23日	関連あり	重い	不明	未回復 (報告日:平成28年2月8日)
6	15週	男	平成27年10月14日	テトラビック	4K10C	阪大微研	あり	アクトヒブ ビームゲン プレベナー13 ロタリックス	心房中隔欠損症	チアノーゼ、アナフィラキシー反応	平成27年10月14日	関連あり	重い	平成27年10月14日	回復
7	3ヶ月	女	平成27年10月15日	クアトロバック	A025B	化血研	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン ロタリックス	なし	痙攣発作	平成27年10月16日	評価不能	重い	不明	未回復 (報告日:平成27年12月2日)
8	2ヶ月	女	平成27年10月21日	プレベナー13	14G03A	ファイザー	なし		なし	熱性痙攣、気分変化、発熱、蒼白	平成27年10月21日	関連あり	重い	不明	軽快
9	95	女	平成27年10月22日	プレベナー13	不明	ファイザー	なし		なし	ギラン・バレー症候群	平成27年10月26日	記載なし	重い	不明	未回復
10	1	男	平成27年10月30日	アクトヒブ	K1731	サノフィ	あり	プレベナー13 水痘	食物アレルギー	ギラン・バレー症候群、関節炎、倦怠感	平成27年10月30日	評価不能	重い	平成27年11月12日	回復
11	3ヶ月	男	平成27年11月5日	アクトヒブ	K1731	サノフィ	あり	プレベナー13 クアトロバック ヘプタバックス ロタリックス	なし	血小板減少性紫斑病	平成27年11月14日	評価不能	重い	平成27年12月10日	回復
12	1	女	平成27年11月13日	プレベナー13	14H02A	ファイザー	なし		なし	全身性強直性間代性発作	平成27年11月13日	評価不能	重い	平成27年11月14日	回復
13	2ヶ月	男	平成27年11月13日	アクトヒブ	L1081	サノフィ	あり	プレベナー13 ビームゲン ロタテック	なし	血小板減少性紫斑病	平成27年11月22日	評価不能	重い	平成28年1月	回復
14	3ヶ月	男	平成27年11月19日	ロタリックス	AROLB079 AA	GSK	あり	アクトヒブ プレベナー13 クアトロバック	なし	腸重積症	平成27年11月25日	評価不能	重い	平成27年11月27日	回復
15	2ヶ月	男	平成27年11月30日	アクトヒブ	L1081	サノフィ	あり	プレベナー13	なし	発熱	平成27年12月1日	評価不能	重い	平成27年12月2日	回復
16	17週	女	平成27年12月4日	アクトヒブ	L1132	サノフィ	あり	プレベナー13 ビームゲン テトラビック ロタテック	なし	痙攣発作	平成27年12月4日	評価不能	重い	平成28年1月6日	軽快
17	10週	女	平成27年12月8日	ロタリックス	AROLB087 AA	GSK	あり	アクトヒブ プレベナー13 ビームゲン	なし	腸重積症、血便排泄	平成27年12月12日	記載なし	重い	平成27年12月15日	回復
18	2ヶ月	女	平成27年12月15日	プレベナー13	14H03A	ファイザー	あり	アクトヒブ ヘプタバックス ロタリックス	なし	アナフィラキシー反応	平成27年12月15日	関連あり	重い	平成27年12月15日	回復
19	9週	女	平成27年12月16日	アクトヒブ	L1205	サノフィ	あり	プレベナー13 ヘプタバックス ロタテック	なし	失神寸前の状態	平成27年12月16日	関連あり	重い	平成27年12月16日	回復
20	3ヶ月	女	平成28年1月29日	プレベナー13	14K01A	ファイザー	あり	アクトヒブ ロタテック	なし	アナフィラキシー反応	平成28年1月29日	関連あり	重い	平成28年1月30日	回復

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
21	2ヶ月	男	平成28年1月29日	プレベナー13	14J03A	ファイザー	あり	アクトヒブ ヘプタバックス ロタテック	早産児、新生児仮死	痙攣発作	平成28年1月30日	関連あり	重い	平成28年2月4日	軽快
22	3ヶ月	男	平成28年2月19日	アクトヒブ	L1311	サノフィ	あり	プレベナー13 テトラビック ロタリックス	1/19 ヒブ 肺炎球菌 皮フの乾燥は強い	水疱	平成28年2月19日	関連あり	重い	平成28年2月27日	軽快

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) 非重篤症例一覧

(平成27年11月1日から平成28年2月29日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造所名	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	2ヶ月	女	平成27年10月6日	アクトヒブ	K1699	サノフィ	あり	プレベナー13 ビームゲン ロタリックス	なし	左大腿外側索状の褐色皮疹	平成27年10月13日 患者家族申告	評価不能	重くない	平成27年11月13日	未回復
2	1	女	平成27年11月5日	プレベナー13	14H01A	ファイザー	あり	アクトヒブ クアトロバック	10月5日MR(MR240)、水痘(VZ154)接種	接種部を中心として発赤、腫脹	平成27年11月6日	関連あり	重くない	平成27年11月12日	軽快
3	4ヶ月	男	平成27年11月30日	テトラビック	4K11B	阪大微研	あり	アクトヒブ プレベナー13	1回めのヒブ、小児肺炎球菌、ロタワクチン 接種(午前中)後、同日午後から翌日朝ま で発熱、2回めの接種のあとは発熱なし。	発熱	平成27年12月1日	評価不能	重くない	平成27年12月4日	軽快
4	1	男	平成27年12月14日	MR	MR242	阪大微研	あり	水痘 アクトヒブ プレベナー13	なし	両手、背部発赤	平成27年12月14日	関連あり	重くない	平成27年12月14日	軽快
5	1	男	平成27年12月15日	プレベナー13	14H03A	ファイザー	あり	アクトヒブ MR	12月8日 インフルエンザワクチン2回目施 行(右上腕)	左上腕から手首にかけて発赤、腫脹	平成27年12月16日	関連あり	重くない	平成27年12月18日	軽快
6	4ヶ月	男	平成28年1月13日	アクトヒブ	L1078	サノフィ	あり	プレベナー13 テトラビック	平成27年12月21日に水痘の児と接触 平成27年12月31日発熱(1日だけ)	右上肢の発赤、腫脹、発熱	平成28年1月13日	関連あり	重くない	平成28年1月16日	軽快
7	4ヶ月	男	平成28年2月16日	プレベナー13	14L01A	ファイザー	あり	アクトヒブ	なし	躯幹の上半分と顔面の発赤	平成28年2月16日	関連あり	重くない	平成28年2月16日 午後2時15分	軽快

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

ワクチン接種後の後遺症症例 2015年11月1日～2016年2月29日入手分

No.	ワクチン名	年齢・性別	基礎疾患等	経過	症状名	重篤/非重篤	ロット	転帰	専門家の意見
1 企 No. 80	プレベナー1 3	9ヶ月・男性	なし	年月日不明 1回日本剤の接種を行った。 年月日不明 2回日本剤の接種を行った。 年月日不明 3回日本剤の接種を行った。 月齢9か月 肺炎球菌性髄膜炎、肺炎球菌性菌血症、血清型15Aが発現した。 年月日不明 肺炎球菌性髄膜炎、肺炎球菌性菌血症は回復したが後遺症が残った。	肺炎球菌性髄膜炎 肺炎球菌性菌血症 (後遺症:不明)	重篤	不明	後遺症	<p>○A委員:ワクチン接種、症状発現時期、臨床症状など重要な所見が欠けていて、因果関係は評価できない。</p> <p>○B委員:沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)は7つの血清型(4、6B、9V、14、18C、19F、23F)に加え、6種類の血清型(1、3、5、6A、7F、19A)も含まれている。しかし患児の血清型15Aは含まれていないようであり、情報は少ないものの、因果関係は認められないと考える。</p> <p>○C委員:菌血症になっており、ADEMではない。また沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)の血清型に15Aはないので、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)とはまったく無関係な偶発的な感染と考えるのが妥当である。</p>

小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー13)接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシーのブライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年11月～平成26年2月	2	1	175万人
平成26年3月～平成26年9月	11	4	230万人
平成26年10月～平成26年12月	4	1	103万人
平成27年1月～平成27年10月	5	2	330万人
平成27年11月～平成28年2月	6	1	134万人

ワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例(重篤)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

平成27年11月1日～平成28年2月29日入手分まで

No.	接種ワクチン	年齢・性別	基礎疾患等	経過	症状名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル(企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
									ブライトン分類レベル	因果関係	意見	
1 企 No.43	スクエアキッズ アクトヒブ プレベナー13 ヘパタックス	3ヶ月・女性	食物アレルギー	接種当日に来院し乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)の2回目と沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチンの1回目を接種。直後から血圧低下、顔面蒼白、脈感知出来ずとなりエビネフリン等の初期治療を行うが、中々容態が安定せず他院へ搬送となった。 現在詳細調査中	アナフィラキシーショック	不明 不明 不明	不明	-	OA委員:4 OB委員:5 OC委員:4	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:十分な情報が得られていないため、症例定義に合致すると判断できない。 OB委員:迷走神経反射と思われる。 OC委員:情報不足	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
2 企 No.44	アクトヒブ スクエアキッズ プレベナー13 ヘパタックス	3ヶ月・女性	乳アレルギー	合併症、既往歴、医薬品副作用歴:なし アレルギー素因:あり:食物 接種当日に来院し乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)の2回目と沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチンの1回目を接種。直後から血圧低下、顔面蒼白、脈感知出来ずとなりエビネフリン等の初期治療を行うが、中々容態が安定せず近隣のAセンターに送った。アナフィラキシーショックが発現。 転帰:不明。	アナフィラキシーショック	不明 不明 不明	不明	-	OA委員:4 OB委員:5 OC委員:4	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:十分な情報が得られていないため、症例定義に合致すると判断できない。 OB委員:迷走神経反射と思われる。 OC委員:情報不足	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。
3 企 No.45	プレベナー13 アクトヒブ ヘパタックス スクエアキッズ	3ヶ月・女性	乳アレルギー	年月日不明 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)0.5mL/日(1回目)を接種した。5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(1回目)と同時接種であった。 接種当日 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)0.5mL/日(2回目)、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(2回目)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(2回目)を接種した。沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン(1回目)と同時接種であった。唇は蒼白になり、脈は減っていた。意識消失も見られた。アナフィラキシーショックが発現した。アレルギー専門医による初期対応を行い、他院へ入院した。他院へ移送後、30分後には回復した。 接種翌日 退院した。	アナフィラキシーショック	不明 不明 不明	回復	-	OA委員:4 OB委員:5 OC委員:4	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:記載されている症状だけでは、診断の必須条件を満たしていない。 OB委員:迷走神経反射と思われる。	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。

ワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例(重篤)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

平成27年11月1日～平成28年2月29日入手分まで

No.	接種ワクチン	年齢・性別	基礎疾患等	経過	症状名	ロット	転帰	プライトン分類レベル(企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
									プライトン分類レベル	因果関係	意見	
4 医 重 No.6	ロタリックス プレベナー13 テトラビック ビームゲン アクトヒブ	15週・男性	心房中隔欠損症	<p>本例は医師からの報告。情報入手経路はライセンス。患者:15週、男性 被疑製品:経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(使用理由:予防)、 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン(使用理由:予防)、 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(使用理由:予防)、 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)注射用(水溶液)(使用理由:予防)、 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)注射用(水溶液)(使用理由:予防) 現病:卵円孔開存 接種42日前 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)1回接種。 接種当日 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(2回目)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)接種。 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンロット番号:AROLB079AA ワクチン接種5分後より顔色不良(重篤性:企業重篤)というような症状(重篤性:非重篤)が出現し、60回/分以上の多呼吸(重篤性:非重篤)が約30秒程度認められた。 アナフィラキシー疑い(重篤性:企業重篤)、迷走神経反射(重篤性:非重篤)を発現。 全身チアノーゼ(重篤性:入院または入院期間の延長が必要なものと筋緊張低下(重篤性:非重篤)を認めたが10分以内に自然回復した。チアノーゼ消失し活気が回復した。 多呼吸、筋緊張低下、顔色不良、全身チアノーゼ、アナフィラキシー疑い、迷走神経反射の転帰は回復。 A病院紹介受診。 受診時には顔色不良や意識障害認めず、膨疹等の皮膚症状なく、呼吸器、消化器症状認めず、バイタルサインも異常なし。 ファロー四徴症のスペルなど心疾患の除外のため、心臓超音波検査を行ったが、先天性心疾患や不全徴候も認めなかった。 ワクチンの副反応を完全に除外できず、モニター管理下で経過観察目的にA病院へ入院となった。 原因は不明であった。 接種翌日 症状再燃なく退院。 接種107日後 B医療センターにて検査実施。(心電図・心エコー) 診断に関連する検査及び処置の結果 接種当日 心臓超音波検査:異常なし 接種107日後 心電図・心エコー:小さな卵円孔開存(1年後に経過観察予定) ロタリックス内用液 取られた処置:非該当 投与中止後改善:いいえ 再投与後再発:該当せず (過敏症/アナフィラキシー) 事象の詳細: 患者に下記の症状を認めましたでしょうか?:全身のチアノーゼ 過敏症反応が現れる前にどれくらいの量の被疑薬を投与していたでしょうか?:経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン1.5mL経口内服 治療内容についてご記入をお願いします:特になし(経過観察のみで回復) 本事象はどれくらい持続したでしょうか?:約10分 患者は完全に回復したでしょうか?:はい 既往歴: 薬剤投与歴を全て記載をお願いします: 1.生後1ヶ月時にカルボシステインシロップ、小児用アンブロキシール塩酸塩シロップ(接種63日前) 2.ワクチン接種 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(接種42日前) 他の薬剤でアレルギー反応が現れたことがあるでしょうか?:いいえ アナフィラキシーの分類評価(プライトン分類) カテゴリー(4)十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない</p>	チアノーゼ アナフィラキシー反応	AROLB079AA 14G04A 4K10C Y083L K1726	回復	-	<p>OA委員:4 OB委員:5 OC委員:4</p>	<p>OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない</p>	<p>OA委員:記載されている症状からは、呼吸器系のMajor基準に該当するが、その他の臓器症状はなく、複数臓器の症状を含むことが、診断の必須条件であり、カテゴリ4と考えられる。 OB委員:アナフィラキシーではないと考えますが、迷走神経反射なのか、泣き入りひきつけなのかはこれだけの情報ではわからない。</p>	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。

ワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例(重篤)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

平成27年11月1日～平成28年2月29日入手分まで

No.	接種ワクチン	年齢・性別	基礎疾患等	経過	症状名	ロット	転帰	プライトン分類レベル(企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
									プライトン分類レベル	因果関係	意見	
5 医重 No.18	アクトヒブ ロタリックス ヘパタックス スプレベナー13	2ヶ月・女性	なし	<p>薬剤投与歴:特になし 他の薬剤でアレルギーが現れたこと:なし 接種当日 近隣開業医院にて経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(経口、1回目)接種した。 接種20分後 同医院にて乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(皮下、初回1回目)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(皮下、1回目)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)(皮下、初回1回目)を同時接種した。接種後まもなく顔面紅潮、呻吟が出現、その後顔色不良、傾眠傾向、脈拍も60-80/分となった。 接種27分後頃 アドレナリン筋注(左大腿部)し数分で改善。脈拍110-130/分に回復した。全身色、活気はなかなか戻らず、筋注前はSpO2:95%だったが、一時SpO2:89%となり(うまくひろえてない可能性あり)、酸素投与を行った。1-2分後に酸素なしでSpO2:100%をたもてるようになり、A病院へ搬送となる。 接種1時間30分後頃 病室時には症状なし。ステロイドを投与の上、経過観察目的で入院し、著変なく退院。 アナフィラキシーの転帰:回復。 検査結果 白血球数:10.6、赤血球数:3.71、ヘモグロビン量:10.6、ヘマトクリット値:33.6、血小板数:698、MCHC31.6、MCH28.6、MCV90.5 [WBC分類]No:19.4、Ly:67.0、Mono:4.6、Eo:4.6、Baso:0.7、LUC:3.8 芽球0.0、全骨髄球:0.0、骨髄球0.0、後骨髄球0.0、好中球桿状核:1.0、好中球分葉核:25、リンパ球:70.0、単球:2.0、好酸球:2.0、好塩基球:0.0、異型リンパ球0.0、赤芽球0.0 総ビリルビン:2.4、直接ビリルビン:0.2、AST:36、ALT:24、ALP:1235、γ-GTP:44、LD:236、CK:86、アミラーゼ:30、総蛋白:5.8、アルブミン:4.4、尿素窒素:6.2、クレアチニン:0.23、尿酸:3.3、総コレステロール:239、CRP:0.0、ナトリウム:139、カリウム:4.6、クロール:105、カルシウム:10.5、無機リン:6.6、乳び:陽性、溶血:陰性、血糖(血清):126 アナフィラキシーの分類評価(プライトン分類) ステップ1、随伴症状のチェック <Major基準> 皮膚症状/粘膜症状:全身性蕁麻疹もしくは全身性紅斑 循環器系症状:測定された血圧低下(徐脈(HR60-80)、傾眠傾向) 呼吸器系症状:(呻吟) ステップ2、症例定義(診断基準レベル)のチェック <アナフィラキシーの症例定義> 突然発症AND徴候及び症状の急速な進行AND以下の複数(2つ以上)の器官系症状を含む:レベル1:1つ以上のMajor皮膚症状基準AND1つ以上のMajor循環器系症状基準 ステップ3、カテゴリーのチェック カテゴリー(1)レベル1</p>	アナフィラキシー反応	L1081 AROLB087AA 9KR04R 14H03A	回復	-	<p>OA委員:4 OB委員:5 OC委員:1</p>	<p>OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない</p>	<p>OA委員:記載されている症状だけでは、診断の必須条件を満たしていない。 OB委員:迷走神経反射もしくは泣き入りひきつけと思われる。 OC委員:因果関係は否定できない</p>	アナフィラキシーとは判断できない。ワクチン接種との因果関係は否定できない。
6 医重 No.20	スプレベナー13 アクトヒブ ロタテック	3ヶ月・女性	なし	<p>年月日不明 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)と乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(ともに1回目)を同時接種した。直後に両腕上肢紅斑(非重篤)が出現したが、すぐ1に消失した。 接種当日 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)0.5mL/日(2回目)、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(2回目)、5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(1回目)を同時接種した。 接種32分後頃 両上肢紅斑出現したため、様子を見ていた。 その後、頭、全身に広がってきたため、直ちにデキサメタゾンエリキシルを内服し経過をみていたが、改善せず、少し喘鳴が出現したため(SPO2:99%)、他院に救急搬送した。全身状態は悪くなく意識は明瞭であった(アナフィラキシーの発現)。 接種翌日 アナフィラキシーは回復した。</p>	アナフィラキシー反応	14K01A L1293 L007250	回復	-	<p>OA委員:1 OB委員:1 OC委員:1</p>	<p>OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない</p>	<p>OA委員:全身性の紅斑は、皮膚のMajor症状、喘鳴は呼吸器のMajor症状と解釈すれば、レベル1。 OB委員:アナフィラキシーと判断する。</p>	プライトン分類3以上のアナフィラキシー症例。ワクチン接種との因果関係は否定できない。

平成28年2月12日の合同会議にて一度報告されたが、新たに情報が得られた結果、ワクチン接種後のアナフィラキシー※が疑われたため、評価を行った症例

※【選択基準】
 症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

No.	接種ワクチン	年齢・性別	基礎疾患等	経過	症状名	ロット	転帰	ブライトン分類レベル (企業評価)	専門家の評価			事務局総合評価
									ブライトン分類レベル	因果関係	意見	
1	アクトヒブ プレベナー13 クアトロバック ビームゲン ロタテック	3ヶ月・女性	下痢	出生体重:2876グラム 予診票での留意点:接種8日前より下痢が出現。整腸剤処方し軽快した。 家族歴:特になし 接種当日 接種前の体温:36度8分 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(2回目)内服後、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(皮下、右上腕上、初回2回目)、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)(皮下、左上腕下、初回2回目)、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(皮下、右上腕下、初回1回目)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(皮下、左上腕上、2回目)を接種した。 啼泣後、顔色不良、口周囲チアノーゼを伴い意識低下がみられた。 SpO2(room air)97%、脈は触れ、皮膚症状や喘鳴は認めなかった。 生食の輸液を開始した。 接種21分後 顔色、チアノーゼも改善したが、他院で観察入院となった。 アナフィラキシーの分類評価(ブライトン分類) ステップ1、随伴症状のチェック (Major基準) 循環器系症状:意識レベル低下もしくは意識消失、呼吸器系症状:チアノーゼ (Minor基準) 循環器系症状:意識レベルの低下 ステップ2、症例定義(診断基準レベル)のチェック 全てのレベルで確実に診断されているべき事項(診断の必須条件) 突然発症 AND、徴候及び症状の急速な進行 ステップ3、カテゴリーのチェック 症例定義に合致しないもの(分析のための追加分類):カテゴリー(4)十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない。	失神寸前の状態 アナフィラキシー反応	K1726 14H01A A025A Y083A K010233	回復	-	OA委員:5 OB委員:5 OC委員:4	OA委員:因果関係は否定できない OB委員:因果関係は否定できない OC委員:因果関係は否定できない	OA委員:記載されている症状だけでは、診断の必須条件を満たしていない。 OB委員:泣き入りひきつけと思われる。	アナフィラキシーとは判断できない。 ワクチン接種との因果関係は否定できない。

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）に関する死亡報告一覧

平成 28 年 4 月 21 日現在

<2 種類以上のワクチンが同時接種された症例>

No.	ワクチン（ロット）	年齢・性別・ 基礎疾患 （持病）	接種日・経過	報告医評価	調査の結果	死亡症例として 報告を受けた日付 調査会評価
① 企 No 47 ～ 50	プレベナー13（14J01A） アクトヒブ（L1228） ヘプタバックス（9KR06R） テトラビック（4K11B） ロタウイルスワクチン	3 ヶ月・男	平成 28 年 2 月 9 日接種 接種翌日、死亡。	調査中	調査中	平成 28 年 2 月 18 日 平成 28 年 5 月 23 日調 査会（報告）

※○の付いた症例：今回の調査会の対象ワクチン接種後の死亡症例