

ゼプリオン[®]水懸筋注用との因果関係が不明であるが市販直後調査中に 報告された死亡症例

2014年4月15日時点でゼプリオン投与患者における死亡報告例は20例であり、このうち、
情報開示の許諾を情報提供者より得られた14例は以下のとおりです。

No	報告事象名 (MedDRA 基本語)	年齢	性別	パリペリドン又はリスペリドンの 前投与の有無・用量	本剤の 投与量 (開始時)	投与開始 から死亡 までの期間 (日)	合併症	抗精神病薬の併用
<u>1</u>	死亡	50代	女	リスペリドン持効性注射液・50mg	100mg	3	便秘	アリピプラゾール錠, クエチアピンフマル酸塩錠
<u>2</u>	肺塞栓,横紋筋融解症, 右室不全,精神症状	50代	男	リスペリドン持効性注射液・50mg	150mg	41	高尿酸血症,脂肪肝	オランザピン錠
<u>3</u>	死亡	60代	男	リスペリドン持効性注射液・25mg	25mg	14	不明	クエチアピンフマル酸塩錠
<u>4</u>	死亡	50代	男	リスペリドン持効性注射液・25mg	75mg	40	C型肝炎, 高血圧, 肝機能異常	ゾテピン錠
<u>5</u>	急性心筋梗塞	30代	男	リスペリドン内服液・4mg	150mg	4	高尿酸血症, 肥満	アリピプラゾール錠, オランザピン錠
<u>6</u>	死亡,動悸,呼吸困難, 構語障害	50代	男	無	50mg	13	高血糖, 喘息, 背部痛	オランザピン錠
<u>7</u>	低体温	40代	男	リスペリドン持効性注射液・25mg	50mg	42	高尿酸血症, 下肢骨折	リスペリドン錠, ゾテピン錠
<u>8</u>	死亡	30代	男	無	150mg	14	軽度精神遅滞	ハロペリドールデカン酸エステ ル注射液, オランザピン錠, プロナンセリン錠
<u>9</u>	心筋梗塞	60代	女	リスペリドン持効性注射液・50mg	150mg	34	低血圧, 不整脈	オランザピン錠, クエチアピンフマル酸塩錠, レボメプロマジンマレイン酸塩 錠
<u>10</u>	窒息, 嘔吐	50代	女	無	150mg	19	不眠, 不穏, 糖尿病, 高血圧	リスペリドン内服液
<u>11</u>	死亡	50代	男	リスペリドン錠・9mg, パリペリドン 徐放錠・12mg (本剤投与後も継続)	150mg	43	高血圧, 肥満, 糖尿病, 錐体外路症状	パリペリドン徐放錠, リスペリドン錠
<u>12</u>	死亡	40代	男	リスペリドン (剤形は不明)	150mg	77	誤嚥性肺炎	無
<u>13</u>	多臓器不全, 肝機能異常	50代	女	無	150mg	107	肺炎, イレウス	無
<u>14</u>	肺炎	70代	男	リスペリドン内服液・2mg (頓服)	150mg	36	無	リスペリドン内服液, ハロペリドール注射液, ハロペリドール内服液, オランザピン錠

下線：死亡に至った事象