

子宮頸がん予防ワクチン接種後の 疼痛症例一覧について

(平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日に報告された症例)

<選択基準>

ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J 16.1) の器官別大分類 (SOC: System Organ Class) が「筋骨格系および結合組織障害」に含まれる基本語 (PT: Preferred Terms) を含むもの、又は PT に「痛」を含むもの

<除外基準>

- 失神、アナフィラキシーに伴うもの
- 軽度の局所疼痛
- 原因疾患が特定されているもの
- 発熱に伴う頭痛又は筋肉痛であり、数日で回復したものの
- 痙攣、不整脈等で疼痛を伴わないもの
- 疼痛が接種側上肢に限定されるもの
- 疼痛以外の症状 (頭痛等) が主訴のもの

分類基準

- A 接種の翌日までに症状が発現しているもの。
- B 接種の数週間後 (2 日以上、1 ヶ月未満) に主要な症状が発現しているもの。
- C 接種から 1 ヶ月以上たって主要な症状が発現しているもの。
- Z 疾患概念が確立している疾患であり、これまでの医学的知見では接種以外の要因がより疑われるもの。
- X 情報が少なく判断ができない。

サ: サーバリックス ガ: ガーダシル

それぞれの後ろについている数字は症例リストにおける対応する症例の No.を示している。

No.	年齢		主たる副反応名	概要	発症まで	持続時間	分類案
1	16	サ2	股関節痛	2回目接種時、四肢脱力、股関節痛出現。3回目接種後に増悪。	0日	1年以上	A
2	44	サ4	全身の痛み	1回目接種後全身の痛み。2回目接種後全身の痛みとだるさ。	0日	3年以上	A
3	14	サ19	上肢下肢の筋肉痛	3回目接種後下肢筋肉痛、しびれ。その後上肢筋肉痛も出現。	0日	1年8ヶ月以上	A
4	15	サ20	関節痛	1回目接種後から全身の関節痛あり。3回目まで接種。	0日	2年10ヶ月以上	A
5	14	ガ8	ギラン・バレー症候群、背部痛	接種後、頭痛とともに、上下肢に力が入らなくなる症状が出現。その後背部や全身に痛み、高次脳機能障害。	0日	7ヶ月以上	A
6	48	サ3	左大腿痛、脱力	1回目接種後数時間後に頭が真っ白になってしまう。2回目接種後、接種部位の疼痛とともに左半身の脱力。	0日	0日	A
7	13	サ7	全身の痛み	2回目接種より月経異常。3回目接種翌日より全身に疼痛。	1日	不明	A
8	13	ガ7	胸痛	2回目接種数日後に頭痛、胸痛、動悸。	数日	1ヶ月以上	B
9	15	サ23	全身の疼痛	3回目接種数日後より頭痛、嘔吐、めまい、全身の疼痛。	数日	3ヶ月以上	B
10	13	ガ5	四肢の疼痛	接種3日後より左手指の痺れ、痛み。その後全身の痛み。ステロイドパルス療法施行されるも効果なし。	3日	2年8ヶ月以上	B
11	13	サ16	全身の慢性疼痛	3回目接種後、午後に全身疼痛。その後不登校となる。	1週間以内	6ヶ月以上	B
12	16	サ17	左膝の痛み	3回目接種4日後から左膝痛。関節滑膜生検施行する非特異的な所見。MTXの内服等で治療。その後軽快。	4日	1年9ヶ月程度	B
13	15	サ18	両膝の疼痛	3回目接種約10日後から両膝痛。リウマチは否定された。	10日	1年9ヶ月程度	B
14	16	サ8	全身の痛み	3回目接種12日後より左足を中心に痛み。	12日	16日以上	B
15	14	サ11	関節痛	3回目接種2週間後より関節痛、不随意運動。入院したところ高次脳機能障害あり。	2週間	2年以上	B
16	13	ガ2	全身の痛み	3回目接種1ヶ月後より頸部痛。その後全身の痛み、アロディニア、筋力低下あり。	1ヶ月程度	9ヶ月以上	C
17	14	サ22	CRPSの疑い	2回目接種1ヶ月以上のちに四肢の疼痛、筋力低下。	1ヶ月以上	2年3ヶ月以内	C
18	13	ガ3	CRPS1型	2回目接種1ヶ月後より右下肢中心の痛み。CRPS1型と診断。	1ヶ月程度	4ヶ月以上	C
19	17	サ21	関節痛	3回目接種約2ヶ月後より右膝関節痛。プレドニン、MTX等内服で軽快傾向。	40日程度	2年3ヶ月以上	C
20	15	サ5	全身関節痛	1回目接種約50日後に全身関節痛。プレドニンで軽快。	50日程度	1年程度	C
21	13	サ14	背部痛	3回目接種2ヶ月後より手のけいれん、過換気。その後背部痛。	2ヶ月	7ヶ月以上	C
22	12	ガ1	両上下肢の痺れ	2回目接種後、両足の痺れ。3回目接種後、しびれ、筋痛。他高CK血症。	2ヶ月程度	1年2ヶ月以上	C
23	15	サ6	全身関節痛	3回目接種約70日後に全身疼痛。リリカ、プレドニン等内服で軽快。	70日程度	1年4ヶ月以上	C
24	13	サ9	全身性の痛み	3回目接種2-3ヶ月後より全身性の痛み	2-3ヶ月	不明	C
25	16	サ15	移動性の痛み	3回目接種3ヶ月後より移動性の痛み、月経痛、疲労感等。	3ヶ月	不明	C
26	13	ガ4	肩、膝の痛み	3回目接種5ヶ月後より肩周囲の痛み。その後全身の痛み、頭痛。	5ヶ月程度	4ヶ月以上	C
27	16	サ1	四肢の疼痛、脱力	3回目接種6ヶ月後に四肢の疼痛。接種1年後には軽快傾向。	6ヶ月	553	C
28	14	サ12	関節痛、筋痛	接種後、肩、膝の痛み出現。歩行障害。	半年以上	2年以上	C
29	13	サ13	両下肢痛	接種6ヶ月後より両下肢痛、歩行困難。	半年以上	3ヶ月程度	C
30	-	サ10	足の痛み	接種後、足の指の関節が痛く、歩行困難。	不明	不明	X