

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

# リスク評価書（案）

No. 51（詳細）

## ナフタレン (Naphthalene)

### 目 次

本文	1
別添 1 有害性総合評価表	7
別添 2 有害性評価書	11
別添 3 ばく露作業報告集計表	21
別添 4 測定分析法	22

2014年 7月

厚生労働省

化学物質のリスク評価検討会

21 1 物理化学的性質

22 (1) 化学物質の基本情報


23 名称：ナフタレン (Naphthalene)

24 別名：ナフタリン、Naphthaline、Naphthene

25 化学式：C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>

26 構造式：

27



28

29 分子量：128.18

30 CAS番号：91-20-3

31 労働安全衛生法施行令別表9(名称等を通知すべき有害物)第408号

32

33 (2) 物理的・化学的性状

34

外観：特徴的な臭気のある白色固体	引火点 (C.C.) : 80°C
密度：1.16 g/cm <sup>3</sup>	発火点：567 °C
沸点：218 °C	爆発限界 (空気中) : 0.9 ~ 5.9 vol%、
初留点：該当しない	溶解性(水) : 3.1-3.4 mg/100 ml(20°C)
蒸留範囲：該当しない	オクタノール/水分配係数 log Pow : 3.3
蒸気圧：11 Pa (20°C)	換算係数：
蒸気密度 (空気=1) : 4.42	1ppm = 5.24 mg/m <sup>3</sup> (25°C)
融点：80 °C	1mg/m <sup>3</sup> = 0.19 ppm (25°C)

35

36 (3) 生産・輸入量、使用量、用途

37 生産量：177,482トン(2011年)

38 輸入量：1~10万トン未満 (製造・輸入量)

39 用途：染料中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤、有機顔料、テトラリン、デカ  
40 リン、ナフチルアミン、無水フタル酸、滅菌剤等、燃料、色素 (塗料・  
41 顔料)

42

43 2 有害性評価の結果 (別添1及び別添2参照)

44 (1) 発がん性

45 ○ヒトに対する発がん性が疑われる

46 根拠：IARCは、ヒトに対する証拠は不十分であるが、動物実験で発がん性の  
47 十分な証拠があったとして、2B (ヒトに対して発がんの可能性のある)  
48 に分類しているため

49

50 (各評価区分)  
51 IARC : 2B (ヒトに対して発がんの可能性がある)  
52 産衛学会 : 情報なし  
53 EU Annex VI : Carc. Cat. 3  
54 NTP 12<sup>th</sup>: R (合理的にヒト発がん物質と予測される)  
55 ACGIH : A3(動物に対して発がん性を示す)

56  
57 ○閾値の有無の判断 : 判断できない

58 根拠 : *In vitro* 遺伝毒性試験の結果は、哺乳類動物細胞を用いる染色体異常試  
59 験では陽性であるが、ネズミチフス菌を用いる復帰試験では陰性であっ  
60 た。*In vivo* では、遺伝毒性試験 (ラット肝を用いる一本鎖DNA切断試  
61 験) で陰性、ショウジョウバエを用いる特定座位試験では陽性であった。  
62 このように遺伝毒性試験の結果が陽性、陰性に分かれており、その有無  
63 が判断できないことから、閾値の有無は判断できないとした。

64  
65 (2) 発がん性以外の有害性

66 ○急性毒性 :

67 吸入毒性 :  $LC_{50} = 65 \text{ ppm/ } 1 \text{ H}$ 、 $100 \text{ ppm/ } 8 \text{ H}$ を超える値 (ラット)

68 経口毒性 :  $LD_{50} = 490\text{-}9,430 \text{ mg/kg}$  体重 (ラット)

69 吸入毒性 :  $LC_{50} =$  データなし (マウス)

70 経口毒性 :  $LD_{50} = 350\text{-}710 \text{ mg/kg}$  体重 (マウス)

71 経皮毒性 :  $LD_{50} = 2,500 \text{ mg/kg}$  体重以上 (ラット)

72  $LD_{50} = 20,000 \text{ mg/kg}$  体重以上 (ウサギ)

73 ヒトへの影響 : 化学工場におけるナフタレン粉末機の修理作業における高濃  
74 度のナフタレンの粉塵吸入による急性毒性の例があり、頭痛、悪心、嘔  
75 吐の症状、さらに赤血球減少、ウロビリノーゲン尿、尿潜血反応陽性、  
76 肝臓の腫大、溶血性貧血などがみられた。

77 ○皮膚刺激性/腐食性 : あり (軽度から中等度の皮膚刺激性)

78 眼に対する重篤な損傷性/刺激性 : あり (ごく軽度から中等度の眼刺激性)

79 ○皮膚感作性 : 報告なし

80 ○呼吸器感作性 : 報告なし

81 ○反復投与毒性 :  $LOAEL=10 \text{ ppm}$

82 根拠 : B6C3F1マウス雌雄各75~150匹を群とし、0、10、30 ppmを104週  
83 間 (6時間/日、5日/週) 吸入させた結果、鼻の慢性炎症、嗅上皮の化  
84 生、呼吸上皮の過形成は10 ppm以上の群の雄の96~99%、雌の100%  
85 にみられた。

86 ○生殖毒性 : なし

87

88 (3) 許容濃度等

89 ○ACGIH

90 TWA : 10 ppm (52 mg/m<sup>3</sup>)、経皮吸収  
91 STEL : 15 ppm (79 mg/m<sup>3</sup>)  
92 根拠(妥当性の評価) : これらの値は、眼及び呼吸器系の刺激、眼毒性(白  
93 内障、視神経、レンズの混濁、網膜変性)の可能性を最小限にすることを意  
94 図している。ナフタレンの有害性には、頭痛、食欲不振、吐き気、溶血性貧  
95 血、ヘモグロビン尿などの血液疾患を含む。  
96 ○日本産業衛生学会 情報なし  
97 ○NIOSH TWA: 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)  
98 STEL: 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)  
99 ○OSHA TWA: 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)  
100 STEL: 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)

101 (参考)

102 ナフタレンについては、2010年にWHOで室内空気質のガイドライン値(動物  
103 実験のLOAELから算定した0.01mg/m<sup>3</sup>(年平均濃度))が設定されている。

104  
105 (4) 評価値

- 106 ○一次評価値 : 評価値なし  
107 発がん性の閾値の有無が判断できないため、一次評価値なし。  
108 ○二次評価値 : 10 ppm (52 mg/m<sup>3</sup>) (ACGIH)  
109 米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が提言している、ばく露限界値(TLV-  
110 TWA)を二次評価値とした。

111  
112 3 ばく露実態評価

113 (1) 有害物ばく露作業報告の提出状況(詳細を別添3に添付)

114 平成21年におけるナフタレンの有害物ばく露作業報告は、合計で152事業場か  
115 ら、505作業についてなされ、作業従事労働者数の合計は9,151人(延べ)であっ  
116 た。また、対象物質の取扱量の合計は約4530万2千トン(延べ)であった。

117 主な用途は「他の製剤等の原料として使用」、「顔料、染料、塗料又は印刷イン  
118 キンキとして使用」等、であり、主な作業は「計量、配合、注入、投入又は小分け  
119 の作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の作業」等、であった。

120 505作業のうち、作業時間が20時間/月以下の作業が61%、局所排気装置の設  
121 置がなされている作業が56%、保護手袋を使用する作業は88%、防毒マスクの  
122 着用がなされている作業が50%、保護眼鏡の着用も71%であった。

123  
124 (2) ばく露実態調査結果

125 有害物ばく露作業報告のあった、ナフタレンを製造し、又は取り扱っている事  
126 業場から、「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に基づき、ばく露  
127 予測モデル(コントロールバンディング)を用いて、ばく露レベルが高いと推定  
128 される7事業場を選定した。

129 平成24年度において、作業実態の聞き取り調査を行った上で、特定の作業に従

130 事する30人の労働者に対する個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場にお  
131 いて作業環境測定基準に基づくA測定を行い、45地点についてスポット測定を実  
132 施した。

133 この結果、個人ばく露測定結果の8時間加重平均濃度（8時間TWA）の最大値  
134 は7.55ppm（充填作業）となり、二次評価値（10ppm）を下回ったが、全データ  
135 を用いて信頼率90%で区間推定した上限値（上側5%）は14.6ppmと二次評価値  
136 を上回っていたことから、更に詳細なリスク評価が必要とされた。

137 詳細リスク評価においては、ナフタレンを取り扱う作業、特に当該物質の充填  
138 、梱包作業を行う事業場に対して、当該作業に係る追跡調査を行い、当該作業工  
139 程に共通した問題かをより詳細に分析することとされた。

140 平成25年度の調査は、ナフタレンを原料とした化学製品を製造する事業場（F  
141 ）、対象物質（原体）を原料として防虫剤を製造する2事業場（G、H）の計3事  
142 業場で、10名の作業員について個人ばく露測定を実施した。Fでは原料仕込み、  
143 サンプルング（製品検査）、充填の工程における各作業について、G、Hでは、  
144 原料投入、打錠又は充填・梱包の工程における各作業について、個人ばく露測  
145 定を実施した。また、それぞれの事業場の作業員が担当するばく露作業の内、可  
146 能な作業についてスポット測定とA測定を実施した。

147 なお、平成25年度に追加調査を行った3事業場のうち、1事業場については、  
148 平成24年度のばく露実態調査対象事業場と同一事業場である。

149

150 ○測定分析法（詳細な測定分析法は別添4に添付）

- 151 ・ 個人ばく露測定：スチレンジビニルベンゼン捕集管により捕集
- 152     ※個人ばく露測定は、呼吸域でのばく露条件下でのサンプルングである。
- 153 ・ 作業環境測定：捕集剤にポンプを接続して捕集
- 154 ・ スポット測定：捕集剤にポンプを接続して捕集
- 155 ・ 分析法：ガスクロマトグラフ法

156

157 ○対象事業場における作業の概要

158 対象事業場におけるナフタレンの用途は、「当該物質を小口包装し防虫剤と  
159 する」、「ナフサ分解ボトム（タール状で副生する当該物質を含有する）から軽  
160 質分を分留し、重油燃料を回収する」、「タール分をカーボンブラック原料と  
161 して燃焼する」、「コールタールから分留精製して当該物質を製造する」、「  
162 当該物質を95%含有する粗油を反応原料とした他物質を製造する」、「活性  
163 炭の製造原料として当該物質を含有する石油ピッチを取り扱う」、「コークス  
164 炉ガスから得られるタール分を蒸留して軽油を製造する工程で副生する当該  
165 物質を40%以上含有する溜分を取り扱う」等であった。

166 ナフタレンのばく露の可能性のある主な作業は、「梱包」「充填」作業で、  
167 また、一部は、局所排気装置が設置されていない屋内で行われていた。


168

169 ○測定結果

170 25年度の個人ばく露測定の結果、最大TWA値は、3.2ppmであり、二次評価値を下  
171 回った。

172 24, 25年度の2年間のばく露実態調査の結果、個人ばく露TWA値は全て二次  
173 評価値（10ppm）を下回り、その最大値は7.55ppmであった。一方、平成24  
174 及び25年度の全測定データ（測定値が定量下限値を下回ったものを除く22デー  
175 タ）から統計手法による区間推定上側限界値を求めたところ、17.3ppmとなっ  
176 たため、ばく露評価ガイドラインの規定（個人ばく露TWA8h実測最大値と区  
177 間推定上側限界値のいずれか大きい方を最大値とする）に基づき、最大ばく露  
178 濃度は 17.3 ppmとなった。また、2年間で56地点についてスポット測定を実  
179 施したが、他の製剤の原料として使用している事業場における梱包・充填作業  
180 について、9.24ppmと最大となり、個人ばく露測定と同様に高い水準となった。

181



182

183

#### 184 4 リスクの判定及び今後の対応

185 ナフタレンの製造・取扱事業場におけるばく露最大値は17.3ppmとなり、二次評  
186 価値を超える水準となった。また、スポット測定においても、9.24ppmと、二次評  
187 価値に近い水準が確認された。このことから、ナフタレンの製造・取扱事業場にお  
188 いては、労働者の健康障害に係るリスクが高いと考えられる。

189 この場合、作業別に見ると、ナフタレンを含有する製剤の包装・充填作業におい  
190 て比較的高いばく露が確認されているが、原料投入、清掃等他の作業も含む全デー  
191 タによる区間推定により得られたばく露最大値を高いリスクと判定していること

192 から、包装・充填以外の作業も含めて健康障害防止措置を検討する必要がある。  
 193 また、ナフタレンについては、経皮毒性、皮膚刺激性があり、ヒトに皮膚炎を起  
 194 こす場合もあることから、健康障害防止措置の検討に当たっては、皮膚の保護等の  
 195 措置を合わせて検討する必要がある。

196  
 197

198 ばく露実態調査集計表

199

用途	対象事業場数	個人ばく露測定結果(ppm)				スポット測定結果(ppm)			作業環境測定結果(A測定準拠)(ppm)			
		測定数	平均(※1)	8時間TWAの平均(※2)	最大(※3)	単位作業場所数	平均(※4)	最大値(※3)	単位作業場所数	平均(※5)	最大値(※3)	
ナフタレン												
1.ばく露作業報告対象物質の製造	1	11	0.008	-	-	9	0.031	0.1	-	-	-	
2.他の製剤等の製造を目的とした原料としての使用	6	19	0.099	0.125	7.55	31	0.576	9.24	7	0.09	4.8	
3.触媒又は添加剤として使用	1	4	0.113	0.094	0.457	4	0.089	0.21	-	-	-	
12.その他	2	6	0.014	0.022	0.250	12	0.075	0.237	-	-	-	
計	10	40	0.038	0.085	7.55	56	0.204	9.24	7	0.09	4.8	
集計上の注: 定量下限未満の値及び個々の測定値は測定時の採気量(測定時間×流速)により有効桁数が異なるが集計にはこの値を用いて小数点以下3桁で処理した(1以上は有効数字3桁) ※1: 測定値の幾何平均値 ※2: 8時間TWAの幾何平均値 ※3: 個人ばく露測定結果においては、8時間TWAの、それ以外については測定値の、最大値を表す ※4: 短時間作業を作業時間を通じて測定した値の単位作業場所ごとの算術平均を代表値とし、その幾何平均 ※5: 単位作業ごとの幾何平均を代表値とし、その幾何平均												

200

201

## 有害性総合評価表

物質名：ナフタレン

有害性の種類	評 価 結 果
ア 急性毒性	<p><u>致死性</u></p> <p><u>ラット</u>  吸入毒性：LC<sub>50</sub> = 65 ppm/ 1 H、100 ppm/ 8 H を超える値  経口毒性：LD<sub>50</sub> = 490-9430mg/kg 体重</p> <p><u>マウス</u>  吸入毒性：LC<sub>50</sub> = データなし  経口毒性：LD<sub>50</sub> = 350-710 mg/kg 体重</p> <p><u>ウサギ</u>  経口毒性：LD<sub>50</sub> = 情報なし</p> <p><u>健康影響</u>  ・イヌで貧血、嘔吐、下痢がみられ、マウスの経口投与では浅呼吸、運動失調、眼瞼下垂がみられた。</p>
イ 刺激性/腐食性	<p>皮膚刺激性/腐食性：あり  軽度から中等度の皮膚刺激性</p> <p>眼に対する重篤な損傷性/刺激性：あり  ごく軽度から中等度の眼刺激性</p>
ウ 感作性	<p>皮膚感作性：報告なし  呼吸器感作性：報告なし</p>
エ 反復投与毒性(生殖・発生毒性/遺伝毒性/発がん性は除く) (信頼できる評価レベルが複数求まる場合は複数記載する)	<p>LOAEL=10 ppm</p> <p>根拠：B6C3F1 マウス雌雄各 75～150 匹を群とし、0、10、30 ppm を 104 週間 (6 時間/日、5 日/週) 吸入させた結果、鼻の慢性炎症、嗅上皮の化生、呼吸上皮の過形成は 10 ppm 以上の群の雄の 96～99%、雌の 100%にみられた。</p> <p>不確実係数 UF=100</p> <p>根拠：種差(10)、LOAEL から NOAEL への変換(10)</p> <p>評価レベル=0.075 ppm (0.39 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>評価式：10 ppm×6/8 ×1/100= 0.075 ppm</p> <p>(:経口投与試験の結果を参考として計算する)</p> <p>(参考)</p> <p>NOAEL=100 mg/kg 体重/日</p> <p>根拠：ラットに 5 日/週 x 13 週間経口投与した実験では、200 mg/kg 体重/日以上で体重増加抑制、200 mg/kg で皮質尿細管へのリンパ球浸潤あるいは局所再生尿細管の出現がみられた。NOAEL は 100 mg/kg 体重/日であった。</p>



	<p>不確実性係数 UF=10</p> <p>根拠：種差</p> <p>評価レベル=11.4 ppm (60 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>計算式：100 mg/kg/day x 60 kg/10m<sup>3</sup> x 5/5 x 1/10 = 60 mg/m<sup>3</sup></p>
オ 生殖・発生毒性 (信頼できる評価レベルが複数求まる場合は複数記載する)	<p>生殖・発生毒性：判断できない</p>
カ 遺伝毒性 (変異原性を含む)	<p>遺伝毒性：判断できない</p> <p>根拠：<i>In vitro</i> 遺伝毒性試験の結果は、哺乳類動物細胞を用いる染色体異常試験では陽性であるが、ネズミチフス菌を用いる復帰試験では陰性であった。<i>In vivo</i> 遺伝毒性試験（ラット肝を用いる一本鎖 DNA 切断試験）で陰性であった。ただしショウジョウバエを用いる特定座位試験では陽性であった。</p>
キ 発がん性	<p>発がん性：ヒトに対する発がん性が疑われる</p> <p>根拠：IARC では、以下のことから 2B（ヒトに対する発がんの可能性がある）に分類している。</p> <p>ヒトに関する証拠は不十分であった。</p> <p>動物試験では十分な証拠があった。</p> <p>雌雄のラットの吸入試験において、ナフタレンへのばく露と嗅上皮の神経芽腫及び鼻腔呼吸上皮の腺腫の発生との関係がみられた。これらの腫瘍は、無処理のラットでは稀であると考えられている。</p> <p>雌の担がんマウスを用いたスクリーニングのための吸入試験で、肺腺腫の増加がみられた。マウスの吸入試験で、雌マウスでは、細気管支／肺胞腺腫が増加し、雄では有意な増加はみられなかった。</p> <p>ラットの経口試験、マウスの腹腔内投与試験、ラットの皮下投与試験の報告は、発がん性の評価に用いるには、限定的であった。</p> <p>閾値の有無：判断できない</p> <p>根拠：<i>In vitro</i> 遺伝毒性試験の結果は、哺乳類動物細胞を用いる染色体異常試験では陽性であるが、ネズミチフス菌を用いる復帰試験では陰性であった。<i>In vivo</i> 遺伝毒性試験（ラット肝を用いる一本鎖 DNA 切断試験）で陰性である。ただしショウジョウバエを用いる特定座位試験では陽性であった。</p> <p>閾値ありの場合</p>

	<p>LOAEL = 10 ppm</p> <p>根拠：対象動物：F344/N ラット</p> <p>ばく露条件：吸入ばく露、0、10、30、60 ppm、6時間/日、5日/週、105週間</p> <p>腫瘍のタイプ：雌雄、投与全群で鼻腔呼吸上皮腺腫発生率の有意な増加<sup>2)</sup></p> <p>不確実係数 UF=1000</p> <p>不確実性係数 UF = 1000</p> <p>根拠：種差(10)、LOAEL から NOAEL への変換(10)、がんの重大性(10)</p> <p>評価レベル = 0.0075 ppm (3.9 x 10<sup>-2</sup> mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>計算式：10 ppm x 1/1000 x 6/8 x 5/5 = 0.0075 ppm</p> <p><u>閾値なしの場合</u></p> <p>California EPA(OEHHA): Hot Spots unit Risk and Cancer Potency Values は USEPA の実施したラットのナフタレンの吸入試験の結果から、当該物質のユニットリスクに関して以下の提案をしている。</p> <p>Unit Risk (UR) = 3.4 × 10<sup>-5</sup> = 1 μg/ m<sup>3</sup></p> <p>これに基づいて算出した。</p> <p>生涯発がんリスクレベル[RF(10<sup>-4</sup>)] = 2.9 × 10<sup>-4</sup> mg/m<sup>3</sup>(1.0 × 10<sup>-4</sup> ppm)。</p> <p>[RL(10<sup>-4</sup>)] = 2.9 × 10<sup>-4</sup> (μg/m<sup>3</sup>)<sup>-1</sup> × 0.19 = 0.55 × 10<sup>-4</sup> (ppm)</p> <p>労働補正後の[RL(10<sup>-4</sup>)]に対応する濃度は</p> <p>[RL(10<sup>-4</sup>)]/ (呼吸量：10/20 × 労働日数：240/365 × 労働年数：45/75) を行う。) </p> <p>計算式：RL(10<sup>-4</sup>)/(10/20 × 240/365 × 45/75) = 0.119 × 10<sup>-4</sup> ppm = 1.9 × 10<sup>-5</sup> ppm</p>
ク 許容濃度	<p>ACGIH</p> <p>TWA：10 ppm (52 mg/m<sup>3</sup>)、経皮吸収</p> <p>STEL：15 ppm (79 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>根拠(妥当性の評価)：これらの値は、眼及び呼吸器系の刺激、眼毒性（白内障、視神経、レンズの混濁、網膜変性）の可能性を最小限にすることを意図している。ナフタレンの有害性には、頭痛、食欲不振、吐き気、溶血性貧血、ヘモグロビン尿などの血液疾患を含む。</p> <p>日本産業衛生学会 情報なし</p> <p>NIOSH TWA: 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>STEL: 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>OSHA TW: 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)</p> <p>STEL: 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)</p>

有害性評価書

物質名：ナフタレン

1. 化学物質の同定情報<sup>1)</sup>

名称：ナフタレン (Naphthalene)

別名：ナフタリン、Naphthaline、Naphthene

化学式：C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>

分子量：128.18

CAS 番号：91-20-3

労働安全衛生法施行令別表 9 (名称を通知すべき有害物) 第 408 号

2. 物理化学情報

(1) 物理的・化学的性状<sup>1)</sup>

外観：特徴的な臭気のある白色固体

引火点 (C.C.)：80℃

密度：1.16 g/cm<sup>3</sup>

発火点：567℃

沸点：218℃

爆発限界 (空気中)：0.9 ~ 5.9 vol%、

初留点：該当しない

溶解性(水)：3.1-3.4 mg/100 ml(20℃)<sup>5)</sup>

蒸留範囲：該当しない

オクタノール/水分配係数 log Pow : 3.3

蒸気圧：11 Pa (20℃)

換算係数：

1ppm = 5.24 mg/m<sup>3</sup> (25℃)

蒸気密度 (空気=1)：4.42

1mg/m<sup>3</sup> = 0.19 ppm (25℃)

融点：80℃

(2) 物理的・化学的危険性<sup>1)</sup>

ア 火災危険性：可燃性である。

イ 爆発危険性：80℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。空气中で粒子が細かく拡散して爆発性の混合気体を生じる。

ウ 物理的危険性：粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉塵爆発の可能性がある。

エ 化学的危険性：燃焼すると刺激性で有毒なガスを生成する。強力な酸化剤と反応する。

3. 生産・輸入量/使用量/用途<sup>2), 3)</sup>

生産量：177,482 トン(2011年)<sup>2)</sup>

輸入量：1~10 万トン未満 (製造・輸入量)<sup>3)</sup>

用途：染料中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤、有機顔料、テトラリン、デカリン、ナフチルアミン、無水フタル酸<sup>2)</sup> 滅菌剤等、燃料、色素 (塗料・顔料)<sup>3)</sup>

製造業者：大阪ガス、シーケム、JFE ケミカル、日本コークス工業<sup>2)</sup>

31  
32  
33  
34  
35  
36  
37

4. 健康影響

(1) 実験動物に対する毒性

ア 急性毒性

致死性

実験動物に対するナフタレンの急性毒性試験結果を以下にまとめる<sup>4)</sup>。

	マウス	ラット	ウサギ
吸入、LC <sub>50</sub>	情報なし	65 ppm / 1H を超える値 100 ppm / 8H を超える値	情報なし
経口、LD <sub>50</sub>	350-710 mg/kg 体重	490-9430mg/kg 体重	情報なし
経皮、LD <sub>50</sub>	情報なし	2500 mg/kg 体重 以上	20000 mg/kg 体重 以上
腹腔内 LD <sub>50</sub>	150-380 mg/kg 体重	約 1000 mg/kg 体重	

38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

健康影響

・イヌで貧血、嘔吐、下痢がみられ、マウス経口投与では浅呼吸、運動失調、眼瞼下垂がみられた<sup>20)</sup>。

イ 刺激性及び腐食性<sup>20)</sup>

- ・軽度から中等度の皮膚刺激性
- ・ごく軽度から中等度の眼刺激性

ウ 感作性<sup>20)</sup>

- ・報告なし

エ 反復投与毒性（生殖・発生毒性、遺伝毒性/変異原性、発がん性は除く）

吸入ばく露

・B6C3F<sub>1</sub> マウス雌雄各75~150 匹を群とし、0、10、30 ppm を104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、10 ppm 以上の群で雌雄の体重は試験期間を通してやや低かった。雌の生存率に有意差はなかったが、雄では対照群の生存率が有意に低く、その原因は群内での闘争による外傷とその二次感染であった。組織への影響は鼻と肺にみられ、鼻の慢性炎症、嗅上皮の化生、呼吸上皮の過形成は10 ppm 以上の群の雄の96~99%、雌の100%にみられた。肺では主に炎症性の変化がみられ、10 ppm 以上の群の雌雄で慢性炎症、肉芽腫性炎症、雄で組織球の細胞浸潤、雌でリンパ球の

細胞浸潤の発生率が有意に高かった)。この結果から、LOAEL を10 ppmとした<sup>27)</sup>

- Fischer 344 ラット雌雄各 49 匹を 1 群とし、0、10、30、60 ppm を 105 週間 (6 時間/日、5 日/週) 吸入させた結果、10 ppm 以上の群の雄の体重は試験期間を通して低かったが、雌の体重には影響はなく、雌雄の生存率にも影響なかった。組織への影響は鼻及び肺でみられ、10 ppm 以上の群の雌雄で嗅上皮の過形成、萎縮、慢性炎症、硝子滴変性、呼吸上皮の過形成、扁平上皮化生、硝子滴変性、呼吸上皮杯細胞の過形成、30 ppm 以上の群の雌雄で腺の扁平上皮化生の発生率にそれぞれ有意な増加を認め、特に嗅上皮の変性は雌雄ともに投与群のほぼ全例にみられた。肺では雌の 10 ppm 以上の群で肺胞上皮の過形成の発生率に増加がみられ、10、30 ppm 群の発生率は有意に高かったが、雄では 10、30 ppm 群の発生率は有意に低かった。また、雄の 10、60 ppm 群の肺では軽度の慢性炎症の発生率が有意に高かったが、ばく露との関連は明らかでなかった。この結果から、LOAEL を 10 ppm (ばく露状況で補正 : 1.8 ppm (9.4 mg/m<sup>3</sup>)) とした。<sup>27)</sup>

#### 経口投与

- CD-1 マウスに 0、27、53、267 mg/kg 体重/日を 14 日間投与した実験では、体重増加の抑制と死亡がみられた。また、雄で胸腺の絶対重量の減少、雌でビリルビンの増加、脾臓の絶対及び相対重量の減少、肺の絶対及び相対重量の増加がみられた。<sup>5)</sup>
- CD-1 マウスに 5.3、53、133 mg/kg 体重/日を 7 日/週で 90 日間投与した実験で肝臓のベンゾピレンヒドロキシラーゼ活性の低下がみられ、NOAEL は 5.3 mg/kg 体重/日であった。<sup>9)</sup>
- F344 ラットに 25、50、100、200、400 mg/kg 体重/日を 5 日/週で 13 週間投与した実験では、200 mg/kg 以上の群で体重増加抑制、200 mg/kg 群で皮質尿細管へのリンパ球浸潤あるいは局所再生尿細管の出現がみられた。この結果から NOAEL は 100 mg/kg 体重/日であった。<sup>9)</sup>
- Blue-Spruce 雄ラット 24 匹を 1 群として 0、100 mg/kg 体重/日を 1 日おきに 2 週間強制経口投与し、その後は 3~6 週にかけて段階的に 100 mg/kg 体重/日を 750 mg/kg まで増量して 9 週まで投与を継続した結果、死亡や瀕死はみられなかったが、投与 5 週間後から 100 から 750 mg/kg 群で体重増加の抑制が始まり、最終的な体重は約 20%低かった。また、肝臓では過酸化脂質が約 200%増加したが、肺や眼、心臓では過酸化脂質の増加はなかった。<sup>27)</sup>
- Brown Norway ラット雌 7~15 匹を 1 群として 0、100、500、1,000 および 1,500 mg/kg 体重/日を 10 週間 (2 回/週) 強制経口投与し、白内障の発生を調べた結果、対照群及び 100 mg/kg 群での発生はなかったが、500 mg/kg 以上の群では 2.5~3 週頃から白内障様の変化が現れて全数にみられるようになり、その程度は用量及び投与期間に依存して増加した。なお、平均体重は 1,500 mg/kg 群では 180 g から 150 g に、1,000 mg/kg 群では 180 g から 170 g に低下したが、100 および 500 mg/kg 群の体重は対照群と同程度であった<sup>27)</sup>。

96 ・イヌに 220 mg/kg 体重/日を 7 日間投与した実験で下痢、虚脱、食欲の欠如、運動失調、  
97 貧血がみられた。また、イヌに 1500 mg/kg 体重/日を 40 日間投与した実験で溶血性貧  
98 血、血色素尿症がみられたが、投与中止後回復した。<sup>20)</sup>

99

100 オ 生殖・発生毒性

101 吸入ばく露

102 ・Fischer 344 ラット雌雄各 49 匹を 1 群とし、0、10、30、60 ppm を 105 週間（6 時  
103 間/日、5 日/週）吸入させた試験、および B6C3F<sub>1</sub> マウス雌雄各 75～150 匹を 1 群とし、  
104 0、10、30 ppm を 104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた試験では、いずれも雌  
105 雄の生殖器に影響はなかった。<sup>27)</sup>

106

107 経口投与/経皮投与/その他の経路等

108 ・Sprague-Dawley ラット雌に 0、100、400、500、600、800 mg/kg 体重/日 を妊娠 6 日か  
109 ら 15 日まで強制経口投与した用量設定のための予備試験の結果、800 mg/kg 群では 67%  
110 が投与期間内に死亡し、生存した 33%でも全数で全胚吸収がみられ、同様の有意な影響  
111 は 600mg/kg 群にもみられた。400、500 mg/kg 群でも母ラット及び胎児に対する軽度の  
112 影響がみられ、母ラットの LD<sub>10</sub> は 400～500 mg/kg 体重の範囲内にあるものと思われた。  
113 <sup>27)</sup>

114 ・Sprague-Dawley ラット雌 28 匹を 1 群とし、0、50、150、450 mg/kg 体重/日を妊娠  
115 6 日から 15 日まで強制経口投与した結果、50 mg/kg 以上の群で嗜眠、呼吸数の低下、  
116 腹臥位姿勢、鼻先を床に押しつけるような動作がみられ、これらの症状は 50、150 mg/kg  
117 群では投与期間が終わるまでに沈静化したが、450 mg/kg 群では投与期間を通して持続  
118 した。体重増加の有意な抑制は 150 mg/kg 以上の群でみられた。黄体数や着床数、吸収  
119 胚数、胎仔の生存数や体重、奇形の発生率等に有意な差はなかった。この結果から、母  
120 ラットで 50 mg/kg 体重/日が LOAEL、胎児で 450 mg/kg 体重/日が NOAEL となるが、  
121 胎仔の低体重や奇形の発生率には有意な増加傾向があったことから、450 mg/kg 体重/  
122 日という最大用量は胎児での LOAEL をわずかに下回るものであった可能性が示唆され  
123 た。<sup>27)</sup>

124 ・ニュージーランドホワイトウサギ雌 25 匹を 1 群とし、0、20、80、120 mg/kg 体重/日を  
125 妊娠 6 日から 19 日まで強制経口投与した結果、母ウサギに死亡はなく、一般状態や体  
126 重、胎仔の生存数や体重などにも影響はなかった。また、奇形の発生率増加もなかった。  
127 なお、用量設定のために実施した予備試験の 150 mg/kg 体重/日では母ウサギの 40%が死  
128 亡した。この結果から、NOAEL を 120 mg/kg 体重/日とする。<sup>27)</sup>

129 ・CD-1 マウスに 300 mg/kg 体重/日を妊娠 7-14 日の期間経口投与した実験で、母動物で  
130 体重増加抑制及び死亡動物がみられ、生存胎児数が減少したが、奇形はみられなかった。  
131 <sup>9)</sup>

132 ・ニュージーランドホワイトウサギ雌 4 匹を 1 群とし、0、50、250、630、1,000 mg/kg 体  
133 重/日を妊娠 6 日から 18 日まで強制経口投与した結果、1,000 mg/kg 群では全数が死亡

134 し、630mg/kg 群でも半数が死亡し、そのうちの半数が流産した。630 mg/kg 以上の群で  
 135 は体重増加の有意な抑制や軟便、流涎、流涙、眼のうっ血、結膜炎、チアノーゼなどが  
 136 みられたが、着床数や黄体数、生存胎仔数などには影響はなく、胎児の奇形や死亡もみ  
 137 られなかった。このため、18 匹を 1 群として 0、40、200、400 mg/kg 体重/日を同様に  
 138 強制経口投与した結果、死亡や体重への影響はなく、400 mg/kg 群の摂餌量は妊娠 7～15  
 139 日に有意に減少したが、23～25、27～29 日には増加した。200 mg/kg 以上の群で活動低  
 140 下や呼吸障害、下痢、軟便、流涎、チアノーゼなどの一般状態の変化に増加がみられた  
 141 が、着床数や黄体数、生存又は死亡胎仔数、性比、着床後胚損失、胎仔の体重に有意な  
 142 差はなく、奇形の発生率増加もなかった。<sup>27)</sup>

143 ・SD ラットに 395 mg/kg 体重/日を妊娠 1-15 日の期間腹腔内投与した実験で、骨化及び  
 144 心臓の発達遅延がみられた。<sup>15)</sup>

145

146 カ 遺伝毒性 (変異原性)

147 ・*In vitro* 試験ではチャイニーズハムスターCHO 細胞を用いる染色体異常の代謝活性化法  
 148 及び姉妹染色分体交換試験で陽性を示した。一方、ネズミチフス菌及び大腸菌を用いる  
 149 復帰突然変異試験、枯草菌を用いる Rec assay、ラット肝細胞を用いるアルカリ溶出法  
 150 による一本鎖 DNA 損傷試験ではいずれも陰性であった<sup>21)</sup>。

151 ・*In vivo* 試験ではショウジョウバエを用いる特定座位試験で陽性であった。

152 ・マウスの妊娠 3 日目の胚を、ナフタレンを 0.16 mM 含む培地で培養した実験で染色体異  
 153 常がみられた<sup>21)</sup>。

154

試験方法		使用細胞種・動物種	結果
In vitro	復帰突然変異試験	ネズミチフス菌TA98、TA100、TA1535、 TA1537、UTH8414、UTH8413 代謝活性化-および+で実施 <sup>21)</sup>	-
	Rec assay	枯草菌 <sup>21)</sup>	-
	DNA損傷試験	ラット肝細胞 <sup>21)</sup>	-
	不定期DNA合成試験	報告なし	
	染色体異常試験	チャイニーズハムスターCHO細胞 S9+ <sup>21)</sup> マウス3日胚	+ +
	姉妹染色分体交換試験	チャイニーズハムスターCHO細胞 <sup>21)</sup>	+
In vivo			
	DNA一本鎖切断試験	詳細不明	-
	特定座位試験	ショウジョウバエ <sup>21)</sup>	+

155 - : 陰性 + : 陽性 ? : どちらとも言えない。

156

157 キ 発がん性

158 吸入ばく露

- 159 ・NTP で実施した雌雄の B6C3F1 マウスを 10、30 ppm で 6 時間/日 x 5 日/週 x 104 週間  
160 ばく露した実験では、雌の 30 ppm 群で肺の細気管支/肺胞上皮腺腫の発生率が有意に増  
161 加し、雌の 30 ppm 群の他の 1 例では細気管支/肺胞上皮癌が発生した。雄ではばく露に  
162 関連した腫瘍の発生はみられなかった。<sup>21)</sup>
- 163 ・NTP で実施した雌雄の F344/N ラットを 10、30、60 ppm で 6 時間/日 x 5 日/週 x 105  
164 週間ばく露した実験では、鼻腔呼吸上皮の腺腫ならびに嗅上皮の神経芽腫が雌雄共に用  
165 量相関性に増加した。<sup>21)</sup>

166

167 経口投与/経皮投与・その他の経路等<sup>20)</sup>

- 168 ・ラットに 41 mg/kg 体重/日を 2 年間混餌投与した実験では、腫瘍の発生はみられなかつ  
169 た。

170 (2) ヒトへの影響 (疫学調査及び事例)

171 ア 急性毒性<sup>20)</sup>

- 172 ・ナフタレンは溶血作用及びメトヘモグロビン血症を起こす血液毒の一つである。
- 173 ・ヒトにおける中毒例の大部分は、小児の防虫用ナフタレンの誤飲で、いずれも急性溶血  
174 性貧血と血色素尿がみられ、下痢、悪心、嘔吐、発熱、無欲状態等の症状を呈した。血  
175 液所見としては貧血、網状赤血球及び白血球の増加、有核赤血球の出現がみられ、尿は  
176 暗赤褐色を呈し、血色素、タンパク共に陽性で、一部に肝臓や脾臓の腫大を認めた。職  
177 業的ばく露の例として、化学工場におけるナフタレン粉末機の修理作業における高濃度  
178 のナフタレンの粉塵吸入による急性毒性の例があり、頭痛、悪心、嘔吐の症状、さらに  
179 赤血球減少、ウロビリノーゲン尿、尿潜血反応陽性、肝臓の腫大、溶血性貧血などがみ  
180 られた。その他、妊娠時ナフタレンにばく露し、その代謝物が胎盤を通して胎児に移行  
181 し、新生児に溶血性貧血を発症した例があった。

182

183 イ 刺激性及び腐食性

- 184 ・ナフタレンは局所刺激作用があり、皮膚に付着した場合、ヒトによっては過敏症を示す  
185 ため皮膚炎を起こした<sup>20)</sup>。

186

187 ウ 感作性

- 188 ・調査した範囲内で情報は得られなかった。

189

190 エ 反復ばく露毒性 (生殖・発生毒性、遺伝毒性、発がん性は除く)

- 191 ・ナフタレンの慢性影響として、ナフタレンの分別作業場 (濃度 2.1 mg/m<sup>3</sup>) 及び圧搾場  
192 (濃度 41.4-590 mg/m<sup>3</sup>) で実施された作業員の健康調査報告で、皮膚、目及び咽喉頭の  
193 刺激及び炎症、胃腸障害、貧血、尿糖及びジアゾ反応陽性、視野狭窄が示された。また、  
194 他の例では 5 年間にわたり高濃度のナフタレン蒸気にばく露された 21 名の作業員中 8  
195 名に水晶体の混濁がみられた<sup>20)</sup>。

196



197 オ 生殖・発生毒性.  
198 ・調査した範囲内で情報は得られなかった。

199  
200 カ 遺伝毒性  
201 調査した範囲内で情報は得られなかった。

202  
203 キ 発がん性  
204 ・退職前でも後でも 60 年間に 30 万人の石油工業社を調査した範囲内で肺がんの増加は認められなかった,また鼻腔がんの増加も認められなかった。肺がんの[SMR]は 0.81(95%  
205 信頼区間は[CI]=0.79- 0.83 であった<sup>32)</sup>。  
206 ・鉱物油ばくろ露では *sininasal cancer* の増加は認められなかった<sup>32)</sup>。  
207 ・JP-8 ばく露による肺および鼻腔がんの増加は認められていない、(USAF の報告)。  
208 アスファル産業において、肺がんの増加が報告された例がある<sup>32)</sup>。  
209 屋根職人や 11 か国の屋根職人における疫学調査が肺がん死亡率の上昇が示唆された  
210 ことがある<sup>32)</sup>。

#### 212 213 発がんの定量的リスク評価

214 ・カリフォルニア EPA Hot Spot は吸入試験にもとづくユニットリスクを  $3.4 \times 10^{-5}$   
215  $(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$  としている<sup>12), 13)</sup>。

#### 216 217 発がん性分類

218 IARC : 2B (ヒトに対して発がんの可能性がある)<sup>5)</sup>  
219 産衛学会 : 情報なし<sup>6)</sup>  
220 EU Annex VI : Carc. Cat. 3<sup>7)</sup>  
221 NTP 12<sup>th</sup>: R (ヒトに対しておそらく発がん性がある)<sup>8)</sup>  
222 ACGIH : A4 (ヒト発がん性について分類できない物質)<sup>14)</sup>

#### 223 224 (3) 許容濃度の設定

225 ACGIH TLV-TWA : 10 ppm (52 mg/m<sup>3</sup>)

226 根拠 (妥当性の評価) : ナフタレンは眼刺激性であり吸入されたナフタレンは急性の溶血  
227 を起こすことが考えられる。ヒトのナフタレンによる血液障害は赤血球大小不同、変形赤血  
228 球の増加、黄疸、貧血、ヘモグロビンの現象などが特徴で、ヘマトクリット値が低下する。  
229 ヒトにおけるナフタレンの重篤な症状はヘモグロビン血症、メトヘモグロビン血症、ハイン  
230 ツ小体の出現であり、核黄疸によって死に至る。血液毒性後に生存したヒトの中には急性腎  
231 障害によって腎臓の遮断による寿命の短縮が起こりうる。ナフタレンのばく露によってヒト  
232 や実験動物において白内障が起こりうる。眼への刺激は 15ppm の工場労働者で報告されて  
233 おり、その後の連続した勤務によって眼の毒性を引き起こす。そのために TLV-TWA は  
234 10ppm を、 TLV-STEL は 15ppm を推奨する。これらの数値は、眼刺激性がナフタレン被

235 害の TLV において、高感受性（グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症）のヒトの被害を  
236 最小化することについては明らかではない。吸入されたナフタレンの血液毒性の個人的な感  
237 受性の範囲は幅広く、ごく少数のヒトであっても急性の溶血を誘発する。ナフタレンの皮膚  
238 接触による、ヒトの全身的なナフタレンの毒性については、「皮膚への表示」は適当であろう。  
239 ナフタレンを投与された雌マウスにおける発がん性の証拠はあるが、雄マウスや雌雄のラッ  
240 トにおける発がん性の証拠はない。そのためにナフタレンは、A 4 「ヒト発がん性物質とし  
241 て分類できない」という表示を付する。S E N の表示を付すことを推奨するには十分なデー  
242 タはない。

243

244 STEL : 15 ppm (79 mg/m<sup>3</sup>) (1996) <sup>14)</sup>

245 勧告根拠 :

246 これらの値は、眼及び呼吸器系の刺激、眼毒性（白内障、視神経、レンズの混濁、網膜変性）  
247 の可能性を最小限にすることを意図している。ナフタレンの有害性には、頭痛、食欲不振、吐  
248 き気、溶血性貧血、ヘモグロビン尿などの血液疾患を含む。

249

250 日本産業衛生学会：設定なし <sup>6)</sup>

251 DFG MAK : H (経皮吸収の危険性)

252 発がん性区分 2 (ヒトに対しておそらく発がん性がある)

253 生殖細胞変異原性 3B(生殖細胞変異原性が推定される) <sup>15)</sup>

254 勧告根拠 :

255 ナフタレンは微生物に対して変異原性を有しない。ラット肝培養細胞では DNA 鎖切断およ  
256 び DNA 修復を誘導しない。姉妹染色分体交換試験の結果は不明確である。CHO 細胞やマウ  
257 ス胎児細胞を用いる In vitro 試験ではナフタレンは染色体異常を誘発する。しかし、マウス骨  
258 髄細胞の小核試験では陰性である。ナフタレンの代謝物がアルブミン、ヘモグロビンおよび  
259 他の細胞たんぱく質と結合することが知られている。

260 ナフタレンのヒトへの発がん性についての有用な報告はない。唯一はっきりしている発が  
261 ん性の研究結果は、雌 B6C3F1 マウスによるものであり、ナフタレンの 30mL/m<sup>3</sup> の 2 年間  
262 吸入によるもので、肺の腫瘍の増加が認められている。しかしながらマウスの肺組織はナフ  
263 タレンに特異的に感受性であり、気管支上皮の毒性症状は 10mL/m<sup>3</sup> の 1 から 4 時間吸入で  
264 も起きているが、肺腫瘍の形成メカニズムが種特異的かどうかという点、すなわち他の動物  
265 種で低い頻度や高濃度での発がんの可能性については考察できない。これらの点が解明され  
266 るまで、ナフタレンはその遺伝毒性および雌における発がんの不明確さから「MAK and BAT  
267 Values」の IIIB に分類される。MAK Value 取り下げられている。

268 ナフタレンのアレルギー反応についてはさまざまなく露形態の可能性が考えられるが、  
269 それに関する記述はほとんどない。反応の頻度は 0.13%とされている。これらの理由からナ  
270 フタレンは感作性をもつ “S”物質としては記載されない。

271

272 NIOSH TWA : 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)、

273 STEL : 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)<sup>16)</sup>

274 OSHA TWA : 10 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>)

275 STEL : 15 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)<sup>17)</sup>

276 (参考)

277 ナフタレンについては、2010年にWHOで室内空気質のガイドライン値（動物実験の  
278 LOAELから算定した0.01mg/m<sup>3</sup>（年平均濃度））が設定されている<sup>33)</sup>。

279

280 引用・参考文献

281 1) IPCS : 国際化学物質安全性カード(ICSC)日本語版 ICSC番号 667 (2005)

282 2) 化学工業日報社 : 16313の化学商品 (2013)

283 3) 経済産業省 : 平成20年度製造・輸入量実態調査集計結果

284 4) NIOSH : Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) (CD版(2011))

285 5) IARC : IARC Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol.xx. (発  
286 行年)

287 または IARC : Agents Classified by the IARC Monographs

288 (<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>)

289 6) (社) 日本産業衛生学会 : 許容濃度の勧告、産業衛生学雑誌 52 巻 5 号 (2010)

290 7) European Commission Joint research Centre : Details on Substances Classified in Annex  
291 VI to Regulation (EC) No 1272/2008

292 (<http://tcsweb3.jrc.it/classification-labelling/clp/>)

293 8) National Institute of Health : Carcinogens Listed in NTP 12th Report

294 (<http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12>)

295 9) US EPA : Integrated Risk Information System (IRIS), Cancer Unit Risk Values

296 (<http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm?fuseaction=iris.showSubstanceList>)

297 10) WHO : "Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition", (2000)

298 (<http://www.euro.who.int/document/e71922.pdf>)

299 11) WHO : "Air Quality Guidelines – global update 2005"

300 ([http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO\\_SDE\\_PHE\\_OEH\\_06.02\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf))

301 12) California EPA (OEHHA) : Hot Spots Unit Risk and Cancer Potency Values (2009)

302 ([http://www.oehha.ca.gov/air/hot\\_spots/2009/AppendixA.pdf](http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/AppendixA.pdf))

303 13) California EPA (OEHHA) : Air Toxics Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines

304 Part II "Technical Support Document for Cancer Potency Factors: Methodologies for

305 derivation, listing of available values, and adjustments to allow for early life stage

306 exposures. May 2009"(2009)

307 ([http://www.oehha.ca.gov/air/hot\\_spots/2009/TSDCancerPotency.pdf](http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/TSDCancerPotency.pdf))

308 14) ACGIH : TLVs and BELs (Booklet 2011)

309 15) Deutsche Forschungsgemeinschaft : List of MAK and BAT values. (2010)

310 ([http://www.mrw.interscience.wiley.com/makbat/makbat\\_chemicals\\_fs.html](http://www.mrw.interscience.wiley.com/makbat/makbat_chemicals_fs.html))

- 311 16) NIOSH : NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards  
312 (<http://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html>)
- 313 17) OSHA : 1988 OSHA PEL Project Documentation  
314 (<http://www.cdc.gov/niosh/pel88/npelname.html>)
- 315 18) UK : EH40/2005 Table-1:List of WEL (as consolidated with amendments Oct. '07)  
316 (<http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf>)
- 317 19) AIHA : Current AIHA WEEL Guides (2007)  
318 (<http://www.aiha.org/1documents/Committees/WEEL-WEELsLevels2007.pdf>)
- 319 20) 化学物質評価研究機構 : 既存化学物質安全性 (ハザード) 評価シート : 物質名ナフタレン  
320 (1999)
- 321 21) ACGIH Documentation (Draft) (2011)
- 322 22) National Toxicology Program: Toxicology and Carcinogenesis Studies of Naphthalene in  
323 F344/N Rats. (TR-500) (2000)
- 324 23) National Institute of Health : NTP Technical Report on Toxicity Studies of Naphthalene  
325 (Inhalation Studies). (Mice:TR-410) (1992), (Rats:TR-500)(2000)
- 326 24) International Programme on Chemical Safety (IPCS) : Environmental health criteria 202,  
327 Selected non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons. World Health Organization,  
328 Geneva (1998)
- 329 25) DFG : Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values and  
330 Classification of Carcinogens” Vol. 11
- 331 26) 製品評価技術基盤機構、化学物質評価研究機構、新エネルギー産業技術総合開発機構 : 初期  
332 リスク評価書 : 物質名 (発行年)
- 333 27) 環境省 : 「化学物質の環境リスク評価(第 1-9 巻)」  
334 (<http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html>)
- 335 28) (社) 日本化学物質安全・情報センター : 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化  
336 学物質 変異原性試験データ集 (発行年)
- 337 29) IPCS : Concise International Chemical Assessment Documents (CICAD)
- 338 30) OECD : Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report
- 339 31) EU : リスク評価書 (EU Risk Assessment Report) NAPHTHALENE (2007 年)
- 340 32) Lewis, R.J.: Naphthalene animal carcinogenicity and human relevancy: Overview of  
341 industries with naphthalene-containing streams. Regul. Toxic. Pharm., 62: 131-137  
342 (2011)
- 343 33) WHO : "WHO Guidelines for Indoor Air Quality : Selected Pollutants" (2010)
- 344



## ナフタレン標準測定分析法

構造式: $C_{10}H_8$		分子量: 128.18	CASNo: 91-20-3
許容濃度等: OSHA 10ppm NIOSH 10ppm ACGIH 10ppm(TLV-TWA) 15ppm (TLV-STEL)		物性等 形状: 白色結晶 比重: 1.16 BP : 218°C(昇華性) MP: 80°C	
別名: ナフタリン			
サンプリング		分析	
<p>サンプラー: スチレンジビニルベンゼン捕集管: (InertSep Slim-J AERO SDB、ジールサイエンス社製) 注: ポリプロピレン製ルアータイプ型容器に SDB を 400mg 充填した捕集管のみが保存性を満足し、他のタイプの捕集管では保存性にバラツキが見られた。 サンプリング流量: 0.02L/min または 0.1L/min 以下の定量下限を確認の上、決定する。</p> <p>0.02L/min: 0.5ppm(10 分間), 0.02ppm(240 分間) 0.1L/min: 0.1ppm(10 分間), 0.004ppm(240 分間)</p> <p>サンプリング時間: 10min(定点) 240min(個人ばく露)*注 *注) 測定手法検討分科会における個人ばく露濃度測定の測定手法は 240min 捕集を基本とする。但し、0.02L/min、0.1L/min どちらの流量であっても、捕集量 1210 <math>\mu</math>g で 480min までの通気を確認。その場合 0.02L/min で 24ppm、0.1L/min で 4.8ppm まで捕集が可能である。</p> <p>採気量: 0.02L/min <math>\times</math> 10 分間 0.2L 0.02L/min <math>\times</math> 240 分間 4.8L 0.1L/min <math>\times</math> 10 分間 1.0L 0.1L/min <math>\times</math> 240 分間 24L</p> <p>保存性: 冷蔵(4°C) 14 日間保管において回収率は脱着率とほぼ同値が得られ、回収率の低下は認められなかった。 (0~14 日間保管の平均回収率 94.7% )</p> <p>ブランク: 検出せず</p>		<p>分析方法: ガスクロマトグラフ質量分析法 脱着溶媒: ジクロロメタン(内部標準物質入り) 5mL</p> <p>捕集管に注射外筒、共栓付試験管をセットし、脱着溶媒を捕集管に約 5mL/min 程度で通過させる。その後、捕集管にゴム球を接続し、残留した脱着溶媒を完全に押し出し、最終的に脱着溶媒で共栓付試験管の目盛り 5mL に調整する。</p> <p>機器: Agilent GC6890 (5973MS) カラム: DB-5MS 30m <math>\times</math> 0.25mm <math>\Phi</math> <math>\times</math> 0.25 <math>\mu</math>m 温度: 注入口 300°C インターフェース 325°C 昇温: 75°C (0.5min) <math>\rightarrow</math> 10°C/min <math>\rightarrow</math> 180°C (0min) <math>\rightarrow</math> 25°C/min <math>\rightarrow</math> 310°C (10min) 注入法: ハルスストースプリット (ハルス圧 15psi 0.8min) スプリット比 50:1 試料液導入量: 1 <math>\mu</math>L キャリアーガス: He 0.8mL/min ヘッド圧 7.07psi メイクアップ: <math>N_2</math> 定量イオン: ナフタレン Tgt.128, Q.127, 129 ナフタレン-d8 Tgt.136, Q.137, 134</p> <p>検量線: 内部標準法 (IS: ナフタレン-d8 2 <math>\mu</math>g/mL) 0.1 <math>\mu</math>g/mL 0.5 <math>\mu</math>g/mL 1.0 <math>\mu</math>g/mL 20 <math>\mu</math>g/mL 50 <math>\mu</math>g/mL 100 <math>\mu</math>g/mL 250 <math>\mu</math>g/mL 500 <math>\mu</math>g/mL</p> <p>分析時のリテンションタイム ナフタレン-d8: 7.36min , ナフタレン: 7.40min</p>	
精度			
<p>脱着率 直接添加法 ジクロロメタン 5mL 脱着 添加量 3~1210 <math>\mu</math>g 平均脱着率 96.2 % 通気試験における回収率 添加量 3~1210 <math>\mu</math>g 平均回収率 97.7 % 定量下限 0.1 <math>\mu</math>g/mL 0.5ppm(0.2L) 0.02ppm(4.8L) 0.1ppm(1L) 0.004ppm(24L)</p>			
適用: ナフタレン蒸気を測定対象とする。			
妨害:			
参考: NIOSH 5515 POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS by GC			