

| | |
|------|-------------------|
| 参考 1 | 専門家会合 (第 4 回) |
| | 平成 25 年 11 月 15 日 |

各文献におけるChild-Pughスコアの記載
特に凝固系(プロトロンビン時間・活性値・INR値について)

| 日本肝臓学会編 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2013 | | 2013年4月発刊 | | |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--|
| | 1点 | 2点 | 3点 | |
| 肝性脳症 | なし | 軽度(I・II) | 昏睡(III以上) | |
| 腹水 | なし | 軽度 | 中等度以上 | |
| 血清ビリルビン(mg/dl) | <2.0 | 2.0~3.0 | >3.0 | |
| 血清アルブミン(g/dl) | >3.5 | 2.8~3.5 | <2.8 | |
| プロトロンビン活性値(%) | >70 | 40~70 | <40 | |
| (INR) | (<1.7) | (1.7~2.3) | (>2.3) | |

日本医師会生涯教育シリーズ 消化器疾患診療のすべて 2012年10月発刊

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|------------|--|----------|----------|
| プロトロンビン時間* | 70%超 | 40~70% | 40%未満 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 延長した秒数; <4, 4~6, >6 INR; <1.7, 1.7~2.3, >2.3 | | |

E.Kuntz, H.-D.Kuntz. Hepatology –Principles and Practice- 2nd Edition 2006
J Radle, et al. Dtsch Arztebl 2007; 104(26):A 1914–21.

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| Quick's value(%)* | >70 | 40~70 | <40 |
| (or INR) | (<1.7) | (1.7~2.3) | (>2.3) |

*Quick's value is additionally used by Pugh

新しい診断と治療のABC 肝硬変 2007年発刊
肝炎診療マニュアル 2013年7月発刊

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|--------------|---------|----------|----------|
| プロトロンビン時間(%) | >80 | 50~80 | <50 |

J Boursier , et al. J Clin Gastroenterol 2009;43:580–585

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| Prothrombin Index (%) | >54 | 54~44 | <44 |

F Durand, et al. Journal of Hepatology 2005;42:S100–S107

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|------------------|---------|----------|----------|
| Prothrombin s *) | <4 | 4~6 | >6 |

*) Prothrombin time values of 4 and 6s correspond approximately to 50 and 40% of normal, respectively.

Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition 2011年発刊
 Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System 11th Edition 2004年発刊(日本語版)

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|--|-------------|----------------|------------|
| Prothrombin time (s prolonged) or INR | 1~4 <1.7 | 4~6 1.7~2.3 | >6 >2.3 |

参考: Child-Pugh score original version

Pugh RNH, Murray-Lyon IM, Dawson JL et al. Br J Surg 1973;60:649-9.

| | 1 point | 2 points | 3 points |
|------------------------------|---------|----------|----------|
| Bilirubin(mg/100ml) | 1~2 | 2~3 | >3 |
| Albumin(g/100ml) | >3.5 | 2.8~3.5 | <2.8 |
| Ascites | Absent | Slight | Moderate |
| Encephalopathy(grade) | None | 1 and 2 | 3 and 4 |
| Prothrombin time (prolonged) | 1~4 | 4~6 | >6 |