

Há EPIDEMIA do **vírus da Zika**

nas Américas do Sul e Central,
África, sudeste Asiático, etc.



Pessoas que retornaram desses locais devem sanar possíveis dúvidas
junto ao Escritório de Controle de Epidemias

Pessoas que viajaram a locais de epidemia
(cuidados após o retorno ao Japão)



- Não há necessidade de grande preocupação apenas por ter sido picado por mosquito. No entanto, **pessoas com sintomas como febre devem procurar o Escritório de Controle de Epidemia.**
- Para evitar que o vírus se alastre pelo Japão, **utilize repelentes (sprays, etc.) e outros métodos de prevenção contra a picada de mosquitos por pelo menos 2 semanas após o retorno ao Japão.**
- Homens e mulheres que retornaram de locais de epidemia, **mesmo não apresentando sintomas, devem utilizar preservativos durante relações sexuais ou evitar tê-las por pelo menos 6 meses (em caso de gravidez, durante toda a gestação).**
- **Em caso de dúvidas ou sintomas como febre, procure o Posto de Saúde mais próximo.**

Informações sobre o
retorno ao Japão

Departamento de Quarentena: FORTH
<http://www.forth.go.jp>

FORTH zika



A doença do zika vírus



Sintomas

Principalmente **febre baixa, manchas no corpo, conjuntivite, dores nas articulações e musculares, desânimo, dor de cabeça, etc.**

Vias de contágio

O contágio se dá ao ter o sangue sugado por mosquito portador do zika vírus. Há possibilidade de contágio por transfusão de sangue ou relação sexual. Mesmo após o contágio, há casos em que não há sintomas, ou estes são muito leves.

Locais de epidemia

Há ocorrências na África, Américas do Sul e Central, e na região Ásia-Pacífico; e recentemente está mais frequente nas Américas Central e do Sul.