
3 血圧降下剤 アリスキレンフマル酸塩・アムロジピンベシル酸塩

- [販売名] ラジムロ配合錠LD, 同配合錠HD (ノバルティスファーマ)
- [副作用
(重大な副作用)] 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸 : 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少 : 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少があらわれることがあるので, 検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症 : 横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には, 投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
-

4 血圧降下剤 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

- [販売名] アイミクス配合錠LD, 同配合錠HD (大日本住友製薬)
- [副作用
(重大な副作用)] 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸 : 劇症肝炎, AST (GOT), ALT (GPT), ALP, γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症 : 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, このような場合には直ちに投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
- 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少 : 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少があらわれることがあるので, 検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
-

5 血圧降下剤 カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩

- [販売名] ユニシア配合錠LD, 同配合錠HD (武田薬品工業) 他
- [副作用
(重大な副作用)] 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸 : 劇症肝炎, AST (GOT), ALT (GPT), γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症 : 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, このような場合には直ちに投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
-

6 血圧降下剤 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩

- [販売名] ミカムロ配合錠AP, 同配合錠BP (日本ベーリンガーインゲルハイム)
- [副作用
(重大な副作用)] 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸: 劇症肝炎, AST (GOT), ALT (GPT), Al-P, LDH, γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症: 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, このような場合には直ちに投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
- 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少: 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少があらわれることがあるので, 検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

7 血圧降下剤 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

- [販売名] エックスフォージ配合錠, 同配合OD錠 (ノバルティスファーマ) 他
- [副作用
(重大な副作用)] 劇症肝炎, 肝炎, 肝機能障害, 黄疸: 劇症肝炎, 肝炎, 肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症: 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, このような場合には直ちに投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

8 その他の循環器官用薬 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

- [販売名] カデュエット配合錠1番, 同2番, 同3番, 同4番 (ファイザー) 他
- [副作用
(重大な副作用:
アムロジピン)] 劇症肝炎, 肝機能障害, 黄疸: 劇症肝炎, AST (GOT), ALT (GPT), γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少: 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少があらわれることがあるので, 検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症: 横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 筋肉痛, 脱力感, CK (CPK) 上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には, 投与を中止し, 適切な処置を行うこと。また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

9 他に分類されない代謝性医薬品 ニンテダニブエタンスルホン酸塩

[販売名]	オフェブカプセル100mg, 同カプセル150mg (日本ベーリンガーインゲルハイム)
[重要な基本的注意]	<u>中等度及び高度の肝機能障害 (Child Pugh B, C) のある患者には治療上やむを得ないと判断される場合を除き, 使用は避けること。</u>

10 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾバクタム・ピペラシリン水和物

[販売名]	ゾシン静注用2.25, 同静注用4.5, 同配合点滴静注用バッグ4.5 (大鵬薬品工業) 他
[副作用 (重大な副作用)]	<u>中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN), 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群), 急性汎発性発疹性膿疱症</u> : 中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群, 急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。 <u>薬剤性過敏症症候群</u> : 初期症状として発疹, 発熱がみられ, 更に肝機能障害, リンパ節腫脹, 白血球増加, 好酸球増多, 異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, このような症状があらわれた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。なお, ヒトヘルペスウイルス6 (HHV-6) 等のウイルスの再活性化を伴うことが多く, 投与中止後も発疹, 発熱, 肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

11 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ピペラシリンナトリウム

[販売名]	ペントシリン注射用1g, 同注射用2g, 同静注用1gバッグ, 同静注用2gバッグ (富山化学工業) 他
[副作用 (重大な副作用)]	<u>中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN), 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群), 急性汎発性発疹性膿疱症</u> : 中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群, 急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

12 その他の化学療法剤 アトバコン

[販売名]	サムチレール内用懸濁液15% (グラクソ・スミスクライン)
[副作用 (重大な副作用)]	<u>無顆粒球症, 白血球減少</u> : 無顆粒球症, 白血球減少があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

13 抗原虫剤 アトバコン・プログアニル塩酸塩

[販売名]	マラロン配合錠 (グラクソ・スミスクライン)
[副作用 (重大な副作用)]	<u>汎血球減少症, 無顆粒球症, 白血球減少</u> : 汎血球減少症, 無顆粒球症, 白血球減少があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。