

3

使用上の注意の改訂について (その267)

平成27年8月6日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

1 精神神経用剤

①ヒドロキシジン塩酸塩 ②ヒドロキシジンパモ酸塩

[販売名]	①アタラックス錠10mg, 同錠25mg, 同-P注射液(25mg/mL), 同-P注射液(50mg/mL)(ファイザー) ②アタラックス-P散10%, 同-Pカプセル25mg, 同-Pカプセル50mg, 同-Pシロップ0.5%, 同-Pドライシロップ2.5%(ファイザー)他
[慎重投与]	QT延長のある患者(先天性QT延長症候群等), QT延長を起こすことが知られている薬剤を投与中の患者, 著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者
[副作用 (重大な副作用)]	QT延長, 心室頻拍(torsades de pointesを含む): QT延長, 心室頻拍(torsades de pointesを含む)があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

2 その他の中枢神経系用薬 メマンチン塩酸塩

[販売名]	メマリー錠5mg, 同錠10mg, 同錠20mg, 同OD錠5mg, 同OD錠10mg, 同OD錠20mg (第一三共)
[副作用 (重大な副作用)]	横紋筋融解症: 横紋筋融解症があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 筋肉痛, 脱力感, CK(CPK)上昇, 血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には, 投与を中止し, 適切な処置を行うこと。 また, 横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

3 解毒剤 デフェラシロクス

[販売名]	エクジェイド懸濁用錠125mg, 同懸濁用錠500mg(ノバルティスファーマ)
[副作用 (重大な副作用)]	消化管穿孔, 胃潰瘍(多発性潰瘍を含む), 十二指腸潰瘍, 胃腸出血: 消化管穿孔, 胃潰瘍(多発性潰瘍を含む), 十二指腸潰瘍, 胃腸出血があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には休薬するなど適切な処置を行うこと。

4 その他の腫瘍用薬

4 ポマリドミド

[販売名]	ポマリストカプセル1mg, 同カプセル2mg, 同カプセル3mg, 同カプセル4mg (セルジーン)
[副作用 (重大な副作用)]	<u>肝機能障害, 黄疸: AST (GOT), ALT (GPT), γ-GTP, ビリルビン上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 定期的に検査を行うなど, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 減量, 休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</u>

5 抗ウイルス剤

① ザナミビル水和物

② ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

[販売名]	① リレンザ (グラクソ・スミスクライン) ② イナビル吸入粉末剤20mg (第一三共)
[慎重投与]	<u>乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者</u>
[重要な基本的注意]	<u>本剤は, 夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物を使用しており, 乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者に投与した際にアナフィラキシーがあらわれたとの報告があるので, 投与に際しては十分に注意すること。</u>
