

5

使用上の注意の改訂について (その279)

平成28年10月18日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

1 血液凝固阻止剤 ワルファリンカリウム

[販売名] ワルファリン錠0.5mg, 同錠1mg, 同錠5mg, 同顆粒0.2% (エーザイ) 他
[禁忌] ミコナゾール (ゲル剤・注射剤) を投与中の患者
[相互作用 (併用禁忌)] ミコナゾール (ゲル剤・注射剤)

2 主としてカビに作用するもの・その他の化学療法剤 ①イトラコナゾール ②フルコナゾール ③ホスフルコナゾール ④ボリコナゾール

[販売名] ①イトリゾールカプセル50, 同内用液1%, 同注1% [200mg] (ヤンセンファーマ) 他
②ジフルカンカプセル50mg, 同カプセル100mg, 同ドライシロップ350mg, 同ドライシロップ1400mg, 同静注液50mg, 同静注液100mg, 同静注液200mg (ファイザー) 他
③プロジフ静注液100, 同静注液200, 同静注液400 (ファイザー)
④ブイフェンド錠50mg, 同錠200mg, 同ドライシロップ2800mg, 同200mg静注用 (ファイザー) 他
[慎重投与] ワルファリンを投与中の患者
[重要な基本的注意] 本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強し、著しいINR上昇を来した症例が報告されている。本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。

3 その他の化学療法剤 ミコナゾール (ゲル剤・注射剤)

[販売名] フロリードゲル経口用2%, 同F注200mg (持田製薬)
[禁忌] ワルファリンカリウムを投与中の患者
[相互作用 (併用禁忌)] ワルファリンカリウム

4 主としてグラム陽性菌に作用するもの ダプトマイシン

[販売名] キュビシン静注用350mg (MSD)

[副作用
(重大な副作用)] 急性汎発性発疹性膿疱症：急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

5 抗ウイルス剤 ペラミビル水和物

[販売名] ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg，同点滴静注液バイアル150mg (塩野義製薬)

[副作用
(重大な副作用)] 急性腎不全：急性腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
