

4

使用上の注意の改訂について (その285)

平成29年5月30日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

1 その他の循環器官用薬 トレプロスチニル

[販売名] トレプロスト注射液20mg, 同注射液50mg, 同注射液100mg, 同注射液200mg (持田製薬株式会社)

[副作用 (重大な副作用)] 甲状腺機能亢進症：甲状腺機能亢進症があらわれることがあるので、必要に応じて甲状腺機能検査を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

2 その他のホルモン剤 デュラグルチド (遺伝子組換え)

[販売名] トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (日本イーライリリー株式会社)

[副作用 (重大な副作用)] アナフィラキシー, 血管浮腫：アナフィラキシー, 血管浮腫があらわれることがある。観察を十分に行い、蕁麻疹, 口唇腫脹, 咽・喉頭浮腫, 呼吸困難等の異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

3 その他の腫瘍用薬 ボスチニブ水和物

[販売名] ボシュリフ錠100mg (ファイザー株式会社)

[副作用 (重大な副作用)] [中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN), 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群), 多形紅斑]：中毒性表皮壊死融解症, 皮膚粘膜眼症候群, 多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

ワクチン類 4 肺炎球菌ワクチン

[販 売 名]	ニューモバックスNP (MSD株式会社)
[副反応 (重大な副反応)]	蜂巢炎・蜂巢炎様反応，注射部位壊死，注射部位潰瘍 ：本剤接種後，主として注射部位を中心とした蜂巢炎・蜂巢炎様反応（発赤，腫脹，疼痛，発熱等）があらわれ， <u>壊死や潰瘍に至ることがあるので</u> ，このような症状が認められた場合には，適切な処置を行うこと。
