

平成27年度 健康実態調査結果の報告

平成28年1月

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部

1 調査の概要	1
1.1 調査の目的	1
1.2 調査の対象	1
1.3 調査期間	1
1.4 調査項目	1
1.5 調査結果の活用	1
1.6 調査の実施状況	1
2 調査結果	2
2.1 調査の実施状況	2
2.2 生活習慣について	3
2.2.1 1日の歩行時間について	3
2.2.2 運動（スポーツ）頻度	4
2.2.3 飲酒頻度	5
2.2.4 喫煙状況	7
2.2.5 睡眠時間	13
2.2.6 睡眠時間のとれている度合い	14
2.2.7 労働時間	15
2.2.8 野菜摂取量	16
2.2.9 果物類摂取量	17
2.2.10 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬	18
2.3 健康・悩み・ストレスについて	20
2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無	20
2.4 介護や日常生活動作の状況について	23
2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況	23
2.4.2 要介護認定の状況	24
2.4.3 介助なしでできること	27
2.5 この1年間の治療状況について	28
2.5.1 現在の受診頻度について	28
2.5.2 医師の方から処方を受けている	29
2.6 油症患者受療券（油症券）の使用状況について	31
2.6.1 油症券の保有状況	31
2.6.2 油症券の発行について	32
2.6.3 油症券を使用せずに受診したことがあるか	33
2.7 油症検診について	35
2.7.1 昨年度の油症検診の受診について	35
2.7.2 油症検診の受診を受けなかった理由	36
2.8 相談体制について	37
2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について	37
2.8.2 相談を受けなかった理由	38
2.9 これまでにかかったことのある病気（今かかっている病気・症状も含む）について	39
2.9.1 悪性腫瘍（がん）について	39
2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について	42
2.9.3 自律神経系の病気・症状について	43
2.9.4 眼の病気・症状について	44
2.9.5 口の中の病気・症状について	45
2.9.6 耳・鼻の病気・症状について	46
2.9.7 甲状腺の病気・症状について	47
2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について	48
2.9.9 心臓の病気・症状について	49
2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について	51
2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について	53
2.9.12 すい臓の病気・症状について	54
2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について	56
2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について	57
2.9.15 血液・リンパの病気・症状について	58
2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）	60
2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）	61
2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）	62
2.9.19 骨・関節の病気・症状について	66
2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について	68
2.9.21 アレルギー疾患について	70
2.9.22 膠原病について	71
2.9.23 その他の病気・症状について	73
2.10 調査票の自由記入欄について	74
別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表	76
参考資料 調査票	255

1 調査の概要

1.1 調査の目的

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的とする。

1.2 調査の対象

各都道府県で把握している1,630人（平成27年3月31日時点の推計生存認定患者、前年度1,651人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方を除く1,443人に調査にご協力頂いた。

1.3 調査期間

平成27年4月～6月末

1.4 調査項目

平成20年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。

1.5 調査結果の活用

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、平成20年の健康実態調査及び過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。

1.6 調査の実施状況

各都道府県で把握している1,630人の認定患者（平成27年3月31日時点の推計認定患者、前年度1,651人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた1,443人（前年度1,437人）から回答を得た。

以下の報告は、本調査に回答があった1,443人（前年度1,437人）についてとりまとめたものである。

「割合」の計算において使用する分母は、表中に記載しているNの値とする。

2 調査結果

2.1 調査の実施状況

回答者の性別は、男性687人、女性756人であった（前年度 男性687人、女性750人）。回答者の平均年齢（回答時点での申告年齢）は64.4歳（男性63.1歳、女性65.5歳）となっている。

男性は、「55～59歳」の者が17.5%（前年度16.9%）と最も多く、次いで、「50～54歳」が16.4%（前年度16.6%）、「60～64歳」が13.7%（前年度12.2%）等の順であった。

女性は、「55～59歳」の者が15.7%（前年度14.1%）と最も多く、次いで、「50～54歳」が14.4%（前年度16.0%）、「60～64歳」が13.0%（前年度12.0%）等の順であった。

各集団の男女比及び年齢階級については、表1-1、1-2、図1-1のとおりである。

表1-1 回答者の男女比

	回答者(N=1443)	
	件数	割合
男	687	47.6%
女	756	52.4%
計	1,443	

図1-1 回答者数及び年齢階級別回答者の割合




表1-2 回答者数及び年齢階級別回答者の割合

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
30～34歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
35歳～39歳	3	0.4%	1	0.1%	4	0.3%
40歳～44歳	21	3.1%	17	2.2%	38	2.6%
45歳～49歳	63	9.2%	58	7.7%	121	8.4%
50歳～54歳	113	16.4%	109	14.4%	222	15.4%
55歳～59歳	120	17.5%	119	15.7%	239	16.6%
60歳～64歳	94	13.7%	98	13.0%	192	13.3%
65歳～69歳	63	9.2%	72	9.5%	135	9.4%
70歳～74歳	52	7.6%	63	8.3%	115	8.0%
75歳～79歳	56	8.2%	73	9.7%	129	8.9%
80歳～84歳	55	8.0%	63	8.3%	118	8.2%
85歳～89歳	36	5.2%	59	7.8%	95	6.6%
90歳以上	11	1.6%	24	3.2%	35	2.4%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

2.2 生活習慣について


2.2.1 1日の歩行時間について

農作業・家事などを含め1日の平均的な歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が30.1%（男性28.8%、女性31.2%）（前年度 男性30.0%、女性32.4%、全体31.2%）と最も多く、次いで、「30分～60分未満」25.3%（男性27.4%、女性23.4%）（前年度 男性26.8%、女性24.8%、全体25.7%）、「30分未満」24.7%（男性24.2%、女性25.3%）（前年度 男性24.1%、女性25.3%、全体23.9%）、「60分～90分未満」18.7%（男性18.3%、女性19.0%）（前年度 男性17.8%、女性18.5%、全体18.2%）の順となっている。（表2-1、図2-1）

表2-1 1日の歩行時間

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
90分以上	198	28.8%	236	31.2%	434	30.1%
60分以上～90分未満	126	18.3%	144	19.0%	270	18.7%
30分以上～60分未満	188	27.4%	177	23.4%	365	25.3%
30分未満	166	24.2%	191	25.3%	357	24.7%
未回答	9	1.3%	8	1.1%	17	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-1 1日の歩行時間




2.2.2 運動（スポーツ）頻度

ウォーキング、ジョギング、体操も含めた運動（スポーツ）頻度をみると、「ほとんどしていない」と回答した方が47.2%（男性42.8%、女性51.2%）（前年度 男性43.7%、女性52.4%、全体47.9%）と最も多く、次いで「週2～4回程度」が19.3%（男性18.8%、女性19.8%）（前年度 男性17.3%、女性18.2%、全体17.7%）、「ほぼ毎日」が14.8%（男性16.0%、女性13.6%）（前年度 男性16.0%、女性13.5%、全体14.6%）、「週1回程度」が13.4%（男性15.7%、女性11.4%）（前年度 男性16.6%、女性13.0%、全体14.6%）、「月1回程度」が4.0%（男性5.7%、女性2.5%）（前年度 男性5.7%、女性2.8%、全体4.2%）の順となっている。（表2-2、図2-2）

表2-2 運動（スポーツ）頻度

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	110	16.0%	103	13.6%	213	14.8%
週2～4回程度	129	18.8%	150	19.8%	279	19.3%
週1回程度	108	15.7%	86	11.4%	194	13.4%
月1回程度	39	5.7%	19	2.5%	58	4.0%
ほとんどしていない	294	42.8%	387	51.2%	681	47.2%
未回答	7	1.0%	11	1.5%	18	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-2 運動（スポーツ）頻度




2.2.3 飲酒頻度

飲酒頻度をみると、男性では「ほぼ毎日飲む」と回答した方が31.1%（前年度 32.2%）と最も多く、女性では「飲まない」と回答した方が70.5%（前年度 70.5%）と最も多かった。（表2-3-1、図2-3-1）

表2-3-1 飲酒頻度

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	214	31.1%	50	6.6%	264	18.3%
週3～5回程度	98	14.3%	39	5.2%	137	9.5%
週1～2回程度	83	12.1%	38	5.0%	121	8.4%
月1～3回程度	34	4.9%	38	5.0%	72	5.0%
年1～10回程度	38	5.5%	51	6.7%	89	6.2%
飲まない	210	30.6%	533	70.5%	743	51.5%
未回答	10	1.5%	7	0.9%	17	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-3-1 飲酒頻度




飲酒をすると回答した686人（前年度 688人）の1日の飲酒量（ビール大瓶換算）についてみると、男性では「1～2本未満」が41.5%（前年度 42.8%）と最も多く、女性では「0.5～1本未満」が44.4%（前年度 53.2%）と最も多かった。全体では、「1～2本未満」が38.3%（前年度 36.8%）と最も多く（男性41.5%、女性31.5%）（前年度 男性42.8%、女性23.6%）、次いで「0.5～1本未満」が32.1%（男性26.4%、女性44.4%）（前年度 男性24.4%、女性53.2%、全体33.4%）等の順となっている。（表2-3-2、図2-3-2）

表2-3-2 飲酒量

	男性(N=470)		女性(N=216)		計(N=686)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0.5本未満	6	1.3%	15	6.9%	21	3.1%
0.5～1本未満	124	26.4%	96	44.4%	220	32.1%
1～2本	195	41.5%	68	31.5%	263	38.3%
2～3本	97	20.6%	17	7.9%	114	16.6%
3～4本	27	5.7%	1	0.5%	28	4.1%
4～5本	6	1.3%	1	0.5%	7	1.0%
5～10本	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%
10本以上	2	0.4%	0	0.0%	2	0.3%
未回答	10	2.1%	18	8.3%	28	4.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	470	100.0%	216	100.0%	686	100.0%

図2-3-2 飲酒量




2.2.4 喫煙状況

喫煙状況についてみると、男性・女性ともに「吸わない」と回答した方が最も多かった（男性37.8%、女性86.1%、全体63.1%）（前年度 男性38.7%、女性85.6%、全体63.2%）。（表2-4-1、図2-4-1）

表2-4-1 喫煙状況

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
吸う	224	32.6%	65	8.6%	289	20.0%
やめた	197	28.7%	31	4.1%	228	15.8%
吸わない	260	37.8%	651	86.1%	911	63.1%
未回答	6	0.9%	9	1.2%	15	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1,443	100.0%

図2-4-1 喫煙状況




たばこを吸うと回答した289人（前年度 301人）の喫煙年数をみると、男性では、「30年～40年未満」38.8%（前年度35.7%）と最も多く、次いで「40年以上」30.4%（前年度 29.0%）、「20年～30年未満」22.3%（前年度 23.1%）等の順であった。女性では、「20年～30年未満」38.5%（前年度 33.3%）と最も多く、次いで「30年～40年未満」32.3%（前年度34.9%）、「40年以上」13.8%（前年度 14.3%）等の順となっている。（表2-4-2、図2-4-2）

表2-4-2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）

	男性(N=224)		女性(N=65)		計(N=289)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
2年～3年未満	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
3年～5年未満	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
5年～10年未満	1	0.4%	2	3.1%	3	1.0%
10年～20年未満	5	2.2%	7	10.8%	12	4.2%
20年～30年未満	50	22.3%	25	38.5%	75	26.0%
30年～40年未満	87	38.8%	21	32.3%	108	37.4%
40年以上	68	30.4%	9	13.8%	77	26.6%
未回答	9	4.0%	1	1.5%	10	3.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	224	100.0%	65	100.0%	289	100.0%

図2-4-2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）




たばこを吸うと回答した289人（前年度 301人）の1日の平均喫煙本数をみると、男性では「20本～30本未満」が57.1%（前年度 57.1%）と最も多く、女性は「10本～20本未満」が41.5%（前年度 50.8%）と最も多かった。（表2-4-3、図2-4-3）

表2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）

	男性(N=224)		女性(N=65)		計(N=289)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	4	1.8%	4	6.2%	8	2.8%
5本～10本未満	9	4.0%	13	20.0%	22	7.6%
10本～20本未満	57	25.4%	27	41.5%	84	29.1%
20本～30本未満	128	57.1%	19	29.2%	147	50.9%
30本～40本未満	18	8.0%	1	1.5%	19	6.6%
40本以上	8	3.6%	1	1.5%	9	3.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	224	100.0%	65	100.0%	289	100.0%

図2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した228人（前年度205人）の喫煙年数をみると、男性では「20～30年未満」が26.4%（前年度 24.4%）と最も多く、女性では「5～10年未満」（前年度 12.0%）、「10年～20年未満」（前年度 20.0%）、「20年～30年未満」（前年度 12.0%）、「30年～40年未満」（前年度 16.0%）が共に16.1%と最も多かった。（表2－4－4、図2－4－4）

表2－4－4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）

	男性(N=197)		女性(N=31)		計(N=228)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	4	2.0%	1	3.2%	5	2.2%
2年～3年未満	3	1.5%	0	0.0%	3	1.3%
3年～5年未満	3	1.5%	3	9.7%	6	2.6%
5年～10年未満	10	5.1%	5	16.1%	15	6.6%
10年～20年未満	31	15.7%	5	16.1%	36	15.8%
20年～30年未満	52	26.4%	5	16.1%	57	25.0%
30年～40年未満	38	19.3%	5	16.1%	43	18.9%
40年以上	42	21.3%	4	12.9%	46	20.2%
未回答	14	7.1%	3	9.7%	17	7.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	197	100.0%	31	100.0%	228	100.0%

図2－4－4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）




たばこをやめたと回答した228人（前年度205人）の過去の喫煙本数をみると、男性は「20本～30本未満」46.2%（前年度49.4%）が最も多く、次いで「10本～20本未満」18.3%（前年度 13.9%）、「40本以上」17.3%（前年度12.8%）等の順であった。

女性は「10本～20本未満」41.9%（前年度 36.0%）が最も多く、次いで「20本～30本未満」32.3%（前年度 36.0%）、その後「1本～5本未満」（前年度 0.0%）、「5本～10本未満」（前年度 12.0%）、「30本～40本未満」（前年度 0.0%）が共に6.5%となっている。（表2-4-5、図2-4-5）

表2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）

	男性(N=197)		女性(N=31)		計(N=228)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	0	0.0%	2	6.5%	2	0.9%
5本～10本未満	7	3.6%	2	6.5%	9	3.9%
10本～20本未満	36	18.3%	13	41.9%	49	21.5%
20本～30本未満	91	46.2%	10	32.3%	101	44.3%
30本～40本未満	21	10.7%	2	6.5%	23	10.1%
40本以上	34	17.3%	0	0.0%	34	14.9%
未回答	8	4.1%	2	6.5%	10	4.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	197	100.0%	31	100.0%	228	100.0%

図2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した228人（前年度205人）が何年前に卒煙したかについてみると、男性・女性ともに「5年～10年未満」前にやめたと回答した方が最も多く（男性25.4%、女性25.8%、全体 25.4%）（前年度 男性23.3%、女性24.0%、全体 23.4%）、次いで男性では「10年～15年未満」18.8%（前年度 17.2%）「30年以上」16.2%（前年度 18.3%）等の順であった。

女性では「2年～3年未満」（前年度 16.0%）、「20年～30年未満」（前年度 12.0%）が共に12.9%となっている。（表2-4-6、図2-4-6）

表2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）

	男性(N=197)		女性(N=31)		計(N=228)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1年未満	5	2.5%	1	3.2%	6	2.6%
1年～2年未満	10	5.1%	1	3.2%	11	4.8%
2年～3年未満	6	3.0%	4	12.9%	10	4.4%
3年～4年未満	4	2.0%	3	9.7%	7	3.1%
4年～5年未満	7	3.6%	1	3.2%	8	3.5%
5年～10年未満	50	25.4%	8	25.8%	58	25.4%
10年～15年未満	37	18.8%	1	3.2%	38	16.7%
15年～20年未満	12	6.1%	2	6.5%	14	6.1%
20年～30年未満	27	13.7%	4	12.9%	31	13.6%
30年以上	32	16.2%	3	9.7%	35	15.4%
未回答	7	3.6%	3	9.7%	10	4.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	197	100.0%	31	100.0%	228	100.0%

図2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）




2.2.5 睡眠時間

睡眠時間についてみると、「6時間以上7時間未満」と回答した方が33.7%（男性35.2%、女性32.4%）（前年度 男性37.0%、女性33.2%、全体35.0%）と最も多く、次いで「5時間以上6時間未満」が25.9%（男性23.1%、女性28.4%）（前年度 男性22.3%、女性27.9%、全体25.2%）「7時間以上8時間未満」が17.3%（男性19.2%、女性15.5%）（前年度 男性18.7%、女性16.3%、全体17.4%）等の順となっている。（表2-5、図2-5）

表2-5 睡眠時間

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
9時間以上	25	3.6%	28	3.7%	53	3.7%
8時間以上～9時間未満	78	11.4%	68	9.0%	146	10.1%
7時間以上～8時間未満	132	19.2%	117	15.5%	249	17.3%
6時間以上～7時間未満	242	35.2%	245	32.4%	487	33.7%
5時間以上～6時間未満	159	23.1%	215	28.4%	374	25.9%
5時間未満	47	6.8%	79	10.4%	126	8.7%
未回答	4	0.6%	4	0.5%	8	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-5 睡眠時間




2.2.6 睡眠時間のとれている度合い

睡眠時間のとれている度合いについてみると、「まあまあとれている。」と回答した方が47.5%（男性49.5%、女性45.8%）と最も多く、次いで「あまりとれていない。」が32.9%（男性29.1%、女性36.4%）「充分とれている。」が16.0%（男性18.2%、女性14.0%）等の順となっている。（表2-6、図2-6）

表2-6 睡眠時間のとれている度合い

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
充分とれている。	125	18.2%	106	14.0%	231	16.0%
まあまあとれている。	340	49.5%	346	45.8%	686	47.5%
あまりとれていない。	200	29.1%	275	36.4%	475	32.9%
まったくとれていない。	18	2.6%	22	2.9%	40	2.8%
未回答	4	0.6%	7	0.9%	11	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-6 睡眠時間のとれている度合い



2.2.7 労働時間


労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が28.8%と最も多く（男性26.8%、女性30.6%）（前年度 男性27.7%、女性32.8%、全体30.3%）、次いで男性は「8時間以上9時間未満」が18.0%（前年度 17.8%）、「9時間以上10時間未満」が15.7%（前年度 13.7%）等の順であった。

女性は「10時間以上」12.6%（前年度 11.2%）、「4時間以上5時間未満」12.4%（前年度 11.5%）等の順となっている。（表2－7、図2－7）

表2－7 労働時間

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
10時間以上	92	13.4%	95	12.6%	187	13.0%
9時間以上10時間未満	108	15.7%	55	7.3%	163	11.3%
8時間以上9時間未満	124	18.0%	71	9.4%	195	13.5%
7時間以上8時間未満	51	7.4%	56	7.4%	107	7.4%
6時間以上7時間未満	39	5.7%	75	9.9%	114	7.9%
5時間以上6時間未満	31	4.5%	65	8.6%	96	6.7%
4時間以上5時間未満	43	6.3%	94	12.4%	137	9.5%
4時間未満	184	26.8%	231	30.6%	415	28.8%
未回答	15	2.2%	14	1.9%	29	2.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2－7 労働時間




2.2.8 野菜摂取量

野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満」と回答した方が30.8%と最も多く（男性33.5%、女性28.3%）、次いで「140g以上210g未満」が21.8%（男性18.9%、女性24.3%）、「210g以上270g未満」が18.2%（男性15.7%、女性20.5%）等の順となっている。（表2-8、図2-8）

表2-8 野菜摂取量

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
70g未満(1つ未満)	163	23.7%	96	12.7%	259	17.9%
70g以上140g未満(1~2つ)	230	33.5%	214	28.3%	444	30.8%
140g以上210g未満(2~3つ)	130	18.9%	184	24.3%	314	21.8%
210g以上270g未満(3~4つ)	108	15.7%	155	20.5%	263	18.2%
270g以上350g未満(4~5つ)	34	4.9%	58	7.7%	92	6.4%
350g以上(5つ以上)	16	2.3%	38	5.0%	54	3.7%
未回答	6	0.9%	11	1.5%	17	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-8 野菜摂取量




2.2.9 果物類摂取量

果物摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が47.6%と最も多く（男性55.6%、女性40.3%）、次いで「50g以上100g未満」が29.5%（男性25.3%、女性33.2%）、「100g以上150g未満」が16.5%（男性14.3%、女性18.5%）等の順となっている。（表2-9、図2-9）

表2-9 果物類摂取

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
50g未満	382	55.6%	305	40.3%	687	47.6%
50g以上100g未満	174	25.3%	251	33.2%	425	29.5%
100g以上150g未満	98	14.3%	140	18.5%	238	16.5%
150g以上	25	3.6%	48	6.3%	73	5.1%
未回答	8	1.2%	12	1.6%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-9 果物類摂取




2.2.10 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、「ある」と回答したものは26.7%（男性21.8%、女性31.1%）（前年度 男性22.6%、女性34.5%、全体28.8%）となっている。（表2-10-1、図2-10-1）

表2-10-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	150	21.8%	235	31.1%	385	26.7%
ない	529	77.0%	509	67.3%	1038	71.9%
未回答	8	1.2%	12	1.6%	20	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図2-10-1 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬



また、サプリメント・健康食品・漢方薬を常用していると回答した385人（前年度 375人）から具体的な品目名および効果について回答があった。

そのうち、患者が常用していると回答した品目の効果についてみると、「不快症状が改善したと思う」との回答が79件（前年度 79件）、「特にはっきりとした効果があるとは思わない」が128件（前年度 93件）、「その他」が21件（前年度 30件）であった。（表 2－10－2）

表 2－10－2 常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬（上位品目）

	計				計
	不快症状が改善したと思う	特にはっきりとした効果があるとは思わない	その他	未回答	
青汁	14	18	5	4	41
黒酢	10	21	3	2	36
グルコサミン	10	21	4	0	35
ブルーベリー	6	9	1	2	18
DHA	6	10	0	0	16
ビタミンC	5	8	0	1	14
カルシウム	3	9	0	0	12
クロレラ	4	6	0	0	10
にんにく卵黄	5	4	1	0	10
高麗人参	4	4	1	0	9
セサミン	4	5	0	0	9
ビタミンE	0	5	4	0	9
コンドロイチン	4	4	0	0	8
ウコン	2	3	0	1	6
養命酒	2	1	2	0	5
その他	197	178	49	22	446
未回答	1	0	0	3	4

2.3 健康・悩み・ストレスについて


2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無

日常生活での悩みやストレスの有無について、「ある」と回答した方が1,100人（76.2%）男性486人（70.7%）、女性614人（81.2%）（前年度 男性511人（74.4%）、女性631人（84.1%）、全体1,142人（79.5%））であった。（表3-1、図3-1）

表3-1 日常生活での悩みやストレス

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	486	70.7%	614	81.2%	1100	76.2%
ない	191	27.8%	133	17.6%	324	22.5%
未回答	10	1.5%	9	1.2%	19	1.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図3-1 日常生活での悩みやストレス



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した1,100人（男性486人、女性614人）（前年度 男性511人、女性631人、全体1,142人）を対象に、悩みやストレスの原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が58.2%と最も多く（男性54.9%、女性60.7%）（前年度 男性51.9%、女性59.6%、全体56.1%）、次いで「収入・家計・借金等」37.7%（男性41.4%、女性34.9%）（前年度 男性38.0%、女性37.2%、全体37.6%）、「自分の仕事」34.4%（男性43.8%、女性26.9%）（前年度 男性42.5%、女性24.3%、全体32.5%）、「家族の病気や介護」34.2%（男性31.9%、女性36.0%）（前年度 男性30.2%、女性40.3%、全体35.7%）、「家族以外との人間関係」24.6%（男性24.5%、女性24.8%）（前年度 男性22.9%、女性25.0%、全体24.1%）等の順であった。（表3-2）

表3-2 悩みやストレスの原因（複数回答）

	男性(N=486)		女性(N=614)		計(N=1100)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	86	17.7%	167	27.2%	253	23.0%
家族以外との人間関係	119	24.5%	152	24.8%	271	24.6%
恋愛・性に関すること	12	2.5%	6	1.0%	18	1.6%
結婚	13	2.7%	7	1.1%	20	1.8%
離婚	6	1.2%	4	0.7%	10	0.9%
いじめ、セクハラ	3	0.6%	6	1.0%	9	0.8%
生きがいに関すること	108	22.2%	140	22.8%	248	22.5%
自由にできる時間がない	37	7.6%	63	10.3%	100	9.1%
収入・家計・借金等	201	41.4%	214	34.9%	415	37.7%
自分の病気や介護	267	54.9%	373	60.7%	640	58.2%
家族の病気や介護	155	31.9%	221	36.0%	376	34.2%
妊娠・出産	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
育児	9	1.9%	9	1.5%	18	1.6%
家事	22	4.5%	116	18.9%	138	12.5%
自分の学業・受験・進学	4	0.8%	4	0.7%	8	0.7%
子どもの教育	41	8.4%	33	5.4%	74	6.7%
自分の仕事	213	43.8%	165	26.9%	378	34.4%
家族の仕事	35	7.2%	96	15.6%	131	11.9%
住まいや生活環境	46	9.5%	82	13.4%	128	11.6%
その他	21	4.3%	46	7.5%	67	6.1%
わからない	4	0.8%	8	1.3%	12	1.1%
未回答	1	0.2%	1	0.2%	2	0.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

また、上記の悩みやストレスの原因のうち、最も気になる原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が32.2%と最も多く（男性29.8%、女性34.0%）（前年度 男性29.2%、女性35.3%、全体32.6%）、次いで「収入・家計・借金等」13.6%（男性14.8%、女性12.7%）（前年度 男性13.5%、女性9.0%、全体11.0%）、「家族の病気や介護」12.2%（男性10.5%、女性13.5%）（前年度 男性8.6%、女性14.3%、全体11.7%）等の順であった。（表3-3）

表3-3 悩みやストレスの最も気になる原因

	男性(N=486)		女性(N=614)		計(N=1100)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	8	1.6%	35	5.7%	43	3.9%
家族以外との人間関係	17	3.5%	30	4.9%	47	4.3%
恋愛・性に関すること	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結婚	3	0.6%	1	0.2%	4	0.4%
離婚	2	0.4%	1	0.2%	3	0.3%
いじめ、セクハラ	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
生きがいに关すること	15	3.1%	16	2.6%	31	2.8%
自由にできる時間がない	6	1.2%	11	1.8%	17	1.5%
収入・家計・借金等	72	14.8%	78	12.7%	150	13.6%
自分の病気や介護	145	29.8%	209	34.0%	354	32.2%
家族の病気や介護	51	10.5%	83	13.5%	134	12.2%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	0	0.0%	2	0.3%	2	0.2%
家事	3	0.6%	3	0.5%	6	0.5%
自分の学業・受験・進学	1	0.2%	1	0.2%	2	0.2%
子どもの教育	5	1.0%	6	1.0%	11	1.0%
自分の仕事	74	15.2%	37	6.0%	111	10.1%
家族の仕事	4	0.8%	15	2.4%	19	1.7%
住まいや生活環境	7	1.4%	13	2.1%	20	1.8%
その他	9	1.9%	11	1.8%	20	1.8%
わからない	3	0.6%	6	1.0%	9	0.8%
未回答	60	12.3%	56	9.1%	116	10.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	486	100.0%	614	100.0%	1100	100.0%

2.4 介護や日常生活動作の状況について


2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況

病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況についてみると、5.8%（男性3.9%、女性7.4%）（前年度 男性3.9%、女性6.4%、全体5.2%）の者が入院中もしくは入所中であった。（表４－１、図４－１）

表４－１ 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	27	3.9%	56	7.4%	83	5.8%
いいえ	657	95.6%	699	92.5%	1356	94.0%
未回答	3	0.4%	1	0.1%	4	0.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図４－１ 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況




2.4.2 要介護認定の状況

要介護認定の状況についてみると、40歳未満の回答者を除いた1,439人（男性684人、女性755人）（前年度 男性683人、女性748人、全体1,431人）のうち、163人（11.3%）（男性46人、女性117人）（前年度 175人（12.2%）、男性53人（7.8%）、女性122人（16.3%））の者が要介護認定を受けていた。（表4-2-1、図4-2-1）

表4-2-1 要介護認定の状況

	男性(N=684)		女性(N=755)		計(N=1439)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	46	6.7%	117	15.5%	163	11.3%
受けていない	624	91.2%	617	81.7%	1241	86.2%
未回答	14	2.0%	21	2.8%	35	2.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	684	100.0%	755	100.0%	1439	100.0%

図4-2-1 要介護認定の状況




要介護認定を受けている163人（前年度 175人）の調査日時点の要介護度の分布は、「要支援1」が18.4%（男性17.4%、女性18.8%）（前年度 男性20.8%、女性23.0%、全体22.3%）、「要介護1」が17.2%（男性19.6%、女性16.2%）（前年度 男性17.0%、女性16.4%、全体16.6%）等の順となっている。（表4-2-2、図4-2-2）

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況

	男性(N=46)		女性(N=117)		計(N=163)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
要支援1	8	17.4%	22	18.8%	30	18.4%
要支援2	11	23.9%	16	13.7%	27	16.6%
要介護1	9	19.6%	19	16.2%	28	17.2%
要介護2	7	15.2%	19	16.2%	26	16.0%
要介護3	4	8.7%	15	12.8%	19	11.7%
要介護4	1	2.2%	12	10.3%	13	8.0%
要介護5	6	13.0%	13	11.1%	19	11.7%
未回答	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	46	100.0%	117	100.0%	163	100.0%

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況



要介護認定を受けている163人（前年度 175人）について、介護が必要となった原因についてみると、男性は「脳血管疾患」が39.1%（前年度 41.5%）と最も多く、次いで「心臓疾患」が26.1%（前年度 7.5%）、「認知症」26.1%（前年度 11.3%）等の順となっている。

女性は「骨折・転倒」が40.2%（前年度 6.6%）と最も多く、次いで「認知症」が38.5%（前年度 13.1%）、「関節疾患」35.0%（前年度 17.2%）等の順となっている。（表4-2-3）

表4-2-3 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因（複数回答）

	男性(N=46)		女性(N=117)		計(N=163)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	18	39.1%	22	18.8%	40	24.5%
心臓疾患	12	26.1%	27	23.1%	39	23.9%
がん	5	10.9%	8	6.8%	13	8.0%
呼吸器疾患	7	15.2%	9	7.7%	16	9.8%
関節疾患	8	17.4%	41	35.0%	49	30.1%
認知症	12	26.1%	45	38.5%	57	35.0%
パーキンソン病	3	6.5%	5	4.3%	8	4.9%
糖尿病	7	15.2%	21	17.9%	28	17.2%
視覚・聴覚障害	4	8.7%	19	16.2%	23	14.1%
骨折・転倒	9	19.6%	47	40.2%	56	34.4%
脊髄損傷	5	10.9%	13	11.1%	18	11.0%
高齢による衰弱	10	21.7%	34	29.1%	44	27.0%
その他	9	19.6%	16	13.7%	25	15.3%
わからない	0	0.0%	2	1.7%	2	1.2%
未回答	1	2.2%	3	2.6%	4	2.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

要介護認定を受けている163人（前年度 175人）について、要介護認定を受けた原因のうち、主たる原因については、男性では「脳血管疾患」が11名（23.9%）前年度 15名（28.3%）と最も多く、女性では「認知症」が21名（17.9%）（前年度 20人（16.4%））と最も多かった。（表4-2-4）

表4-2-4 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因

	男性(N=46)		女性(N=117)		計(N=163)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	11	23.9%	13	11.1%	24	14.7%
心臓疾患	1	2.2%	3	2.6%	6	3.7%
がん	0	0.0%	2	1.7%	4	2.5%
呼吸器疾患	1	2.2%	1	0.9%	2	1.2%
関節疾患	4	8.7%	13	11.1%	20	12.3%
認知症	5	10.9%	21	17.9%	26	16.0%
パーキンソン病	1	2.2%	4	3.4%	5	3.1%
糖尿病	0	0.0%	3	2.6%	4	2.5%
視覚・聴覚障害	0	0.0%	2	1.7%	2	1.2%
骨折・転倒	3	6.5%	15	12.8%	18	11.0%
脊髄損傷	3	6.5%	2	1.7%	5	3.1%
高齢による衰弱	2	4.3%	7	6.0%	9	5.5%
その他	7	15.2%	9	7.7%	18	11.0%
わからない	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
未回答	8	17.4%	21	17.9%	29	17.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	46	100.0%	117	100.0%	163	100.0%

2.4.3 介助なしでできること

介助なしで行うことができるものについてみると、全ての項目において男性・女性ともに約 70%以上の者が「できる」と回答した。（表4－3）

表4－3 介助なしでできること（複数回答）

	男性(N=687)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えがあれ ばできる		介助や支えがあつ てもできない		無回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	578	84.1%	7	1.0%	4	0.6%	98	14.3%	0	0.0%	687
口腔清拭	578	84.1%	7	1.0%	3	0.4%	99	14.4%	0	0.0%	687
身体の清拭	561	81.7%	20	2.9%	6	0.9%	100	14.6%	0	0.0%	687
洗髪	563	82.0%	20	2.9%	5	0.7%	99	14.4%	0	0.0%	687
着替	574	83.6%	10	1.5%	5	0.7%	98	14.3%	0	0.0%	687
入浴	562	81.8%	23	3.3%	4	0.6%	98	14.3%	0	0.0%	687
体位交換・起居	575	83.7%	8	1.2%	3	0.4%	101	14.7%	0	0.0%	687
排泄	577	84.0%	6	0.9%	6	0.9%	98	14.3%	0	0.0%	687
食事の準備・後始末	527	76.7%	21	3.1%	36	5.2%	103	15.0%	0	0.0%	687
食事	583	84.9%	3	0.4%	4	0.6%	97	14.1%	0	0.0%	687
服薬	573	83.4%	11	1.6%	5	0.7%	98	14.3%	0	0.0%	687
散歩	551	80.2%	23	3.3%	15	2.2%	98	14.3%	0	0.0%	687
掃除	532	77.4%	22	3.2%	34	4.9%	99	14.4%	0	0.0%	687
洗濯	530	77.1%	17	2.5%	37	5.4%	103	15.0%	0	0.0%	687
買い物	534	77.7%	21	3.1%	33	4.8%	99	14.4%	0	0.0%	687
日常会話	577	84.0%	9	1.3%	4	0.6%	97	14.1%	0	0.0%	687

	女性(N=756)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えがあれ ばできる		介助や支えがあっ てもできない		無回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	611	80.8%	24	3.2%	16	2.1%	105	13.9%	0	0.0%	756
口腔清拭	613	81.1%	23	3.0%	17	2.2%	103	13.6%	0	0.0%	756
身体の清拭	579	76.6%	47	6.2%	25	3.3%	105	13.9%	0	0.0%	756
洗髪	568	75.1%	51	6.7%	32	4.2%	105	13.9%	0	0.0%	756
着替	597	79.0%	40	5.3%	15	2.0%	104	13.8%	0	0.0%	756
入浴	569	75.3%	54	7.1%	28	3.7%	105	13.9%	0	0.0%	756
体位交換・起居	612	81.0%	22	2.9%	15	2.0%	107	14.2%	0	0.0%	756
排泄	611	80.8%	23	3.0%	17	2.2%	105	13.9%	0	0.0%	756
食事の準備・後始末	554	73.3%	42	5.6%	57	7.5%	103	13.6%	0	0.0%	756
食事	621	82.1%	23	3.0%	9	1.2%	103	13.6%	0	0.0%	756
服薬	603	79.8%	40	5.3%	10	1.3%	103	13.6%	0	0.0%	756
散歩	550	72.8%	44	5.8%	56	7.4%	106	14.0%	0	0.0%	756
掃除	550	72.8%	28	3.7%	76	10.1%	102	13.5%	0	0.0%	756
洗濯	565	74.7%	25	3.3%	64	8.5%	102	13.5%	0	0.0%	756
買い物	539	71.3%	35	4.6%	77	10.2%	105	13.9%	0	0.0%	756
日常会話	626	82.8%	12	1.6%	13	1.7%	105	13.9%	0	0.0%	756

	計(N=1443)										計
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えがあれ ばできる		介助や支えがあつ てもできない		無回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	1189	82.4%	31	2.1%	20	1.4%	203	14.1%	0	0.0%	1443
口腔清拭	1191	82.5%	30	2.1%	20	1.4%	202	14.0%	0	0.0%	1443
身体の清拭	1140	79.0%	67	4.6%	31	2.1%	205	14.2%	0	0.0%	1443
洗髪	1131	78.4%	71	4.9%	37	2.6%	204	14.1%	0	0.0%	1443
着替	1171	81.2%	50	3.5%	20	1.4%	202	14.0%	0	0.0%	1443
入浴	1131	78.4%	77	5.3%	32	2.2%	203	14.1%	0	0.0%	1443
体位交換・起居	1187	82.3%	30	2.1%	18	1.2%	208	14.4%	0	0.0%	1443
排泄	1188	82.3%	29	2.0%	23	1.6%	203	14.1%	0	0.0%	1443
食事の準備・後始末	1081	74.9%	63	4.4%	93	6.4%	206	14.3%	0	0.0%	1443
食事	1204	83.4%	26	1.8%	13	0.9%	200	13.9%	0	0.0%	1443
服薬	1176	81.5%	51	3.5%	15	1.0%	201	13.9%	0	0.0%	1443
散歩	1101	76.3%	67	4.6%	71	4.9%	204	14.1%	0	0.0%	1443
掃除	1082	75.0%	50	3.5%	110	7.6%	201	13.9%	0	0.0%	1443
洗濯	1095	75.9%	42	2.9%	101	7.0%	205	14.2%	0	0.0%	1443
買い物	1073	74.4%	56	3.9%	110	7.6%	204	14.1%	0	0.0%	1443
日常会話	1203	83.4%	21	1.5%	17	1.2%	202	14.0%	0	0.0%	1443

2.5 この1年間の治療状況について


2.5.1 現在の受診頻度について

現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3 回程度」が44.5%と最も多く（男性42.4%、女性46.4%）（前年度 男性42.4%、女性47.3%、全体45.0%）、次いで「数か月に1 回程度」が25.5%（男性26.2%、女性24.9%）（前年度 男性27.8%、女性25.5%、全体26.6%）等の順となっている。（表5－1、図5－1）

表5－1 受診頻度

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	15	2.2%	21	2.8%	36	2.5%
毎週1回以上	40	5.8%	63	8.3%	103	7.1%
毎月1～3回程度	291	42.4%	351	46.4%	642	44.5%
数か月に1回程度	180	26.2%	188	24.9%	368	25.5%
受診していない	139	20.2%	101	13.4%	240	16.6%
未回答	22	3.2%	32	4.2%	54	3.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図5－1 受診頻度



2.5.2 医師の方から処方を受けている

この1年間に医師の方から処方を受けた内容を見ると、何らかの処方を受けていると回答した方は951人（65.9%）（男性428人（62.3%）、女性523人（69.2%））であった。（表5－2）

表5－2 医師の方から処方を受けている

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	428	62.3%	523	69.2%	951	65.9%
未回答	259	37.7%	233	30.8%	492	34.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図5－2 医師の方から処方を受けている





表 5－3－1 薬の対象となる病気

病名	計(N=5318)	
	件数	割合
高血圧	314	5.9%
糖尿病	161	3.0%
狭心症	96	1.8%
睡眠薬	89	1.7%
コレステロール	79	1.5%
骨粗しょう症	76	1.4%
精神安定	75	1.4%
便通	73	1.4%
高脂血症	70	1.3%
痛み	68	1.3%
抗血栓	61	1.1%
胃潰瘍	59	1.1%
十二指腸潰瘍	48	0.9%
胃薬	48	0.9%
胃炎	46	0.9%
その他	1746	32.8%
未回答	2199	41.4%
不詳	10	0.2%
計	5318	100.0%

図 5－3－1 薬の対象となる病気



現在医師の処方により継続して飲んでいる（塗っている）薬の対象となる病気の内容をみると、「高血圧」との回答が314件と最も多く、次いで「糖尿病」が161件、狭心症が96件となっている。。（表 5－3－1、図 5－3－1）

2.6 油症患者受療券（油証券）の使用状況について


2.6.1 油証券の保有状況

油証券を保有しているか質問したところ、「はい」と答えたのは904人（62.6%）（男性418人（60.8%）、女性486人（64.3%））であった。（表6－1、図6－1）

表6－1 カネミ倉庫が発行している油身証券を持っていますか

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	418	60.8%	486	64.3%	904	62.6%
いいえ	255	37.1%	265	35.1%	520	36.0%
未回答	14	2.0%	5	0.7%	19	1.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図6－1 カネミ倉庫が発行している油身証券を持っていますか




2.6.2 油証券の発行について

油証券を所持していないと回答した520人を対象に、油証券の発行の希望の有無を質問したところ、108人（20.8%）（男性62人（24.4%）、女性46人（17.4%））の者が油証券の発行を希望していた。（表6－2、図6－2）

表6－2 油証券の発行を希望しているか

	男性(N=255)		女性(N=265)		計(N=520)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	62	24.3%	46	17.4%	108	20.8%
いいえ	183	71.8%	208	78.5%	391	75.2%
未回答	10	3.9%	11	4.2%	21	4.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	255	100.0%	265	100.0%	520	100.0%

図6－2 油証券の発行を希望しているか




2.6.3 油症券を使用せずに受診したことがあるか

この1年間、油症券を使用せずに受診したことがあるかを質問したところ、928人（64.3%）（男性423人（61.6%）、女性505人（66.8%））（前年度 男性67.1%、女性72.8%、全体70.1%）の者が「はい」と回答した。（表6－3、図6－3）

表6－3 この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	423	61.6%	505	66.8%	928	64.3%
いいえ	227	33.0%	207	27.4%	434	30.1%
未回答	37	5.4%	44	5.8%	81	5.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図6－3 この1年間で、油症券を使用せずに受診したことがあるか




この1年間、油症券を使用せずに受診したことがある928人（前年度 1007人）に油症券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、201人（21.7%）（男性100人（23.6%）、女性101人（20.0%））（前年度 男性121人（26.2%）、女性142人（26.0%）、全体 263人（26.1%））が「はい」と回答した。（表6－4、図6－4）

表6－4 油症券の使用を希望する医療機関があるか

	男性(N=423)		女性(N=505)		計(N=928)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	100	23.6%	101	20.0%	201	21.7%
いいえ	312	73.8%	373	73.9%	685	73.8%
未回答	11	2.6%	31	6.1%	42	4.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	423	100.0%	505	100.0%	928	100.0%

図6－4 油症券の使用を希望する医療機関があるか



油症券の使用を希望する医療機関と受診頻度を質問したところ、のべ316カ所（※）についての回答があり、受診頻度は入院中が0.9%、毎週1回以上が5.7%、毎月1～3回程度が32.3%、数ヶ月に1回程度が43.4%、受診していないが5.1%、未回答が12.7%であった。（※一部、既に油症券が使用可能な医療機関を含む）

2.7 油症検診について


2.7.1 昨年度の油症検診の受診について

昨年度の油症検診の受診をしたかどうかをみると、「はい」と答えたのは39.8%（男性39.7%、女性39.8%）（前年度 男性46.3%、女性45.2%、全体45.7%）であった。（表7-1、図7-1）

表7-1 受診検診

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	273	39.7%	301	39.8%	574	39.8%
いいえ	400	58.2%	448	59.3%	848	58.8%
未回答	14	2.0%	7	0.9%	21	1.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図7-1 受診検診




2.7.2 油症検診の受診を受けなかった理由

油症検診を受けていない848人（男性400人、女性448人）（前年度 男性362人、女性402人、全体764人）を対象に、受けなかった理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかったから」と回答した方が36.0%と最も多く（男性47.5%、女性25.7%）、次いで「体調が悪かったから」が14.6%（男性10.3%、女性18.5%）等の順となっている。（表7-2、図7-2）

表7-2 油症検診の受診を受けなかった理由

	男性(N=400)		女性(N=448)		計(N=848)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから(案内が届かなかった)	10	2.5%	10	2.2%	20	2.4%
仕事などで都合がつかなかったから	190	47.5%	115	25.7%	305	36.0%
体調が悪かったから	41	10.3%	83	18.5%	124	14.6%
検診の場所が遠かったから	38	9.5%	71	15.8%	109	12.9%
職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから	51	12.8%	54	12.1%	105	12.4%
健康に自信があり、必要性を感じないから	2	0.5%	5	1.1%	7	0.8%
その時、医療機関に入院していたから(介護施設への入所も含む)	25	6.3%	42	9.4%	67	7.9%
めんどうだから	14	3.5%	11	2.5%	25	2.9%
その他	36	9.0%	77	17.2%	113	13.3%
無回答	23	5.8%	22	4.9%	45	5.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	400	100.0%	448	100.0%	848	100.0%

図7-2 油症検診の受診を受けなかった理由



2.8 相談体制について


2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について

油症相談員や相談窓口に相談をしたことがあるかどうかみると、「はい」と答えたのは230人(15.9%) (男性113人(16.4%)、女性117人(15.5%))であった。(表8-1、図8-1)

表8-1 相談経験がある

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	113	16.4%	117	15.5%	230	15.9%
いいえ	554	80.6%	624	82.5%	1178	81.6%
未回答	20	2.9%	15	2.0%	35	2.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

図8-1 相談経験がある




2.8.2 相談を受けなかった理由

油症相談員や相談窓口に相談経験を「ない」と回答した1,178人（男性554人、女性624人）を対象に、受けなかった理由を質問したところ、「特に相談することがないから」と回答した方が58.7%と最も多く（男性63.4%、女性54.5%）、次いで「相談窓口を知らなかったから」が15.3%（男性14.8%、女性15.7%）等の順となっている。（表8-2、図8-2）

表8-2 相談を受けなかった理由

	男性(N=554)		女性(N=624)		計(N=1178)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
特に相談することがないから	351	63.4%	340	54.5%	691	58.7%
他に相談できる人がいるから	53	9.6%	87	13.9%	140	11.9%
相談窓口を知らなかったから	82	14.8%	98	15.7%	180	15.3%
その他	37	6.7%	74	11.9%	111	9.4%
未回答	40	7.2%	35	5.6%	75	6.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	554	100.0%	624	100.0%	1178	100.0%

図8-2 相談を受けなかった理由



2.9 これまでにかかったことのある病気（今かかっている病気・症状も含む）について

本調査が、今回が初めてかどうかをみると、43人（3.0%）（男性19人（2.8%）、女性24人（3.2%））が「はい」と回答した。（表9）

表9 本調査が今回初めてかどうか

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	19	2.8%	24	3.2%	43	3.0%
いいえ	668	97.2%	732	96.8%	1400	97.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

2.9.1 悪性腫瘍（がん）について

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるかについてみると、118人（8.2%）（男性64人（9.3%）、女性54人（7.1%））（前年度 男性10.5%、女性10.4%、全体10.4%）が「はい」と回答した。（表9-1）

表9-1-1-1 悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか 性別

	男性(N=687)		女性(N=756)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	64	9.3%	54	7.1%	118	8.2%
いいえ	596	86.8%	642	84.9%	1238	85.8%
未回答	27	3.9%	60	7.9%	87	6.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	687	100.0%	756	100.0%	1443	100.0%

表9-1-1-2 悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか 初既調査

	初調査(N=43)		既調査(N=1400)		計(N=1443)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	8	18.6%	110	7.9%	118	8.2%
いいえ	35	81.4%	1203	85.9%	1238	85.8%
未回答	0	0.0%	87	6.2%	87	6.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	43	100.0%	1400	100.0%	1443	100.0%

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した118人（前年度 150人）に、具体的な病名を記述式で質問したところ、171件（前年度 177件）の回答が寄せられた。大腸がん25件（前年度 26件）が最も多く、次いで胃がん14件（前年度 22件）、前立腺がん11件（前年度 15件）、子宮がん11件（前年度17件）、肺がん10件（前年度 16件）等の順となっている。また、治療歴については、「がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中」の67件が最も多く、次いで「入院治療中・外来（通院）治療中」の42件等の順となっている。（表9-1-2-1）

表9-1-2-1 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 性別

	入院治療中・外来（通院）治療中	がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中	治療が完了し、通院もしていない	その他	未回答	計
大腸がん	2	11	8	2	2	25
胃がん	0	10	4	0	0	14
前立腺がん	6	5	0	0	0	11
子宮がん	0	5	5	1	0	11
肺がん	1	6	2	1	0	10
乳がん	3	2	1	0	0	6
甲状腺ガン	1	1	4	0	0	6
膀胱ガン	0	3	1	0	1	5
腎臓がん	2	3	0	0	0	5
肝臓がん	3	2	0	0	0	5
その他	16	9	9	2	7	43
未回答	8	10	7	0	5	30
計	42	67	41	6	15	171

※調査票の記入をもとに集計しているため「その他」には悪性腫瘍（がん）以外の疾患の記載（回答）があった場合も含まれる。

表 9-1-2-2 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 初既調査

	初調査(N=8)		既調査(N=110)		計(N=118)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸がん	4	50.0%	21	19.1%	25	21.2%
胃がん	1	12.5%	13	11.8%	14	11.9%
前立腺がん	1	12.5%	10	9.1%	11	9.3%
子宮がん	0	0.0%	11	10.0%	11	9.3%
肺がん	1	12.5%	9	8.2%	10	8.5%
乳がん	1	12.5%	5	4.5%	6	5.1%
甲状腺ガン	0	0.0%	6	5.5%	6	5.1%
膀胱ガン	0	0.0%	5	4.5%	5	4.2%
腎臓がん	0	0.0%	5	4.5%	5	4.2%
肝臓がん	1	12.5%	4	3.6%	5	4.2%
その他	2	25.0%	41	37.3%	43	36.4%
なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	2	25.0%	28	25.5%	30	25.4%

同じく悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した118人（前年度 150人）に治療歴を質問したところ、「がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中」が56.8%と最も多く（男性64.1%、女性48.1%）、次いで「入院治療中・外来（通院）治療中」が35.6%（男性35.9%、女性35.2%）等の順となっている。（表 9-1-3-1）

表 9-1-3-1 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 性別

	男性(N=64)		女性(N=54)		計(N=118)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院治療中・外来（通院）治療中	23	35.9%	19	35.2%	42	35.6%
がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中	41	64.1%	26	48.1%	67	56.8%
治療が完了し、通院もしていない	23	35.9%	18	33.3%	41	34.7%
その他	4	6.3%	2	3.7%	6	5.1%
未回答	11	17.2%	4	7.4%	15	12.7%

表 9-1-3-2 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 初既調査

	初調査(N=8)		既検査(N=110)		計(N=118)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院治療中・外来（通院）治療中	3	37.5%	39	35.5%	42	35.6%
がんに対する治療は終了し、定期的な健診のため通院中	4	50.0%	63	57.3%	67	56.8%
治療が完了し、通院もしていない	3	37.5%	38	34.5%	41	34.7%
その他	0	0.0%	6	5.5%	6	5.1%
未回答	3	37.5%	12	10.9%	15	12.7%

同じく悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した118人（前年度 150人）に受けた全ての治療を質問したところ、「外科手術（胸腔鏡・胸腔鏡手術を含む）」が80.5%と最も多く（男性78.1%、女性83.3%）、次いで「薬物療法（抗がん剤・ホルモン剤 など）」が50.0%（男性42.2%、女性59.3%）等の順となっている。（表9-1-3-1）

表9-1-4-1 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 性別

	男性(N=64)		女性(N=54)		計(N=118)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
外科手術(胸腔鏡・胸腔鏡手術を含む)	50	78.1%	45	83.3%	95	80.5%
内視鏡治療	26	40.6%	13	24.1%	39	33.1%
薬物療法(抗がん剤・ホルモン剤 など)	27	42.2%	32	59.3%	59	50.0%
放射線治療	11	17.2%	10	18.5%	21	17.8%
その他	5	7.8%	2	3.7%	7	5.9%
未回答	18	28.1%	8	14.8%	26	22.0%

表9-1-4-2 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴 初既調査

	初調査(N=8)		既検査(N=110)		計(N=118)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
外科手術(胸腔鏡・胸腔鏡手術を含む)	5	62.5%	90	81.8%	95	80.5%
内視鏡治療	6	75.0%	33	30.0%	39	33.1%
薬物療法(抗がん剤・ホルモン剤 など)	3	37.5%	56	50.9%	59	50.0%
放射線治療	1	12.5%	20	18.2%	21	17.8%
その他	0	0.0%	7	6.4%	7	5.9%
未回答	2	25.0%	24	21.8%	26	22.0%

2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について

脳・精神・神経の病気について、これまでかかったことがある病気をみると、男性・女性ともに「頭痛」と回答した方が最も多く、その中で「医療機関で治療中」150件（10.4%） 「医療機関での治療をへて治療」30件（2.1%） 「症状はあるが治療していない」236件（16.4%）であった。（表9－2－1）

表9－2－1 脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)						女性(N=756)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	2	0.3%	4	0.6%	1	0.1%	7	1.0%	6	0.8%	5	0.7%
脳梗塞	26	3.8%	4	0.6%	2	0.3%	32	4.7%	27	3.6%	7	0.9%
頭痛	48	7.0%	6	0.9%	88	12.8%	142	20.7%	102	13.5%	24	3.2%
頭重	24	3.5%	2	0.3%	44	6.4%	70	10.2%	54	7.1%	5	0.7%
神経痛	40	5.8%	6	0.9%	36	5.2%	82	11.9%	75	9.9%	11	1.5%
知的障害	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	4	0.6%	4	0.5%	0	0.0%
躁うつ病	9	1.3%	7	1.0%	7	1.0%	23	3.3%	29	3.8%	5	0.7%
統合失調症	7	1.0%	2	0.3%	1	0.1%	10	1.5%	8	1.1%	1	0.1%
幻覚	6	0.9%	0	0.0%	4	0.6%	10	1.5%	8	1.1%	0	0.0%
認知症	18	2.6%	1	0.1%	6	0.9%	25	3.6%	34	4.5%	1	0.1%
もの忘れ	30	4.4%	0	0.0%	103	15.0%	133	19.4%	63	8.3%	2	0.3%
かっとなりやすい・短気	17	2.5%	1	0.1%	68	9.9%	86	12.5%	21	2.8%	0	0.0%
その他	10	1.5%	4	0.6%	2	0.3%	16	2.3%	15	2.0%	1	0.1%
病気・症状は特にな	246	35.8%	0	0.0%	0	0.0%	246	35.8%	202	26.7%	0	0.0%
未回答	134	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	134	19.5%	115	15.2%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	8	0.6%	9	0.6%	2	0.1%
脳梗塞	53	3.7%	11	0.8%	5	0.3%
頭痛	150	10.4%	30	2.1%	236	16.4%
頭重	78	5.4%	7	0.5%	117	8.1%
神経痛	115	8.0%	17	1.2%	80	5.5%
知的障害	6	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
躁うつ病	38	2.6%	12	0.8%	12	0.8%
統合失調症	15	1.0%	3	0.2%	5	0.3%
幻覚	14	1.0%	0	0.0%	13	0.9%
認知症	52	3.6%	2	0.1%	24	1.7%
もの忘れ	93	6.4%	2	0.1%	215	14.9%
かっとなりやすい・短気	38	2.6%	1	0.1%	113	7.8%
その他	25	1.7%	5	0.3%	10	0.7%
病気・症状は特にな	448	31.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	249	17.3%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－2－2 脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)						既調査(N=1400)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.6%	9	0.6%	2	0.1%
脳梗塞	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	51	3.6%	11	0.8%
頭痛	5	11.6%	0	0.0%	7	16.3%	12	27.9%	145	10.4%	30	2.1%
頭重	2	4.7%	1	2.3%	5	11.6%	8	18.6%	76	5.4%	6	0.4%
神経痛	4	9.3%	1	2.3%	2	4.7%	7	16.3%	111	7.9%	16	1.1%
知的障害	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	5	0.4%	0	0.0%
躁うつ病	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	37	2.6%	11	0.8%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.1%	3	0.2%
幻覚	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	13	0.9%	0	0.0%
認知症	2	4.7%	1	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	50	3.6%	1	0.1%
もの忘れ	2	4.7%	0	0.0%	7	16.3%	9	20.9%	91	6.5%	2	0.1%
かっとなりやすい・短気	1	2.3%	1	2.3%	5	11.6%	7	16.3%	37	2.6%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	1.8%	5	0.4%
病気・症状は特にな	16	37.2%	0	0.0%	0	0.0%	16	37.2%	432	30.9%	0	0.0%
未回答	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	242	17.3%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	8	0.6%	9	0.6%	2	0.1%
脳梗塞	53	3.7%	11	0.8%	5	0.3%
頭痛	150	10.4%	30	2.1%	236	16.4%
頭重	78	5.4%	7	0.5%	117	8.1%
神経痛	115	8.0%	17	1.2%	80	5.5%
知的障害	6	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
躁うつ病	38	2.6%	12	0.8%	12	0.8%
統合失調症	15	1.0%	3	0.2%	5	0.3%
幻覚	14	1.0%	0	0.0%	13	0.9%
認知症	52	3.6%	2	0.1%	24	1.7%
もの忘れ	93	6.4%	2	0.1%	215	14.9%
かっとなりやすい・短気	38	2.6%	1	0.1%	113	7.8%
その他	25	1.7%	5	0.3%	10	0.7%
病気・症状は特にな	448	31.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	249	17.3%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.3 自律神経系の病気・症状について

自律神経系の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性・女性ともに「不眠」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」180件（12.5%） 「医療機関での治療をへて治癒」14件（1.0%） 「症状はあるが治療していない」137件（9.5%）であった。（表9－3－1）

表9－3－1 自律神経系の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	11	1.6%	3	0.4%	41	6.0%	55	8.0%	21	2.8%	6	0.8%	62	8.2%	89	11.8%
過敏性腸症候群	16	2.3%	4	0.6%	39	5.7%	59	8.6%	37	4.9%	10	1.3%	29	3.8%	76	10.1%
多汗症	5	0.7%	1	0.1%	19	2.8%	25	3.6%	8	1.1%	0	0.0%	29	3.8%	37	4.9%
汗が出にくい	5	0.7%	0	0.0%	9	1.3%	14	2.0%	10	1.3%	1	0.1%	28	3.7%	39	5.2%
不眠	50	7.3%	5	0.7%	59	8.6%	114	16.6%	130	17.2%	9	1.2%	78	10.3%	217	28.7%
不安神経症	14	2.0%	1	0.1%	10	1.5%	25	3.6%	34	4.5%	4	0.5%	23	3.0%	61	8.1%
自律神経失調症	18	2.6%	5	0.7%	25	3.6%	48	7.0%	44	5.8%	18	2.4%	50	6.6%	112	14.8%
その他	2	0.3%	0	0.0%	4	0.6%	6	0.9%	5	0.7%	2	0.3%	10	1.3%	17	2.2%
病気・症状は特にない	465	67.7%	0	0.0%	0	0.0%	465	67.7%	379	50.1%	0	0.0%	0	0.0%	379	50.1%
未回答	312	45.4%	0	0.0%	0	0.0%	312	45.4%	253	33.5%	0	0.0%	0	0.0%	253	33.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	32	2.2%	9	0.6%	103	7.1%	144	10.0%
過敏性腸症候群	53	3.7%	14	1.0%	68	4.7%	135	9.4%
多汗症	13	0.9%	1	0.1%	48	3.3%	62	4.3%
汗が出にくい	15	1.0%	1	0.1%	37	2.6%	53	3.7%
不眠	180	12.5%	14	1.0%	137	9.5%	331	22.9%
不安神経症	48	3.3%	5	0.3%	33	2.3%	86	6.0%
自律神経失調症	62	4.3%	23	1.6%	75	5.2%	160	11.1%
その他	7	0.5%	2	0.1%	14	1.0%	23	1.6%
病気・症状は特にない	844	58.5%	0	0.0%	0	0.0%	844	58.5%
未回答	565	39.2%	0	0.0%	0	0.0%	565	39.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－3－2 自律神経系の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	32	2.3%	9	0.6%	101	7.2%	142	10.1%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	53	3.8%	14	1.0%	67	4.8%	134	9.6%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	13	0.9%	1	0.1%	47	3.4%	61	4.4%
汗が出にくい	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	15	1.1%	1	0.1%	35	2.5%	51	3.6%
不眠	2	4.7%	0	0.0%	6	14.0%	8	18.6%	178	12.7%	14	1.0%	131	9.4%	323	23.1%
不安神経症	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	2	4.7%	48	3.4%	4	0.3%	32	2.3%	84	6.0%
自律神経失調症	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	62	4.4%	23	1.6%	73	5.2%	158	11.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	7	0.5%	2	0.1%	13	0.9%	22	1.6%
病気・症状は特にない	29	67.4%	0	0.0%	0	0.0%	29	67.4%	815	58.2%	0	0.0%	0	0.0%	815	58.2%
未回答	20	46.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	46.5%	545	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	545	38.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	32	2.2%	9	0.6%	103	7.1%	144	10.0%
過敏性腸症候群	53	3.7%	14	1.0%	68	4.7%	135	9.4%
多汗症	13	0.9%	1	0.1%	48	3.3%	62	4.3%
汗が出にくい	15	1.0%	1	0.1%	37	2.6%	53	3.7%
不眠	180	12.5%	14	1.0%	137	9.5%	331	22.9%
不安神経症	48	3.3%	5	0.3%	33	2.3%	86	6.0%
自律神経失調症	62	4.3%	23	1.6%	75	5.2%	160	11.1%
その他	7	0.5%	2	0.1%	14	1.0%	23	1.6%
病気・症状は特にない	844	58.5%	0	0.0%	0	0.0%	844	58.5%
未回答	565	39.2%	0	0.0%	0	0.0%	565	39.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.4 眼の病気・症状について

眼の病気・症状について、これまでかかったことがある病気を見ると、男性・女性ともに「近視」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」74件（5.1%） 「医療機関での治療をへて治癒」19件（1.3%） 「症状はあるが治療していない」247件（17.1%）であった。（表9－4－1）

表9－4－1 眼の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	43	6.3%	5	0.7%	92	13.4%	140	20.4%	62	8.2%	7	0.9%	78	10.3%	147	19.4%
瞼板線(まつげの根本)からのチーズ様分泌物	4	0.6%	1	0.1%	20	2.9%	25	3.6%	18	2.4%	3	0.4%	13	1.7%	34	4.5%
結膜(白目)の色素沈着	5	0.7%	0	0.0%	11	1.6%	16	2.3%	8	1.1%	2	0.3%	10	1.3%	20	2.6%
白内障	54	7.9%	31	4.5%	20	2.9%	105	15.3%	108	14.3%	46	6.1%	41	5.4%	195	25.8%
緑内障	16	2.3%	1	0.1%	4	0.6%	21	3.1%	24	3.2%	4	0.5%	12	1.6%	40	5.3%
近視	29	4.2%	7	1.0%	134	19.5%	170	24.7%	45	6.0%	12	1.6%	113	14.9%	170	22.5%
遠視	15	2.2%	2	0.3%	92	13.4%	109	15.9%	30	4.0%	6	0.8%	83	11.0%	119	15.7%
乱視	26	3.8%	8	1.2%	137	19.9%	171	24.9%	48	6.3%	8	1.1%	100	13.2%	156	20.6%
弱視	8	1.2%	0	0.0%	8	1.2%	16	2.3%	6	0.8%	1	0.1%	11	1.5%	18	2.4%
その他	24	3.5%	8	1.2%	27	3.9%	59	8.6%	43	5.7%	9	1.2%	32	4.2%	84	11.1%
病気・症状は特にない	161	23.4%	0	0.0%	0	0.0%	161	23.4%	159	21.0%	0	0.0%	0	0.0%	159	21.0%
未回答	104	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	104	15.1%	84	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	84	11.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	105	7.3%	12	0.8%	170	11.8%	287	19.9%
瞼板線(まつげの根本)からのチーズ様分泌物	22	1.5%	4	0.3%	33	2.3%	59	4.1%
結膜(白目)の色素沈着	13	0.9%	2	0.1%	21	1.5%	36	2.5%
白内障	162	11.2%	77	5.3%	61	4.2%	300	20.8%
緑内障	40	2.8%	5	0.3%	16	1.1%	61	4.2%
近視	74	5.1%	19	1.3%	247	17.1%	340	23.6%
遠視	45	3.1%	8	0.6%	175	12.1%	228	15.8%
乱視	74	5.1%	16	1.1%	237	16.4%	327	22.7%
弱視	14	1.0%	1	0.1%	19	1.3%	34	2.4%
その他	67	4.6%	17	1.2%	59	4.1%	143	9.9%
病気・症状は特にない	320	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	320	22.2%
未回答	188	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	188	13.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－4－2 眼の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)							既調査(N=1400)						
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	1	2.3%	1	2.3%	5	11.6%	7	16.3%	104	7.4%	11	0.8%	165	11.8%
瞼板線(まつげの根本)からのチーズ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	22	1.6%	4	0.3%	31	2.2%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	0.9%	2	0.1%	21	1.5%
白内障	6	14.0%	2	4.7%	2	4.7%	10	23.3%	156	11.1%	75	5.4%	59	4.2%
緑内障	3	7.0%	1	2.3%	3	7.0%	7	16.3%	37	2.6%	4	0.3%	13	0.9%
近視	3	7.0%	1	2.3%	9	20.9%	13	30.2%	71	5.1%	18	1.3%	238	17.0%
遠視	1	2.3%	0	0.0%	6	14.0%	7	16.3%	44	3.1%	8	0.6%	169	12.1%
乱視	4	9.3%	1	2.3%	9	20.9%	14	32.6%	70	5.0%	15	1.1%	228	16.3%
弱視	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	12	0.9%	1	0.1%	19	1.4%
その他	3	7.0%	0	0.0%	1	2.3%	4	9.3%	64	4.6%	17	1.2%	58	4.1%
病気・症状は特にない	10	23.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	23.3%	310	22.1%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	185	13.2%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	105	7.3%	12	0.8%	170	11.8%	287	19.9%
瞼板線(まつげの根本)からのチーズ様分泌物	22	1.5%	4	0.3%	33	2.3%	59	4.1%
結膜(白目)の色素沈着	13	0.9%	2	0.1%	21	1.5%	36	2.5%
白内障	162	11.2%	77	5.3%	61	4.2%	300	20.8%
緑内障	40	2.8%	5	0.3%	16	1.1%	61	4.2%
近視	74	5.1%	19	1.3%	247	17.1%	340	23.6%
遠視	45	3.1%	8	0.6%	175	12.1%	228	15.8%
乱視	74	5.1%	16	1.1%	237	16.4%	327	22.7%
弱視	14	1.0%	1	0.1%	19	1.3%	34	2.4%
その他	67	4.6%	17	1.2%	59	4.1%	143	9.9%
病気・症状は特にない	320	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	320	22.2%
未回答	188	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	188	13.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.5 口の中の病気・症状について

口の中の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「歯周病（歯槽膿漏）」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」208件（14.4%） 「医療機関での治療をへて治癒」55件（3.8%） 「症状はあるが治療していない」183件（12.7%）であった。（表9-5-1）

表9-5-1 口の中の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	8	1.2%	2	0.3%	43	6.3%	53	7.7%	18	2.4%	2	0.3%	48	6.3%	68	9.0%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	1	0.1%	1	0.1%	4	0.6%	6	0.9%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%
歯周病(歯槽膿漏)	90	13.1%	22	3.2%	95	13.8%	207	30.1%	118	15.6%	33	4.4%	88	11.6%	239	31.6%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	43	6.3%	13	1.9%	50	7.3%	106	15.4%	63	8.3%	17	2.2%	55	7.3%	135	17.9%
顎関節症(あご関節の異常)	3	0.4%	2	0.3%	21	3.1%	26	3.8%	12	1.6%	8	1.1%	26	3.4%	46	6.1%
味覚異常	5	0.7%	2	0.3%	10	1.5%	17	2.5%	8	1.1%	3	0.4%	18	2.4%	29	3.8%
口内炎になりやすい	40	5.8%	7	1.0%	98	14.3%	145	21.1%	84	11.1%	17	2.2%	119	15.7%	220	29.1%
虫歯になりやすい	68	9.9%	33	4.8%	92	13.4%	193	28.1%	106	14.0%	44	5.8%	63	8.3%	213	28.2%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	29	4.2%	8	1.2%	79	11.5%	116	16.9%	73	9.7%	17	2.2%	84	11.1%	174	23.0%
永久歯(全歯)を早期に失った	28	4.1%	18	2.6%	22	3.2%	68	9.9%	35	4.6%	15	2.0%	18	2.4%	68	9.0%
その他	15	2.2%	3	0.4%	6	0.9%	24	3.5%	13	1.7%	5	0.7%	11	1.5%	29	3.8%
病気・症状は特にならない	156	22.7%	0	0.0%	0	0.0%	156	22.7%	150	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	150	19.8%
未回答	107	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	107	15.6%	83	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	11.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	26	1.8%	4	0.3%	91	6.3%	121	8.4%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	2	0.1%	2	0.1%	4	0.3%	8	0.6%
歯周病(歯槽膿漏)	208	14.4%	55	3.8%	183	12.7%	446	30.9%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	106	7.3%	30	2.1%	105	7.3%	241	16.7%
顎関節症(あご関節の異常)	15	1.0%	10	0.7%	47	3.3%	72	5.0%
味覚異常	13	0.9%	5	0.3%	28	1.9%	46	3.2%
口内炎になりやすい	124	8.6%	24	1.7%	217	15.0%	365	25.3%
虫歯になりやすい	174	12.1%	77	5.3%	155	10.7%	406	28.1%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	102	7.1%	25	1.7%	163	11.3%	290	20.1%
永久歯(全歯)を早期に失った	63	4.4%	33	2.3%	40	2.8%	136	9.4%
その他	28	1.9%	8	0.6%	17	1.2%	53	3.7%
病気・症状は特にならない	306	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	306	21.2%
未回答	190	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	190	13.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-5-2 口の中の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	4	9.3%	26	1.9%	4	0.3%	87	6.2%	117	8.4%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	2	0.1%	4	0.3%	8	0.6%
歯周病(歯槽膿漏)	7	16.3%	1	2.3%	10	23.3%	18	41.9%	201	14.4%	54	3.9%	173	12.4%	428	30.6%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	4	9.3%	1	2.3%	6	14.0%	11	25.6%	102	7.3%	29	2.1%	99	7.1%	230	16.4%
顎関節症(あご関節の異常)	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	2	4.7%	14	1.0%	10	0.7%	46	3.3%	70	5.0%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	13	0.9%	5	0.4%	27	1.9%	45	3.2%
口内炎になりやすい	0	0.0%	1	2.3%	10	23.3%	11	25.6%	124	8.9%	23	1.6%	207	14.8%	354	25.3%
虫歯になりやすい	8	18.6%	3	7.0%	9	20.9%	20	46.5%	166	11.9%	74	5.3%	146	10.4%	386	27.6%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	5	11.6%	0	0.0%	7	16.3%	12	27.9%	97	6.9%	25	1.8%	156	11.1%	278	19.9%
永久歯(全歯)を早期に失った	3	7.0%	3	7.0%	3	7.0%	9	20.9%	60	4.3%	30	2.1%	37	2.6%	127	9.1%
その他	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	27	1.9%	7	0.5%	17	1.2%	51	3.6%
病気・症状は特にならない	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	8	18.6%	298	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	298	21.3%
未回答	6	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	14.0%	184	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	184	13.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)	26	1.8%	4	0.3%	91	6.3%	121	8.4%
歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)	2	0.1%	2	0.1%	4	0.3%	8	0.6%
歯周病(歯槽膿漏)	208	14.4%	55	3.8%	183	12.7%	446	30.9%
歯肉炎(歯ぐきの病気)	106	7.3%	30	2.1%	105	7.3%	241	16.7%
顎関節症(あご関節の異常)	15	1.0%	10	0.7%	47	3.3%	72	5.0%
味覚異常	13	0.9%	5	0.3%	28	1.9%	46	3.2%
口内炎になりやすい	124	8.6%	24	1.7%	217	15.0%	365	25.3%
虫歯になりやすい	174	12.1%	77	5.3%	155	10.7%	406	28.1%
歯の知覚過敏(歯がしみる)	102	7.1%	25	1.7%	163	11.3%	290	20.1%
永久歯(全歯)を早期に失った	63	4.4%	33	2.3%	40	2.8%	136	9.4%
その他	28	1.9%	8	0.6%	17	1.2%	53	3.7%
病気・症状は特にならない	306	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	306	21.2%
未回答	190	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	190	13.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.6 耳・鼻の病気・症状について

耳・鼻の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「めまい」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」117件（8.1%）「医療機関での治療をへて治癒」33件（2.3%）「症状はあるが治療していない」159件（11.0%）であった。（表9－6－1）

表9－6－1 耳・鼻の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	11	1.6%	8	1.2%	19	2.8%	38	5.5%	34	4.5%	20	2.6%	22	2.9%	76	10.1%
めまい	30	4.4%	7	1.0%	59	8.6%	96	14.0%	87	11.5%	26	3.4%	100	13.2%	213	28.2%
中耳炎	8	1.2%	27	3.9%	13	1.9%	48	7.0%	11	1.5%	29	3.8%	9	1.2%	49	6.5%
真珠腫性中耳炎	5	0.7%	4	0.6%	4	0.6%	13	1.9%	5	0.7%	4	0.5%	5	0.7%	14	1.9%
鼻炎を起こしやすい	38	5.5%	4	0.6%	81	11.8%	123	17.9%	59	7.8%	10	1.3%	80	10.6%	149	19.7%
難聴	28	4.1%	0	0.0%	89	13.0%	117	17.0%	30	4.0%	6	0.8%	56	7.4%	92	12.2%
蓄膿症	16	2.3%	11	1.6%	31	4.5%	58	8.4%	12	1.6%	17	2.2%	21	2.8%	50	6.6%
鼻血がよく出る	7	1.0%	0	0.0%	36	5.2%	43	6.3%	15	2.0%	7	0.9%	30	4.0%	52	6.9%
鼻血が止まりにくい	2	0.3%	0	0.0%	6	0.9%	8	1.2%	3	0.4%	2	0.3%	3	0.4%	8	1.1%
その他	8	1.2%	3	0.4%	11	1.6%	22	3.2%	11	1.5%	5	0.7%	27	3.6%	43	5.7%
病気・症状はとくにない	226	32.9%	0	0.0%	0	0.0%	226	32.9%	228	30.2%	0	0.0%	0	0.0%	228	30.2%
未回答	124	18.0%	0	0.0%	0	0.0%	124	18.0%	92	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	92	12.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	45	3.1%	28	1.9%	41	2.8%	114	7.9%
めまい	117	8.1%	33	2.3%	159	11.0%	309	21.4%
中耳炎	19	1.3%	56	3.9%	22	1.5%	97	6.7%
真珠腫性中耳炎	10	0.7%	8	0.6%	9	0.6%	27	1.9%
鼻炎を起こしやすい	97	6.7%	14	1.0%	161	11.2%	272	18.8%
難聴	58	4.0%	6	0.4%	145	10.0%	209	14.5%
蓄膿症	28	1.9%	28	1.9%	52	3.6%	108	7.5%
鼻血がよく出る	22	1.5%	7	0.5%	66	4.6%	95	6.6%
鼻血が止まりにくい	5	0.3%	2	0.1%	9	0.6%	16	1.1%
その他	19	1.3%	8	0.6%	38	2.6%	65	4.5%
病気・症状はとくにない	454	31.5%	0	0.0%	0	0.0%	454	31.5%
未回答	216	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	216	15.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－6－2 耳・鼻の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	1	2.3%	2	4.7%	0	0.0%	3	7.0%	44	4.1%	26	14.4%	41	6.1%	111	7.9%
めまい	2	4.7%	1	2.3%	5	11.6%	8	18.6%	115	10.8%	32	17.8%	154	22.8%	301	21.5%
中耳炎	1	2.3%	5	11.6%	3	7.0%	9	20.9%	18	1.7%	51	28.3%	19	2.8%	88	6.3%
真珠腫性中耳炎	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	10	0.9%	7	3.9%	9	1.3%	26	1.9%
鼻炎を起こしやすい	4	9.3%	0	0.0%	7	16.3%	11	25.6%	93	8.8%	14	7.8%	154	22.8%	261	18.6%
難聴	4	9.3%	0	0.0%	6	14.0%	10	23.3%	54	5.1%	6	3.3%	139	20.6%	199	14.2%
蓄膿症	0	0.0%	1	2.3%	4	9.3%	5	11.6%	28	2.6%	27	15.0%	48	7.1%	103	7.4%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	22	2.1%	7	3.9%	64	9.5%	93	6.6%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	1.1%	9	1.3%	16	1.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	1.8%	8	4.4%	38	5.6%	65	4.6%
病気・症状はとくにない	11	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	25.6%	443	41.5%	0	0.0%	0	0.0%	443	31.6%
未回答	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	213	20.1%	0	0.0%	0	0.0%	213	15.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	45	4.1%	28	14.7%	41	5.8%	114	7.9%
めまい	117	10.8%	33	17.4%	159	22.6%	309	21.4%
中耳炎	19	1.7%	56	29.5%	22	3.1%	97	6.7%
真珠腫性中耳炎	10	0.9%	8	4.2%	9	1.3%	27	1.9%
鼻炎を起こしやすい	97	8.9%	14	7.4%	161	22.9%	272	18.8%
難聴	58	5.3%	6	3.2%	145	20.7%	209	14.5%
蓄膿症	28	2.6%	28	14.7%	52	7.4%	108	7.5%
鼻血がよく出る	22	2.0%	7	3.7%	66	9.4%	95	6.6%
鼻血が止まりにくい	5	0.5%	2	1.1%	9	1.3%	16	1.1%
その他	19	1.7%	8	4.2%	38	5.4%	65	4.5%
病気・症状はとくにない	454	41.5%	0	0.0%	0	0.0%	454	31.5%
未回答	216	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	216	15.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.7 甲状腺の病気・症状について

甲状腺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「甲状腺機能低下」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」34件（2.4%） 「医療機関での治療をへて治癒」2件（0.1%） 「症状はあるが治療していない」12件（0.8%）であった。（表9－7－1）

表9－7－1 甲状腺の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	1	0.1%	2	0.3%	3	0.4%	6	0.9%	12	1.6%	6	0.8%	5	0.7%	23	3.0%
慢性甲状腺炎	2	0.3%	0	0.0%	3	0.4%	5	0.7%	4	0.5%	1	0.1%	0	0.0%	5	0.7%
バセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	7	0.9%	6	0.8%	2	0.3%	15	2.0%
甲状腺機能低下	1	0.1%	0	0.0%	5	0.7%	6	0.9%	33	4.4%	2	0.3%	7	0.9%	42	5.6%
その他	1	0.1%	0	0.0%	5	0.7%	6	0.9%	3	0.4%	1	0.1%	3	0.4%	7	0.9%
病気・症状はとくにない	465	67.7%	0	0.0%	0	0.0%	465	67.7%	483	63.9%	0	0.0%	0	0.0%	483	63.9%
未回答	204	29.7%	0	0.0%	0	0.0%	204	29.7%	191	25.3%	0	0.0%	0	0.0%	191	25.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	13	0.9%	8	0.6%	8	0.6%	29	2.0%
慢性甲状腺炎	6	0.4%	1	0.1%	3	0.2%	10	0.7%
バセドウ病	7	0.5%	6	0.4%	3	0.2%	16	1.1%
甲状腺機能低下	34	2.4%	2	0.1%	12	0.8%	48	3.3%
その他	4	0.3%	1	0.1%	8	0.6%	13	0.9%
病気・症状はとくにない	948	65.7%	0	0.0%	0	0.0%	948	65.7%
未回答	395	27.4%	0	0.0%	0	0.0%	395	27.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－7－2 甲状腺の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	12	0.9%	8	0.6%	8	0.6%	28	2.0%
慢性甲状腺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.4%	1	0.1%	3	0.2%	10	0.7%
バセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	6	0.4%	3	0.2%	16	1.1%
甲状腺機能低下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	2.4%	2	0.1%	12	0.9%	48	3.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.1%	8	0.6%	13	0.9%
病気・症状はとくにない	32	74.4%	0	0.0%	0	0.0%	32	74.4%	916	65.4%	0	0.0%	0	0.0%	916	65.4%
未回答	10	23.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	23.3%	385	27.5%	0	0.0%	0	0.0%	385	27.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	13	0.9%	8	0.6%	8	0.6%	29	2.0%
慢性甲状腺炎	6	0.4%	1	0.1%	3	0.2%	10	0.7%
バセドウ病	7	0.5%	6	0.4%	3	0.2%	16	1.1%
甲状腺機能低下	34	2.4%	2	0.1%	12	0.8%	48	3.3%
その他	4	0.3%	1	0.1%	8	0.6%	13	0.9%
病気・症状はとくにない	948	65.7%	0	0.0%	0	0.0%	948	65.7%
未回答	395	27.4%	0	0.0%	0	0.0%	395	27.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について

のど・気管支・肺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「せき」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」133件（9.2%）「医療機関での治療をへて治癒」34件（2.4%）「症状はあるが治療していない」230件（15.9%）であった。（表9-8-1）

表9-8-1 のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	4	0.6%	0	0.0%	2	0.3%	6	0.9%	5	0.7%	0	0.0%	1	0.1%	6	0.8%
無気肺	2	0.3%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.4%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
肺水腫	5	0.7%	0	0.0%	1	0.1%	6	0.9%	7	0.9%	1	0.1%	0	0.0%	8	1.1%
肺炎	7	1.0%	23	3.3%	1	0.1%	31	4.5%	13	1.7%	21	2.8%	0	0.0%	34	4.5%
慢性気管支炎	25	3.6%	5	0.7%	8	1.2%	38	5.5%	29	3.8%	5	0.7%	5	0.7%	39	5.2%
嚔声(声がかれる)	15	2.2%	0	0.0%	31	4.5%	46	6.7%	19	2.5%	2	0.3%	44	5.8%	65	8.6%
呼吸困難	6	0.9%	4	0.6%	8	1.2%	18	2.6%	22	2.9%	3	0.4%	8	1.1%	33	4.4%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	12	1.7%	1	0.1%	17	2.5%	30	4.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
息切れ	32	4.7%	0	0.0%	90	13.1%	122	17.8%	50	6.6%	4	0.5%	69	9.1%	123	16.3%
風邪を引きやすい	31	4.5%	17	2.5%	95	13.8%	143	20.8%	74	9.8%	45	6.0%	92	12.2%	211	27.9%
風邪が治りにくい	23	3.3%	11	1.6%	64	9.3%	98	14.3%	51	6.7%	31	4.1%	58	7.7%	140	18.5%
せき	45	6.6%	6	0.9%	119	17.3%	170	24.7%	88	11.6%	28	3.7%	111	14.7%	227	30.0%
たん	54	7.9%	7	1.0%	120	17.5%	181	26.3%	87	11.5%	17	2.2%	108	14.3%	212	28.0%
その他	7	1.0%	1	0.1%	7	1.0%	15	2.2%	12	1.6%	0	0.0%	4	0.5%	16	2.1%
病気・症状はとくにない	216	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	216	31.4%	252	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	252	33.3%
未回答	114	16.6%	0	0.0%	0	0.0%	114	16.6%	97	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	97	12.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	9	0.6%	0	0.0%	3	0.2%
無気肺	4	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
肺水腫	12	0.8%	1	0.1%	1	0.1%
肺炎	20	1.4%	44	3.0%	1	0.1%
慢性気管支炎	54	3.7%	10	0.7%	13	0.9%
嚔声(声がかれる)	34	2.4%	2	0.1%	75	5.2%
呼吸困難	28	1.9%	7	0.5%	16	1.1%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	13	0.9%	1	0.1%	17	1.2%
息切れ	82	5.7%	4	0.3%	159	11.0%
風邪を引きやすい	105	7.3%	62	4.3%	187	13.0%
風邪が治りにくい	74	5.1%	42	2.9%	122	8.5%
せき	133	9.2%	34	2.4%	230	15.9%
たん	141	9.8%	24	1.7%	228	15.8%
その他	19	1.3%	1	0.1%	11	0.8%
病気・症状はとくにない	468	32.4%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	211	14.6%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-8-2 のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.6%	0	0.0%	3	0.2%	12	0.9%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	1	0.1%	5	0.4%
肺水腫	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	11	0.8%	1	0.1%	1	0.1%	13	0.9%
肺炎	1	2.3%	3	7.0%	0	0.0%	4	9.3%	19	1.4%	41	2.9%	1	0.1%	61	4.4%
慢性気管支炎	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	53	3.8%	9	0.6%	13	0.9%	75	5.4%
嚔声(声がかれる)	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	34	2.4%	2	0.1%	73	5.2%	109	7.8%
呼吸困難	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	27	1.9%	7	0.5%	16	1.1%	50	3.6%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	12	0.9%	1	0.1%	17	1.2%	30	2.1%
息切れ	1	2.3%	0	0.0%	5	11.6%	6	14.0%	81	5.8%	4	0.3%	154	11.0%	239	17.1%
風邪を引きやすい	3	7.0%	2	4.7%	6	14.0%	11	25.6%	102	7.3%	60	4.3%	181	12.9%	343	24.5%
風邪が治りにくい	2	4.7%	0	0.0%	7	16.3%	9	20.9%	72	5.1%	42	3.0%	115	8.2%	229	16.4%
せき	4	9.3%	2	4.7%	7	16.3%	13	30.2%	129	9.2%	32	2.3%	223	15.9%	384	27.4%
たん	4	9.3%	1	2.3%	7	16.3%	12	27.9%	137	9.8%	23	1.6%	221	15.8%	381	27.2%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	19	1.4%	1	0.1%	10	0.7%	30	2.1%
病気・症状はとくにない	15	34.9%	0	0.0%	0	0.0%	15	34.9%	453	32.4%	0	0.0%	0	0.0%	453	32.4%
未回答	5	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	11.6%	206	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	206	14.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	9	0.6%	0	0.0%	3	0.2%
無気肺	4	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
肺水腫	12	0.8%	1	0.1%	1	0.1%
肺炎	20	1.4%	44	3.0%	1	0.1%
慢性気管支炎	54	3.7%	10	0.7%	13	0.9%
嚔声(声がかれる)	34	2.4%	2	0.1%	75	5.2%
呼吸困難	28	1.9%	7	0.5%	16	1.1%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	13	0.9%	1	0.1%	17	1.2%
息切れ	82	5.7%	4	0.3%	159	11.0%
風邪を引きやすい	105	7.3%	62	4.3%	187	13.0%
風邪が治りにくい	74	5.1%	42	2.9%	122	8.5%
せき	133	9.2%	34	2.4%	230	15.9%
たん	141	9.8%	24	1.7%	228	15.8%
その他	19	1.3%	1	0.1%	11	0.8%
病気・症状はとくにない	468	32.4%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	211	14.6%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.9 心臓の病気・症状について

心臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不整脈(脈がとぶ)」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」79件 (5.5%) 「医療機関での治療をへて治癒」12件 (0.8%) 「症状はあるが治療していない」101件 (7.0%) であった。(表9-9-1-1)

表9-9-1-1 心臓の病気・症状(複数回答) 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	9	1.3%	2	0.3%	3	0.4%	14	2.0%	13	1.7%	0	0.0%	3	0.4%	16	2.1%
狭心症	30	4.4%	7	1.0%	5	0.7%	42	6.1%	44	5.8%	5	0.7%	5	0.7%	54	7.1%
心不全	8	1.2%	1	0.1%	4	0.6%	13	1.9%	24	3.2%	0	0.0%	3	0.4%	27	3.6%
心肥大	10	1.5%	3	0.4%	7	1.0%	20	2.9%	12	1.6%	3	0.4%	14	1.9%	29	3.8%
不整脈(脈がとぶ)	33	4.8%	5	0.7%	53	7.7%	91	13.2%	46	6.1%	7	0.9%	48	6.3%	101	13.4%
頻脈(脈拍が増加している状態)	9	1.3%	1	0.1%	10	1.5%	20	2.9%	23	3.0%	2	0.3%	12	1.6%	37	4.9%
動悸(異常にドキドキする)	15	2.2%	1	0.1%	31	4.5%	47	6.8%	41	5.4%	3	0.4%	72	9.5%	116	15.3%
その他	7	1.0%	0	0.0%	8	1.2%	15	2.2%	11	1.5%	2	0.3%	13	1.7%	26	3.4%
病気・症状はとくにない	359	52.3%	0	0.0%	0	0.0%	359	52.3%	378	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	378	50.0%
未回答	146	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	146	21.3%	134	17.7%	0	0.0%	0	0.0%	134	17.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	22	1.5%	2	0.1%	6	0.4%	30	2.1%
狭心症	74	5.1%	12	0.8%	10	0.7%	96	6.7%
心不全	32	2.2%	1	0.1%	7	0.5%	40	2.8%
心肥大	22	1.5%	6	0.4%	21	1.5%	49	3.4%
不整脈(脈がとぶ)	79	5.5%	12	0.8%	101	7.0%	192	13.3%
頻脈(脈拍が増加している状態)	32	2.2%	3	0.2%	22	1.5%	57	4.0%
動悸(異常にドキドキする)	56	3.9%	4	0.3%	103	7.1%	163	11.3%
その他	18	1.2%	2	0.1%	21	1.5%	41	2.8%
病気・症状はとくにない	737	51.1%	0	0.0%	0	0.0%	737	51.1%
未回答	280	19.4%	0	0.0%	0	0.0%	280	19.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-9-1-2 心臓の病気・症状(複数回答) 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	21	1.5%	1	0.1%	6	0.4%	28	2.0%
狭心症	2	4.7%	1	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	72	5.1%	11	0.8%	10	0.7%	93	6.6%
心不全	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	29	2.1%	1	0.1%	7	0.5%	37	2.6%
心肥大	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	22	1.6%	6	0.4%	20	1.4%	48	3.4%
不整脈(脈がとぶ)	1	2.3%	0	0.0%	4	9.3%	5	11.6%	78	5.6%	12	0.9%	97	6.9%	187	13.4%
頻脈(脈拍が増加している状態)	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	31	2.2%	3	0.2%	22	1.6%	56	4.0%
動悸(異常にドキドキする)	4	9.3%	0	0.0%	3	7.0%	7	16.3%	52	3.7%	4	0.3%	100	7.1%	156	11.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.3%	2	0.1%	21	1.5%	41	2.9%
病気・症状はとくにない	20	46.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	46.5%	717	51.2%	0	0.0%	0	0.0%	717	51.2%
未回答	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	273	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	273	19.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	22	1.5%	2	0.1%	6	0.4%	30	2.1%
狭心症	74	5.1%	12	0.8%	10	0.7%	96	6.7%
心不全	32	2.2%	1	0.1%	7	0.5%	40	2.8%
心肥大	22	1.5%	6	0.4%	21	1.5%	49	3.4%
不整脈(脈がとぶ)	79	5.5%	12	0.8%	101	7.0%	192	13.3%
頻脈(脈拍が増加している状態)	32	2.2%	3	0.2%	22	1.5%	57	4.0%
動悸(異常にドキドキする)	56	3.9%	4	0.3%	103	7.1%	163	11.3%
その他	18	1.2%	2	0.1%	21	1.5%	41	2.8%
病気・症状はとくにない	737	51.1%	0	0.0%	0	0.0%	737	51.1%
未回答	280	19.4%	0	0.0%	0	0.0%	280	19.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

心臓の病気で現在治療中という方192名（前年度 152名）に治療法を伺ったところ男性・女性ともに「内服薬」（男性73.1%、女性82.5%、全体78.6%）（前年度 男性90.8%、女性97.7%、全体94.7%）での治療が最も多い治療法となっている。（表9-9-2-1、図9-9-2-1）

表9-9-2-1 心臓の病気、現在の治療内容 性別

	男性(N=78)		女性(N=114)		計(N=192)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	4	5.1%	3	2.6%	7	3.6%
内服薬	57	73.1%	94	82.5%	151	78.6%
注射薬	0	0.0%	2	1.8%	2	1.0%
その他	11	14.1%	11	9.6%	22	11.5%
未回答	10	12.8%	10	8.8%	20	10.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	78	100.0%	114	100.0%	192	100.0%

図9-9-2-1 心臓の病気、現在の治療内容 性別





表9-9-2-2 心臓の病気、現在の治療内容

	初調査(N=8)		既調査(N=184)		計(N=192)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	7	3.8%	7	3.6%
内服薬	6	75.0%	145	78.8%	151	78.6%
注射薬	0	0.0%	2	1.1%	2	1.0%
その他	1	12.5%	21	11.4%	22	11.5%
未回答	1	12.5%	19	10.3%	20	10.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	8	100.0%	184	100.0%	192	100.0%

図9-9-2-2 心臓の病気、現在の治療内容



2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について

高血圧や血管の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「高血圧」と回答した方が最も多く
 その中で「医療機関で治療中」427件（29.6%） 「医療機関での治療をへて治癒」11件（0.8%） 「症状はあるが治療して
 いない」59件（4.1%）であった。（表9－10－1－1）

表9－10－1－1 高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	193	28.1%	6	0.9%	32	4.7%	231	33.6%	234	31.0%	5	0.7%	27	3.6%	266	35.2%
低血圧	10	1.5%	0	0.0%	20	2.9%	30	4.4%	12	1.6%	5	0.7%	36	4.8%	53	7.0%
動脈硬化	18	2.6%	1	0.1%	8	1.2%	27	3.9%	15	2.0%	0	0.0%	4	0.5%	19	2.5%
動脈瘤	10	1.5%	3	0.4%	5	0.7%	18	2.6%	6	0.8%	2	0.3%	7	0.9%	15	2.0%
静脈炎	1	0.1%	0	0.0%	3	0.4%	4	0.6%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.4%	4	0.5%
静脈瘤	3	0.4%	0	0.0%	9	1.3%	12	1.7%	7	0.9%	3	0.4%	20	2.6%	30	4.0%
その他	2	0.3%	0	0.0%	3	0.4%	5	0.7%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.4%	5	0.7%
病気・症状はとくにない	275	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	275	40.0%	279	36.9%	0	0.0%	0	0.0%	279	36.9%
未回答	129	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	129	18.8%	129	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	129	17.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	427	29.6%	11	0.8%	59	4.1%	497	34.4%
低血圧	22	1.5%	5	0.3%	56	3.9%	83	5.8%
動脈硬化	33	2.3%	1	0.1%	12	0.8%	46	3.2%
動脈瘤	16	1.1%	5	0.3%	12	0.8%	33	2.3%
静脈炎	1	0.1%	1	0.1%	6	0.4%	8	0.6%
静脈瘤	10	0.7%	3	0.2%	29	2.0%	42	2.9%
その他	4	0.3%	0	0.0%	6	0.4%	10	0.7%
病気・症状はとくにない	554	38.4%	0	0.0%	0	0.0%	554	38.4%
未回答	258	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	258	17.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－10－1－1 高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	7	16.3%	3	7.0%	4	9.3%	14	32.6%	420	30.0%	8	0.6%	55	3.9%	483	34.5%
低血圧	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	21	1.5%	5	0.4%	56	4.0%	82	5.9%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	2.4%	1	0.1%	12	0.9%	46	3.3%
動脈瘤	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	14	1.0%	5	0.4%	12	0.9%	31	2.2%
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	6	0.4%	8	0.6%
静脈瘤	1	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	4	9.3%	9	0.6%	3	0.2%	26	1.9%	38	2.7%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	6	0.4%	10	0.7%
病気・症状はとくにない	20	46.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	46.5%	534	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	534	38.1%
未回答	6	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	14.0%	252	18.0%	0	0.0%	0	0.0%	252	18.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	427	29.6%	11	0.8%	59	4.1%	497	34.4%
低血圧	22	1.5%	5	0.3%	56	3.9%	83	5.8%
動脈硬化	33	2.3%	1	0.1%	12	0.8%	46	3.2%
動脈瘤	16	1.1%	5	0.3%	12	0.8%	33	2.3%
静脈炎	1	0.1%	1	0.1%	6	0.4%	8	0.6%
静脈瘤	10	0.7%	3	0.2%	29	2.0%	42	2.9%
その他	4	0.3%	0	0.0%	6	0.4%	10	0.7%
病気・症状はとくにない	554	38.4%	0	0.0%	0	0.0%	554	38.4%
未回答	258	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	258	17.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

高血圧や血管の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く92.0%（男性91.2%、女性92.7%）（前年度 男性98.3%、女性98.3%、全体98.3%）であった。（表9-10-2-1、図9-10-2-1）

表9-10-2-1 高血圧 治療方法 性別

	男性(N=193)		女性(N=234)		計(N=427)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	24	12.4%	29	12.4%	53	12.4%
内服薬	176	91.2%	217	92.7%	393	92.0%
その他	4	2.1%	4	1.7%	8	1.9%
未回答	0	0.0%	3	1.3%	3	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-10-2-1 高血圧 治療方法 性別





表9-10-2-2 高血圧 治療方法 初既調査

	初調査(N=7)		既調査(N=420)		計(N=427)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	2	28.6%	51	12.1%	53	12.4%
内服薬	5	71.4%	388	92.4%	393	92.0%
その他	1	14.3%	7	1.7%	8	1.9%
未回答	0	0.0%	3	0.7%	3	0.7%
不詳	0	0.0%	3	0.7%	0	0.0%

図9-10-2-2 高血圧 治療方法 初既調査



2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「肝機能障害」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」37件（2.6%）「医療機関での治療をへて治癒」11件（0.8%）「症状はあるが治療していない」36件（2.5%）であった。（表9－11－1）

表9－11－1 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	6	0.9%	3	0.4%	4	0.6%	13	1.9%	7	0.9%	4	0.5%	8	1.1%	19	2.5%
C型肝炎	5	0.7%	2	0.3%	1	0.1%	8	1.2%	10	1.3%	2	0.3%	4	0.5%	16	2.1%
肝機能障害	22	3.2%	6	0.9%	24	3.5%	52	7.6%	15	2.0%	5	0.7%	12	1.6%	32	4.2%
胆のう炎	5	0.7%	5	0.7%	2	0.3%	12	1.7%	2	0.3%	6	0.8%	1	0.1%	9	1.2%
胆石症	6	0.9%	12	1.7%	12	1.7%	30	4.4%	11	1.5%	13	1.7%	18	2.4%	42	5.6%
黄疸	2	0.3%	4	0.6%	1	0.1%	7	1.0%	1	0.1%	2	0.3%	2	0.3%	5	0.7%
脾腫(脾臓がはれる)	3	0.4%	0	0.0%	1	0.1%	4	0.6%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.4%	6	0.8%
その他	4	0.6%	4	0.6%	7	1.0%	15	2.2%	8	1.1%	0	0.0%	9	1.2%	17	2.2%
病気・症状はとくにない	417	60.7%	0	0.0%	0	0.0%	417	60.7%	476	63.0%	0	0.0%	0	0.0%	476	63.0%
未回答	158	23.0%	0	0.0%	0	0.0%	158	23.0%	171	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	171	22.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	13	0.9%	7	0.5%	12	0.8%	32	2.2%
C型肝炎	15	1.0%	4	0.3%	5	0.3%	24	1.7%
肝機能障害	37	2.6%	11	0.8%	36	2.5%	84	5.8%
胆のう炎	7	0.5%	11	0.8%	3	0.2%	21	1.5%
胆石症	17	1.2%	25	1.7%	30	2.1%	72	5.0%
黄疸	3	0.2%	6	0.4%	3	0.2%	12	0.8%
脾腫(脾臓がはれる)	4	0.3%	2	0.1%	4	0.3%	10	0.7%
その他	12	0.8%	4	0.3%	16	1.1%	32	2.2%
病気・症状はとくにない	893	61.9%	0	0.0%	0	0.0%	893	61.9%
未回答	329	22.8%	0	0.0%	0	0.0%	329	22.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－11－2 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	13	0.9%	7	0.5%	10	0.7%	30	2.1%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.1%	4	0.3%	5	0.4%	24	1.7%
肝機能障害	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	3	7.0%	36	2.6%	11	0.8%	34	2.4%	81	5.8%
胆のう炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	11	0.8%	3	0.2%	21	1.5%
胆石症	1	2.3%	1	2.3%	1	2.3%	3	7.0%	16	1.1%	24	1.7%	29	2.1%	69	4.9%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	6	0.4%	3	0.2%	12	0.9%
脾腫(脾臓がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	2	0.1%	4	0.3%	10	0.7%
その他	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	12	0.9%	3	0.2%	16	1.1%	31	2.2%
病気・症状はとくにない	25	58.1%	0	0.0%	0	0.0%	25	58.1%	868	62.0%	0	0.0%	0	0.0%	868	62.0%
未回答	9	20.9%	0	0.0%	0	0.0%	9	20.9%	320	22.9%	0	0.0%	0	0.0%	320	22.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	13	0.9%	7	0.5%	12	0.8%	32	2.2%
C型肝炎	15	1.0%	4	0.3%	5	0.3%	24	1.7%
肝機能障害	37	2.6%	11	0.8%	36	2.5%	84	5.8%
胆のう炎	7	0.5%	11	0.8%	3	0.2%	21	1.5%
胆石症	17	1.2%	25	1.7%	30	2.1%	72	5.0%
黄疸	3	0.2%	6	0.4%	3	0.2%	12	0.8%
脾腫(脾臓がはれる)	4	0.3%	2	0.1%	4	0.3%	10	0.7%
その他	12	0.8%	4	0.3%	16	1.1%	32	2.2%
病気・症状はとくにない	893	61.9%	0	0.0%	0	0.0%	893	61.9%
未回答	329	22.8%	0	0.0%	0	0.0%	329	22.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.12 すい臓の病気・症状について

すい臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「糖尿病」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」140件（9.7%）「医療機関での治療をへて治癒」2件（0.1%）「症状はあるが治療していない」10件（0.7%）であった。（表9-12-1-1）

表9-12-1-1 すい臓の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	3	0.4%	2	0.3%	2	0.3%	7	1.0%	4	0.5%	10	1.3%	3	0.4%	17	2.2%
糖尿病	82	11.9%	1	0.1%	8	1.2%	91	13.2%	58	7.7%	1	0.1%	2	0.3%	61	8.1%
その他	3	0.4%	1	0.1%	3	0.4%	7	1.0%	2	0.3%	2	0.3%	5	0.7%	9	1.2%
病気・症状はとくにない	412	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	412	60.0%	497	65.7%	0	0.0%	0	0.0%	497	65.7%
未回答	179	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	179	26.1%	178	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	178	23.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	7	0.5%	12	0.8%	5	0.3%	24	1.7%
糖尿病	140	9.7%	2	0.1%	10	0.7%	152	10.5%
その他	5	0.3%	3	0.2%	8	0.6%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	909	63.0%	0	0.0%	0	0.0%	909	63.0%
未回答	357	24.7%	0	0.0%	0	0.0%	357	24.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-12-1-2 すい臓の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	7	0.5%	11	0.8%	5	0.4%	23	1.6%
糖尿病	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	133	9.5%	2	0.1%	10	0.7%	145	10.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.4%	3	0.2%	8	0.6%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	27	62.8%	0	0.0%	0	0.0%	27	62.8%	882	63.0%	0	0.0%	0	0.0%	882	63.0%
未回答	9	20.9%	0	0.0%	0	0.0%	9	20.9%	348	24.9%	0	0.0%	0	0.0%	348	24.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	7	0.5%	12	0.8%	5	0.3%	24	1.7%
糖尿病	140	9.7%	2	0.1%	10	0.7%	152	10.5%
その他	5	0.3%	3	0.2%	8	0.6%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	909	63.0%	0	0.0%	0	0.0%	909	63.0%
未回答	357	24.7%	0	0.0%	0	0.0%	357	24.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

糖尿病で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く85.0%（男性85.4%、女性84.5%）（前年度 男性91.5%、女性89.1%、全体90.5%）であった。（表9-12-2-1、図9-12-2-1）

表9-12-2-1 糖尿病 治療方法 性別

	男性(N=82)		女性(N=58)		計(N=140)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	25	30.5%	17	29.3%	42	30.0%
内服薬	70	85.4%	49	84.5%	119	85.0%
インスリン	16	19.5%	5	8.6%	21	15.0%
その他	3	3.7%	0	0.0%	3	2.1%
未回答	1	1.2%	2	3.4%	3	2.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図 9-12-2-1 糖尿病 治療方法 性別





表 9-12-2-2 糖尿病 治療方法 初既調査

	初調査(N=7)		既調査(N=133)		計(N=140)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	2	28.6%	40	30.1%	42	30.0%
内服薬	6	85.7%	113	85.0%	119	85.0%
インスリン	2	28.6%	19	14.3%	21	15.0%
その他	1	14.3%	2	1.5%	3	2.1%
未回答	0	0.0%	3	2.3%	3	2.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図 9-12-2-2 糖尿病 治療方法 初既調査



2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について

腎臓・膀胱の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「膀胱炎」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」39件（2.7%）「医療機関での治療をへて治癒」108件（7.5%）「症状はあるが治療していない」23件（1.6%）であった。（表9－13－1）

表9－13－1 腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	9	1.3%	3	0.4%	1	0.1%	13	1.9%	14	1.9%	22	2.9%	2	0.3%	38	5.0%
膀胱炎	7	1.0%	14	2.0%	5	0.7%	26	3.8%	32	4.2%	94	12.4%	18	2.4%	144	19.0%
腎結石	9	1.3%	13	1.9%	8	1.2%	30	4.4%	3	0.4%	4	0.5%	7	0.9%	14	1.9%
尿管結石	8	1.2%	30	4.4%	4	0.6%	42	6.1%	4	0.5%	14	1.9%	2	0.3%	20	2.6%
膀胱結石	3	0.4%	3	0.4%	3	0.4%	9	1.3%	2	0.3%	3	0.4%	0	0.0%	5	0.7%
血尿	13	1.9%	16	2.3%	12	1.7%	41	6.0%	21	2.8%	25	3.3%	34	4.5%	80	10.6%
蛋白尿	9	1.3%	5	0.7%	20	2.9%	34	4.9%	12	1.6%	11	1.5%	9	1.2%	32	4.2%
その他	14	2.0%	3	0.4%	8	1.2%	25	3.6%	16	2.1%	2	0.3%	6	0.8%	24	3.2%
病気・症状はとくにない	376	54.7%	0	0.0%	0	0.0%	376	54.7%	399	52.8%	0	0.0%	0	0.0%	399	52.8%
未回答	172	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	172	25.0%	124	16.4%	0	0.0%	0	0.0%	124	16.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	23	1.6%	25	1.7%	3	0.2%	51	3.5%
膀胱炎	39	2.7%	108	7.5%	23	1.6%	170	11.8%
腎結石	12	0.8%	17	1.2%	15	1.0%	44	3.0%
尿管結石	12	0.8%	44	3.0%	6	0.4%	62	4.3%
膀胱結石	5	0.3%	6	0.4%	3	0.2%	14	1.0%
血尿	34	2.4%	41	2.8%	46	3.2%	121	8.4%
蛋白尿	21	1.5%	16	1.1%	29	2.0%	66	4.6%
その他	30	2.1%	5	0.3%	14	1.0%	49	3.4%
病気・症状はとくにない	775	53.7%	0	0.0%	0	0.0%	775	53.7%
未回答	296	20.5%	0	0.0%	0	0.0%	296	20.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－13－2 腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答）初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	1	2.3%	1	2.3%	1	2.3%	3	7.0%	22	1.6%	24	1.7%	2	0.1%	48	3.4%
膀胱炎	1	2.3%	8	18.6%	0	0.0%	9	20.9%	38	2.7%	100	7.1%	23	1.6%	161	11.5%
腎結石	2	4.7%	1	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	10	0.7%	16	1.1%	15	1.1%	41	2.9%
尿管結石	1	2.3%	3	7.0%	0	0.0%	4	9.3%	11	0.8%	41	2.9%	6	0.4%	58	4.1%
膀胱結石	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	4	0.3%	6	0.4%	3	0.2%	13	0.9%
血尿	2	4.7%	2	4.7%	1	2.3%	5	11.6%	32	2.3%	39	2.8%	45	3.2%	116	8.3%
蛋白尿	1	2.3%	1	2.3%	3	7.0%	5	11.6%	20	1.4%	15	1.1%	26	1.9%	61	4.4%
その他	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	2	4.7%	29	2.1%	5	0.4%	13	0.9%	47	3.4%
病気・症状はとくにない	19	44.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	44.2%	756	54.0%	0	0.0%	0	0.0%	756	54.0%
未回答	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	8	18.6%	288	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	288	20.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	23	1.6%	25	1.7%	3	0.2%	51	3.5%
膀胱炎	39	2.7%	108	7.5%	23	1.6%	170	11.8%
腎結石	12	0.8%	17	1.2%	15	1.0%	44	3.0%
尿管結石	12	0.8%	44	3.0%	6	0.4%	62	4.3%
膀胱結石	5	0.3%	6	0.4%	3	0.2%	14	1.0%
血尿	34	2.4%	41	2.8%	46	3.2%	121	8.4%
蛋白尿	21	1.5%	16	1.1%	29	2.0%	66	4.6%
その他	30	2.1%	5	0.3%	14	1.0%	49	3.4%
病気・症状はとくにない	775	53.7%	0	0.0%	0	0.0%	775	53.7%
未回答	296	20.5%	0	0.0%	0	0.0%	296	20.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について

食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「便秘」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」172件（11.9%）「医療機関での治療をへて治癒」20件（1.4%）「症状はあるが治療していない」193件（13.4%）であった。（表9－14－1）

表9－14－1 食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	17	2.5%	41	6.0%	19	2.8%	77	11.2%	17	2.2%	31	4.1%	13	1.7%	61	8.1%
慢性胃炎	24	3.5%	6	0.9%	11	1.6%	41	6.0%	46	6.1%	10	1.3%	31	4.1%	87	11.5%
胃潰瘍	24	3.5%	39	5.7%	5	0.7%	68	9.9%	19	2.5%	19	2.5%	3	0.4%	41	5.4%
十二指腸潰瘍	11	1.6%	31	4.5%	4	0.6%	46	6.7%	8	1.1%	15	2.0%	0	0.0%	23	3.0%
下痢	31	4.5%	7	1.0%	87	12.7%	125	18.2%	40	5.3%	12	1.6%	73	9.7%	125	16.5%
便秘	51	7.4%	4	0.6%	60	8.7%	115	16.7%	121	16.0%	16	2.1%	133	17.6%	270	35.7%
腹部膨満感(おなかが張る)	17	2.5%	3	0.4%	41	6.0%	61	8.9%	38	5.0%	3	0.4%	67	8.9%	108	14.3%
痔疾(ち)	19	2.8%	35	5.1%	63	9.2%	117	17.0%	23	3.0%	28	3.7%	65	8.6%	116	15.3%
腹痛	15	2.2%	6	0.9%	37	5.4%	58	8.4%	28	3.7%	6	0.8%	53	7.0%	87	11.5%
逆流性食道炎	36	5.2%	4	0.6%	34	4.9%	74	10.8%	40	5.3%	17	2.2%	34	4.5%	91	12.0%
その他	7	1.0%	2	0.3%	1	0.1%	10	1.5%	15	2.0%	6	0.8%	9	1.2%	30	4.0%
病気・症状はとくにない	195	28.4%	0	0.0%	0	0.0%	195	28.4%	209	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	209	27.6%
未回答	111	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	111	16.2%	87	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	87	11.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	34	2.4%	72	5.0%	32	2.2%	138	9.6%
慢性胃炎	70	4.9%	16	1.1%	42	2.9%	128	8.9%
胃潰瘍	43	3.0%	58	4.0%	8	0.6%	109	7.6%
十二指腸潰瘍	19	1.3%	46	3.2%	4	0.3%	69	4.8%
下痢	71	4.9%	19	1.3%	160	11.1%	250	17.3%
便秘	172	11.9%	20	1.4%	193	13.4%	385	26.7%
腹部膨満感(おなかが張る)	55	3.8%	6	0.4%	108	7.5%	169	11.7%
痔疾(ち)	42	2.9%	63	4.4%	128	8.9%	233	16.1%
腹痛	43	3.0%	12	0.8%	90	6.2%	145	10.0%
逆流性食道炎	76	5.3%	21	1.5%	68	4.7%	165	11.4%
その他	22	1.5%	8	0.6%	10	0.7%	40	2.8%
病気・症状はとくにない	404	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	404	28.0%
未回答	198	13.7%	0	0.0%	0	0.0%	198	13.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－14－2 食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	3	7.0%	1	2.3%	0	0.0%	4	9.3%	31	2.2%	71	5.1%	32	2.3%	134	9.6%
慢性胃炎	3	7.0%	2	4.7%	4	9.3%	9	20.9%	67	4.8%	14	1.0%	38	2.7%	119	8.5%
胃潰瘍	2	4.7%	2	4.7%	1	2.3%	5	11.6%	41	2.9%	56	4.0%	7	0.5%	104	7.4%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	3	7.0%	19	1.4%	43	3.1%	4	0.3%	66	4.7%
下痢	3	7.0%	0	0.0%	7	16.3%	10	23.3%	68	4.9%	19	1.4%	153	10.9%	240	17.1%
便秘	3	7.0%	0	0.0%	6	14.0%	9	20.9%	169	12.1%	20	1.4%	187	13.4%	376	26.9%
腹部膨満感(おなかが張る)	2	4.7%	0	0.0%	1	2.3%	3	7.0%	53	3.8%	6	0.4%	107	7.6%	166	11.9%
痔疾(ち)	1	2.3%	3	7.0%	4	9.3%	8	18.6%	41	2.9%	60	4.3%	124	8.9%	225	16.1%
腹痛	3	7.0%	0	0.0%	3	7.0%	6	14.0%	40	2.9%	12	0.9%	87	6.2%	139	9.9%
逆流性食道炎	2	4.7%	1	2.3%	4	9.3%	7	16.3%	74	5.3%	20	1.4%	64	4.6%	158	11.3%
その他	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	21	1.5%	8	0.6%	10	0.7%	39	2.8%
病気・症状はとくにない	11	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	25.6%	393	28.1%	0	0.0%	0	0.0%	393	28.1%
未入力	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	195	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	195	13.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	34	2.4%	72	5.0%	32	2.2%	138	9.6%
慢性胃炎	70	4.9%	16	1.1%	42	2.9%	128	8.9%
胃潰瘍	43	3.0%	58	4.0%	8	0.6%	109	7.6%
十二指腸潰瘍	19	1.3%	46	3.2%	4	0.3%	69	4.8%
下痢	71	4.9%	19	1.3%	160	11.1%	250	17.3%
便秘	172	11.9%	20	1.4%	193	13.4%	385	26.7%
腹部膨満感(おなかが張る)	55	3.8%	6	0.4%	108	7.5%	169	11.7%
痔疾(ち)	42	2.9%	63	4.4%	128	8.9%	233	16.1%
腹痛	43	3.0%	12	0.8%	90	6.2%	145	10.0%
逆流性食道炎	76	5.3%	21	1.5%	68	4.7%	165	11.4%
その他	22	1.5%	8	0.6%	10	0.7%	40	2.8%
病気・症状はとくにない	404	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	404	28.0%
未入力	198	13.7%	0	0.0%	0	0.0%	198	13.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.15 血液・リンパの病気・症状について

血液・リンパの病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「脂質異常症（高脂血症）」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」192件（13.3%） 「医療機関での治療をへて治癒」8件（0.6%） 「症状はあるが治療していない」70件（4.9%）であった。（表9－15－1－1）

表9－15－1－1 血液・リンパの病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	77	11.2%	4	0.6%	30	4.4%	111	16.2%	115	15.2%	4	0.5%	40	5.3%	159	21.0%
貧血	13	1.9%	3	0.4%	20	2.9%	36	5.2%	35	4.6%	24	3.2%	43	5.7%	102	13.5%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	4	0.6%	3	0.4%	4	0.6%	11	1.6%	4	0.5%	2	0.3%	3	0.4%	9	1.2%
その他	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.1%	2	0.3%	6	0.8%	9	1.2%
病気・症状はとくにない	369	53.7%	0	0.0%	0	0.0%	369	53.7%	349	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	349	46.2%
未回答	173	25.2%	0	0.0%	0	0.0%	173	25.2%	153	20.2%	0	0.0%	0	0.0%	153	20.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	192	13.3%	8	0.6%	70	4.9%	270	18.7%
貧血	48	3.3%	27	1.9%	63	4.4%	138	9.6%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	8	0.6%	5	0.3%	7	0.5%	20	1.4%
その他	2	0.1%	3	0.2%	6	0.4%	11	0.8%
病気・症状はとくにない	718	49.8%	0	0.0%	0	0.0%	718	49.8%
未回答	326	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	326	22.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－15－1－2 血液・リンパの病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	4	9.3%	0	0.0%	4	9.3%	8	18.6%	188	13.4%	8	0.6%	66	4.7%	262	18.7%
貧血	1	2.3%	2	4.7%	4	9.3%	7	16.3%	47	3.4%	25	1.8%	59	4.2%	131	9.4%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	8	0.6%	5	0.4%	6	0.4%	19	1.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	3	0.2%	6	0.4%	11	0.8%
病気・症状はとくにない	20	46.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	46.5%	698	49.9%	0	0.0%	0	0.0%	698	49.9%
未入力	9	20.9%	0	0.0%	0	0.0%	9	20.9%	317	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	317	22.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	192	13.3%	8	0.6%	70	4.9%	270	18.7%
貧血	48	3.3%	27	1.9%	63	4.4%	138	9.6%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	8	0.6%	5	0.3%	7	0.5%	20	1.4%
その他	2	0.1%	3	0.2%	6	0.4%	11	0.8%
病気・症状はとくにない	718	49.8%	0	0.0%	0	0.0%	718	49.8%
未入力	326	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	326	22.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

脂質異常症（高脂血症）を現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く87.0%（男性83.1%、女性89.6%）（前年度 男性95.5%、女性91.1%、全体93.0%）であった。（表9－15－2、図9－15－2）

表9－15－2－1 脂質異常症（高脂血症）治療方法

	男性(N=77)		女性(N=115)		計(N=192)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	19	24.7%	16	13.9%	35	18.2%
内服薬	64	83.1%	103	89.6%	167	87.0%
その他	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%
未回答	1	1.3%	2	1.7%	3	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9－15－2－1 脂質異常症（高脂血症）治療方法





表9－15－2－2 脂質異常症（高脂血症）治療方法 初既調査

	初調査(N=4)		既調査(N=188)		計(N=192)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	1	25.0%	34	18.1%	35	18.2%
内服薬	3	75.0%	164	87.2%	167	87.0%
その他	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%
未回答	0	0.0%	3	1.6%	3	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9－15－2－2 脂質異常症（高脂血症）治療方法 初既調査



2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）

男性がこれまでにかかったことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、「前立腺肥大」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」55件（8.0%） 「医療機関での治療をへて治癒」9件（1.3%） 「症状はあるが治療していない」17件（2.5%）であった。（表9－16－1）

表9－16－1 前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 男性

	男性(N=687)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	55	8.0%	9	1.3%	17	2.5%	81	11.8%
男性不妊(子供ができない)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%
インポテンツ	3	0.4%	0	0.0%	23	3.3%	26	3.8%
その他	14	2.0%	1	0.1%	6	0.9%	21	3.1%
病気・症状はとくにない	403	58.7%	0	0.0%	0	0.0%	403	58.7%
未回答	165	24.0%	0	0.0%	0	0.0%	165	24.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－16－2 前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=19)								既調査(N=668)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	2	10.5%	0	0.0%	1	5.3%	3	15.8%	53	8.0%	9	1.4%	16	2.3%	78	11.6%
男性不妊(子供ができない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.3%
インポテンツ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	23	3.5%	26	3.9%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.1%	1	0.2%	6	0.9%	21	3.2%
病気・症状はとくにない	10	52.6%	0	0.0%	0	0.0%	10	52.6%	400	59.9%	0	0.0%	0	0.0%	400	59.9%
未回答	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	31.6%	159	23.9%	0	0.0%	0	0.0%	159	23.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=687)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	55	8.0%	9	1.3%	17	2.3%	81	11.7%
男性不妊(子供ができない)	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%
インポテンツ	3	0.4%	0	0.0%	23	3.4%	26	3.8%
その他	14	2.0%	1	0.1%	6	0.9%	21	3.1%
病気・症状はとくにない	410	59.7%	0	0.0%	0	0.0%	410	59.7%
未回答	165	24.0%	0	0.0%	0	0.0%	165	24.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）

女性がこれまでかかったことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子宮筋腫」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」21件（2.8%） 「医療機関での治療をへて治癒」30件（4.0%） 「症状はあるが治療していない」24件（3.2%）であった。（表9－17－1）

表9－17－1 子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 女性

	女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	8	1.1%	19	2.5%	3	0.4%	30	4.0%
子宮筋腫	21	2.8%	30	4.0%	24	3.2%	75	9.9%
卵巣のう腫	3	0.4%	16	2.1%	3	0.4%	22	2.9%
月経困難症(生理痛)	7	0.9%	7	0.9%	18	2.4%	32	4.2%
不正出血	6	0.8%	18	2.4%	12	1.6%	36	4.8%
月経不順	10	1.3%	15	2.0%	18	2.4%	43	5.7%
過多月経(月経が多い)	4	0.5%	11	1.5%	11	1.5%	26	3.4%
過少月経(月経が少ない)	2	0.3%	1	0.1%	7	0.9%	10	1.3%
その他	11	1.5%	6	0.8%	7	0.9%	24	3.2%
病気・症状はとくにない	436	57.7%	0	0.0%	0	0.0%	436	57.7%
未回答	141	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	141	18.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－17－2 子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 初既調査

	初調査(N=24)								既調査(N=732)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	4.2%	8	1.1%	18	2.5%	3	0.4%	29	4.0%
子宮筋腫	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	4.2%	21	2.9%	29	4.0%	24	3.3%	74	10.1%
卵巣のう腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	16	2.2%	3	0.4%	22	3.0%
月経困難症(生理痛)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	7	1.0%	18	2.5%	32	4.4%
不正出血	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	4.2%	6	0.8%	17	2.3%	12	1.6%	35	4.8%
月経不順	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	2	8.3%	10	1.4%	15	2.0%	16	2.2%	41	5.6%
過多月経(月経が多い)	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	4.2%	4	0.5%	11	1.5%	10	1.4%	25	3.4%
過少月経(月経が少ない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.1%	7	1.0%	10	1.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.5%	6	0.8%	7	1.0%	24	3.3%
病気・症状はとくにない	15	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	62.5%	421	57.5%	0	0.0%	0	0.0%	421	57.5%
未回答	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	138	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	138	18.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	未回答(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	8	1.1%	19	2.5%	3	0.4%	30	4.0%
子宮筋腫	21	2.8%	30	4.0%	24	3.2%	75	9.9%
卵巣のう腫	3	0.4%	16	2.1%	3	0.4%	22	2.9%
月経困難症(生理痛)	7	0.9%	7	0.9%	18	2.4%	32	4.2%
不正出血	6	0.8%	18	2.4%	12	1.6%	36	4.8%
月経不順	10	1.3%	15	2.0%	18	2.4%	43	5.7%
過多月経(月経が多い)	4	0.5%	11	1.5%	11	1.5%	26	3.4%
過少月経(月経が少ない)	2	0.3%	1	0.1%	7	0.9%	10	1.3%
その他	11	1.5%	6	0.8%	7	0.9%	24	3.2%
病気・症状はとくにない	436	57.7%	0	0.0%	0	0.0%	436	57.7%
未回答	141	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	141	18.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）

初経「あり」と回答した266人（前年度 696人）の平均年齢は、13.7歳（前年度 13.8歳）であった。（表9-18-1）

表9-18-1-1 初経のあり・なし 女性

	女性(N=756)		
	件数	割合	平均年齢
あり	266	35.2%	13.7
なし	7	0.9%	-
未回答	483	63.9%	
不詳	0	0.0%	
計	756	100.0%	-

表9-18-1-2 初経のあり・なし 初既調査

	女性(N=756)						
	初調査(N=24)		既調査(N=732)		計(N=756)		平均年齢
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
あり	16	66.7%	250	34.2%	266	35.2%	13.7
なし	0	0.0%	7	1.0%	7	0.9%	-
未回答	8	33.3%	475	64.9%	483	63.9%	
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計	24	100.0%	732	100.0%	756	100.0%	-

閉経「あり」と回答した242人（前年度 574人）の平均年齢は、49.9歳（前年度 49.3歳）であった。（表9-18-2）

表9-18-2-1 閉経のあり・なし 女性

	女性(N=756)		
	件数	割合	平均年齢
あり	242	32.0%	49.9
なし	47	6.2%	-
未回答	467	61.8%	
不詳	0	0.0%	
計	756	100.0%	-

表9-18-2-2 閉経のあり・なし 初既調査

	女性(N=756)						
	初調査(N=24)		既調査(N=732)		計(N=756)		平均年齢
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
あり	14	58.3%	228	31.1%	242	32.0%	49.9
なし	1	4.2%	46	6.3%	47	6.2%	-
未回答	9	37.5%	458	62.6%	467	61.8%	
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計	24	100.0%	732	100.0%	756	100.0%	-

不妊症についてみると、1.1%（前年度 4.5%）が「あり」と回答した。（表9-18-3-1）

表9-18-3-1 不妊症 女性

	女性(N=756)	
	件数	割合
あり	8	1.1%
なし	175	23.1%
未回答	573	75.8%
不詳	0	0.0%
計	756	100.0%

表 9-18-3-2 不妊症 初既調査

	女性(N=756)					
	初調査(N=24)		既調査(N=732)		計(N=756)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
あり	0	0.0%	8	1.1%	8	1.1%
なし	15	2.0%	160	21.9%	175	23.1%
未回答	9	1.2%	564	77.0%	573	75.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	756	100.0%	732	100.0%	756	100.0%

妊娠回数についてみると、「2回」と回答した方が11.5%（前年度 28.3%）と最も多く、次いで「3回」が9.0%（前年度 23.2%）、「4回」が4.5%（前年度 11.5%）等の順となっている。（表 9-18-4-1）

表 9-18-4-1 妊娠回数 女性

	女性(N=756)	
	件数	割合
0	23	3.0%
1	22	2.9%
2	87	11.5%
3	68	9.0%
4	34	4.5%
5	17	2.2%
6	11	1.5%
7	2	0.3%
8	2	0.3%
9	0	0.0%
10	0	0.0%
11回以上	1	0.1%
未回答	489	64.7%
不詳	0	0.0%
計	756	100.0%

表 9-18-4-2 妊娠回数 初既調査

	初調査(N=24)		既調査(N=732)		計(N=756)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0	1	4.2%	22	3.0%	23	3.0%
1	1	4.2%	21	2.9%	22	2.9%
2	5	20.8%	82	11.2%	87	11.5%
3	7	29.2%	61	8.3%	68	9.0%
4	3	12.5%	31	4.2%	34	4.5%
5	0	0.0%	17	2.3%	17	2.2%
6	1	4.2%	10	1.4%	11	1.5%
7	0	0.0%	2	0.3%	2	0.3%
8	0	0.0%	2	0.3%	2	0.3%
9	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11回以上	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%
未回答	6	25.0%	483	66.0%	489	64.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	24	100.0%	732	100.0%	756	100.0%

記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「とくになし」が50.5%（前年度 77.1%）で最も多い。次いで、「切迫流産」が5.2%（前年度 8.5%）、「妊娠中毒症」4.1%（前年度 4.3%）等の順となっている。（表9－18－5－1）

表9－18－5－1 妊娠中の状況（複数回答） 女性

	女性(N=707)	
	件数	割合
とくになし	357	50.5%
切迫流産	37	5.2%
切迫早産	8	1.1%
妊娠中毒症	29	4.1%
その他	23	3.3%
未回答	253	35.8%
不詳	0	0.0%

表9－18－5－2 妊娠中の状況（複数回答） 初既調査

	初調査(N=49)		既調査(N=688)		計(N=737)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
とくになし	27	55.1%	336	48.8%	363	49.3%
切迫流産	3	6.1%	34	4.9%	37	5.0%
切迫早産	0	0.0%	8	1.2%	8	1.1%
妊娠中毒症	0	0.0%	29	4.2%	29	3.9%
その他	2	4.1%	21	3.1%	23	3.1%
未回答	17	34.7%	260	37.8%	277	37.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

記載のあった出産等を集計してみると、「正常分娩」が51.5%（前年度 60.8%）で、「人工流産」が7.0%（前年度 12.8%）等の順となっている。（表9－18－6－1）

表9－18－6－1 出産等の状況（複数回答） 女性

	女性(N=728)	
	件数	割合
正常分娩	375	51.5%
帝王切開	35	4.8%
早産	9	1.2%
死産	13	1.8%
自然流産	38	5.2%
人工流産	51	7.0%
その他	6	0.8%
未回答	201	27.6%
不詳	0	0.0%

表9－18－6－2 出産等の状況（複数回答） 初既調査

	初調査(N=49)		既調査(N=683)		計(N=732)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
正常分娩	34	69.4%	343	50.2%	377	51.5%
帝王切開	2	4.1%	33	4.8%	35	4.8%
早産	0	0.0%	9	1.3%	9	1.2%
死産	2	4.1%	11	1.6%	13	1.8%
自然流産	1	2.0%	37	5.4%	38	5.2%
人工流産	1	2.0%	51	7.5%	52	7.1%
その他	0	0.0%	6	0.9%	6	0.8%
未回答	9	18.4%	193	28.3%	202	27.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」が21.0%で最も多い。次いで、「小」8.9%、「多」5.1%の順となっている。（表9－18－7－1）

表9－18－7－1 出産時の出血量 女性

	女性(N=728)	
	件数	割合
小	65	8.9%
中	153	21.0%
多	37	5.1%
未回答	473	65.0%
不詳	0	0.0%

表9－18－7－2 出産時の出血量 初既調査

	初調査(N=49)		既調査(N=679)		計(N=728)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
小	4	8.2%	61	9.0%	65	8.9%
中	12	24.5%	141	20.8%	153	21.0%
多	3	6.1%	34	5.0%	37	5.1%
未回答	30	61.2%	443	65.2%	473	65.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」が63.1%（前年度 64.0%）と最も多い。次いで、「低出生体重児」が1.8%（前年度 2.8%）、「先天異常」が1.0%（前年度 0.9%）等の順となっている。（表9－18－8－1）

表9－18－8－1 新生児の状況（複数回答） 女性

	女性(N=732)	
	件数	割合
とくになし	462	63.1%
低出生体重児	13	1.8%
先天異常	7	1.0%
奇形	4	0.5%
その他	38	5.2%
未回答	208	28.4%
不詳	0	0.0%

表9－18－8－2 新生児の状況（複数回答） 初既調査

	初調査(N=49)		既調査(N=671)		計(N=720)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
とくになし	41	83.7%	421	62.7%	462	64.2%
低出生体重児	0	0.0%	13	1.9%	13	1.8%
先天異常	0	0.0%	7	1.0%	7	1.0%
奇形	0	0.0%	4	0.6%	4	0.6%
その他	1	2.0%	37	5.5%	38	5.3%
未回答	7	14.3%	189	28.2%	196	27.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.19 骨・関節の病気・症状について

骨・関節の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「腰痛」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」298件（20.7%）「医療機関での治療をへて治癒」27件（1.9%）「症状はあるが治療していない」405件（28.1%）であった。（表9－19－1－1）

表9－19－1 骨・関節の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)						女性(N=756)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	14	2.0%	49	7.1%	3	0.4%	66	9.6%	32	4.2%	67	8.9%
椎間板ヘルニア	20	2.9%	14	2.0%	26	3.8%	60	8.7%	19	2.5%	13	1.7%
骨粗しょう症	10	1.5%	0	0.0%	9	1.3%	19	2.8%	115	15.2%	2	0.3%
骨の変形	13	1.9%	0	0.0%	19	2.8%	32	4.7%	51	6.7%	6	0.8%
痛風	40	5.8%	9	1.3%	9	1.3%	58	8.4%	7	0.9%	0	0.0%
関節痛	52	7.6%	3	0.4%	83	12.1%	138	20.1%	126	16.7%	8	1.1%
ガングリオン	5	0.7%	10	1.5%	14	2.0%	29	4.2%	7	0.9%	28	3.7%
骨痛骨がうずくような痛み	11	1.6%	0	0.0%	16	2.3%	27	3.9%	35	4.6%	2	0.3%
肩こり	72	10.5%	1	0.1%	153	22.3%	226	32.9%	142	18.8%	5	0.7%
腰痛	122	17.8%	14	2.0%	195	28.4%	331	48.2%	176	23.3%	13	1.7%
その他	10	1.5%	1	0.1%	5	0.7%	16	2.3%	9	1.2%	3	0.4%
病気・症状はとくにない	112	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	112	16.3%	86	11.4%	0	0.0%
未回答	123	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	123	17.9%	69	9.1%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	46	3.2%	116	8.0%	5	0.3%
椎間板ヘルニア	39	2.7%	27	1.9%	36	2.5%
骨粗しょう症	125	8.7%	2	0.1%	49	3.4%
骨の変形	64	4.4%	6	0.4%	78	5.4%
痛風	47	3.3%	9	0.6%	15	1.0%
関節痛	178	12.3%	11	0.8%	181	12.5%
ガングリオン	12	0.8%	38	2.6%	43	3.0%
骨痛骨がうずくような痛み	46	3.2%	2	0.1%	44	3.0%
肩こり	214	14.8%	6	0.4%	381	26.4%
腰痛	298	20.7%	27	1.9%	405	28.1%
その他	19	1.3%	4	0.3%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	198	13.7%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	192	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－19－2 骨・関節の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)						既調査(N=1400)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	1	2.3%	7	16.3%	0	0.0%	8	18.6%	45	3.2%	109	7.8%
椎間板ヘルニア	2	4.7%	2	4.7%	0	0.0%	4	9.3%	37	2.6%	25	1.8%
骨粗しょう症	1	2.3%	0	0.0%	1	2.3%	2	4.7%	124	8.9%	2	0.1%
骨の変形	2	4.7%	1	2.3%	5	11.6%	8	18.6%	62	4.4%	5	0.4%
痛風	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	44	3.1%	9	0.6%
関節痛	5	11.6%	1	2.3%	7	16.3%	13	30.2%	173	12.4%	10	0.7%
ガングリオン	0	0.0%	2	4.7%	0	0.0%	2	4.7%	12	0.9%	36	2.6%
骨痛骨がうずくような痛み	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	43	3.1%	2	0.1%
肩こり	3	7.0%	0	0.0%	10	23.3%	13	30.2%	211	15.1%	6	0.4%
腰痛	6	14.0%	4	9.3%	9	20.9%	19	44.2%	292	20.9%	23	1.6%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	1.4%	4	0.3%
病気・症状はとくにない	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	191	13.6%	0	0.0%
未回答	6	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	14.0%	186	13.3%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)					
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	46	3.2%	116	8.0%	5	0.3%
椎間板ヘルニア	39	2.7%	27	1.9%	36	2.5%
骨粗しょう症	125	8.7%	2	0.1%	49	3.4%
骨の変形	64	4.4%	6	0.4%	78	5.4%
痛風	47	3.3%	9	0.6%	15	1.0%
関節痛	178	12.3%	11	0.8%	181	12.5%
ガングリオン	12	0.8%	38	2.6%	43	3.0%
骨痛骨がうずくような痛み	46	3.2%	2	0.1%	44	3.0%
肩こり	214	14.8%	6	0.4%	381	26.4%
腰痛	298	20.7%	27	1.9%	405	28.1%
その他	19	1.3%	4	0.3%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	198	13.7%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	192	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

骨・関節の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く85.6%（男性70.0%、女性87.0%）（前年度 男性85.7%、女性95.5%、全体94.9%）であった。（表9-19-2-1、図9-19-2-1）

表9-19-2-1 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 性別

	男性(N=10)		女性(N=115)		計(N=125)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	2	20.0%	15	13.0%	17	13.6%
内服薬	7	70.0%	100	87.0%	107	85.6%
注射薬	1	10.0%	13	11.3%	14	11.2%
その他	0	0.0%	1	0.9%	1	0.8%
未回答	0	0.0%	1	0.9%	1	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-19-2-1 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 性別





表9-19-2-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 初既調査

	初調査(N=1)		既調査(N=124)		計(N=125)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	17	13.7%	17	13.6%
内服薬	1	100.0%	106	85.5%	107	85.6%
注射薬	0	0.0%	14	11.3%	14	11.2%
その他	0	0.0%	1	0.8%	1	0.8%
未回答	0	0.0%	1	0.8%	1	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-19-2-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 初既調査



2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について

皮膚・爪の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「皮膚の掻痒かゆみ」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」181件（12.5%） 「医療機関での治療をへて治療」19件（1.3%） 「症状はあるが治療していない」324件（22.5%）であった。（表9-20-1-1）

表9-20-1-1 皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	15	2.2%	10	1.5%	57	8.3%	82	11.9%	20	2.6%	19	2.5%	45	6.0%	84	11.1%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	10	1.5%	4	0.6%	38	5.5%	52	7.6%	20	2.6%	5	0.7%	58	7.7%	83	11.0%
色素沈着肌が黒くなる	17	2.5%	6	0.9%	58	8.4%	81	11.8%	24	3.2%	3	0.4%	71	9.4%	98	13.0%
爪の変形	30	4.4%	5	0.7%	138	20.1%	173	25.2%	53	7.0%	8	1.1%	136	18.0%	197	26.1%
粉瘤皮膚のふくら	11	1.6%	13	1.9%	47	6.8%	71	10.3%	17	2.2%	11	1.5%	46	6.1%	74	9.8%
粘液嚢腫関節のふくら	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.4%	7	0.9%	1	0.1%	8	1.1%	16	2.1%
掌蹼膿疱症	5	0.7%	2	0.3%	7	1.0%	14	2.0%	4	0.5%	6	0.8%	4	0.5%	14	1.9%
湿疹がでやすい	66	9.6%	3	0.4%	80	11.6%	149	21.7%	99	13.1%	9	1.2%	97	12.8%	205	27.1%
皮膚の掻痒かゆみ	83	12.1%	7	1.0%	144	21.0%	234	34.1%	98	13.0%	12	1.6%	180	23.8%	290	38.4%
乾燥肌さめ肌	37	5.4%	3	0.4%	84	12.2%	124	18.0%	40	5.3%	3	0.4%	124	16.4%	167	22.1%
脱毛	8	1.2%	3	0.4%	45	6.6%	56	8.2%	12	1.6%	3	0.4%	35	4.6%	50	6.6%
白斑	2	0.3%	1	0.1%	9	1.3%	12	1.7%	5	0.7%	0	0.0%	14	1.9%	19	2.5%
紫斑内出血	10	1.5%	0	0.0%	25	3.6%	35	5.1%	21	2.8%	1	0.1%	56	7.4%	78	10.3%
その他	12	1.7%	3	0.4%	5	0.7%	20	2.9%	14	1.9%	2	0.3%	15	2.0%	31	4.1%
病気・症状はとくにない	145	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	145	21.1%	169	22.4%	0	0.0%	0	0.0%	169	22.4%
未回答	122	17.8%	0	0.0%	0	0.0%	122	17.8%	84	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	84	11.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	35	2.4%	29	2.0%	102	7.1%	166	11.5%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	30	2.1%	9	0.6%	96	6.7%	135	9.4%
色素沈着肌が黒くなる	41	2.8%	9	0.6%	129	8.9%	179	12.4%
爪の変形	83	5.8%	13	0.9%	274	19.0%	370	25.6%
粉瘤皮膚のふくら	28	1.9%	24	1.7%	93	6.4%	145	10.0%
粘液嚢腫関節のふくら	8	0.6%	2	0.1%	9	0.6%	19	1.3%
掌蹼膿疱症	9	0.6%	8	0.6%	11	0.8%	28	1.9%
湿疹がでやすい	165	11.4%	12	0.8%	177	12.3%	354	24.5%
皮膚の掻痒かゆみ	181	12.5%	19	1.3%	324	22.5%	524	36.3%
乾燥肌さめ肌	77	5.3%	6	0.4%	208	14.4%	291	20.2%
脱毛	20	1.4%	6	0.4%	80	5.5%	106	7.3%
白斑	7	0.5%	1	0.1%	23	1.6%	31	2.1%
紫斑内出血	31	2.1%	1	0.1%	81	5.6%	113	7.8%
その他	26	1.8%	5	0.3%	20	1.4%	51	3.5%
病気・症状はとくにない	314	21.8%	0	0.0%	0	0.0%	314	21.8%
未回答	206	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	206	14.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-20-1-2 皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	1	2.3%	1	2.3%	1	2.3%	3	7.0%	34	2.4%	28	2.0%	101	7.2%	163	11.6%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	3	7.0%	29	2.1%	9	0.6%	94	6.7%	132	9.4%
色素沈着肌が黒くなる	0	0.0%	1	2.3%	7	16.3%	8	18.6%	41	2.9%	8	0.6%	122	8.7%	171	12.2%
爪の変形	2	4.7%	1	2.3%	10	23.3%	13	30.2%	81	5.8%	12	0.9%	264	18.9%	357	25.5%
粉瘤皮膚のふくら	1	2.3%	1	2.3%	2	4.7%	4	9.3%	27	1.9%	23	1.6%	91	6.5%	141	10.1%
粘液嚢腫関節のふくら	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	8	0.6%	2	0.1%	8	0.6%	18	1.3%
掌蹼膿疱症	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	7	0.5%	8	0.6%	11	0.8%	26	1.9%
湿疹がでやすい	2	4.7%	1	2.3%	3	7.0%	6	14.0%	163	11.6%	11	0.8%	174	12.4%	348	24.9%
皮膚の掻痒かゆみ	5	11.6%	0	0.0%	14	32.6%	19	44.2%	176	12.6%	19	1.4%	310	22.1%	505	36.1%
乾燥肌さめ肌	2	4.7%	0	0.0%	7	16.3%	9	20.9%	75	5.4%	6	0.4%	201	14.4%	282	20.1%
脱毛	0	0.0%	1	2.3%	3	7.0%	4	9.3%	20	1.4%	5	0.4%	77	5.5%	102	7.3%
白斑	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	1	0.1%	23	1.6%	31	2.2%
紫斑内出血	1	2.3%	0	0.0%	4	9.3%	5	11.6%	30	2.1%	1	0.1%	77	5.5%	108	7.7%
その他	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	3	7.0%	26	1.9%	5	0.4%	17	1.2%	48	3.4%
病気・症状はとくにない	11	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	11	25.6%	303	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	303	21.6%
未回答	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	202	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	202	14.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡にきび	35	2.4%	29	2.0%	102	7.1%	166	11.5%
毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび	30	2.1%	9	0.6%	96	6.7%	135	9.4%
色素沈着肌が黒くなる	41	2.8%	9	0.6%	129	8.9%	179	12.4%
爪の変形	83	5.8%	13	0.9%	274	19.0%	370	25.6%
粉瘤皮膚のふくら	28	1.9%	24	1.7%	93	6.4%	145	10.0%
粘液嚢腫関節のふくら	8	0.6%	2	0.1%	9	0.6%	19	1.3%
掌蹼膿疱症	9	0.6%	8	0.6%	11	0.8%	28	1.9%
湿疹がでやすい	165	11.4%	12	0.8%	177	12.3%	354	24.5%
皮膚の掻痒かゆみ	181	12.5%	19	1.3%	324	22.5%	524	36.3%
乾燥肌さめ肌	77	5.3%	6	0.4%	208	14.4%	291	20.2%
脱毛	20	1.4%	6	0.4%	80	5.5%	106	7.3%
白斑	7	0.5%	1	0.1%	23	1.6%	31	2.1%
紫斑内出血	31	2.1%	1	0.1%	81	5.6%	113	7.8%
その他	26	1.8%	5	0.3%	20	1.4%	51	3.5%
病気・症状はとくにない	314	21.8%	0	0.0%	0	0.0%	314	21.8%
未回答	206	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	206	14.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

湿疹が特にできやすい場所をみると、男性・女性ともに「体躯（胸、背中、腹、腰）」が最も多く65.5%（男性71.8%、女性61.0%）であった。次いで、「顔面」が27.1%（男性17.4%、女性34.1%）、「関節の裏（ひじ、ひざ）」15.0%（男性12.8%、女性16.6%）等の順となっている。（表9-20-2-1）

表9-20-2-1 湿疹が特にできやすい場所 性別

	男性(N=149)		女性(N=205)		計(N=354)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節の裏(ひじ、ひざ)	19	12.8%	34	16.6%	53	15.0%
顔面	26	17.4%	70	34.1%	96	27.1%
体躯(胸、背中、腹、腰)	107	71.8%	125	61.0%	232	65.5%
その他	29	19.5%	45	22.0%	74	20.9%
未回答	6	4.0%	8	3.9%	14	4.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-20-2-1 湿疹が特にできやすい場所 性別





表9-20-2-2 湿疹が特にできやすい場所 初既調査

	初調査(N=6)		既調査(N=348)		計(N=354)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節の裏(ひじ、ひざ)	0	0.0%	53	15.2%	53	15.0%
顔面	1	16.7%	95	27.3%	96	27.1%
体躯(胸、背中、腹、腰)	2	33.3%	230	66.1%	232	65.5%
その他	2	33.3%	72	20.7%	74	20.9%
未回答	2	33.3%	12	3.4%	14	4.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-20-2-2 湿疹が特にできやすい場所 初既調査



2.9.21 アレルギー疾患について

アレルギー疾患について、これまでかかったことがある病気をみると、「花粉症」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」131件（9.1%） 「医療機関での治療をへて治癒」18件（1.2%） 「症状はあるが治療していない」150件（10.4%）であった。（表9-21-1）

表9-21-1 アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	9	1.3%	8	1.2%	7	1.0%	24	3.5%	8	1.1%	3	0.4%	9	1.2%	20	2.6%
アレルギー性鼻炎	32	4.7%	2	0.3%	42	6.1%	76	11.1%	56	7.4%	18	2.4%	65	8.6%	139	18.4%
花粉症	51	7.4%	4	0.6%	68	9.9%	123	17.9%	80	10.6%	14	1.9%	82	10.8%	176	23.3%
喘息	19	2.8%	8	1.2%	11	1.6%	38	5.5%	39	5.2%	10	1.3%	15	2.0%	64	8.5%
蕁麻疹	7	1.0%	18	2.6%	23	3.3%	48	7.0%	26	3.4%	29	3.8%	23	3.0%	78	10.3%
食物アレルギー	2	0.3%	5	0.7%	19	2.8%	26	3.8%	8	1.1%	9	1.2%	20	2.6%	37	4.9%
薬物アレルギー	5	0.7%	8	1.2%	18	2.6%	31	4.5%	14	1.9%	13	1.7%	25	3.3%	52	6.9%
その他	3	0.4%	0	0.0%	7	1.0%	10	1.5%	9	1.2%	3	0.4%	8	1.1%	20	2.6%
病気・症状はとくにない	301	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	301	43.8%	288	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	288	38.1%
未回答	148	21.5%	0	0.0%	0	0.0%	148	21.5%	131	17.3%	0	0.0%	0	0.0%	131	17.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	17	1.2%	11	0.8%	16	1.1%	44	3.0%
アレルギー性鼻炎	88	6.1%	20	1.4%	107	7.4%	215	14.9%
花粉症	131	9.1%	18	1.2%	150	10.4%	299	20.7%
喘息	58	4.0%	18	1.2%	26	1.8%	102	7.1%
蕁麻疹	33	2.3%	47	3.3%	46	3.2%	126	8.7%
食物アレルギー	10	0.7%	14	1.0%	39	2.7%	63	4.4%
薬物アレルギー	19	1.3%	21	1.5%	43	3.0%	83	5.8%
その他	12	0.8%	3	0.2%	15	1.0%	30	2.1%
病気・症状はとくにない	589	40.8%	0	0.0%	0	0.0%	589	40.8%
未回答	279	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	279	19.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-21-2 アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	1	3.1%	1	11.1%	1	4.5%	3	7.0%	16	1.3%	10	7.0%	15	3.6%	41	2.9%
アレルギー性鼻炎	2	6.3%	0	0.0%	7	31.8%	9	20.9%	86	7.2%	20	14.0%	100	23.8%	206	14.7%
花粉症	0	0.0%	1	11.1%	5	22.7%	6	14.0%	131	10.9%	17	11.9%	145	34.5%	293	20.9%
喘息	2	6.3%	1	11.1%	3	13.6%	6	14.0%	56	4.7%	17	11.9%	23	5.5%	96	6.9%
蕁麻疹	1	3.1%	3	33.3%	3	13.6%	7	16.3%	32	2.7%	44	30.8%	43	10.2%	119	8.5%
食物アレルギー	0	0.0%	1	11.1%	2	9.1%	3	7.0%	10	0.8%	13	9.1%	37	8.8%	60	4.3%
薬物アレルギー	0	0.0%	2	22.2%	1	4.5%	3	7.0%	19	1.6%	19	13.3%	42	10.0%	80	5.7%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.0%	3	2.1%	15	3.6%	30	2.1%
病気・症状はとくにない	19	59.4%	0	0.0%	0	0.0%	19	44.2%	570	47.3%	0	0.0%	0	0.0%	570	40.7%
未回答	7	21.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	272	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	272	19.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	17	1.4%	11	7.2%	16	3.6%	44	3.0%
アレルギー性鼻炎	88	7.1%	20	13.2%	107	24.2%	215	14.9%
花粉症	131	10.6%	18	11.8%	150	33.9%	299	20.7%
喘息	58	4.7%	18	11.8%	26	5.9%	102	7.1%
蕁麻疹	33	2.7%	47	30.9%	46	10.4%	126	8.7%
食物アレルギー	10	0.8%	14	9.2%	39	8.8%	63	4.4%
薬物アレルギー	19	1.5%	21	13.8%	43	9.7%	83	5.8%
その他	12	1.0%	3	2.0%	15	3.4%	30	2.1%
病気・症状はとくにない	589	47.6%	0	0.0%	0	0.0%	589	40.8%
未回答	279	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	279	19.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.22 膠原病について

膠原病について、これまでかかったことがある病気をみると、「関節リウマチ」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」25件（1.7%）「医療機関での治療をへて治癒」3件（0.2%）「症状はあるが治療していない」7件（0.5%）であった。（表9-22-1-1）

表9-22-1-1 膠原病（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	4	0.6%	2	0.3%	1	0.1%	7	1.0%	21	2.8%	1	0.1%	6	0.8%	28	3.7%
全身性エリテマトーデスSLE	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.4%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.4%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.3%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.4%
ベーチェット病	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
その他	1	0.1%	0	0.0%	4	0.6%	5	0.7%	6	0.8%	0	0.0%	6	0.8%	12	1.6%
病気・症状はとくにない	462	67.2%	0	0.0%	0	0.0%	462	67.2%	501	66.3%	0	0.0%	0	0.0%	501	66.3%
未回答	214	31.1%	0	0.0%	0	0.0%	214	31.1%	209	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	209	27.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	25	1.7%	3	0.2%	7	0.5%	35	2.4%
全身性エリテマトーデスSLE	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.2%
強皮症	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	4	0.3%
皮膚筋炎	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	4	0.3%
シェーグレン症候群	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%	4	0.3%
ベーチェット病	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.2%
その他	7	0.5%	0	0.0%	10	0.7%	17	1.2%
病気・症状はとくにない	963	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	963	66.7%
未回答	423	29.3%	0	0.0%	0	0.0%	423	29.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9-22-1-2 膠原病（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	24	1.7%	3	0.2%	7	0.5%	34	2.4%
全身性エリテマトーデスSLE	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.2%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	4	0.3%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	4	0.3%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%	4	0.3%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.2%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	7	0.5%	0	0.0%	9	0.6%	16	1.1%
病気・症状はとくにない	26	60.5%	0	0.0%	0	0.0%	26	60.5%	937	67.0%	0	0.0%	0	0.0%	937	67.0%
未回答	16	37.2%	0	0.0%	0	0.0%	16	37.2%	407	29.1%	0	0.0%	0	0.0%	407	29.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	25	2.2%	3	0.3%	7	0.6%	35	3.1%
全身性エリテマトーデスSLE	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.3%
強皮症	1	0.1%	1	0.1%	2	0.2%	4	0.3%
皮膚筋炎	1	0.1%	1	0.1%	2	0.2%	4	0.3%
シェーグレン症候群	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	4	0.3%
ベーチェット病	2	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.3%
その他	7	0.6%	0	0.0%	10	0.9%	17	1.5%
病気・症状はとくにない	963	84.3%	0	0.0%	0	0.0%	963	84.3%
未回答	423	37.0%	0	0.0%	0	0.0%	423	37.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、男性・女性ともに「内服薬」が最も多く71.8%（男性83.3%、女性69.7%）（前年度 男性100.0%、女性88.0%、全体90.6%）であった。（表9-22-2、図9-22-2-1）

表9-22-2-1 膠原病 治療方法 性別

	男性(N=6)		女性(N=33)		計(N=39)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	1	16.7%	2	6.1%	3	7.7%
内服薬	5	83.3%	23	69.7%	28	71.8%
注射薬	0	0.0%	3	9.1%	3	7.7%
その他	0	0.0%	4	12.1%	4	10.3%
未回答	0	0.0%	3	9.1%	3	7.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	6	100.0%	33	100.0%	39	100.0%

図9-22-2-1 膠原病 治療方法 性別





表9-22-2-2 膠原病 治療方法 初既調査

	初調査(N=1)		既調査(N=36)		計(N=37)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	3	8.3%	3	8.1%
内服薬	1	100.0%	27	75.0%	28	75.7%
注射薬	1	100.0%	2	5.6%	3	8.1%
その他	0	0.0%	4	11.1%	4	10.8%
未回答	0	0.0%	3	8.3%	3	8.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-22-2-2 膠原病 治療方法 初既調査



2.9.23 その他の病気・症状について

その他の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「全身倦怠感（体がだるい）」と回答した方が最も多くその中で「医療機関で治療中」129件（8.9%） 「医療機関での治療をへて治癒」7件（0.5%） 「症状はあるが治療していない」388件（26.9%）であった。（表9－23－1）

表9－23－1 その他の病気・症状（複数回答） 性別

	男性(N=687)								女性(N=756)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	43	6.3%	2	0.3%	178	25.9%	223	32.5%	86	11.4%	5	0.7%	210	27.8%	301	39.8%
手足のしびれ	73	10.6%	4	0.6%	164	23.9%	241	35.1%	106	14.0%	10	1.3%	165	21.8%	281	37.2%
体がつる	38	5.5%	3	0.4%	117	17.0%	158	23.0%	47	6.2%	6	0.8%	132	17.5%	185	24.5%
のどがつる	1	0.1%	0	0.0%	12	1.7%	13	1.9%	8	1.1%	1	0.1%	20	2.6%	29	3.8%
筋肉の痛み	38	5.5%	2	0.3%	65	9.5%	105	15.3%	81	10.7%	2	0.3%	86	11.4%	169	22.4%
体がむくむ	26	3.8%	0	0.0%	55	8.0%	81	11.8%	58	7.7%	4	0.5%	111	14.7%	173	22.9%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹がでたりする	4	0.6%	0	0.0%	25	3.6%	29	4.2%	26	3.4%	3	0.4%	60	7.9%	89	11.8%
指が腫れる	12	1.7%	0	0.0%	35	5.1%	47	6.8%	42	5.6%	3	0.4%	86	11.4%	131	17.3%
全身に痛みがある	16	2.3%	2	0.3%	15	2.2%	33	4.8%	40	5.3%	1	0.1%	45	6.0%	86	11.4%
手足に痛みがある	57	8.3%	1	0.1%	92	13.4%	150	21.8%	115	15.2%	5	0.7%	136	18.0%	256	33.9%
その他	8	1.2%	1	0.1%	14	2.0%	23	3.3%	4	0.5%	0	0.0%	15	2.0%	19	2.5%
症状はとくにない	157	22.9%	0	0.0%	0	0.0%	157	22.9%	134	17.7%	0	0.0%	0	0.0%	134	17.7%
未回答	123	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	123	17.9%	71	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	71	9.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	129	8.9%	7	0.5%	388	26.9%	524	36.3%
手足のしびれ	179	12.4%	14	1.0%	329	22.8%	522	36.2%
体がつる	85	5.9%	9	0.6%	249	17.3%	343	23.8%
のどがつる	9	0.6%	1	0.1%	32	2.2%	42	2.9%
筋肉の痛み	119	8.2%	4	0.3%	151	10.5%	274	19.0%
体がむくむ	84	5.8%	4	0.3%	166	11.5%	254	17.6%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹がでたりする	30	2.1%	3	0.2%	85	5.9%	118	8.2%
指が腫れる	54	3.7%	3	0.2%	121	8.4%	178	12.3%
全身に痛みがある	56	3.9%	3	0.2%	60	4.2%	119	8.2%
手足に痛みがある	172	11.9%	6	0.4%	228	15.8%	406	28.1%
その他	12	0.8%	1	0.1%	29	2.0%	42	2.9%
症状はとくにない	291	20.2%	0	0.0%	0	0.0%	291	20.2%
未回答	194	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	194	13.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表9－23－2 その他の病気・症状（複数回答） 初既調査

	初調査(N=43)								既調査(N=1400)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	3	7.0%	0	0.0%	9	20.9%	12	27.9%	126	9.0%	7	0.5%	379	27.1%	512	36.6%
手足のしびれ	1	2.3%	1	2.3%	7	16.3%	9	20.9%	178	12.7%	13	0.9%	322	23.0%	513	36.6%
体がつる	1	2.3%	0	0.0%	8	18.6%	9	20.9%	84	6.0%	9	0.6%	241	17.2%	334	23.9%
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	2.3%	9	0.6%	1	0.1%	31	2.2%	41	2.9%
筋肉の痛み	3	7.0%	0	0.0%	4	9.3%	7	16.3%	116	8.3%	4	0.3%	147	10.5%	267	19.1%
体がむくむ	2	4.7%	0	0.0%	2	4.7%	4	9.3%	82	5.9%	4	0.3%	164	11.7%	250	17.9%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹がでたりする	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	2.1%	3	0.2%	85	6.1%	118	8.4%
指が腫れる	1	2.3%	0	0.0%	2	4.7%	3	7.0%	53	3.8%	3	0.2%	119	8.5%	175	12.5%
全身に痛みがある	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	55	3.9%	3	0.2%	60	4.3%	118	8.4%
手足に痛みがある	3	7.0%	0	0.0%	4	9.3%	7	16.3%	169	12.1%	6	0.4%	224	16.0%	399	28.5%
その他	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	4.7%	12	0.9%	1	0.1%	27	1.9%	40	2.9%
症状はとくにない	14	32.6%	0	0.0%	0	0.0%	14	32.6%	277	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	277	19.8%
未回答	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	187	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	187	13.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	計(N=1443)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	129	8.9%	7	0.5%	388	26.9%	524	36.3%
手足のしびれ	179	12.4%	14	1.0%	329	22.8%	522	36.2%
体がつる	85	5.9%	9	0.6%	249	17.3%	343	23.8%
のどがつる	9	0.6%	1	0.1%	32	2.2%	42	2.9%
筋肉の痛み	119	8.2%	4	0.3%	151	10.5%	274	19.0%
体がむくむ	84	5.8%	4	0.3%	166	11.5%	254	17.6%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹がでたりする	30	2.1%	3	0.2%	85	5.9%	118	8.2%
指が腫れる	54	3.7%	3	0.2%	121	8.4%	178	12.3%
全身に痛みがある	56	3.9%	3	0.2%	60	4.2%	119	8.2%
手足に痛みがある	172	11.9%	6	0.4%	228	15.8%	406	28.1%
その他	12	0.8%	1	0.1%	29	2.0%	42	2.9%
症状はとくにない	291	20.2%	0	0.0%	0	0.0%	291	20.2%
未回答	194	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	194	13.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.10 調査票の自由記入欄について

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、290人から回答があった。いずれも、回答いただいた一人一人の貴重なご意見ではあるが、個人情報を含む内容もあり、また、公表にあたっての認識が一人一人異なることから、本報告書には主な内容を記載するととめることとした。

<自由記載欄の主な記入内容>

○自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について（160件）

めまいの症状が引続き有り、日々不安な状況です。
将来的に油症が体にどのように影響するのかは不安。
子供のころから、体のだるさ、疲労感が強くあります。
心房細動が完治しなく心配
長期にわたり病気がひどく学校を休んだため友達がいない。
セキが出るとなかなか止まらない。
手・足がむくんで、力が入りにくく、不安です。
これから先仕事にと、生活にと不安です。

○職業（仕事）に関する苦労について（3件）

仕事を辞めました。収入が欲しいです。
対仕事となるとか過呼吸がでるのではないかと不安で仕事にふみ込めない。
脱毛と体調不良で仕事がなかなか出来ない。

○経済的な苦労について（13件）

無収入で年金も最低限しかなく生活できない状態。
経済的に苦しく毎月の病院代すべての人生をかえしてほしい。
年金は少なくなるばかりで先の事が思ったら本当に自分の心がどうなるか心配です。
つかれが取れない為セサミン等のサプリを飲用しているがそれも、費用として認めて欲しい。
生活の方できびしいのでできたら早めに支援金の振り込みをお願いします

○治療法の研究開発への要望、期待（39件）

膿が出ないようにしてほしい
PCB等は、加齢とともに自然に体外に排泄されるか知りたい。
薬が合わないが医師も解らず薬を変えているが成果が出ない。研究してほしい。
少しでも効果のある治療方があれば教えて下さい。
ガン治療の研究を進めてほしいのと
一日でも早く、汚染物質が対外に排出出来るお薬の御研究を切にお願い申し上げます。
死ぬまでにダイオキシンが体の中から取り除ける方法が見つかればと願いつつ。
にきびあとの皮フのへこみを治すことができるようにしてほしい。
やる気がおきる特効薬、手だてがあったら教えて下さい。

○病院、医師、検診に関する要望（41件）

医師はダイオキシン被害の酷さをもっと、もっと知るべきではないのか。
子供もつかれやすいので油症検診を受けさせて下さい。
顔などににきび、油のかたまりのようなしっしんが多くできて来ています。
運動をした後に筋肉が硬くなる。
毎日背中や足のひざより下にしっしんが出来、薬をつけても直りません。
入院中だが、今の若い医師達は、カネミ油症を知らない。
レントゲン上で異常でもない限り先生方も真剣に考えて下さる人も見た事ありません。

○行政機関に対する要望（38件）

行政からの種々の通知はこの調査以外、送ってほしくない。

介護保険の自己負担分を払ってほしい。

油証券を発行していただける医療機関が大阪は少ないので増やしてほしい。

どの医療機関でも、油症患者受療券が使用できるようにしてほしい。

高知では使用できる病院が少な過ぎです。

出来ない病院の名前は載せないで頂きたいです。

油証券はこの様な病気に使えるのですか？どこまで使って良いのか？

このアンケート少しは、改善の道につながっているのでしょうか。

調査の集計結果だけでも知りたいものです。

2世・3世、子ども達の実態調査をお願いします。

○カネミ倉庫に対する要望（4件）

カネミ油証券でカネミ倉庫が全額負担していただけるなら油証券の発行を希望します。

カミネ会社もみとめてしっかり保証してほしい。

両足の爪が変形し、巻き爪用クリップで治療してもらい、カネミへ請求したがカットされた。

○その他（8件）

二度と同じ事をくり返さないで下さい。と、訴え続けたい。

本人が脳梗塞で会話が出来ない為分かる範囲内で記入致しました。

私がなにを悪い事をしたのでしょうか、薬も治療法も望めないのでしょうか。

答えたくありません。

別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表

別表 1

1 日の歩行時間、性、年齢（5 歳階級）別

(単位: 人)

性 年齢階層	総数	90分以上	60分以上 ～90分未 満	30分以上 ～60分未 満	30分未満	未回答	不詳
総 数	1443	434	270	365	357	17	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	1	2	0	1	0	0
40 ～ 44	38	14	14	5	4	1	0
45 ～ 49	121	48	20	32	21	0	0
50 ～ 54	222	83	42	55	41	1	0
55 ～ 59	239	87	52	59	38	3	0
60 ～ 64	192	82	26	49	33	2	0
65 ～ 69	135	35	30	40	29	1	0
70 ～ 74	115	32	28	33	21	1	0
75 ～ 79	129	25	31	40	30	3	0
80 ～ 84	118	21	17	27	49	4	0
85 ～ 89	95	6	5	19	64	1	0
90 歳 以上	35	0	3	6	26	0	0
男	687	198	126	188	166	9	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	1	0	1	0	0
40 ～ 44	21	9	7	3	1	1	0
45 ～ 49	63	21	9	17	16	0	0
50 ～ 54	113	36	19	30	27	1	0
55 ～ 59	120	42	28	31	17	2	0
60 ～ 64	94	33	16	25	18	2	0
65 ～ 69	63	18	10	19	16	0	0
70 ～ 74	52	13	11	18	10	0	0
75 ～ 79	56	9	14	19	13	1	0
80 ～ 84	55	11	8	13	21	2	0
85 ～ 89	36	5	2	9	20	0	0
90 歳 以上	11	0	1	4	6	0	0
女	756	236	144	177	191	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	17	5	7	2	3	0	0
45 ～ 49	58	27	11	15	5	0	0
50 ～ 54	109	47	23	25	14	0	0
55 ～ 59	119	45	24	28	21	1	0
60 ～ 64	98	49	10	24	15	0	0
65 ～ 69	72	17	20	21	13	1	0
70 ～ 74	63	19	17	15	11	1	0
75 ～ 79	73	16	17	21	17	2	0
80 ～ 84	63	10	9	14	28	2	0
85 ～ 89	59	1	3	10	44	1	0
90 歳 以上	24	0	2	2	20	0	0

別表 2

運動（スポーツ）頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週2～4回 程度	週1回程 度	月1回程 度	ほとんどし ていない	未回答	不詳
総 数	1443	213	279	194	58	681	18	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	1	2	0	1	0	0
40 ～ 44	38	1	4	9	4	20	0	0
45 ～ 49	121	15	17	17	9	63	0	0
50 ～ 54	222	24	35	26	16	120	1	0
55 ～ 59	239	26	43	44	12	112	2	0
60 ～ 64	192	27	43	27	8	86	1	0
65 ～ 69	135	19	37	19	3	53	4	0
70 ～ 74	115	25	37	12	2	37	2	0
75 ～ 79	129	37	25	18	2	45	2	0
80 ～ 84	118	23	19	14	1	57	4	0
85 ～ 89	95	11	16	6	1	59	2	0
90 歳 以上	35	5	2	0	0	28	0	0
男	687	110	129	108	39	294	7	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	1	2	0	0	0	0
40 ～ 44	21	1	3	6	2	9	0	0
45 ～ 49	63	5	9	12	5	32	0	0
50 ～ 54	113	13	17	14	13	55	1	0
55 ～ 59	120	16	16	24	8	55	1	0
60 ～ 64	94	11	19	15	7	41	1	0
65 ～ 69	63	9	19	8	3	23	1	0
70 ～ 74	52	16	14	8	0	13	1	0
75 ～ 79	56	18	15	8	0	14	1	0
80 ～ 84	55	13	10	7	0	24	1	0
85 ～ 89	36	5	5	4	1	21	0	0
90 歳 以上	11	3	1	0	0	7	0	0
女	756	103	150	86	19	387	11	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	1	3	2	11	0	0
45 ～ 49	58	10	8	5	4	31	0	0
50 ～ 54	109	11	18	12	3	65	0	0
55 ～ 59	119	10	27	20	4	57	1	0
60 ～ 64	98	16	24	12	1	45	0	0
65 ～ 69	72	10	18	11	0	30	3	0
70 ～ 74	63	9	23	4	2	24	1	0
75 ～ 79	73	19	10	10	2	31	1	0
80 ～ 84	63	10	9	7	1	33	3	0
85 ～ 89	59	6	11	2	0	38	2	0
90 歳 以上	24	2	1	0	0	21	0	0

別表 3

飲酒頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週3～5回 程度	週1～2回 程度	月1～3回 程度	年1～10 回程度	飲まない	未回答	不詳
総 数	1443	264	137	121	72	89	743	17	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	2	1	0	1	0	0	0
40 ～ 44	38	8	4	6	3	5	11	1	0
45 ～ 49	121	29	13	19	8	11	40	1	0
50 ～ 54	222	50	32	25	14	13	86	2	0
55 ～ 59	239	59	31	19	15	20	93	2	0
60 ～ 64	192	33	25	16	10	15	90	3	0
65 ～ 69	135	26	15	7	6	8	72	1	0
70 ～ 74	115	20	6	7	5	3	72	2	0
75 ～ 79	129	21	4	8	3	3	89	1	0
80 ～ 84	118	11	4	7	6	6	80	4	0
85 ～ 89	95	5	1	6	2	4	77	0	0
90 歳 以上	35	2	0	0	0	0	33	0	0
男	687	214	98	83	34	38	210	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	2	1	0	0	0	0	0
40 ～ 44	21	6	2	4	1	3	4	1	0
45 ～ 49	63	20	9	12	3	5	13	1	0
50 ～ 54	113	39	21	14	7	6	24	2	0
55 ～ 59	120	48	23	13	7	5	23	1	0
60 ～ 64	94	27	19	14	5	5	22	2	0
65 ～ 69	63	20	9	2	2	6	23	1	0
70 ～ 74	52	17	4	6	3	2	19	1	0
75 ～ 79	56	20	4	6	2	1	23	0	0
80 ～ 84	55	10	4	5	3	2	30	1	0
85 ～ 89	36	5	1	6	1	3	20	0	0
90 歳 以上	11	2	0	0	0	0	9	0	0
女	756	50	39	38	38	51	533	7	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	1	0	0	0
40 ～ 44	17	2	2	2	2	2	7	0	0
45 ～ 49	58	9	4	7	5	6	27	0	0
50 ～ 54	109	11	11	11	7	7	62	0	0
55 ～ 59	119	11	8	6	8	15	70	1	0
60 ～ 64	98	6	6	2	5	10	68	1	0
65 ～ 69	72	6	6	5	4	2	49	0	0
70 ～ 74	63	3	2	1	2	1	53	1	0
75 ～ 79	73	1	0	2	1	2	66	1	0
80 ～ 84	63	1	0	2	3	4	50	3	0
85 ～ 89	59	0	0	0	1	1	57	0	0
90 歳 以上	24	0	0	0	0	0	24	0	0

別表 4

飲酒量（ビール大瓶換算）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0.5本未満	0.5～1本 未満	1～2本	2～3本	3～4本	4～5本	5～10本	10本以上	未回答
総 数	686	21	220	263	114	28	7	3	2	28
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	27	0	9	12	4	1	0	0	0	1
45 ～ 49	80	0	32	25	17	5	0	0	1	0
50 ～ 54	135	7	39	38	34	6	2	3	1	5
55 ～ 59	144	2	45	58	27	8	2	0	0	2
60 ～ 64	99	6	27	40	14	6	2	0	0	4
65 ～ 69	63	1	20	24	12	0	0	0	0	6
70 ～ 74	41	1	12	23	3	0	1	0	0	1
75 ～ 79	39	0	14	21	2	1	0	0	0	1
80 ～ 84	34	3	11	12	1	1	0	0	0	6
85 ～ 89	18	1	7	8	0	0	0	0	0	2
90 歳 以上	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
男	470	6	124	195	97	27	6	3	2	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	0	6	8	2	1	0	0	0	0
45 ～ 49	49	0	15	15	13	5	0	0	1	0
50 ～ 54	88	1	15	27	32	5	2	3	1	2
55 ～ 59	96	1	20	43	21	8	2	0	0	1
60 ～ 64	70	1	16	32	13	6	1	0	0	1
65 ～ 69	40	1	12	16	10	0	0	0	0	1
70 ～ 74	32	1	10	16	3	0	1	0	0	1
75 ～ 79	33	0	10	20	2	1	0	0	0	0
80 ～ 84	24	0	11	9	1	1	0	0	0	2
85 ～ 89	16	1	6	7	0	0	0	0	0	2
90 歳 以上	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
女	216	15	96	68	17	1	1	0	0	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	10	0	3	4	2	0	0	0	0	1
45 ～ 49	31	0	17	10	4	0	0	0	0	0
50 ～ 54	47	6	24	11	2	1	0	0	0	3
55 ～ 59	48	1	25	15	6	0	0	0	0	1
60 ～ 64	29	5	11	8	1	0	1	0	0	3
65 ～ 69	23	0	8	8	2	0	0	0	0	5
70 ～ 74	9	0	2	7	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	6	0	4	1	0	0	0	0	0	1
80 ～ 84	10	3	0	3	0	0	0	0	0	4
85 ～ 89	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5

喫煙状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	吸う	やめた	吸わない	未回答	不詳
総 数	1443	289	228	911	15	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	1	1	2	0	0
40 ～ 44	38	17	3	17	1	0
45 ～ 49	121	39	16	66	0	0
50 ～ 54	222	69	36	116	1	0
55 ～ 59	239	68	38	131	2	0
60 ～ 64	192	38	37	116	1	0
65 ～ 69	135	26	28	80	1	0
70 ～ 74	115	14	21	78	2	0
75 ～ 79	129	11	15	100	3	0
80 ～ 84	118	4	13	97	4	0
85 ～ 89	95	2	16	77	0	0
90 歳 以上	35	0	4	31	0	0
男	687	224	197	260	6	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	1	1	0	0
40 ～ 44	21	13	2	6	0	0
45 ～ 49	63	26	14	23	0	0
50 ～ 54	113	55	27	30	1	0
55 ～ 59	120	55	31	33	1	0
60 ～ 64	94	29	36	28	1	0
65 ～ 69	63	18	21	24	0	0
70 ～ 74	52	12	19	21	0	0
75 ～ 79	56	10	15	29	2	0
80 ～ 84	55	4	13	37	1	0
85 ～ 89	36	1	14	21	0	0
90 歳 以上	11	0	4	7	0	0
女	756	65	31	651	9	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0
40 ～ 44	17	4	1	11	1	0
45 ～ 49	58	13	2	43	0	0
50 ～ 54	109	14	9	86	0	0
55 ～ 59	119	13	7	98	1	0
60 ～ 64	98	9	1	88	0	0
65 ～ 69	72	8	7	56	1	0
70 ～ 74	63	2	2	57	2	0
75 ～ 79	73	1	0	71	1	0
80 ～ 84	63	0	0	60	3	0
85 ～ 89	59	1	2	56	0	0
90 歳 以上	24	0	0	24	0	0

別表 6

喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0～2年未 満	2年～3年 未満	3年～5年 未満	5年～10 年未満	10年～20 年未満	20年～30 年未満	30年～40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総 数	289	1	1	2	3	12	75	108	77	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	0	1	4	12	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	39	2	1	13	19	3	1	0	0	0	0
50 ～ 54	69	2	5	17	36	8	1	0	0	3	0
55 ～ 59	68	1	5	14	40	6	2	0	9	3	0
60 ～ 64	38	1	2	9	22	1	2	0	23	1	0
65 ～ 69	26	0	2	11	10	1	2	0	20	1	0
70 ～ 74	14	0	4	7	3	0	0	0	12	1	0
75 ～ 79	11	0	2	6	3	0	0	0	7	1	0
80 ～ 84	4	1	0	3	0	0	0	0	4	0	0
85 ～ 89	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	223	1	1	2	1	5	50	87	68	9	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
45 ～ 49	26	0	0	0	0	0	20	6	0	0	0
50 ～ 54	55	0	0	1	0	2	10	40	0	2	0
55 ～ 59	55	1	0	1	0	1	5	35	9	3	0
60 ～ 64	29	0	1	0	0	1	1	4	21	1	0
65 ～ 69	18	0	0	0	0	1	0	1	15	1	0
70 ～ 74	12	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0
75 ～ 79	10	0	0	0	0	0	1	1	7	1	0
80 ～ 84	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
85 ～ 89	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	65	0	0	0	2	7	25	21	9	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
45 ～ 49	13	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0
50 ～ 54	14	0	0	0	1	2	2	8	0	1	0
55 ～ 59	13	0	0	0	1	2	2	8	0	0	0
60 ～ 64	9	0	0	0	0	2	2	3	2	0	0
65 ～ 69	8	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0
70 ～ 74	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
75 ～ 79	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7

喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	1～5本未 満	5本～10 本未満	10本～20 本未満	20本～30 本未満	30本～40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総 数	289	8	22	84	147	19	9	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	17	0	1	4	12	0	0	0	0
45 ～ 49	39	2	1	13	19	3	1	0	0
50 ～ 54	69	2	5	17	36	8	1	0	0
55 ～ 59	68	1	5	14	40	6	2	0	0
60 ～ 64	38	1	2	9	23	1	2	0	0
65 ～ 69	26	0	2	11	10	1	2	0	0
70 ～ 74	14	0	4	7	3	0	0	0	0
75 ～ 79	11	0	2	6	3	0	0	0	0
80 ～ 84	4	1	0	3	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	1	0	0	0	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	224	4	9	57	128	18	8	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	13	0	0	3	10	0	0	0	0
45 ～ 49	26	0	1	5	16	3	1	0	0
50 ～ 54	55	1	1	13	32	7	1	0	0
55 ～ 59	55	1	1	8	37	6	2	0	0
60 ～ 64	29	0	0	6	20	1	2	0	0
65 ～ 69	18	0	1	7	7	1	2	0	0
70 ～ 74	12	0	3	6	3	0	0	0	0
75 ～ 79	10	0	2	6	2	0	0	0	0
80 ～ 84	4	1	0	3	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	65	4	13	27	19	1	1	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	1	1	2	0	0	0	0
45 ～ 49	13	2	0	8	3	0	0	0	0
50 ～ 54	14	1	4	4	4	1	0	0	0
55 ～ 59	13	0	4	6	3	0	0	0	0
60 ～ 64	9	1	2	3	3	0	0	0	0
65 ～ 69	8	0	1	4	3	0	0	0	0
70 ～ 74	2	0	1	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	0	0	0	1	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	0	0	0	0	0	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8

喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	0～2年未 満	2年～3年 未満	3年～5年 未満	5年～10 年未満	10年～20 年未満	20年～30 年未満	30年～40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総 数	228	5	3	6	15	36	57	43	46	17	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
45 ～ 49	16	0	0	0	0	6	9	0	0	1	0
50 ～ 54	36	0	1	2	4	5	16	6	0	2	0
55 ～ 59	38	1	1	2	4	9	9	8	2	2	0
60 ～ 64	37	0	0	1	3	6	8	10	9	0	0
65 ～ 69	28	1	1	1	1	3	3	7	11	0	0
70 ～ 74	21	2	0	0	3	2	4	1	9	0	0
75 ～ 79	15	0	0	0	0	1	3	7	1	3	0
80 ～ 84	13	0	0	0	0	0	2	1	5	5	0
85 ～ 89	16	0	0	0	0	2	1	2	8	3	0
90歳以上	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
男	197	4	3	3	10	31	52	38	42	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	14	0	0	0	0	5	8	0	0	1	0
50 ～ 54	27	0	1	1	1	3	16	4	0	1	0
55 ～ 59	31	0	1	2	4	8	7	7	2	0	0
60 ～ 64	36	0	0	0	3	6	8	10	9	0	0
65 ～ 69	21	1	1	0	1	2	2	5	9	0	0
70 ～ 74	19	2	0	0	1	2	4	1	9	0	0
75 ～ 79	15	0	0	0	0	1	3	7	1	3	0
80 ～ 84	13	0	0	0	0	0	2	1	5	5	0
85 ～ 89	14	0	0	0	0	2	1	2	6	3	0
90歳以上	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
女	31	1	0	3	5	5	5	5	4	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
50 ～ 54	9	0	0	1	3	2	0	2	0	1	0
55 ～ 59	7	1	0	0	0	1	2	1	0	2	0
60 ～ 64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	7	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0
70 ～ 74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9

喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	1～5本未 満	5本～10 本未満	10本～20 本未満	20本～30 本未満	30本～40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総 数	228	2	9	49	100	23	34	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	1	1	0	1	0	0
45 ～ 49	16	0	1	4	5	2	4	0	0
50 ～ 54	36	1	2	8	14	5	5	1	0
55 ～ 59	38	0	2	7	16	4	6	2	0
60 ～ 64	37	1	0	6	21	4	5	0	0
65 ～ 69	28	0	2	5	13	1	7	0	0
70 ～ 74	21	0	0	6	11	3	1	0	0
75 ～ 79	15	0	0	3	6	1	3	2	0
80 ～ 84	13	0	1	3	2	1	2	4	0
85 ～ 89	16	0	1	5	8	1	0	1	0
90 歳 以上	4	0	0	1	2	1	0	0	0
男	197	0	7	36	90	21	34	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	1	0	0	1	0	0
45 ～ 49	14	0	1	3	4	2	4	0	0
50 ～ 54	27	0	2	4	13	3	5	0	0
55 ～ 59	31	0	2	4	13	4	6	1	0
60 ～ 64	36	0	0	6	21	4	5	0	0
65 ～ 69	21	0	1	2	10	1	7	0	0
70 ～ 74	19	0	0	4	11	3	1	0	0
75 ～ 79	15	0	0	3	6	1	3	2	0
80 ～ 84	13	0	1	3	2	1	2	4	0
85 ～ 89	14	0	0	5	7	1	0	1	0
90 歳 以上	4	0	0	1	2	1	0	0	0
女	31	2	2	13	10	2	0	2	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	0	1	1	0	0	0	0
50 ～ 54	9	1	0	4	1	2	0	1	0
55 ～ 59	7	0	0	3	3	0	0	1	0
60 ～ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	7	0	1	3	3	0	0	0	0
70 ～ 74	2	0	0	2	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	0	1	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 10

喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	1年未満	1年～2年 未満	2年～3年 未満	3年～4年 未満	4年～5年 未満	5年～10 年未満	10年～15 年未満	15年～20 年未満	20年～30 年未満	30年以上	未回答	不詳
総数	228	6	11	10	7	8	58	38	14	31	35	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
45～49	16	1	0	2	1	0	7	3	1	1	0	0	0
50～54	36	2	2	2	2	1	8	8	2	5	2	2	0
55～59	38	1	2	2	1	2	11	6	1	5	6	1	0
60～64	37	1	2	2	0	3	7	8	4	5	4	1	0
65～69	28	1	2	2	3	0	7	4	1	1	4	3	0
70～74	21	0	2	0	0	1	6	5	0	2	5	0	0
75～79	15	0	0	0	0	0	1	3	0	5	5	1	0
80～84	13	0	0	0	0	0	3	0	1	4	3	2	0
85～89	16	0	0	0	0	1	3	1	4	3	4	0	0
90歳以上	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
男	197	5	10	6	4	7	50	37	12	27	32	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
45～49	14	1	0	1	1	0	6	3	1	1	0	0	0
50～54	27	1	2	2	1	1	8	8	1	2	1	0	0
55～59	31	1	1	1	1	2	9	5	0	5	5	1	0
60～64	36	1	2	2	0	3	7	8	4	5	3	1	0
65～69	21	1	2	0	1	0	5	4	1	1	4	2	0
70～74	19	0	2	0	0	1	5	5	0	1	5	0	0
75～79	15	0	0	0	0	0	1	3	0	5	5	1	0
80～84	13	0	0	0	0	0	3	0	1	4	3	2	0
85～89	14	0	0	0	0	0	2	1	4	3	4	0	0
90歳以上	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
女	31	1	1	4	3	1	8	1	2	4	3	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50～54	8	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	0
55～59	7	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
65～69	6	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70～74	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1

睡眠時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	9時間以上	8時間以上 ～9時間未満	7時間以上 ～8時間未満	6時間以上 ～7時間未満	5時間以上 ～6時間未満	5時間未満	未回答	不詳
総 数	1443	53	146	249	487	374	126	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	0	0	3	1	0	0	0
40 ～ 44	38	1	4	5	13	13	2	0	0
45 ～ 49	121	1	8	11	42	48	11	0	0
50 ～ 54	222	1	16	26	87	71	20	1	0
55 ～ 59	239	2	9	36	98	73	19	2	0
60 ～ 64	192	3	14	33	79	48	14	1	0
65 ～ 69	135	3	13	33	44	30	12	0	0
70 ～ 74	115	3	12	24	44	24	7	1	0
75 ～ 79	129	7	21	32	32	23	14	0	0
80 ～ 84	118	10	19	24	27	25	11	2	0
85 ～ 89	95	14	22	20	13	15	10	1	0
90歳以上	35	8	8	5	5	3	6	0	0
男	687	25	78	132	242	159	47	4	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	0	0	2	1	0	0	0
40 ～ 44	21	1	3	1	8	6	2	0	0
45 ～ 49	63	1	6	7	20	25	4	0	0
50 ～ 54	113	0	7	18	52	27	8	1	0
55 ～ 59	120	0	6	23	49	34	7	1	0
60 ～ 64	94	3	8	15	44	19	4	1	0
65 ～ 69	63	1	7	17	23	12	3	0	0
70 ～ 74	52	2	6	12	18	11	3	0	0
75 ～ 79	56	4	14	16	11	7	4	0	0
80 ～ 84	55	5	11	13	8	11	6	1	0
85 ～ 89	36	4	7	8	7	5	5	0	0
90歳以上	11	4	3	2	0	1	1	0	0
女	756	28	68	117	245	215	79	4	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	17	0	1	4	5	7	0	0	0
45 ～ 49	58	0	2	4	22	23	7	0	0
50 ～ 54	109	1	9	8	35	44	12	0	0
55 ～ 59	119	2	3	13	49	39	12	1	0
60 ～ 64	98	0	6	18	35	29	10	0	0
65 ～ 69	72	2	6	16	21	18	9	0	0
70 ～ 74	63	1	6	12	26	13	4	1	0
75 ～ 79	73	3	7	16	21	16	10	0	0
80 ～ 84	63	5	8	11	19	14	5	1	0
85 ～ 89	59	10	15	12	6	10	5	1	0
90歳以上	24	4	5	3	5	2	5	0	0

別表 1 2

睡眠時間の十分度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	充分と れている。	あまりと れていない。	まあまあと れている。	まったく れていな い。	未回答	不詳
総 数	1443	231	686	475	40	11	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	2	2	0	0	0
40 ～ 44	38	4	14	19	1	0	0
45 ～ 49	121	11	61	44	4	1	0
50 ～ 54	222	27	106	80	8	1	0
55 ～ 59	239	27	109	94	7	2	0
60 ～ 64	192	29	93	64	5	1	0
65 ～ 69	135	25	60	47	3	0	0
70 ～ 74	115	19	62	29	3	2	0
75 ～ 79	129	26	63	39	1	0	0
80 ～ 84	118	26	61	24	5	2	0
85 ～ 89	95	26	44	21	3	1	0
90 歳 以上	35	11	11	12	0	1	0
男	687	125	340	200	18	4	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	1	2	0	0	0
40 ～ 44	21	2	7	12	0	0	0
45 ～ 49	63	7	34	19	3	0	0
50 ～ 54	113	17	53	39	3	1	0
55 ～ 59	120	9	58	49	3	1	0
60 ～ 64	94	19	44	28	2	1	0
65 ～ 69	63	17	29	16	1	0	0
70 ～ 74	52	14	27	9	2	0	0
75 ～ 79	56	16	28	11	1	0	0
80 ～ 84	55	12	33	7	2	1	0
85 ～ 89	36	8	22	5	1	0	0
90 歳 以上	11	4	4	3	0	0	0
女	756	106	346	275	22	7	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	17	2	7	7	1	0	0
45 ～ 49	58	4	27	25	1	1	0
50 ～ 54	109	10	53	41	5	0	0
55 ～ 59	119	18	51	45	4	1	0
60 ～ 64	98	10	49	36	3	0	0
65 ～ 69	72	8	31	31	2	0	0
70 ～ 74	63	5	35	20	1	2	0
75 ～ 79	73	10	35	28	0	0	0
80 ～ 84	63	14	28	17	3	1	0
85 ～ 89	59	18	22	16	2	1	0
90 歳 以上	24	7	7	9	0	1	0

別表 1 3

労働時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	10時間以上	9時間以上 ～10時間未満	8時間以上 ～9時間未満	7時間以上 ～8時間未満	6時間以上 ～7時間未満	5時間以上 ～6時間未満	4時間以上 ～5時間未満	4時間未満	未回答	不詳
総数	1443	187	163	195	107	114	96	137	415	29	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
40 ～ 44	38	7	8	11	3	1	3	2	3	0	0
45 ～ 49	121	43	21	27	11	5	5	3	5	1	0
50 ～ 54	222	51	47	45	22	22	6	11	15	3	0
55 ～ 59	239	47	50	55	18	25	10	11	23	0	0
60 ～ 64	192	18	22	31	26	19	21	15	37	3	0
65 ～ 69	135	11	7	13	8	13	13	20	44	6	0
70 ～ 74	115	4	3	5	4	12	18	13	52	4	0
75 ～ 79	129	5	1	5	11	8	12	33	51	3	0
80 ～ 84	118	1	2	2	3	7	6	17	74	6	0
85 ～ 89	95	0	0	0	0	1	2	10	80	2	0
90歳以上	35	0	0	0	1	1	0	2	30	1	0
男	687	92	108	124	51	39	31	43	184	15	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
40 ～ 44	21	6	7	6	0	0	1	0	1	0	0
45 ～ 49	63	21	15	18	4	1	1	0	2	1	0
50 ～ 54	113	25	31	30	9	8	1	1	7	1	0
55 ～ 59	120	24	30	38	12	7	3	0	6	0	0
60 ～ 64	94	7	16	20	15	6	9	5	15	1	0
65 ～ 69	63	7	5	6	3	8	3	6	23	2	0
70 ～ 74	52	2	1	3	2	4	7	5	25	3	0
75 ～ 79	56	0	0	2	5	2	3	12	31	1	0
80 ～ 84	55	0	1	1	1	2	1	7	37	5	0
85 ～ 89	36	0	0	0	0	0	2	5	28	1	0
90歳以上	11	0	0	0	0	1	0	2	8	0	0
女	756	95	55	71	56	75	65	94	231	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	1	1	5	3	1	2	2	2	0	0
45 ～ 49	58	22	6	9	7	4	4	3	3	0	0
50 ～ 54	109	26	16	15	13	14	5	10	8	2	0
55 ～ 59	119	23	20	17	6	18	7	11	17	0	0
60 ～ 64	98	11	6	11	11	13	12	10	22	2	0
65 ～ 69	72	4	2	7	5	5	10	14	21	4	0
70 ～ 74	63	2	2	2	2	8	11	8	27	1	0
75 ～ 79	73	5	1	3	6	6	9	21	20	2	0
80 ～ 84	63	1	1	1	2	5	5	10	37	1	0
85 ～ 89	59	0	0	0	0	1	0	5	52	1	0
90歳以上	24	0	0	0	1	0	0	0	22	1	0

別表 1 4

一日平均野菜摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	70g未満(1 つ未満)	70g以上 140g未満 (1～2つ)	140g以上 210g未満 (2～3つ)	210g以上 270g未満 (3～4つ)	270g以上 350g未満 (4～5つ)	350g以上 (5つ以上)	未回答	不詳
総 数	1443	259	444	314	263	92	54	17	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	1	1	1	0	1	0	0
40 ～ 44	38	9	16	8	2	0	3	0	0
45 ～ 49	121	25	54	20	15	6	1	0	0
50 ～ 54	222	43	78	48	37	11	5	0	0
55 ～ 59	239	47	80	60	34	8	10	0	0
60 ～ 64	192	35	66	38	38	7	7	1	0
65 ～ 69	135	24	26	38	29	13	2	3	0
70 ～ 74	115	12	30	31	24	6	11	1	0
75 ～ 79	129	15	33	24	35	13	5	4	0
80 ～ 84	118	22	25	17	27	20	4	3	0
85 ～ 89	95	21	23	23	16	5	3	4	0
90 歳 以上	35	6	12	6	5	3	2	1	0
男	687	163	230	130	108	34	16	6	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	0	1	1	0	1	0	0
40 ～ 44	21	6	9	3	1	0	2	0	0
45 ～ 49	63	14	35	6	6	1	1	0	0
50 ～ 54	113	34	35	21	16	6	1	0	0
55 ～ 59	120	33	48	21	12	4	2	0	0
60 ～ 64	94	26	35	20	10	2	0	1	0
65 ～ 69	63	14	9	22	9	7	1	1	0
70 ～ 74	52	7	18	9	13	2	3	0	0
75 ～ 79	56	9	17	10	14	3	2	1	0
80 ～ 84	55	10	12	7	16	5	3	2	0
85 ～ 89	36	9	7	8	8	3	0	1	0
90 歳 以上	11	1	5	2	2	1	0	0	0
女	756	96	214	184	155	58	38	11	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	3	7	5	1	0	1	0	0
45 ～ 49	58	11	19	14	9	5	0	0	0
50 ～ 54	109	9	43	27	21	5	4	0	0
55 ～ 59	119	14	32	39	22	4	8	0	0
60 ～ 64	98	9	31	18	28	5	7	0	0
65 ～ 69	72	10	17	16	20	6	1	2	0
70 ～ 74	63	5	12	22	11	4	8	1	0
75 ～ 79	73	6	16	14	21	10	3	3	0
80 ～ 84	63	12	13	10	11	15	1	1	0
85 ～ 89	59	12	16	15	8	2	3	3	0
90 歳 以上	24	5	7	4	3	2	2	1	0

別表 1 5

一日平均果物類摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	50g未満	50g以上 100g未満	100g以上 150g未満	150g以上	未回答	不詳
総 数	1443	687	425	238	73	20	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	3	1	0	0	0
40 ～ 44	38	24	11	2	1	0	0
45 ～ 49	121	83	22	15	1	0	0
50 ～ 54	222	132	55	29	6	0	0
55 ～ 59	239	133	72	23	10	1	0
60 ～ 64	192	89	55	39	8	1	0
65 ～ 69	135	47	52	25	7	4	0
70 ～ 74	115	39	29	29	15	3	0
75 ～ 79	129	47	36	31	10	5	0
80 ～ 84	118	42	38	27	8	3	0
85 ～ 89	95	36	39	14	4	2	0
90 歳 以上	35	15	13	3	3	1	0
男	687	382	174	98	25	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0	0	0	0
40 ～ 44	21	13	7	1	0	0	0
45 ～ 49	63	46	8	9	0	0	0
50 ～ 54	113	75	23	13	2	0	0
55 ～ 59	120	78	30	8	4	0	0
60 ～ 64	94	54	23	15	1	1	0
65 ～ 69	63	31	17	10	4	1	0
70 ～ 74	52	21	13	13	4	1	0
75 ～ 79	56	22	16	11	4	3	0
80 ～ 84	55	23	18	10	2	2	0
85 ～ 89	36	13	14	7	2	0	0
90 歳 以上	11	6	2	1	2	0	0
女	756	305	251	140	48	12	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	4	1	1	0	0
45 ～ 49	58	37	14	6	1	0	0
50 ～ 54	109	57	32	16	4	0	0
55 ～ 59	119	55	42	15	6	1	0
60 ～ 64	98	35	32	24	7	0	0
65 ～ 69	72	16	35	15	3	3	0
70 ～ 74	63	18	16	16	11	2	0
75 ～ 79	73	25	20	20	6	2	0
80 ～ 84	63	19	20	17	6	1	0
85 ～ 89	59	23	25	7	2	2	0
90 歳 以上	24	9	11	2	1	1	0

別表 1 6

常用しているサプリメント、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総 数	1443	385	1038	20	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	4	0	0
40 ～ 44	38	4	34	0	0
45 ～ 49	121	26	94	1	0
50 ～ 54	222	53	168	1	0
55 ～ 59	239	60	178	1	0
60 ～ 64	192	49	141	2	0
65 ～ 69	135	51	83	1	0
70 ～ 74	115	37	77	1	0
75 ～ 79	129	42	82	5	0
80 ～ 84	118	35	77	6	0
85 ～ 89	95	23	70	2	0
90 歳 以上	35	5	30	0	0
男	687	150	529	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0	0
40 ～ 44	21	1	20	0	0
45 ～ 49	63	8	54	1	0
50 ～ 54	113	22	91	0	0
55 ～ 59	120	20	99	1	0
60 ～ 64	94	17	76	1	0
65 ～ 69	63	20	43	0	0
70 ～ 74	52	16	36	0	0
75 ～ 79	56	16	38	2	0
80 ～ 84	55	17	36	2	0
85 ～ 89	36	10	25	1	0
90 歳 以上	11	3	8	0	0
女	756	235	509	12	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	3	14	0	0
45 ～ 49	58	18	40	0	0
50 ～ 54	109	31	77	1	0
55 ～ 59	119	40	79	0	0
60 ～ 64	98	32	65	1	0
65 ～ 69	72	31	40	1	0
70 ～ 74	63	21	41	1	0
75 ～ 79	73	26	44	3	0
80 ～ 84	63	18	41	4	0
85 ～ 89	59	13	45	1	0
90 歳 以上	24	2	22	0	0

別表 1 7

常用しているサプリメントの効果、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	不快症状 が改善し たと思う	特にはっ きりとした 効果があ ると思 わない	その他	未回答	不詳
総 数	656	277	308	71	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	3	2	2	0	0
45 ～ 49	43	28	13	2	0	0
50 ～ 54	91	32	54	5	0	0
55 ～ 59	87	37	40	10	0	0
60 ～ 64	76	30	39	7	0	0
65 ～ 69	97	46	31	20	0	0
70 ～ 74	60	21	32	7	0	0
75 ～ 79	77	32	41	4	0	0
80 ～ 84	66	30	31	5	0	0
85 ～ 89	43	13	22	8	0	0
90 歳 以上	9	5	3	1	0	0
男	256	113	114	29	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	2	0	0	0	0
45 ～ 49	12	10	2	0	0	0
50 ～ 54	38	12	23	3	0	0
55 ～ 59	30	15	11	4	0	0
60 ～ 64	29	18	10	1	0	0
65 ～ 69	32	11	12	9	0	0
70 ～ 74	24	7	14	3	0	0
75 ～ 79	26	14	10	2	0	0
80 ～ 84	37	17	19	1	0	0
85 ～ 89	19	4	10	5	0	0
90 歳 以上	7	3	3	1	0	0
女	400	164	194	42	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	1	2	2	0	0
45 ～ 49	31	18	11	2	0	0
50 ～ 54	53	20	31	2	0	0
55 ～ 59	57	22	29	6	0	0
60 ～ 64	47	12	29	6	0	0
65 ～ 69	65	35	19	11	0	0
70 ～ 74	36	14	18	4	0	0
75 ～ 79	51	18	31	2	0	0
80 ～ 84	29	13	12	4	0	0
85 ～ 89	24	9	12	3	0	0
90 歳 以上	2	2	0	0	0	0

別表 1 8

日常生活での悩みやストレス、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総 数	1443	1100	324	19	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	2	2	0	0
40 ～ 44	38	32	6	0	0
45 ～ 49	121	98	22	1	0
50 ～ 54	222	172	47	3	0
55 ～ 59	239	200	38	1	0
60 ～ 64	192	150	42	0	0
65 ～ 69	135	102	30	3	0
70 ～ 74	115	77	36	2	0
75 ～ 79	129	97	29	3	0
80 ～ 84	118	78	37	3	0
85 ～ 89	95	67	27	1	0
90 歳 以上	35	25	8	2	0
男	687	486	191	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	2	1	0	0
40 ～ 44	21	15	6	0	0
45 ～ 49	63	47	15	1	0
50 ～ 54	113	78	32	3	0
55 ～ 59	120	97	23	0	0
60 ～ 64	94	66	28	0	0
65 ～ 69	63	42	18	3	0
70 ～ 74	52	32	20	0	0
75 ～ 79	56	40	15	1	0
80 ～ 84	55	36	17	2	0
85 ～ 89	36	23	13	0	0
90 歳 以上	11	8	3	0	0
女	756	614	133	9	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	17	0	0	0
45 ～ 49	58	51	7	0	0
50 ～ 54	109	94	15	0	0
55 ～ 59	119	103	15	1	0
60 ～ 64	98	84	14	0	0
65 ～ 69	72	60	12	0	0
70 ～ 74	63	45	16	2	0
75 ～ 79	73	57	14	2	0
80 ～ 84	63	42	20	1	0
85 ～ 89	59	44	14	1	0
90 歳 以上	24	17	5	2	0

別表 1 9

悩みやストレスの原因（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない
総 数	1100	253	271	18	20	10	9	248	100
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	32	5	5	1	0	1	0	4	2
45 ～ 49	98	23	36	2	3	2	1	13	15
50 ～ 54	172	41	58	7	7	1	0	43	25
55 ～ 59	200	52	63	3	2	2	2	49	29
60 ～ 64	150	35	36	2	4	0	1	26	14
65 ～ 69	102	31	29	2	1	2	2	30	7
70 ～ 74	77	16	14	1	0	2	2	20	2
75 ～ 79	97	22	11	0	1	0	0	23	5
80 ～ 84	78	14	5	0	1	0	0	22	1
85 ～ 89	67	10	11	0	0	0	1	15	0
90 歳 以上	25	2	2	0	0	0	0	3	0
男	486	86	119	12	13	6	3	108	37
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	15	1	2	1	0	1	0	2	2
45 ～ 49	47	5	18	2	2	1	1	8	9
50 ～ 54	78	10	21	5	5	1	0	18	6
55 ～ 59	97	19	33	1	2	1	0	23	13
60 ～ 64	66	14	14	2	2	0	0	11	4
65 ～ 69	42	9	11	0	0	1	1	12	1
70 ～ 74	32	7	7	1	0	1	1	9	1
75 ～ 79	40	10	6	0	1	0	0	12	1
80 ～ 84	36	5	1	0	0	0	0	8	0
85 ～ 89	23	4	4	0	0	0	0	4	0
90 歳 以上	8	0	1	0	0	0	0	1	0
女	614	167	152	6	7	4	6	140	63
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	4	3	0	0	0	0	2	0
45 ～ 49	51	18	18	0	1	1	0	5	6
50 ～ 54	94	31	37	2	2	0	0	25	19
55 ～ 59	103	33	30	2	0	1	2	26	16
60 ～ 64	84	21	22	0	2	0	1	15	10
65 ～ 69	60	22	18	2	1	1	1	18	6
70 ～ 74	45	9	7	0	0	1	1	11	1
75 ～ 79	57	12	5	0	0	0	0	11	4
80 ～ 84	42	9	4	0	1	0	0	14	1
85 ～ 89	44	6	7	0	0	0	1	11	0
90 歳 以上	17	2	1	0	0	0	0	2	0

別表 2 0

悩みやストレスの原因（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金 等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出 産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総 数	1100	415	640	376	1	18	138	8	74
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	1	2	0	0	0	0	0
40 ～ 44	32	15	10	4	0	5	4	2	14
45 ～ 49	98	47	37	29	0	7	8	2	19
50 ～ 54	172	77	75	51	0	2	26	2	21
55 ～ 59	200	95	96	88	0	2	18	2	14
60 ～ 64	150	61	79	50	1	1	23	0	2
65 ～ 69	102	47	64	43	0	1	12	0	2
70 ～ 74	77	22	58	28	0	0	11	0	2
75 ～ 79	97	28	75	39	0	0	12	0	0
80 ～ 84	78	13	65	21	0	0	15	0	0
85 ～ 89	67	6	57	16	0	0	8	0	0
90歳以上	25	3	23	5	0	0	1	0	0
男	486	201	267	155	1	9	22	4	41
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	1	2	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	7	5	3	0	1	0	1	7
45 ～ 49	47	22	21	12	0	6	1	1	11
50 ～ 54	78	38	33	22	0	1	4	0	8
55 ～ 59	97	50	43	39	0	0	2	2	11
60 ～ 64	66	33	31	16	1	1	8	0	1
65 ～ 69	42	18	21	13	0	0	2	0	2
70 ～ 74	32	8	23	9	0	0	0	0	1
75 ～ 79	40	14	30	16	0	0	1	0	0
80 ～ 84	36	6	30	10	0	0	4	0	0
85 ～ 89	23	3	21	10	0	0	0	0	0
90歳以上	8	1	8	3	0	0	0	0	0
女	614	214	373	221	0	9	116	4	33
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	8	5	1	0	4	4	1	7
45 ～ 49	51	25	16	17	0	1	7	1	8
50 ～ 54	94	39	42	29	0	1	22	2	13
55 ～ 59	103	45	53	49	0	2	16	0	3
60 ～ 64	84	28	48	34	0	0	15	0	1
65 ～ 69	60	29	43	30	0	1	10	0	0
70 ～ 74	45	14	35	19	0	0	11	0	1
75 ～ 79	57	14	45	23	0	0	11	0	0
80 ～ 84	42	7	35	11	0	0	11	0	0
85 ～ 89	44	3	36	6	0	0	8	0	0
90歳以上	17	2	15	2	0	0	1	0	0

別表 2 1

悩みやストレスの原因（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや 生活環境 （公害、安全及び交通事情を含む）	その他	わからない	未回答	不詳
総 数	1100	378	131	128	67	12	2	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	32	20	3	1	1	0	0	0
45 ～ 49	98	64	9	10	3	0	0	0
50 ～ 54	172	92	31	16	14	0	0	0
55 ～ 59	200	102	36	27	9	1	0	0
60 ～ 64	150	66	17	20	13	2	1	0
65 ～ 69	102	13	8	8	8	0	0	0
70 ～ 74	77	9	13	8	8	0	0	0
75 ～ 79	97	7	10	15	4	0	1	0
80 ～ 84	78	3	3	9	2	4	0	0
85 ～ 89	67	1	0	9	4	3	0	0
90 歳 以上	25	0	1	4	1	2	0	0
男	486	213	35	46	21	4	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	15	13	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	47	35	2	3	1	0	0	0
50 ～ 54	78	49	2	7	4	0	0	0
55 ～ 59	97	58	15	13	1	1	0	0
60 ～ 64	66	40	2	7	5	1	1	0
65 ～ 69	42	9	3	1	2	0	0	0
70 ～ 74	32	4	4	2	3	0	0	0
75 ～ 79	40	2	3	4	2	0	0	0
80 ～ 84	36	1	2	5	2	1	0	0
85 ～ 89	23	1	0	1	1	1	0	0
90 歳 以上	8	0	1	2	0	0	0	0
女	614	165	96	82	46	8	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	7	2	1	1	0	0	0
45 ～ 49	51	29	7	7	2	0	0	0
50 ～ 54	94	43	29	9	10	0	0	0
55 ～ 59	103	44	21	14	8	0	0	0
60 ～ 64	84	26	15	13	8	1	0	0
65 ～ 69	60	4	5	7	6	0	0	0
70 ～ 74	45	5	9	6	5	0	0	0
75 ～ 79	57	5	7	11	2	0	1	0
80 ～ 84	42	2	1	4	0	3	0	0
85 ～ 89	44	0	0	8	3	2	0	0
90 歳 以上	17	0	0	2	1	2	0	0

別表 2 2

悩みやストレスの最も気になる原因 1、性、年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない
総 数	1100	43	47	0	4	3	1	31	17
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	32	2	1	0	0	1	0	1	1
45 ～ 49	98	1	7	0	0	0	0	2	3
50 ～ 54	172	4	10	0	2	0	0	4	2
55 ～ 59	200	11	7	0	1	0	0	7	5
60 ～ 64	150	6	15	0	0	0	0	4	2
65 ～ 69	102	6	3	0	0	0	1	7	1
70 ～ 74	77	3	1	0	0	2	0	3	0
75 ～ 79	97	6	1	0	0	0	0	0	3
80 ～ 84	78	3	0	0	1	0	0	1	0
85 ～ 89	67	1	2	0	0	0	0	1	0
90 歳 以上	25	0	0	0	0	0	0	1	0
男	486	8	17	0	3	2	1	15	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	0	1	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	47	0	2	0	0	0	0	2	2
50 ～ 54	78	0	3	0	2	0	0	2	0
55 ～ 59	97	2	4	0	1	0	0	3	1
60 ～ 64	66	1	6	0	0	0	0	4	0
65 ～ 69	42	1	0	0	0	0	1	2	1
70 ～ 74	32	2	0	0	0	1	0	1	0
75 ～ 79	40	1	1	0	0	0	0	0	1
80 ～ 84	36	1	0	0	0	0	0	1	0
85 ～ 89	23	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	8	0	0	0	0	0	0	0	0
女	614	35	30	0	1	1	0	16	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	2	0	0	0	0	0	1	0
45 ～ 49	51	1	5	0	0	0	0	0	1
50 ～ 54	94	4	7	0	0	0	0	2	2
55 ～ 59	103	9	3	0	0	0	0	4	4
60 ～ 64	84	5	9	0	0	0	0	0	2
65 ～ 69	60	5	3	0	0	0	0	5	0
70 ～ 74	45	1	1	0	0	1	0	2	0
75 ～ 79	57	5	0	0	0	0	0	0	2
80 ～ 84	42	2	0	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	44	1	2	0	0	0	0	1	0
90 歳 以上	17	0	0	0	0	0	0	1	0

別表 2 3

悩みやストレスの最も気になる原因 2、性、年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金 等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出 産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総 数	1100	150	354	134	0	2	6	2	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	32	2	5	2	0	2	0	0	1
45 ～ 49	98	23	11	9	0	0	0	0	6
50 ～ 54	172	28	36	13	0	0	0	1	3
55 ～ 59	200	30	45	33	0	0	0	1	1
60 ～ 64	150	20	40	25	0	0	1	0	0
65 ～ 69	102	18	36	14	0	0	1	0	0
70 ～ 74	77	10	33	8	0	0	2	0	0
75 ～ 79	97	14	47	12	0	0	0	0	0
80 ～ 84	78	3	41	9	0	0	2	0	0
85 ～ 89	67	2	40	8	0	0	0	0	0
90 歳 以上	25	0	19	1	0	0	0	0	0
男	486	72	145	51	0	0	3	1	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	1	2	2	0	0	0	0	1
45 ～ 49	47	9	6	1	0	0	0	0	3
50 ～ 54	78	13	15	3	0	0	0	0	1
55 ～ 59	97	17	24	12	0	0	0	1	0
60 ～ 64	66	10	14	7	0	0	0	0	0
65 ～ 69	42	9	15	5	0	0	1	0	0
70 ～ 74	32	3	14	5	0	0	0	0	0
75 ～ 79	40	8	18	4	0	0	0	0	0
80 ～ 84	36	1	19	5	0	0	2	0	0
85 ～ 89	23	1	12	6	0	0	0	0	0
90 歳 以上	8	0	5	1	0	0	0	0	0
女	614	78	209	83	0	2	3	1	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	1	3	0	0	2	0	0	0
45 ～ 49	51	14	5	8	0	0	0	0	3
50 ～ 54	94	15	21	10	0	0	0	1	2
55 ～ 59	103	13	21	21	0	0	0	0	1
60 ～ 64	84	10	26	18	0	0	1	0	0
65 ～ 69	60	9	21	9	0	0	0	0	0
70 ～ 74	45	7	19	3	0	0	2	0	0
75 ～ 79	57	6	29	8	0	0	0	0	0
80 ～ 84	42	2	22	4	0	0	0	0	0
85 ～ 89	44	1	28	2	0	0	0	0	0
90 歳 以上	17	0	14	0	0	0	0	0	0

別表 2 4

悩みやストレスの最も気になる原因 3、性、年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや 生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総 数	1100	111	19	20	20	9	116	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	32	9	0	0	0	0	5	0
45 ～ 49	98	23	0	1	2	0	10	0
50 ～ 54	172	34	6	2	4	0	23	0
55 ～ 59	200	25	6	6	3	0	19	0
60 ～ 64	150	16	1	2	2	3	13	0
65 ～ 69	102	3	3	0	1	0	8	0
70 ～ 74	77	0	2	1	4	0	8	0
75 ～ 79	97	0	1	2	3	0	8	0
80 ～ 84	78	0	0	2	0	1	15	0
85 ～ 89	67	0	0	3	1	3	6	0
90 歳 以上	25	0	0	1	0	2	1	0
男	486	74	4	7	9	3	60	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	4	0	0	0	0	2	0
45 ～ 49	47	12	0	1	1	0	8	0
50 ～ 54	78	24	1	1	1	0	12	0
55 ～ 59	97	17	3	2	1	0	9	0
60 ～ 64	66	13	0	0	1	2	8	0
65 ～ 69	42	3	0	0	1	0	3	0
70 ～ 74	32	0	0	0	2	0	4	0
75 ～ 79	40	0	0	1	1	0	5	0
80 ～ 84	36	0	0	1	0	0	6	0
85 ～ 89	23	0	0	0	1	1	2	0
90 歳 以上	8	0	0	1	0	0	1	0
女	614	37	15	13	11	6	56	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	5	0	0	0	0	3	0
45 ～ 49	51	11	0	0	1	0	2	0
50 ～ 54	94	10	5	1	3	0	11	0
55 ～ 59	103	8	3	4	2	0	10	0
60 ～ 64	84	3	1	2	1	1	5	0
65 ～ 69	60	0	3	0	0	0	5	0
70 ～ 74	45	0	2	1	2	0	4	0
75 ～ 79	57	0	1	1	2	0	3	0
80 ～ 84	42	0	0	1	0	1	9	0
85 ～ 89	44	0	0	3	0	2	4	0
90 歳 以上	17	0	0	0	0	2	0	0

別表 2 5

病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況、性、年齢
(5歳階級) 別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	1443	83	1356	4	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	4	0	0
40 ～ 44	38	1	37	0	0
45 ～ 49	121	1	120	0	0
50 ～ 54	222	2	220	0	0
55 ～ 59	239	1	238	0	0
60 ～ 64	192	0	191	1	0
65 ～ 69	135	4	131	0	0
70 ～ 74	115	4	111	0	0
75 ～ 79	129	5	124	0	0
80 ～ 84	118	20	97	1	0
85 ～ 89	95	29	64	2	0
90 歳 以上	35	16	19	0	0
男	687	27	657	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0	0
40 ～ 44	21	1	20	0	0
45 ～ 49	63	1	62	0	0
50 ～ 54	113	1	112	0	0
55 ～ 59	120	1	119	0	0
60 ～ 64	94	0	93	1	0
65 ～ 69	63	3	60	0	0
70 ～ 74	52	1	51	0	0
75 ～ 79	56	2	54	0	0
80 ～ 84	55	7	47	1	0
85 ～ 89	36	6	29	1	0
90 歳 以上	11	4	7	0	0
女	756	56	699	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	17	0	0
45 ～ 49	58	0	58	0	0
50 ～ 54	109	1	108	0	0
55 ～ 59	119	0	119	0	0
60 ～ 64	98	0	98	0	0
65 ～ 69	72	1	71	0	0
70 ～ 74	63	3	60	0	0
75 ～ 79	73	3	70	0	0
80 ～ 84	63	13	50	0	0
85 ～ 89	59	23	35	1	0
90 歳 以上	24	12	12	0	0

別表 2 6

要介護認定の状況（40歳未満の回答者は除く）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	1443	163	1245	35	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	4	0	0
40 ～ 44	38	0	34	4	0
45 ～ 49	121	0	118	3	0
50 ～ 54	222	1	217	4	0
55 ～ 59	239	2	232	5	0
60 ～ 64	192	2	184	6	0
65 ～ 69	135	5	127	3	0
70 ～ 74	115	11	102	2	0
75 ～ 79	129	21	104	4	0
80 ～ 84	118	36	80	2	0
85 ～ 89	95	58	35	2	0
90 歳 以上	35	27	8	0	0
男	687	46	627	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0	0
40 ～ 44	21	0	20	1	0
45 ～ 49	63	0	60	3	0
50 ～ 54	113	1	112	0	0
55 ～ 59	120	0	119	1	0
60 ～ 64	94	0	89	5	0
65 ～ 69	63	2	60	1	0
70 ～ 74	52	4	48	0	0
75 ～ 79	56	9	46	1	0
80 ～ 84	55	10	43	2	0
85 ～ 89	36	14	22	0	0
90 歳 以上	11	6	5	0	0
女	756	117	618	21	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	14	3	0
45 ～ 49	58	0	58	0	0
50 ～ 54	109	0	105	4	0
55 ～ 59	119	2	113	4	0
60 ～ 64	98	2	95	1	0
65 ～ 69	72	3	67	2	0
70 ～ 74	63	7	54	2	0
75 ～ 79	73	12	58	3	0
80 ～ 84	63	26	37	0	0
85 ～ 89	59	44	13	2	0
90 歳 以上	24	21	3	0	0

別表 2 7

要介護認定を受けている場合の要介護度の状況、性、年齢（5歳階級）

別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	未回答	不詳
総 数	163	30	27	28	26	19	13	19	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
65 ～ 69	5	3	0	0	0	0	2	0	0	0
70 ～ 74	11	2	2	3	2	1	0	1	0	0
75 ～ 79	21	6	5	5	2	1	0	2	0	0
80 ～ 84	36	11	5	5	5	2	2	6	0	0
85 ～ 89	58	8	12	9	11	6	7	5	0	0
90 歳 以上	27	0	2	6	4	7	2	5	1	0
男	46	8	11	9	7	4	1	6	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	9	2	3	3	0	0	0	1	0	0
80 ～ 84	10	3	1	2	1	0	0	3	0	0
85 ～ 89	14	1	4	2	5	1	0	1	0	0
90 歳 以上	6	0	0	2	0	3	0	1	0	0
女	117	22	16	19	19	15	12	13	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
65 ～ 69	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	7	1	0	3	1	1	0	1	0	0
75 ～ 79	12	4	2	2	2	1	0	1	0	0
80 ～ 84	26	8	4	3	4	2	2	3	0	0
85 ～ 89	44	7	8	7	6	5	7	4	0	0
90 歳 以上	21	0	2	4	4	4	2	4	1	0

別表 2 8

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 1、性、年齢
(5 歳階級) 別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾 患	心臓疾患	がん	呼吸器疾 患	関節疾患	認知症	パーキン ソン病	糖尿病
総 数	163	40	39	13	16	49	57	8	28
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	0	0	1	0	0	1
60 ～ 64	2	0	0	1	0	1	0	1	0
65 ～ 69	5	1	0	1	0	3	0	0	1
70 ～ 74	11	2	6	0	1	5	2	1	1
75 ～ 79	21	5	5	0	2	7	7	3	5
80 ～ 84	36	10	8	7	5	8	14	0	12
85 ～ 89	58	11	15	2	7	17	22	2	7
90 歳 以上	27	9	5	2	1	7	12	1	1
男	46	18	12	5	7	8	12	3	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	4	2	3	0	0	2	1	1	0
75 ～ 79	9	3	2	0	1	1	1	1	4
80 ～ 84	10	5	2	3	1	0	4	0	2
85 ～ 89	14	4	5	1	4	3	5	1	1
90 歳 以上	6	3	0	1	1	1	1	0	0
女	117	22	27	8	9	41	45	5	21
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	0	0	1	0	0	1
60 ～ 64	2	0	0	1	0	1	0	1	0
65 ～ 69	3	1	0	1	0	2	0	0	1
70 ～ 74	7	0	3	0	1	3	1	0	1
75 ～ 79	12	2	3	0	1	6	6	2	1
80 ～ 84	26	5	6	4	4	8	10	0	10
85 ～ 89	44	7	10	1	3	14	17	1	6
90 歳 以上	21	6	5	1	0	6	11	1	1

別表 2 9

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 2、性、年齢
(5 歳階級) 別

(単位: 人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総 数	163	23	56	18	44	25	2	4	0
30 ～ 34 歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	0	1	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	0	1	0	0	0
65 ～ 69	5	1	1	2	0	2	0	0	0
70 ～ 74	11	1	3	3	0	1	0	0	0
75 ～ 79	21	3	5	1	4	5	1	2	0
80 ～ 84	36	3	16	7	6	5	0	1	0
85 ～ 89	58	9	21	3	21	10	0	1	0
90 歳 以上	27	6	10	2	13	0	1	0	0
男	46	4	9	5	10	9	0	1	0
30 ～ 34 歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	1	0	1	0	0	0
70 ～ 74	4	0	1	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	9	1	3	0	3	4	0	1	0
80 ～ 84	10	0	1	2	1	1	0	0	0
85 ～ 89	14	2	4	0	5	3	0	0	0
90 歳 以上	6	1	0	1	1	0	0	0	0
女	117	19	47	13	34	16	2	3	0
30 ～ 34 歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	0	1	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	0	1	0	0	0
65 ～ 69	3	1	1	1	0	1	0	0	0
70 ～ 74	7	1	2	2	0	1	0	0	0
75 ～ 79	12	2	2	1	1	1	1	1	0
80 ～ 84	26	3	15	5	5	4	0	1	0
85 ～ 89	44	7	17	3	16	7	0	1	0
90 歳 以上	21	5	10	1	12	0	1	0	0

別表 3 0

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 1、性、
年齢 (5 歳階級) 別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾 患	心臓疾患	がん	呼吸器疾 患	関節疾患	認知症	パーキン ソン病	糖尿病
総 数	163	24	4	2	2	17	26	5	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	0	0	0	0	0	1
60 ～ 64	2	0	0	0	0	1	0	1	0
65 ～ 69	5	1	0	0	0	2	0	0	0
70 ～ 74	11	1	1	0	1	1	1	0	0
75 ～ 79	21	1	2	0	0	3	4	1	0
80 ～ 84	36	7	0	0	0	2	6	0	0
85 ～ 89	58	6	1	1	1	5	12	2	2
90 歳 以上	27	6	0	1	0	3	3	1	0
男	46	11	1	0	1	4	5	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	4	1	0	0	0	1	0	0	0
75 ～ 79	9	1	0	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	10	3	0	0	0	0	2	0	0
85 ～ 89	14	2	1	0	1	1	2	1	0
90 歳 以上	6	3	0	0	0	0	0	0	0
女	117	13	3	2	1	13	21	4	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	0	0	0	0	0	1
60 ～ 64	2	0	0	0	0	1	0	1	0
65 ～ 69	3	1	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	7	0	1	0	1	0	1	0	0
75 ～ 79	12	0	2	0	0	2	3	1	0
80 ～ 84	26	4	0	0	0	2	4	0	0
85 ～ 89	44	4	0	1	0	4	10	1	2
90 歳 以上	21	3	0	1	0	3	3	1	0

別表 3 1

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 2、性、
年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総 数	163	2	18	5	9	16	1	29	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	5	0	0	0	0	1	0	1	0
70 ～ 74	11	0	1	1	0	1	0	3	0
75 ～ 79	21	0	3	0	0	3	0	4	0
80 ～ 84	36	1	7	2	1	3	0	7	0
85 ～ 89	58	0	6	1	5	8	0	8	0
90 歳 以上	27	1	1	1	3	0	1	6	0
男	46	0	3	3	2	7	0	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	0	0	1	0	0	0
70 ～ 74	4	0	0	1	0	0	0	1	0
75 ～ 79	9	0	2	0	0	3	0	1	0
80 ～ 84	10	0	1	1	0	1	0	2	0
85 ～ 89	14	0	0	0	2	2	0	2	0
90 歳 以上	6	0	0	1	0	0	0	2	0
女	117	2	15	2	7	9	1	21	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	3	0	0	0	0	0	0	1	0
70 ～ 74	7	0	1	0	0	1	0	2	0
75 ～ 79	12	0	1	0	0	0	0	3	0
80 ～ 84	26	1	6	1	1	2	0	5	0
85 ～ 89	44	0	6	1	3	6	0	6	0
90 歳 以上	21	1	1	0	3	0	1	4	0

別表 3 2

介助なしでできること（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	洗顔					口腔清拭				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1189	31	20	203	1443	1191	30	20	202
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	183	0	0	39	222	182	0	0	40
55 ～ 59	239	189	0	0	50	239	189	0	0	50
60 ～ 64	192	165	0	0	27	192	163	2	0	27
65 ～ 69	135	117	5	0	13	135	120	3	0	12
70 ～ 74	115	107	1	1	6	115	108	0	1	6
75 ～ 79	129	110	2	2	15	129	110	2	2	15
80 ～ 84	118	102	4	3	9	118	102	6	2	8
85 ～ 89	95	72	12	10	1	95	73	11	10	1
90歳以上	35	23	7	4	1	35	23	6	5	1
男	687	578	7	4	98	687	578	7	3	99
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	95	0	0	18	113	94	0	0	19
55 ～ 59	120	96	0	0	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	81	0	0	13	94	81	0	0	13
65 ～ 69	63	58	2	0	3	63	59	1	0	3
70 ～ 74	52	49	1	0	2	52	50	0	0	2
75 ～ 79	56	46	2	0	8	56	46	2	0	8
80 ～ 84	55	50	1	2	2	55	50	2	1	2
85 ～ 89	36	33	1	1	1	36	32	2	1	1
90歳以上	11	9	0	1	1	11	9	0	1	1
女	756	611	24	16	105	756	613	23	17	103
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	88	0	0	21
55 ～ 59	119	93	0	0	26	119	93	0	0	26
60 ～ 64	98	84	0	0	14	98	82	2	0	14
65 ～ 69	72	59	3	0	10	72	61	2	0	9
70 ～ 74	63	58	0	1	4	63	58	0	1	4
75 ～ 79	73	64	0	2	7	73	64	0	2	7
80 ～ 84	63	52	3	1	7	63	52	4	1	6
85 ～ 89	59	39	11	9	0	59	41	9	9	0
90歳以上	24	14	7	3	0	24	14	6	4	0

別表 3 3

介助なしでできること（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	身体の清拭(体を拭う)					洗髪				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1140	67	31	205	1443	1131	71	37	204
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	182	0	0	40	222	180	1	0	41
55 ～ 59	239	186	3	0	50	239	188	1	0	50
60 ～ 64	192	164	0	1	27	192	164	1	1	26
65 ～ 69	135	115	7	1	12	135	116	7	0	12
70 ～ 74	115	101	6	1	7	115	103	3	2	7
75 ～ 79	129	108	3	3	15	129	109	2	3	15
80 ～ 84	118	90	15	3	10	118	87	17	5	9
85 ～ 89	95	58	23	13	1	95	51	27	16	1
90歳以上	35	15	10	9	1	35	12	12	10	1
男	687	561	20	6	100	687	563	20	5	99
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	94	0	0	19	113	93	1	0	19
55 ～ 59	120	95	1	0	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	81	0	0	13	94	82	0	0	12
65 ～ 69	63	56	4	0	3	63	57	3	0	3
70 ～ 74	52	47	2	0	3	52	48	1	0	3
75 ～ 79	56	45	2	1	8	56	46	1	1	8
80 ～ 84	55	47	4	2	2	55	47	5	1	2
85 ～ 89	36	29	4	2	1	36	27	6	2	1
90歳以上	11	6	3	1	1	11	6	3	1	1
女	756	579	47	25	105	756	568	51	32	105
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	87	0	0	22
55 ～ 59	119	91	2	0	26	119	92	1	0	26
60 ～ 64	98	83	0	1	14	98	82	1	1	14
65 ～ 69	72	59	3	1	9	72	59	4	0	9
70 ～ 74	63	54	4	1	4	63	55	2	2	4
75 ～ 79	73	63	1	2	7	73	63	1	2	7
80 ～ 84	63	43	11	1	8	63	40	12	4	7
85 ～ 89	59	29	19	11	0	59	24	21	14	0
90歳以上	24	9	7	8	0	24	6	9	9	0

別表 3 4

介助なしでできること（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	着替					入浴				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1171	50	20	202	1443	1131	77	32	203
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	183	0	0	39	222	181	1	0	40
55 ～ 59	239	188	1	0	50	239	188	1	0	50
60 ～ 64	192	163	2	0	27	192	163	2	0	27
65 ～ 69	135	118	5	0	12	135	119	4	0	12
70 ～ 74	115	107	1	1	6	115	101	6	2	6
75 ～ 79	129	111	1	2	15	129	107	4	3	15
80 ～ 84	118	95	11	3	9	118	86	20	4	8
85 ～ 89	95	66	19	9	1	95	55	25	14	1
90歳以上	35	19	10	5	1	35	10	14	9	2
男	687	574	10	5	98	687	562	23	4	98
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	95	0	0	18	113	94	1	0	18
55 ～ 59	120	96	0	0	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	81	0	0	13	94	81	0	0	13
65 ～ 69	63	59	1	0	3	63	59	1	0	3
70 ～ 74	52	50	0	0	2	52	48	2	0	2
75 ～ 79	56	47	0	1	8	56	45	2	1	8
80 ～ 84	55	48	3	2	2	55	46	6	1	2
85 ～ 89	36	28	6	1	1	36	28	6	1	1
90歳以上	11	9	0	1	1	11	4	5	1	1
女	756	597	40	15	104	756	569	54	28	105
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	87	0	0	22
55 ～ 59	119	92	1	0	26	119	92	1	0	26
60 ～ 64	98	82	2	0	14	98	82	2	0	14
65 ～ 69	72	59	4	0	9	72	60	3	0	9
70 ～ 74	63	57	1	1	4	63	53	4	2	4
75 ～ 79	73	64	1	1	7	73	62	2	2	7
80 ～ 84	63	47	8	1	7	63	40	14	3	6
85 ～ 89	59	38	13	8	0	59	27	19	13	0
90歳以上	24	10	10	4	0	24	6	9	8	1

別表 3 5

介助なしでできること（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	体位交換・起居(寝返りや体を起こすなど)					排泄(トイレ)				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1187	30	18	208	1443	1188	29	23	203
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	181	0	0	41	222	183	0	0	39
55 ～ 59	239	189	0	0	50	239	189	0	0	50
60 ～ 64	192	164	1	0	27	192	163	2	0	27
65 ～ 69	135	120	2	0	13	135	118	4	0	13
70 ～ 74	115	107	0	1	7	115	107	1	1	6
75 ～ 79	129	109	3	2	15	129	109	2	3	15
80 ～ 84	118	95	9	3	11	118	101	4	4	9
85 ～ 89	95	77	8	9	1	95	74	10	10	1
90歳以上	35	24	7	3	1	35	23	6	5	1
男	687	575	8	3	101	687	577	6	6	98
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	94	0	0	19	113	95	0	0	18
55 ～ 59	120	96	0	0	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	81	0	0	13	94	81	0	0	13
65 ～ 69	63	60	0	0	3	63	59	1	0	3
70 ～ 74	52	49	0	0	3	52	49	1	0	2
75 ～ 79	56	47	1	0	8	56	45	1	2	8
80 ～ 84	55	47	4	1	3	55	50	1	2	2
85 ～ 89	36	32	2	1	1	36	32	2	1	1
90歳以上	11	8	1	1	1	11	9	0	1	1
女	756	612	22	15	107	756	611	23	17	105
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	87	0	0	22	109	88	0	0	21
55 ～ 59	119	93	0	0	26	119	93	0	0	26
60 ～ 64	98	83	1	0	14	98	82	2	0	14
65 ～ 69	72	60	2	0	10	72	59	3	0	10
70 ～ 74	63	58	0	1	4	63	58	0	1	4
75 ～ 79	73	62	2	2	7	73	64	1	1	7
80 ～ 84	63	48	5	2	8	63	51	3	2	7
85 ～ 89	59	45	6	8	0	59	42	8	9	0
90歳以上	24	16	6	2	0	24	14	6	4	0

別表 3 6

介助なしでできること（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	食事の準備・後始末(調理を含む)					食事				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1081	63	93	206	1443	1204	26	13	200
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	179	1	0	42	222	181	0	1	40
55 ～ 59	239	182	5	2	50	239	189	0	0	50
60 ～ 64	192	161	2	2	27	192	163	2	0	27
65 ～ 69	135	113	3	5	14	135	121	1	0	13
70 ～ 74	115	95	6	6	8	115	107	1	1	6
75 ～ 79	129	99	7	11	12	129	115	2	0	12
80 ～ 84	118	77	13	19	9	118	102	3	4	9
85 ～ 89	95	45	18	31	1	95	77	12	5	1
90歳以上	35	9	8	17	1	35	28	5	2	0
男	687	527	21	36	103	687	583	3	4	97
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	91	1	0	21	113	94	0	0	19
55 ～ 59	120	91	3	2	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	80	1	0	13	94	81	0	0	13
65 ～ 69	63	56	1	3	3	63	60	0	0	3
70 ～ 74	52	42	2	4	4	52	50	0	0	2
75 ～ 79	56	36	4	9	7	56	49	0	0	7
80 ～ 84	55	41	3	8	3	55	50	1	2	2
85 ～ 89	36	25	2	8	1	36	32	2	1	1
90歳以上	11	4	4	2	1	11	10	0	1	0
女	756	554	42	57	103	756	621	23	9	103
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	87	0	1	21
55 ～ 59	119	91	2	0	26	119	93	0	0	26
60 ～ 64	98	81	1	2	14	98	82	2	0	14
65 ～ 69	72	57	2	2	11	72	61	1	0	10
70 ～ 74	63	53	4	2	4	63	57	1	1	4
75 ～ 79	73	63	3	2	5	73	66	2	0	5
80 ～ 84	63	36	10	11	6	63	52	2	2	7
85 ～ 89	59	20	16	23	0	59	45	10	4	0
90歳以上	24	5	4	15	0	24	18	5	1	0

別表 3 7

介助なしでできること（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位: 人)

性 年齢階層	服薬(薬を飲む)					散歩				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1176	51	15	201	1443	1101	67	71	204
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	182	0	0	40	222	180	1	0	41
55 ～ 59	239	189	0	0	50	239	184	4	1	50
60 ～ 64	192	165	0	0	27	192	159	3	3	27
65 ～ 69	135	119	4	0	12	135	114	2	5	14
70 ～ 74	115	104	3	1	7	115	100	5	4	6
75 ～ 79	129	112	5	0	12	129	101	6	9	13
80 ～ 84	118	97	7	5	9	118	80	19	10	9
85 ～ 89	95	66	21	7	1	95	52	15	27	1
90歳以上	35	21	11	2	1	35	10	12	12	1
男	687	573	11	5	98	687	551	23	15	98
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	94	0	0	19	113	93	1	0	19
55 ～ 59	120	96	0	0	24	120	92	4	0	24
60 ～ 64	94	81	0	0	13	94	79	2	0	13
65 ～ 69	63	58	2	0	3	63	58	1	1	3
70 ～ 74	52	49	1	0	2	52	47	2	1	2
75 ～ 79	56	48	1	0	7	56	41	3	5	7
80 ～ 84	55	47	3	3	2	55	46	3	4	2
85 ～ 89	36	30	4	1	1	36	29	3	3	1
90歳以上	11	9	0	1	1	11	5	4	1	1
女	756	603	40	10	103	756	550	44	56	106
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	87	0	0	22
55 ～ 59	119	93	0	0	26	119	92	0	1	26
60 ～ 64	98	84	0	0	14	98	80	1	3	14
65 ～ 69	72	61	2	0	9	72	56	1	4	11
70 ～ 74	63	55	2	1	5	63	53	3	3	4
75 ～ 79	73	64	4	0	5	73	60	3	4	6
80 ～ 84	63	50	4	2	7	63	34	16	6	7
85 ～ 89	59	36	17	6	0	59	23	12	24	0
90歳以上	24	12	11	1	0	24	5	8	11	0

別表 3 8

介助なしでできること（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	掃除					洗濯				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1082	50	110	201	1443	1095	42	101	205
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	179	1	1	41	222	180	1	1	40
55 ～ 59	239	184	4	1	50	239	184	3	2	50
60 ～ 64	192	159	3	3	27	192	161	2	2	27
65 ～ 69	135	113	3	6	13	135	115	2	6	12
70 ～ 74	115	99	4	6	6	115	95	5	7	8
75 ～ 79	129	99	5	13	12	129	100	5	12	12
80 ～ 84	118	76	8	26	8	118	78	7	22	11
85 ～ 89	95	44	14	36	1	95	49	11	33	2
90歳以上	35	8	8	18	1	35	12	6	16	1
男	687	532	22	34	99	687	530	17	37	103
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	91	1	1	20	113	92	1	1	19
55 ～ 59	120	93	3	0	24	120	93	2	1	24
60 ～ 64	94	80	1	0	13	94	80	1	0	13
65 ～ 69	63	55	2	3	3	63	55	2	3	3
70 ～ 74	52	45	2	3	2	52	42	2	4	4
75 ～ 79	56	36	4	9	7	56	37	3	9	7
80 ～ 84	55	41	2	10	2	55	39	1	10	5
85 ～ 89	36	26	3	6	1	36	26	2	7	1
90歳以上	11	4	4	2	1	11	5	3	2	1
女	756	550	28	76	102	756	565	25	64	102
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	88	0	0	21
55 ～ 59	119	91	1	1	26	119	91	1	1	26
60 ～ 64	98	79	2	3	14	98	81	1	2	14
65 ～ 69	72	58	1	3	10	72	60	0	3	9
70 ～ 74	63	54	2	3	4	63	53	3	3	4
75 ～ 79	73	63	1	4	5	73	63	2	3	5
80 ～ 84	63	35	6	16	6	63	39	6	12	6
85 ～ 89	59	18	11	30	0	59	23	9	26	1
90歳以上	24	4	4	16	0	24	7	3	14	0

別表 3 9

介助なしでできること（複数回答） 8、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	買い物					日常会話				
	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答	総数	介助なし に自分で 行うことが できる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもできな い	未回答
総 数	1443	1073	56	110	204	1443	1203	21	17	202
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0
40 ～ 44	38	28	0	0	10	38	28	0	0	10
45 ～ 49	121	89	0	0	32	121	89	0	0	32
50 ～ 54	222	180	1	1	40	222	178	1	0	43
55 ～ 59	239	184	5	0	50	239	189	0	0	50
60 ～ 64	192	158	4	3	27	192	164	1	0	27
65 ～ 69	135	114	2	6	13	135	123	0	0	12
70 ～ 74	115	97	3	8	7	115	107	1	1	6
75 ～ 79	129	101	6	10	12	129	112	3	3	11
80 ～ 84	118	71	12	25	10	118	103	4	2	9
85 ～ 89	95	40	14	40	1	95	80	6	7	2
90歳以上	35	7	9	17	2	35	26	5	4	0
男	687	534	21	33	99	687	577	9	4	97
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0
40 ～ 44	21	17	0	0	4	21	17	0	0	4
45 ～ 49	63	41	0	0	22	63	41	0	0	22
50 ～ 54	113	92	1	1	19	113	92	1	0	20
55 ～ 59	120	92	4	0	24	120	96	0	0	24
60 ～ 64	94	79	2	0	13	94	81	0	0	13
65 ～ 69	63	57	0	3	3	63	60	0	0	3
70 ～ 74	52	45	1	4	2	52	49	1	0	2
75 ～ 79	56	40	4	5	7	56	47	1	2	6
80 ～ 84	55	41	2	9	3	55	50	2	1	2
85 ～ 89	36	23	3	9	1	36	32	3	0	1
90歳以上	11	4	4	2	1	11	9	1	1	0
女	756	539	35	77	105	756	626	12	13	105
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	0	0	6	17	11	0	0	6
45 ～ 49	58	48	0	0	10	58	48	0	0	10
50 ～ 54	109	88	0	0	21	109	86	0	0	23
55 ～ 59	119	92	1	0	26	119	93	0	0	26
60 ～ 64	98	79	2	3	14	98	83	1	0	14
65 ～ 69	72	57	2	3	10	72	63	0	0	9
70 ～ 74	63	52	2	4	5	63	58	0	1	4
75 ～ 79	73	61	2	5	5	73	65	2	1	5
80 ～ 84	63	30	10	16	7	63	53	2	1	7
85 ～ 89	59	17	11	31	0	59	48	3	7	1
90歳以上	24	3	5	15	1	24	17	4	3	0

別表 4 0

受診頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院中	毎週1回 以上	毎月1～3 回程度	数か月に1 回程度	受診して いない	未回答	不詳
総 数	1443	36	103	642	368	240	54	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	0	2	1	1	0	0
40 ～ 44	38	1	3	7	9	16	2	0
45 ～ 49	121	0	6	26	36	49	4	0
50 ～ 54	222	0	8	67	83	54	10	0
55 ～ 59	239	0	11	84	75	63	6	0
60 ～ 64	192	2	5	81	64	29	11	0
65 ～ 69	135	2	11	70	36	12	4	0
70 ～ 74	115	4	19	66	16	6	4	0
75 ～ 79	129	2	13	86	20	3	5	0
80 ～ 84	118	14	15	68	13	5	3	0
85 ～ 89	95	7	7	67	9	2	3	0
90歳以上	35	4	5	18	6	0	2	0
男	687	15	40	291	180	139	22	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	0	2	1	0	0	0
40 ～ 44	21	1	2	3	5	9	1	0
45 ～ 49	63	0	5	12	15	28	3	0
50 ～ 54	113	0	1	33	43	32	4	0
55 ～ 59	120	0	4	42	34	40	0	0
60 ～ 64	94	2	2	39	30	15	6	0
65 ～ 69	63	1	3	32	19	6	2	0
70 ～ 74	52	2	7	29	12	2	0	0
75 ～ 79	56	2	7	35	6	3	3	0
80 ～ 84	55	4	5	34	7	3	2	0
85 ～ 89	36	2	4	23	6	1	0	0
90歳以上	11	1	0	7	2	0	1	0
女	756	21	63	351	188	101	32	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	1	4	4	7	1	0
45 ～ 49	58	0	1	14	21	21	1	0
50 ～ 54	109	0	7	34	40	22	6	0
55 ～ 59	119	0	7	42	41	23	6	0
60 ～ 64	98	0	3	42	34	14	5	0
65 ～ 69	72	1	8	38	17	6	2	0
70 ～ 74	63	2	12	37	4	4	4	0
75 ～ 79	73	0	6	51	14	0	2	0
80 ～ 84	63	10	10	34	6	2	1	0
85 ～ 89	59	5	3	44	3	1	3	0
90歳以上	24	3	5	11	4	0	1	0

別表 4 1

油証券を持っているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	1443	904	520	19	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	2	2	0	0
40 ～ 44	38	21	16	1	0
45 ～ 49	121	67	53	1	0
50 ～ 54	222	137	81	4	0
55 ～ 59	239	140	98	1	0
60 ～ 64	192	118	70	4	0
65 ～ 69	135	82	52	1	0
70 ～ 74	115	75	37	3	0
75 ～ 79	129	92	35	2	0
80 ～ 84	118	87	30	1	0
85 ～ 89	95	62	33	0	0
90 歳 以上	35	21	13	1	0
男	687	418	255	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	2	0	0
40 ～ 44	21	10	10	1	0
45 ～ 49	63	30	32	1	0
50 ～ 54	113	68	42	3	0
55 ～ 59	120	70	50	0	0
60 ～ 64	94	56	35	3	0
65 ～ 69	63	36	26	1	0
70 ～ 74	52	34	16	2	0
75 ～ 79	56	42	13	1	0
80 ～ 84	55	42	12	1	0
85 ～ 89	36	22	14	0	0
90 歳 以上	11	7	3	1	0
女	756	486	265	5	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	11	6	0	0
45 ～ 49	58	37	21	0	0
50 ～ 54	109	69	39	1	0
55 ～ 59	119	70	48	1	0
60 ～ 64	98	62	35	1	0
65 ～ 69	72	46	26	0	0
70 ～ 74	63	41	21	1	0
75 ～ 79	73	50	22	1	0
80 ～ 84	63	45	18	0	0
85 ～ 89	59	40	19	0	0
90 歳 以上	24	14	10	0	0

別表 4 2

油証券の発行を希望しているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	520	108	391	21	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	1	0	0
40 ～ 44	16	4	12	0	0
45 ～ 49	53	9	43	1	0
50 ～ 54	81	15	65	1	0
55 ～ 59	98	23	71	4	0
60 ～ 64	70	18	50	2	0
65 ～ 69	52	14	34	4	0
70 ～ 74	37	5	29	3	0
75 ～ 79	35	9	24	2	0
80 ～ 84	30	6	22	2	0
85 ～ 89	33	3	29	1	0
90 歳 以上	13	1	11	1	0
男	255	62	183	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	1	0	0
40 ～ 44	10	3	7	0	0
45 ～ 49	32	5	26	1	0
50 ～ 54	42	9	33	0	0
55 ～ 59	50	15	31	4	0
60 ～ 64	35	11	23	1	0
65 ～ 69	26	7	17	2	0
70 ～ 74	16	2	13	1	0
75 ～ 79	13	5	8	0	0
80 ～ 84	12	3	8	1	0
85 ～ 89	14	1	13	0	0
90 歳 以上	3	0	3	0	0
女	265	46	208	11	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0
40 ～ 44	6	1	5	0	0
45 ～ 49	21	4	17	0	0
50 ～ 54	39	6	32	1	0
55 ～ 59	48	8	40	0	0
60 ～ 64	35	7	27	1	0
65 ～ 69	26	7	17	2	0
70 ～ 74	21	3	16	2	0
75 ～ 79	22	4	16	2	0
80 ～ 84	18	3	14	1	0
85 ～ 89	19	2	16	1	0
90 歳 以上	10	1	8	1	0

別表 4 3

この1年間で、油証券を使用せずに受診したことがあるか、性、年齢
(5歳階級) 別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	1443	928	434	81	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	2	2	0	0
40 ～ 44	38	23	11	4	0
45 ～ 49	121	77	35	9	0
50 ～ 54	222	162	49	11	0
55 ～ 59	239	161	70	8	0
60 ～ 64	192	127	57	8	0
65 ～ 69	135	77	46	12	0
70 ～ 74	115	61	46	8	0
75 ～ 79	129	80	43	6	0
80 ～ 84	118	74	36	8	0
85 ～ 89	95	64	27	4	0
90 歳 以上	35	20	12	3	0
男	687	423	227	37	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	2	1	0	0
40 ～ 44	21	15	5	1	0
45 ～ 49	63	36	20	7	0
50 ～ 54	113	74	33	6	0
55 ～ 59	120	73	43	4	0
60 ～ 64	94	56	33	5	0
65 ～ 69	63	33	24	6	0
70 ～ 74	52	27	23	2	0
75 ～ 79	56	39	15	2	0
80 ～ 84	55	36	16	3	0
85 ～ 89	36	27	8	1	0
90 歳 以上	11	5	6	0	0
女	756	505	207	44	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	8	6	3	0
45 ～ 49	58	41	15	2	0
50 ～ 54	109	88	16	5	0
55 ～ 59	119	88	27	4	0
60 ～ 64	98	71	24	3	0
65 ～ 69	72	44	22	6	0
70 ～ 74	63	34	23	6	0
75 ～ 79	73	41	28	4	0
80 ～ 84	63	38	20	5	0
85 ～ 89	59	37	19	3	0
90 歳 以上	24	15	6	3	0

別表 4 4

油証券の使用を希望する医療機関があるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	928	201	685	42	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	2	0	0
40 ～ 44	23	7	16	0	0
45 ～ 49	77	10	64	3	0
50 ～ 54	162	34	122	6	0
55 ～ 59	161	26	130	5	0
60 ～ 64	127	34	89	4	0
65 ～ 69	77	20	54	3	0
70 ～ 74	61	7	48	6	0
75 ～ 79	80	28	47	5	0
80 ～ 84	74	14	52	8	0
85 ～ 89	64	15	47	2	0
90 歳 以上	20	6	14	0	0
男	423	100	312	11	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	2	0	0
40 ～ 44	15	4	11	0	0
45 ～ 49	36	5	31	0	0
50 ～ 54	74	20	53	1	0
55 ～ 59	73	12	59	2	0
60 ～ 64	56	14	42	0	0
65 ～ 69	33	14	18	1	0
70 ～ 74	27	3	22	2	0
75 ～ 79	39	14	23	2	0
80 ～ 84	36	8	27	1	0
85 ～ 89	27	4	21	2	0
90 歳 以上	5	2	3	0	0
女	505	101	373	31	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0
40 ～ 44	8	3	5	0	0
45 ～ 49	41	5	33	3	0
50 ～ 54	88	14	69	5	0
55 ～ 59	88	14	71	3	0
60 ～ 64	71	20	47	4	0
65 ～ 69	44	6	36	2	0
70 ～ 74	34	4	26	4	0
75 ～ 79	41	14	24	3	0
80 ～ 84	38	6	25	7	0
85 ～ 89	37	11	26	0	0
90 歳 以上	15	4	11	0	0

別表 4 5

油証券の使用を希望する医療機関の受診頻度、性、年齢（5歳階級）
別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院中	毎週1回 以上	毎月1～3 回程度	数か月に1 回程度	受診して いない	未回答	不詳
総 数	299	4	21	117	139	18	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	9	1	0	1	5	2	0	0
45 ～ 49	10	0	1	3	5	1	0	0
50 ～ 54	50	0	2	15	30	3	0	0
55 ～ 59	37	0	3	6	24	4	0	0
60 ～ 64	40	1	1	16	20	2	0	0
65 ～ 69	38	0	1	24	12	1	0	0
70 ～ 74	12	0	1	7	4	0	0	0
75 ～ 79	47	0	10	15	20	2	0	0
80 ～ 84	19	1	0	12	5	1	0	0
85 ～ 89	27	1	2	15	8	1	0	0
90 歳 以上	10	0	0	3	6	1	0	0
男	136	2	10	52	61	11	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	0	0	2	1	0	0
45 ～ 49	3	0	0	1	2	0	0	0
50 ～ 54	30	0	1	9	17	3	0	0
55 ～ 59	12	0	3	2	6	1	0	0
60 ～ 64	11	1	0	3	6	1	0	0
65 ～ 69	26	0	1	14	10	1	0	0
70 ～ 74	6	0	0	5	1	0	0	0
75 ～ 79	20	0	5	4	9	2	0	0
80 ～ 84	13	0	0	8	4	1	0	0
85 ～ 89	8	0	0	4	3	1	0	0
90 歳 以上	3	0	0	2	1	0	0	0
女	163	2	11	65	78	7	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	0	0	1	3	1	0	0
45 ～ 49	7	0	1	2	3	1	0	0
50 ～ 54	20	0	1	6	13	0	0	0
55 ～ 59	25	0	0	4	18	3	0	0
60 ～ 64	29	0	1	13	14	1	0	0
65 ～ 69	12	0	0	10	2	0	0	0
70 ～ 74	6	0	1	2	3	0	0	0
75 ～ 79	27	0	5	11	11	0	0	0
80 ～ 84	6	1	0	4	1	0	0	0
85 ～ 89	19	1	2	11	5	0	0	0
90 歳 以上	7	0	0	1	5	1	0	0

別表 4 6

油症検診を受診したか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総 数	1443	574	848	21	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	1	3	0	0
40 ～ 44	38	10	27	1	0
45 ～ 49	121	36	83	2	0
50 ～ 54	222	55	165	2	0
55 ～ 59	239	74	161	4	0
60 ～ 64	192	86	102	4	0
65 ～ 69	135	72	60	3	0
70 ～ 74	115	62	52	1	0
75 ～ 79	129	73	53	3	0
80 ～ 84	118	56	61	1	0
85 ～ 89	95	40	55	0	0
90 歳 以 上	35	9	26	0	0
男	687	273	400	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	2	0	0
40 ～ 44	21	7	13	1	0
45 ～ 49	63	16	45	2	0
50 ～ 54	113	27	85	1	0
55 ～ 59	120	31	86	3	0
60 ～ 64	94	41	49	4	0
65 ～ 69	63	33	29	1	0
70 ～ 74	52	28	23	1	0
75 ～ 79	56	35	20	1	0
80 ～ 84	55	28	27	0	0
85 ～ 89	36	20	16	0	0
90 歳 以 上	11	6	5	0	0
女	756	301	448	7	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	3	14	0	0
45 ～ 49	58	20	38	0	0
50 ～ 54	109	28	80	1	0
55 ～ 59	119	43	75	1	0
60 ～ 64	98	45	53	0	0
65 ～ 69	72	39	31	2	0
70 ～ 74	63	34	29	0	0
75 ～ 79	73	38	33	2	0
80 ～ 84	63	28	34	1	0
85 ～ 89	59	20	39	0	0
90 歳 以 上	24	3	21	0	0

別表 4 7

検診受診を受けなかった理由 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	知らな かったか ら(案内が 届かなか った)	仕事など で都合が つかなか ったから	体調が悪 かったか ら	検診の場 所が遠 かったか ら	職場や自 治体の検 診を受け ているた め、必要 性を感じ ないから	健康に自 信があり、 必要性を 感じない から
総 数	848	20	305	124	109	105	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	2	0	0	1	0
40 ～ 44	27	0	16	2	3	4	0
45 ～ 49	83	1	54	3	10	11	0
50 ～ 54	165	6	78	8	17	26	2
55 ～ 59	161	7	89	9	15	20	1
60 ～ 64	102	2	38	9	11	17	0
65 ～ 69	60	1	16	7	7	7	2
70 ～ 74	52	0	8	19	12	6	0
75 ～ 79	53	1	2	18	14	6	0
80 ～ 84	61	2	1	21	11	0	2
85 ～ 89	55	0	0	19	8	4	0
90 歳 以上	26	0	1	9	1	3	0
男	400	10	190	41	38	51	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	1	0	0	1	0
40 ～ 44	13	0	10	0	0	2	0
45 ～ 49	45	1	30	1	4	4	0
50 ～ 54	85	4	47	5	4	15	1
55 ～ 59	86	2	54	5	5	12	0
60 ～ 64	49	1	29	1	4	9	0
65 ～ 69	29	0	13	2	2	3	1
70 ～ 74	23	0	5	7	3	2	0
75 ～ 79	20	0	1	8	6	1	0
80 ～ 84	27	2	0	8	5	0	0
85 ～ 89	16	0	0	1	5	2	0
90 歳 以上	5	0	0	3	0	0	0
女	448	10	115	83	71	54	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	14	0	6	2	3	2	0
45 ～ 49	38	0	24	2	6	7	0
50 ～ 54	80	2	31	3	13	11	1
55 ～ 59	75	5	35	4	10	8	1
60 ～ 64	53	1	9	8	7	8	0
65 ～ 69	31	1	3	5	5	4	1
70 ～ 74	29	0	3	12	9	4	0
75 ～ 79	33	1	1	10	8	5	0
80 ～ 84	34	0	1	13	6	0	2
85 ～ 89	39	0	0	18	3	2	0
90 歳 以上	21	0	1	6	1	3	0

別表 4 8

検診受診を受けなかった理由 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	その時、 医療機関 に入院し ていたか ら(介護施 設への入 所も含む)	めんどうだ から	その他	未回答	不詳
総 数	848	67	25	113	45	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	0	0	0	0
40 ～ 44	27	0	0	1	2	0
45 ～ 49	83	2	3	2	5	0
50 ～ 54	165	1	4	24	6	0
55 ～ 59	161	6	2	22	5	0
60 ～ 64	102	2	8	18	5	0
65 ～ 69	60	9	0	11	3	0
70 ～ 74	52	6	4	3	4	0
75 ～ 79	53	8	0	3	5	0
80 ～ 84	61	12	0	11	6	0
85 ～ 89	55	13	2	13	3	0
90 歳 以上	26	8	2	5	1	0
男	400	25	14	36	23	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	0	0	0
40 ～ 44	13	0	0	1	1	0
45 ～ 49	45	2	2	0	4	0
50 ～ 54	85	0	2	7	1	0
55 ～ 59	86	3	2	6	4	0
60 ～ 64	49	0	3	5	3	0
65 ～ 69	29	6	0	3	0	0
70 ～ 74	23	3	2	2	3	0
75 ～ 79	20	2	0	0	4	0
80 ～ 84	27	6	0	5	3	0
85 ～ 89	16	2	2	6	0	0
90 歳 以上	5	1	1	1	0	0
女	448	42	11	77	22	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	0
40 ～ 44	14	0	0	0	1	0
45 ～ 49	38	0	1	2	1	0
50 ～ 54	80	1	2	17	5	0
55 ～ 59	75	3	0	16	1	0
60 ～ 64	53	2	5	13	2	0
65 ～ 69	31	3	0	8	3	0
70 ～ 74	29	3	2	1	1	0
75 ～ 79	33	6	0	3	1	0
80 ～ 84	34	6	0	6	3	0
85 ～ 89	39	11	0	7	3	0
90 歳 以上	21	7	1	4	1	0

別表 4 9

油症相談員、相談窓口への相談経験、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総 数	1443	230	1178	35	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	1	3	0	0
40 ～ 44	38	1	36	1	0
45 ～ 49	121	9	110	2	0
50 ～ 54	222	20	199	3	0
55 ～ 59	239	25	210	4	0
60 ～ 64	192	38	150	4	0
65 ～ 69	135	29	100	6	0
70 ～ 74	115	33	80	2	0
75 ～ 79	129	29	95	5	0
80 ～ 84	118	25	88	5	0
85 ～ 89	95	16	77	2	0
90 歳 以上	35	4	30	1	0
男	687	113	554	20	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	1	2	0	0
40 ～ 44	21	0	20	1	0
45 ～ 49	63	7	54	2	0
50 ～ 54	113	9	103	1	0
55 ～ 59	120	13	104	3	0
60 ～ 64	94	24	66	4	0
65 ～ 69	63	12	49	2	0
70 ～ 74	52	13	38	1	0
75 ～ 79	56	13	39	4	0
80 ～ 84	55	12	42	1	0
85 ～ 89	36	6	29	1	0
90 歳 以上	11	3	8	0	0
女	756	117	624	15	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	1	16	0	0
45 ～ 49	58	2	56	0	0
50 ～ 54	109	11	96	2	0
55 ～ 59	119	12	106	1	0
60 ～ 64	98	14	84	0	0
65 ～ 69	72	17	51	4	0
70 ～ 74	63	20	42	1	0
75 ～ 79	73	16	56	1	0
80 ～ 84	63	13	46	4	0
85 ～ 89	59	10	48	1	0
90 歳 以上	24	1	22	1	0

別表 5 0

油症相談員、相談窓口へ相談しない理由、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	特に相談 することが ないから	他に相談 できる人 がいるか ら	相談窓口 を知らな かったか ら	その他	未回答	不詳
総 数	1178	691	140	180	111	75	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	2	1	0	0	0	0
40 ～ 44	36	17	7	7	2	3	0
45 ～ 49	110	71	14	11	6	9	0
50 ～ 54	199	124	20	31	20	9	0
55 ～ 59	210	128	21	37	16	10	0
60 ～ 64	150	83	14	28	17	11	0
65 ～ 69	100	60	9	19	7	7	0
70 ～ 74	80	45	10	8	14	4	0
75 ～ 79	95	46	17	18	6	9	0
80 ～ 84	88	48	14	9	11	8	0
85 ～ 89	77	49	11	10	6	3	0
90 歳 以上	30	18	2	2	6	2	0
男	554	351	53	82	37	40	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	20	11	2	4	1	2	0
45 ～ 49	54	32	5	6	4	8	0
50 ～ 54	103	69	7	13	10	6	0
55 ～ 59	104	61	12	21	5	6	0
60 ～ 64	66	38	5	10	6	8	0
65 ～ 69	49	37	0	10	2	1	0
70 ～ 74	38	27	4	0	5	2	0
75 ～ 79	39	18	8	9	1	3	0
80 ～ 84	42	28	6	4	3	3	0
85 ～ 89	29	24	2	4	0	0	0
90 歳 以上	8	5	1	1	0	1	0
女	624	340	87	98	74	35	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0
40 ～ 44	16	6	5	3	1	1	0
45 ～ 49	56	39	9	5	2	1	0
50 ～ 54	96	55	13	18	10	3	0
55 ～ 59	106	67	9	16	11	4	0
60 ～ 64	84	45	9	18	11	3	0
65 ～ 69	51	23	9	9	5	6	0
70 ～ 74	42	18	6	8	9	2	0
75 ～ 79	56	28	9	9	5	6	0
80 ～ 84	46	20	8	5	8	5	0
85 ～ 89	48	25	9	6	6	3	0
90 歳 以上	22	13	1	1	6	1	0

別表 5 1

本調査が初めてかどうか、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	不詳
総 数	1443	43	1400	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	4	0
40 ～ 44	38	1	37	0
45 ～ 49	121	2	119	0
50 ～ 54	222	7	215	0
55 ～ 59	239	7	232	0
60 ～ 64	192	9	183	0
65 ～ 69	135	6	129	0
70 ～ 74	115	0	115	0
75 ～ 79	129	1	128	0
80 ～ 84	118	5	113	0
85 ～ 89	95	3	92	0
90 歳 以上	35	2	33	0
男	687	19	668	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0
40 ～ 44	21	1	20	0
45 ～ 49	63	2	61	0
50 ～ 54	113	2	111	0
55 ～ 59	120	2	118	0
60 ～ 64	94	4	90	0
65 ～ 69	63	3	60	0
70 ～ 74	52	0	52	0
75 ～ 79	56	0	56	0
80 ～ 84	55	2	53	0
85 ～ 89	36	1	35	0
90 歳 以上	11	2	9	0
女	756	24	732	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0
40 ～ 44	17	0	17	0
45 ～ 49	58	0	58	0
50 ～ 54	109	5	104	0
55 ～ 59	119	5	114	0
60 ～ 64	98	5	93	0
65 ～ 69	72	3	69	0
70 ～ 74	63	0	63	0
75 ～ 79	73	1	72	0
80 ～ 84	63	3	60	0
85 ～ 89	59	2	57	0
90 歳 以上	24	0	24	0

別表 5 2

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総 数	1443	118	1238	87	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	4	0	4	0	0
40 ～ 44	38	0	36	2	0
45 ～ 49	121	3	115	3	0
50 ～ 54	222	5	213	4	0
55 ～ 59	239	12	214	13	0
60 ～ 64	192	20	166	6	0
65 ～ 69	135	13	113	9	0
70 ～ 74	115	15	88	12	0
75 ～ 79	129	14	105	10	0
80 ～ 84	118	21	82	15	0
85 ～ 89	95	8	78	9	0
90 歳 以上	35	7	24	4	0
男	687	64	596	27	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	0	3	0	0
40 ～ 44	21	0	20	1	0
45 ～ 49	63	1	61	1	0
50 ～ 54	113	4	109	0	0
55 ～ 59	120	5	109	6	0
60 ～ 64	94	12	78	4	0
65 ～ 69	63	5	57	1	0
70 ～ 74	52	7	41	4	0
75 ～ 79	56	9	44	3	0
80 ～ 84	55	15	34	6	0
85 ～ 89	36	3	32	1	0
90 歳 以上	11	3	8	0	0
女	756	54	642	60	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	16	1	0
45 ～ 49	58	2	54	2	0
50 ～ 54	109	1	104	4	0
55 ～ 59	119	7	105	7	0
60 ～ 64	98	8	88	2	0
65 ～ 69	72	8	56	8	0
70 ～ 74	63	8	47	8	0
75 ～ 79	73	5	61	7	0
80 ～ 84	63	6	48	9	0
85 ～ 89	59	5	46	8	0
90 歳 以上	24	4	16	4	0

別表 5 3

悪性腫瘍（がん）の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	入院治療 中・外来 (通院) 治 療中	がんに対 する治療 は終了し、 定期的な 健診のため通院中	治療が完 了し、通院 もしていな い	その他	未回答	不詳
総 数	169	42	67	41	6	13	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	3	0	0	0	0
50 ～ 54	8	2	2	0	0	4	0
55 ～ 59	16	7	5	4	0	0	0
60 ～ 64	21	4	13	4	0	0	0
65 ～ 69	18	5	8	4	1	0	0
70 ～ 74	23	2	11	8	2	0	0
75 ～ 79	24	10	7	6	0	1	0
80 ～ 84	39	7	16	8	2	6	0
85 ～ 89	8	2	1	3	0	2	0
90 歳 以上	8	2	1	4	1	0	0
男	100	23	41	23	4	9	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	7	1	2	0	0	4	0
55 ～ 59	7	2	1	4	0	0	0
60 ～ 64	13	3	8	2	0	0	0
65 ～ 69	9	3	2	3	1	0	0
70 ～ 74	12	2	8	1	1	0	0
75 ～ 79	15	5	4	6	0	0	0
80 ～ 84	29	5	13	5	2	4	0
85 ～ 89	3	0	1	1	0	1	0
90 歳 以上	4	2	1	1	0	0	0
女	69	19	26	18	2	4	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	3	1	2	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0
55 ～ 59	9	5	4	0	0	0	0
60 ～ 64	8	1	5	2	0	0	0
65 ～ 69	9	2	6	1	0	0	0
70 ～ 74	11	0	3	7	1	0	0
75 ～ 79	9	5	3	0	0	1	0
80 ～ 84	10	2	3	3	0	2	0
85 ～ 89	5	2	0	2	0	1	0
90 歳 以上	4	0	0	3	1	0	0

別表 5 4

受けた悪性腫瘍（がん）治療、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	外科手術 (胸腔鏡・ 胸腔鏡手術を含む)	内視鏡治療	薬物療法 (抗がん 剤・ホルモン 剤など)	放射線治療	その他	未回答	不詳
総数	124	46	55	32	11	15	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	1	2	1	0	0	0	0
50～54	4	2	1	0	0	2	3	0
55～59	12	2	7	2	0	1	1	0
60～64	17	4	8	3	0	1	0	0
65～69	14	4	9	4	1	2	0	0
70～74	16	7	5	5	3	2	2	0
75～79	14	9	8	7	1	2	1	0
80～84	31	16	13	7	5	3	6	0
85～89	6	1	1	0	1	1	0	0
90歳以上	7	0	1	3	0	1	0	0
男	71	31	27	15	8	10	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	1	0	0	0	0
50～54	3	2	0	0	0	2	3	0
55～59	7	1	1	0	0	1	1	0
60～64	10	2	4	1	0	1	0	0
65～69	8	3	4	2	1	0	0	0
70～74	6	3	3	3	2	2	1	0
75～79	8	6	4	4	1	1	1	0
80～84	23	13	10	3	4	2	4	0
85～89	1	1	0	0	0	1	0	0
90歳以上	4	0	0	1	0	0	0	0
女	53	15	28	17	3	5	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0	0	0	0
50～54	1	0	1	0	0	0	0	0
55～59	5	1	6	2	0	0	0	0
60～64	7	2	4	2	0	0	0	0
65～69	6	1	5	2	0	2	0	0
70～74	10	4	2	2	1	0	1	0
75～79	6	3	4	3	0	1	0	0
80～84	8	3	3	4	1	1	2	0
85～89	5	0	1	0	1	0	0	0
90歳以上	3	0	1	2	0	1	0	0

別表5 5

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）

別

(単位:人)

性 年齢階層	脳卒中・脳出血・くも膜下出血				脳梗塞			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	19	8	9	2	69	53	11	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	1	0	1	0
55 ～ 59	1	1	0	0	4	3	1	0
60 ～ 64	1	0	1	0	4	2	2	0
65 ～ 69	1	0	1	0	8	7	0	1
70 ～ 74	2	0	1	1	10	8	1	1
75 ～ 79	2	1	1	0	10	9	1	0
80 ～ 84	2	1	1	0	12	9	2	1
85 ～ 89	4	2	1	1	12	9	3	0
90 歳 以上	5	2	3	0	6	4	0	2
男	7	2	4	1	32	26	4	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	3	2	1	0
60 ～ 64	1	0	1	0	1	0	1	0
65 ～ 69	0	0	0	0	3	3	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	4	3	0	1
75 ～ 79	1	0	1	0	5	4	1	0
80 ～ 84	1	1	0	0	6	4	1	1
85 ～ 89	1	0	1	0	5	5	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	3	3	0	0
女	12	6	5	1	37	27	7	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	1	0
55 ～ 59	1	1	0	0	1	1	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	3	2	1	0
65 ～ 69	1	0	1	0	5	4	0	1
70 ～ 74	1	0	1	0	6	5	1	0
75 ～ 79	1	1	0	0	5	5	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	6	5	1	0
85 ～ 89	3	2	0	1	7	4	3	0
90 歳 以上	4	2	2	0	3	1	0	2

別表 5 6

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	頭痛				頭重(頭が重い)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	416	150	30	236	202	78	7	117
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	8	1	6	2	1	0	1
45 ～ 49	39	8	4	27	8	2	0	6
50 ～ 54	67	14	5	48	27	4	0	23
55 ～ 59	81	19	7	55	37	11	3	23
60 ～ 64	49	13	6	30	34	8	0	26
65 ～ 69	36	12	0	24	24	8	1	15
70 ～ 74	26	17	1	8	14	7	1	6
75 ～ 79	43	22	4	17	19	13	1	5
80 ～ 84	27	20	0	7	19	14	0	5
85 ～ 89	23	11	1	11	13	7	0	6
90 歳 以上	10	6	1	3	5	3	1	1
男	142	48	6	88	70	24	2	44
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	4	0	3	2	1	0	1
45 ～ 49	16	3	2	11	3	0	0	3
50 ～ 54	33	7	2	24	13	1	0	12
55 ～ 59	23	6	1	16	14	5	1	8
60 ～ 64	12	3	0	9	9	1	0	8
65 ～ 69	14	2	0	12	6	0	0	6
70 ～ 74	11	4	1	6	4	1	1	2
75 ～ 79	9	8	0	1	7	6	0	1
80 ～ 84	6	5	0	1	6	5	0	1
85 ～ 89	10	5	0	5	5	3	0	2
90 歳 以上	1	1	0	0	1	1	0	0
女	274	102	24	148	132	54	5	73
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	8	4	1	3	0	0	0	0
45 ～ 49	23	5	2	16	5	2	0	3
50 ～ 54	34	7	3	24	14	3	0	11
55 ～ 59	58	13	6	39	23	6	2	15
60 ～ 64	37	10	6	21	25	7	0	18
65 ～ 69	22	10	0	12	18	8	1	9
70 ～ 74	15	13	0	2	10	6	0	4
75 ～ 79	34	14	4	16	12	7	1	4
80 ～ 84	21	15	0	6	13	9	0	4
85 ～ 89	13	6	1	6	8	4	0	4
90 歳 以上	9	5	1	3	4	2	1	1

別表 5 7

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	神経痛				知的障害			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	212	115	17	80	10	6	0	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	8	6	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	10	3	2	5	0	0	0	0
50 ～ 54	23	8	2	13	1	0	0	1
55 ～ 59	26	7	3	16	3	2	0	1
60 ～ 64	22	7	2	13	1	1	0	0
65 ～ 69	18	10	3	5	0	0	0	0
70 ～ 74	20	13	1	6	2	0	0	2
75 ～ 79	34	24	2	8	2	2	0	0
80 ～ 84	20	15	0	5	1	1	0	0
85 ～ 89	20	14	1	5	0	0	0	0
90 歳 以上	11	8	0	3	0	0	0	0
男	82	40	6	36	4	2	0	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	4	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	7	1	1	5	0	0	0	0
50 ～ 54	14	6	1	7	1	0	0	1
55 ～ 59	14	5	2	7	1	1	0	0
60 ～ 64	8	2	0	6	0	0	0	0
65 ～ 69	8	3	1	4	0	0	0	0
70 ～ 74	7	4	1	2	1	0	0	1
75 ～ 79	9	7	0	2	1	1	0	0
80 ～ 84	3	2	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	5	4	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	2	2	0	0	0	0	0	0
女	130	75	11	44	6	4	0	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	2	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	3	2	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	9	2	1	6	0	0	0	0
55 ～ 59	12	2	1	9	2	1	0	1
60 ～ 64	14	5	2	7	1	1	0	0
65 ～ 69	10	7	2	1	0	0	0	0
70 ～ 74	13	9	0	4	1	0	0	1
75 ～ 79	25	17	2	6	1	1	0	0
80 ～ 84	17	13	0	4	1	1	0	0
85 ～ 89	15	10	1	4	0	0	0	0
90 歳 以上	9	6	0	3	0	0	0	0

別表 5 8

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	躁うつ病				統合失調症			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	62	38	12	12	23	15	3	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	6	3	3	0	3	0	2	1
50 ～ 54	11	7	1	3	1	1	0	0
55 ～ 59	11	6	2	3	6	4	1	1
60 ～ 64	3	2	1	0	2	2	0	0
65 ～ 69	7	5	0	2	2	2	0	0
70 ～ 74	7	5	0	2	2	0	0	2
75 ～ 79	9	5	3	1	3	2	0	1
80 ～ 84	3	1	1	1	1	1	0	0
85 ～ 89	3	3	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	2	2	0	0
男	23	9	7	7	10	7	2	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	3	0	1	0	1	0
50 ～ 54	5	3	0	2	0	0	0	0
55 ～ 59	6	3	2	1	4	3	1	0
60 ～ 64	1	1	0	0	1	1	0	0
65 ～ 69	2	0	0	2	2	2	0	0
70 ～ 74	2	1	0	1	1	0	0	1
75 ～ 79	2	0	2	0	1	1	0	0
80 ～ 84	1	0	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	39	29	5	5	13	8	1	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	2	2	0	0	2	0	1	1
50 ～ 54	6	4	1	1	1	1	0	0
55 ～ 59	5	3	0	2	2	1	0	1
60 ～ 64	2	1	1	0	1	1	0	0
65 ～ 69	5	5	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	5	4	0	1	1	0	0	1
75 ～ 79	7	5	1	1	2	1	0	1
80 ～ 84	2	1	1	0	1	1	0	0
85 ～ 89	3	3	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	2	2	0	0

別表 5 9

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	幻覚				認知症			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	27	14	0	13	78	52	2	24
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	3	2	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	3	2	0	1	2	0	0	2
65 ～ 69	1	1	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	4	0	0	4	7	4	0	3
75 ～ 79	2	2	0	0	13	9	1	3
80 ～ 84	5	3	0	2	18	15	0	3
85 ～ 89	5	2	0	3	25	18	1	6
90 歳 以上	3	2	0	1	10	6	0	4
男	10	6	0	4	25	18	1	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	2	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	2	1	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	2	0	0	2	4	2	0	2
75 ～ 79	1	1	0	0	5	3	1	1
80 ～ 84	1	1	0	0	8	7	0	1
85 ～ 89	1	0	0	1	7	6	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	17	8	0	9	53	34	1	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	1	0	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	1	1	0	0	2	0	0	2
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	2	0	0	2	3	2	0	1
75 ～ 79	1	1	0	0	8	6	0	2
80 ～ 84	4	2	0	2	10	8	0	2
85 ～ 89	4	2	0	2	18	12	1	5
90 歳 以上	3	2	0	1	9	6	0	3

別表 6 0

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	もの忘れ				かっとなりやすい・短気			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	310	93	2	215	152	38	1	113
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	4	2	0	2
45 ～ 49	6	1	0	5	12	3	0	9
50 ～ 54	37	7	0	30	16	5	1	10
55 ～ 59	42	7	1	34	32	4	0	28
60 ～ 64	32	3	0	29	15	1	0	14
65 ～ 69	21	3	0	18	14	3	0	11
70 ～ 74	34	12	0	22	18	4	0	14
75 ～ 79	42	19	0	23	17	6	0	11
80 ～ 84	42	20	1	21	15	7	0	8
85 ～ 89	35	13	0	22	6	1	0	5
90 歳 以上	15	7	0	8	3	2	0	1
男	133	30	0	103	86	17	1	68
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	1	0	1
45 ～ 49	2	0	0	2	7	0	0	7
50 ～ 54	21	5	0	16	10	3	1	6
55 ～ 59	25	4	0	21	20	4	0	16
60 ～ 64	16	1	0	15	8	1	0	7
65 ～ 69	9	0	0	9	8	1	0	7
70 ～ 74	16	4	0	12	8	1	0	7
75 ～ 79	14	7	0	7	13	4	0	9
80 ～ 84	15	5	0	10	7	2	0	5
85 ～ 89	12	4	0	8	2	0	0	2
90 歳 以上	2	0	0	2	1	0	0	1
女	177	63	2	112	66	21	0	45
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	2	1	0	1
45 ～ 49	4	1	0	3	5	3	0	2
50 ～ 54	16	2	0	14	6	2	0	4
55 ～ 59	17	3	1	13	12	0	0	12
60 ～ 64	16	2	0	14	7	0	0	7
65 ～ 69	12	3	0	9	6	2	0	4
70 ～ 74	18	8	0	10	10	3	0	7
75 ～ 79	28	12	0	16	4	2	0	2
80 ～ 84	27	15	1	11	8	5	0	3
85 ～ 89	23	9	0	14	4	1	0	3
90 歳 以上	13	7	0	6	2	2	0	0

別表 6 1

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）

別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				病気・症状は特にない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	40	25	5	10	448	448	249	249	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	3	2	0	1	15	15	3	3	0	0
45 ～ 49	5	2	0	3	51	51	18	18	0	0
50 ～ 54	4	2	1	1	93	93	37	37	0	0
55 ～ 59	6	3	0	3	77	77	32	32	0	0
60 ～ 64	9	6	2	1	76	76	32	32	0	0
65 ～ 69	4	3	1	0	42	42	25	25	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	28	28	24	24	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	17	17	34	34	0	0
80 ～ 84	2	1	1	0	23	23	26	26	0	0
85 ～ 89	4	4	0	0	21	21	11	11	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	3	3	6	6	0	0
男	16	10	4	2	246	246	134	134	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	11	11	2	2	0	0
45 ～ 49	2	1	0	1	29	29	8	8	0	0
50 ～ 54	2	1	1	0	51	51	16	16	0	0
55 ～ 59	3	2	0	1	46	46	16	16	0	0
60 ～ 64	4	3	1	0	38	38	22	22	0	0
65 ～ 69	2	1	1	0	24	24	9	9	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	14	14	12	12	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	5	5	23	23	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	15	15	16	16	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	10	10	6	6	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0
女	24	15	1	8	202	202	115	115	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	3	2	0	1	4	4	1	1	0	0
45 ～ 49	3	1	0	2	22	22	10	10	0	0
50 ～ 54	2	1	0	1	42	42	21	21	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	31	31	16	16	0	0
60 ～ 64	5	3	1	1	38	38	10	10	0	0
65 ～ 69	2	2	0	0	18	18	16	16	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	14	14	12	12	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	12	12	11	11	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	8	8	10	10	0	0
85 ～ 89	3	3	0	0	11	11	5	5	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	1	1	3	3	0	0

別表 6 2

自律神経系の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	起立性低血圧				過敏性腸症候群			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	144	32	9	103	135	53	14	68
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	6	0	1	5
45 ～ 49	12	3	0	9	11	3	2	6
50 ～ 54	21	3	2	16	8	2	2	4
55 ～ 59	23	4	0	19	22	8	1	13
60 ～ 64	24	1	2	21	18	4	0	14
65 ～ 69	17	4	2	11	21	9	2	10
70 ～ 74	9	4	0	5	14	6	2	6
75 ～ 79	10	3	1	6	8	5	3	0
80 ～ 84	12	5	1	6	11	8	1	2
85 ～ 89	7	1	1	5	13	7	0	6
90 歳 以上	5	3	0	2	3	1	0	2
男	55	11	3	41	59	16	4	39
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	3	0	0	3
45 ～ 49	7	2	0	5	6	0	2	4
50 ～ 54	7	0	1	6	4	1	0	3
55 ～ 59	11	3	0	8	13	2	1	10
60 ～ 64	8	0	0	8	7	1	0	6
65 ～ 69	5	1	0	4	10	3	0	7
70 ～ 74	5	2	0	3	6	2	1	3
75 ～ 79	1	1	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	4	1	1	2	5	3	0	2
85 ～ 89	4	0	1	3	3	3	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	1	0	0	1
女	89	21	6	62	76	37	10	29
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	3	0	1	2
45 ～ 49	5	1	0	4	5	3	0	2
50 ～ 54	14	3	1	10	4	1	2	1
55 ～ 59	12	1	0	11	9	6	0	3
60 ～ 64	16	1	2	13	11	3	0	8
65 ～ 69	12	3	2	7	11	6	2	3
70 ～ 74	4	2	0	2	8	4	1	3
75 ～ 79	9	2	1	6	7	4	3	0
80 ～ 84	8	4	0	4	6	5	1	0
85 ～ 89	3	1	0	2	10	4	0	6
90 歳 以上	4	2	0	2	2	1	0	1

別表 6 3

自律神経系の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	多汗症				汗が出にくい			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	62	13	1	48	53	15	1	37
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	2	1	0	1
45 ～ 49	5	2	1	2	3	0	1	2
50 ～ 54	15	2	0	13	6	0	0	6
55 ～ 59	9	1	0	8	7	2	0	5
60 ～ 64	5	0	0	5	6	0	0	6
65 ～ 69	4	0	0	4	9	2	0	7
70 ～ 74	3	1	0	2	7	4	0	3
75 ～ 79	6	1	0	5	3	1	0	2
80 ～ 84	10	6	0	4	5	4	0	1
85 ～ 89	2	0	0	2	3	1	0	2
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	0	2
男	25	5	1	19	14	5	0	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	7	2	0	5	2	0	0	2
55 ～ 59	3	0	0	3	3	1	0	2
60 ～ 64	1	0	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	2	3	1	0	2
70 ～ 74	1	0	0	1	1	1	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	1	0	0	1
80 ～ 84	4	2	0	2	3	2	0	1
85 ～ 89	2	0	0	2	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	37	8	0	29	39	10	1	28
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	1	0	1
45 ～ 49	4	2	0	2	3	0	1	2
50 ～ 54	8	0	0	8	4	0	0	4
55 ～ 59	6	1	0	5	4	1	0	3
60 ～ 64	4	0	0	4	6	0	0	6
65 ～ 69	2	0	0	2	6	1	0	5
70 ～ 74	2	1	0	1	6	3	0	3
75 ～ 79	5	0	0	5	2	1	0	1
80 ～ 84	6	4	0	2	2	2	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	3	1	0	2
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1

別表 6 4

自律神経系の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不眠				不安神経症			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	331	180	14	137	86	48	5	33
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	0	4	0	0	0	0
45 ～ 49	19	12	1	6	8	4	0	4
50 ～ 54	49	18	4	27	18	7	2	9
55 ～ 59	50	18	4	28	13	6	1	6
60 ～ 64	39	17	0	22	11	8	0	3
65 ～ 69	37	22	1	14	11	8	0	3
70 ～ 74	34	21	2	11	4	3	0	1
75 ～ 79	32	25	1	6	7	4	0	3
80 ～ 84	31	22	1	8	7	3	1	3
85 ～ 89	28	21	0	7	4	3	0	1
90 歳 以上	7	4	0	3	3	2	1	0
男	114	50	5	59	25	14	1	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	5	4	0	1	2	0	0	2
50 ～ 54	21	7	2	12	4	1	0	3
55 ～ 59	26	6	2	18	7	4	1	2
60 ～ 64	14	6	0	8	4	4	0	0
65 ～ 69	13	6	1	6	3	2	0	1
70 ～ 74	10	6	0	4	1	1	0	0
75 ～ 79	7	4	0	3	2	1	0	1
80 ～ 84	12	7	0	5	2	1	0	1
85 ～ 89	4	4	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	217	130	9	78	61	34	4	23
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	0	0	0	0
45 ～ 49	14	8	1	5	6	4	0	2
50 ～ 54	28	11	2	15	14	6	2	6
55 ～ 59	24	12	2	10	6	2	0	4
60 ～ 64	25	11	0	14	7	4	0	3
65 ～ 69	24	16	0	8	8	6	0	2
70 ～ 74	24	15	2	7	3	2	0	1
75 ～ 79	25	21	1	3	5	3	0	2
80 ～ 84	19	15	1	3	5	2	1	2
85 ～ 89	24	17	0	7	4	3	0	1
90 歳 以上	7	4	0	3	3	2	1	0

別表 6 5

自律神経系の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	自律神経失調症				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	160	62	23	75	23	7	2	14
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	0	3	3	1	0	2
45 ～ 49	13	5	3	5	1	0	0	1
50 ～ 54	28	7	3	18	2	1	0	1
55 ～ 59	23	4	4	15	4	2	0	2
60 ～ 64	22	5	5	12	3	0	1	2
65 ～ 69	20	9	3	8	5	0	1	4
70 ～ 74	15	8	3	4	1	1	0	0
75 ～ 79	15	10	1	4	1	1	0	0
80 ～ 84	12	9	0	3	0	0	0	0
85 ～ 89	6	3	1	2	1	0	0	1
90 歳 以上	2	1	0	1	2	1	0	1
男	48	18	5	25	6	2	0	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	1	2	0	0	0	0
50 ～ 54	7	1	0	6	1	0	0	1
55 ～ 59	10	2	2	6	2	1	0	1
60 ～ 64	4	1	1	2	0	0	0	0
65 ～ 69	9	4	1	4	2	0	0	2
70 ～ 74	3	1	0	2	1	1	0	0
75 ～ 79	4	4	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	5	3	0	2	0	0	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	112	44	18	50	17	5	2	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	3	1	0	2
45 ～ 49	9	4	2	3	1	0	0	1
50 ～ 54	21	6	3	12	1	1	0	0
55 ～ 59	13	2	2	9	2	1	0	1
60 ～ 64	18	4	4	10	3	0	1	2
65 ～ 69	11	5	2	4	3	0	1	2
70 ～ 74	12	7	3	2	0	0	0	0
75 ～ 79	11	6	1	4	1	1	0	0
80 ～ 84	7	6	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	5	2	1	2	1	0	0	1
90 歳 以上	2	1	0	1	2	1	0	1

別表 6 6

自律神経系の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	844	844	565	565	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	2	2	0	0
40 ～ 44	24	24	19	19	0	0
45 ～ 49	83	83	62	62	0	0
50 ～ 54	142	142	107	107	0	0
55 ～ 59	134	134	99	99	0	0
60 ～ 64	120	120	89	89	0	0
65 ～ 69	67	67	48	48	0	0
70 ～ 74	61	61	30	30	0	0
75 ～ 79	80	80	35	35	0	0
80 ～ 84	60	60	33	33	0	0
85 ～ 89	52	52	31	31	0	0
90 歳 以上	18	18	10	10	0	0
男	465	465	312	312	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	17	17	13	13	0	0
45 ～ 49	45	45	33	33	0	0
50 ～ 54	86	86	68	68	0	0
55 ～ 59	70	70	54	54	0	0
60 ～ 64	68	68	47	47	0	0
65 ～ 69	38	38	29	29	0	0
70 ～ 74	30	30	17	17	0	0
75 ～ 79	44	44	14	14	0	0
80 ～ 84	32	32	19	19	0	0
85 ～ 89	25	25	12	12	0	0
90 歳 以上	8	8	5	5	0	0
女	379	379	253	253	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	7	7	6	6	0	0
45 ～ 49	38	38	29	29	0	0
50 ～ 54	56	56	39	39	0	0
55 ～ 59	64	64	45	45	0	0
60 ～ 64	52	52	42	42	0	0
65 ～ 69	29	29	19	19	0	0
70 ～ 74	31	31	13	13	0	0
75 ～ 79	36	36	21	21	0	0
80 ～ 84	28	28	14	14	0	0
85 ～ 89	27	27	19	19	0	0
90 歳 以上	10	10	5	5	0	0

別表 6 7

眼の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	眼脂過多(めやにが多い)				瞼板線(まつげの根本)からのチーズ様分泌物			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	287	105	12	170	59	22	4	33
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	0	3	1	0	0	1
45 ～ 49	15	1	2	12	2	0	0	2
50 ～ 54	33	8	3	22	6	3	0	3
55 ～ 59	43	11	0	32	6	1	0	5
60 ～ 64	36	8	0	28	6	1	0	5
65 ～ 69	28	7	1	20	12	4	1	7
70 ～ 74	24	10	1	13	5	1	0	4
75 ～ 79	38	22	4	12	8	4	2	2
80 ～ 84	35	20	0	15	7	4	0	3
85 ～ 89	22	13	1	8	4	3	1	0
90 歳 以上	8	4	0	4	2	1	0	1
男	140	43	5	92	25	4	1	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	1	0	0	1
45 ～ 49	9	1	0	8	2	0	0	2
50 ～ 54	19	4	2	13	2	0	0	2
55 ～ 59	30	7	0	23	4	0	0	4
60 ～ 64	16	4	0	12	4	0	0	4
65 ～ 69	15	3	0	12	6	2	1	3
70 ～ 74	11	3	0	8	1	0	0	1
75 ～ 79	15	7	3	5	1	0	0	1
80 ～ 84	14	7	0	7	2	1	0	1
85 ～ 89	7	6	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	2	1	0	1
女	147	62	7	78	34	18	3	13
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	6	0	2	4	0	0	0	0
50 ～ 54	14	4	1	9	4	3	0	1
55 ～ 59	13	4	0	9	2	1	0	1
60 ～ 64	20	4	0	16	2	1	0	1
65 ～ 69	13	4	1	8	6	2	0	4
70 ～ 74	13	7	1	5	4	1	0	3
75 ～ 79	23	15	1	7	7	4	2	1
80 ～ 84	21	13	0	8	5	3	0	2
85 ～ 89	15	7	1	7	4	3	1	0
90 歳 以上	7	4	0	3	0	0	0	0

別表 6 8

眼の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	結膜(白目)の色素沈着				白内障			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	36	13	2	21	300	162	77	61
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	2	0	1	1
45 ～ 49	7	2	2	3	2	2	0	0
50 ～ 54	3	1	0	2	3	2	0	1
55 ～ 59	9	3	0	6	16	7	3	6
60 ～ 64	7	1	0	6	19	7	5	7
65 ～ 69	3	0	0	3	25	13	5	7
70 ～ 74	0	0	0	0	39	22	10	7
75 ～ 79	5	5	0	0	64	38	16	10
80 ～ 84	0	0	0	0	61	35	16	10
85 ～ 89	1	1	0	0	49	27	14	8
90歳以上	0	0	0	0	20	9	7	4
男	16	5	0	11	105	54	31	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	2	0	1	1
45 ～ 49	3	1	0	2	1	1	0	0
50 ～ 54	2	0	0	2	2	2	0	0
55 ～ 59	5	2	0	3	9	5	1	3
60 ～ 64	2	0	0	2	9	3	3	3
65 ～ 69	1	0	0	1	5	3	0	2
70 ～ 74	0	0	0	0	12	6	4	2
75 ～ 79	2	2	0	0	20	9	9	2
80 ～ 84	0	0	0	0	23	15	5	3
85 ～ 89	0	0	0	0	15	7	6	2
90歳以上	0	0	0	0	7	3	2	2
女	20	8	2	10	195	108	46	41
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	2	1	1	1	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	4	1	0	3	7	2	2	3
60 ～ 64	5	1	0	4	10	4	2	4
65 ～ 69	2	0	0	2	20	10	5	5
70 ～ 74	0	0	0	0	27	16	6	5
75 ～ 79	3	3	0	0	44	29	7	8
80 ～ 84	0	0	0	0	38	20	11	7
85 ～ 89	1	1	0	0	34	20	8	6
90歳以上	0	0	0	0	13	6	5	2

別表 6 9

眼の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	緑内障				近視			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	61	40	5	16	340	74	19	247
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	9	1	0	8
45 ～ 49	0	0	0	0	45	11	4	30
50 ～ 54	3	3	0	0	78	17	3	58
55 ～ 59	8	2	2	4	75	8	3	64
60 ～ 64	3	0	1	2	45	7	3	35
65 ～ 69	7	3	0	4	27	6	0	21
70 ～ 74	6	6	0	0	22	7	2	13
75 ～ 79	13	12	0	1	13	4	1	8
80 ～ 84	8	7	1	0	11	5	1	5
85 ～ 89	12	7	1	4	12	6	2	4
90 歳 以上	1	0	0	1	2	1	0	1
男	21	16	1	4	170	29	7	134
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	7	1	0	6
45 ～ 49	0	0	0	0	24	6	1	17
50 ～ 54	1	1	0	0	40	6	1	33
55 ～ 59	6	2	1	3	42	3	0	39
60 ～ 64	1	0	0	1	22	3	1	18
65 ～ 69	1	1	0	0	12	2	0	10
70 ～ 74	3	3	0	0	6	2	1	3
75 ～ 79	3	3	0	0	7	2	1	4
80 ～ 84	5	5	0	0	6	2	1	3
85 ～ 89	1	1	0	0	3	1	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	40	24	4	12	170	45	12	113
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	0	0	2
45 ～ 49	0	0	0	0	21	5	3	13
50 ～ 54	2	2	0	0	38	11	2	25
55 ～ 59	2	0	1	1	33	5	3	25
60 ～ 64	2	0	1	1	23	4	2	17
65 ～ 69	6	2	0	4	15	4	0	11
70 ～ 74	3	3	0	0	16	5	1	10
75 ～ 79	10	9	0	1	6	2	0	4
80 ～ 84	3	2	1	0	5	3	0	2
85 ～ 89	11	6	1	4	9	5	1	3
90 歳 以上	1	0	0	1	2	1	0	1

別表 7 0

眼の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	遠視				乱視			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	228	45	8	175	327	74	16	237
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	2	1	0	1
40 ～ 44	1	0	0	1	9	1	0	8
45 ～ 49	16	2	1	13	31	4	2	25
50 ～ 54	35	3	2	30	52	6	1	45
55 ～ 59	45	5	0	40	63	10	2	51
60 ～ 64	37	1	2	34	51	5	4	42
65 ～ 69	30	7	1	22	35	7	0	28
70 ～ 74	16	6	0	10	25	11	1	13
75 ～ 79	16	8	1	7	21	8	4	9
80 ～ 84	21	8	1	12	24	13	1	10
85 ～ 89	8	3	0	5	11	5	1	5
90 歳 以上	2	1	0	1	3	3	0	0
男	109	15	2	92	171	26	8	137
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	8	1	0	7
45 ～ 49	8	1	0	7	19	1	1	17
50 ～ 54	21	1	1	19	31	3	1	27
55 ～ 59	23	1	0	22	32	4	0	28
60 ～ 64	17	0	0	17	27	2	1	24
65 ～ 69	15	2	0	13	18	2	0	16
70 ～ 74	6	2	0	4	6	2	0	4
75 ～ 79	5	2	0	3	12	2	3	7
80 ～ 84	10	4	1	5	11	5	1	5
85 ～ 89	2	1	0	1	6	3	1	2
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	119	30	6	83	156	48	8	100
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	8	1	1	6	12	3	1	8
50 ～ 54	14	2	1	11	21	3	0	18
55 ～ 59	22	4	0	18	31	6	2	23
60 ～ 64	20	1	2	17	24	3	3	18
65 ～ 69	15	5	1	9	17	5	0	12
70 ～ 74	10	4	0	6	19	9	1	9
75 ～ 79	11	6	1	4	9	6	1	2
80 ～ 84	11	4	0	7	13	8	0	5
85 ～ 89	6	2	0	4	5	2	0	3
90 歳 以上	2	1	0	1	3	3	0	0

別表 7 1

眼の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	弱視				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	34	14	1	19	143	67	17	59
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	2	1	2
45 ～ 49	1	1	0	0	14	4	1	9
50 ～ 54	5	1	0	4	27	8	4	15
55 ～ 59	3	0	1	2	22	11	2	9
60 ～ 64	1	0	0	1	22	5	4	13
65 ～ 69	4	2	0	2	17	8	4	5
70 ～ 74	5	4	0	1	7	7	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	10	9	0	1
80 ～ 84	6	3	0	3	9	6	0	3
85 ～ 89	3	1	0	2	6	5	0	1
90 歳 以上	5	2	0	3	4	2	1	1
男	16	8	0	8	59	24	8	27
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	4	0	1	3
50 ～ 54	3	1	0	2	11	4	3	4
55 ～ 59	2	0	0	2	10	2	1	7
60 ～ 64	0	0	0	0	12	4	1	7
65 ～ 69	3	1	0	2	9	4	1	4
70 ～ 74	3	3	0	0	2	2	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	2	2	0	0
80 ～ 84	2	2	0	0	4	3	0	1
85 ～ 89	2	1	0	1	3	3	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	2	0	1	1
女	18	6	1	11	84	43	9	32
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	2	1	2
45 ～ 49	1	1	0	0	10	4	0	6
50 ～ 54	2	0	0	2	16	4	1	11
55 ～ 59	1	0	1	0	12	9	1	2
60 ～ 64	1	0	0	1	10	1	3	6
65 ～ 69	1	1	0	0	8	4	3	1
70 ～ 74	2	1	0	1	5	5	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	8	7	0	1
80 ～ 84	4	1	0	3	5	3	0	2
85 ～ 89	1	0	0	1	3	2	0	1
90 歳 以上	4	2	0	2	2	2	0	0

別表 7 2

眼の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	320	320	188	188	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	14	14	7	7	0	0
45 ～ 49	35	35	16	16	0	0
50 ～ 54	72	72	22	22	0	0
55 ～ 59	61	61	26	26	0	0
60 ～ 64	53	53	20	20	0	0
65 ～ 69	25	25	19	19	0	0
70 ～ 74	18	18	18	18	0	0
75 ～ 79	7	7	24	24	0	0
80 ～ 84	10	10	18	18	0	0
85 ～ 89	17	17	14	14	0	0
90 歳 以上	7	7	3	3	0	0
男	161	161	104	104	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	7	7	4	4	0	0
45 ～ 49	20	20	7	7	0	0
50 ～ 54	36	36	11	11	0	0
55 ～ 59	34	34	11	11	0	0
60 ～ 64	27	27	12	12	0	0
65 ～ 69	12	12	8	8	0	0
70 ～ 74	10	10	12	12	0	0
75 ～ 79	2	2	18	18	0	0
80 ～ 84	7	7	10	10	0	0
85 ～ 89	5	5	9	9	0	0
90 歳 以上	0	0	1	1	0	0
女	159	159	84	84	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	7	3	3	0	0
45 ～ 49	15	15	9	9	0	0
50 ～ 54	36	36	11	11	0	0
55 ～ 59	27	27	15	15	0	0
60 ～ 64	26	26	8	8	0	0
65 ～ 69	13	13	11	11	0	0
70 ～ 74	8	8	6	6	0	0
75 ～ 79	5	5	6	6	0	0
80 ～ 84	3	3	8	8	0	0
85 ～ 89	12	12	5	5	0	0
90 歳 以上	7	7	2	2	0	0

別表 7 3

口の中の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯肉の色素沈着(歯茎が黒い)				歯牙形成不全(子どもの時に歯が生えなかった)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	121	26	4	91	8	2	2	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	8	1	0	7	0	0	0	0
45 ～ 49	10	1	1	8	3	0	2	1
50 ～ 54	20	5	0	15	3	2	0	1
55 ～ 59	20	2	0	18	1	0	0	1
60 ～ 64	20	2	0	18	1	0	0	1
65 ～ 69	12	1	0	11	0	0	0	0
70 ～ 74	9	5	0	4	0	0	0	0
75 ～ 79	10	2	3	5	0	0	0	0
80 ～ 84	8	5	0	3	0	0	0	0
85 ～ 89	4	2	0	2	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	53	8	2	43	6	1	1	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	0	4	0	0	0	0
45 ～ 49	4	0	0	4	2	0	1	1
50 ～ 54	9	1	0	8	2	1	0	1
55 ～ 59	13	2	0	11	1	0	0	1
60 ～ 64	6	0	0	6	1	0	0	1
65 ～ 69	5	1	0	4	0	0	0	0
70 ～ 74	2	0	0	2	0	0	0	0
75 ～ 79	6	1	2	3	0	0	0	0
80 ～ 84	3	2	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	68	18	2	48	2	1	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	0	3	0	0	0	0
45 ～ 49	6	1	1	4	1	0	1	0
50 ～ 54	11	4	0	7	1	1	0	0
55 ～ 59	7	0	0	7	0	0	0	0
60 ～ 64	14	2	0	12	0	0	0	0
65 ～ 69	7	0	0	7	0	0	0	0
70 ～ 74	7	5	0	2	0	0	0	0
75 ～ 79	4	1	1	2	0	0	0	0
80 ～ 84	5	3	0	2	0	0	0	0
85 ～ 89	3	1	0	2	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 4

口の中の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯周病(歯槽膿漏)				歯肉炎(歯ぐきの病気)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	446	208	55	183	241	106	30	105
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	12	5	1	6	6	1	2	3
45 ～ 49	27	8	4	15	14	3	5	6
50 ～ 54	74	32	7	35	36	12	4	20
55 ～ 59	79	32	5	42	47	12	6	29
60 ～ 64	67	34	10	23	40	14	5	21
65 ～ 69	50	16	12	22	22	11	1	10
70 ～ 74	37	23	5	9	17	13	0	4
75 ～ 79	44	26	7	11	22	18	2	2
80 ～ 84	25	15	1	9	17	10	1	6
85 ～ 89	24	15	1	8	14	10	2	2
90歳以上	7	2	2	3	5	1	2	2
男	207	90	22	95	106	43	13	50
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	8	3	1	4	3	1	0	2
45 ～ 49	13	6	1	6	8	3	3	2
50 ～ 54	37	15	3	19	17	4	2	11
55 ～ 59	44	12	3	29	24	5	3	16
60 ～ 64	27	14	3	10	21	9	3	9
65 ～ 69	25	8	5	12	11	4	1	6
70 ～ 74	11	7	1	3	5	2	0	3
75 ～ 79	21	12	4	5	7	6	1	0
80 ～ 84	11	7	0	4	4	3	0	1
85 ～ 89	9	6	1	2	5	5	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0	0
女	239	118	33	88	135	63	17	55
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	2	0	2	3	0	2	1
45 ～ 49	14	2	3	9	6	0	2	4
50 ～ 54	37	17	4	16	19	8	2	9
55 ～ 59	35	20	2	13	23	7	3	13
60 ～ 64	40	20	7	13	19	5	2	12
65 ～ 69	25	8	7	10	11	7	0	4
70 ～ 74	26	16	4	6	12	11	0	1
75 ～ 79	23	14	3	6	15	12	1	2
80 ～ 84	14	8	1	5	13	7	1	5
85 ～ 89	15	9	0	6	9	5	2	2
90歳以上	6	2	2	2	5	1	2	2

別表 7 5

口の中の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	顎関節症(あご関節の異常)				味覚異常			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	72	15	10	47	46	13	5	28
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	0	0	5	1	0	0	1
45 ～ 49	9	2	1	6	3	0	1	2
50 ～ 54	14	2	2	10	1	0	0	1
55 ～ 59	10	1	0	9	7	0	0	7
60 ～ 64	12	1	4	7	4	0	2	2
65 ～ 69	5	2	0	3	7	2	0	5
70 ～ 74	4	2	0	2	5	0	0	5
75 ～ 79	5	2	2	1	7	5	1	1
80 ～ 84	5	2	0	3	6	4	0	2
85 ～ 89	3	1	1	1	3	1	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	0	1
男	26	3	2	21	17	5	2	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	1	1	2	0	1	1
50 ～ 54	7	0	0	7	1	0	0	1
55 ～ 59	5	1	0	4	3	0	0	3
60 ～ 64	4	0	1	3	0	0	0	0
65 ～ 69	1	0	0	1	4	0	0	4
70 ～ 74	2	1	0	1	1	0	0	1
75 ～ 79	1	0	0	1	2	2	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	3	3	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	46	12	8	26	29	8	3	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	1	0	0	1
45 ～ 49	7	2	0	5	1	0	0	1
50 ～ 54	7	2	2	3	0	0	0	0
55 ～ 59	5	0	0	5	4	0	0	4
60 ～ 64	8	1	3	4	4	0	2	2
65 ～ 69	4	2	0	2	3	2	0	1
70 ～ 74	2	1	0	1	4	0	0	4
75 ～ 79	4	2	2	0	5	3	1	1
80 ～ 84	5	2	0	3	3	1	0	2
85 ～ 89	2	0	1	1	2	1	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	0	1

別表 7 6

口の中の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	口内炎になりやすい				虫歯になりやすい			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	365	124	24	217	406	174	77	155
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	1	0	1	0
40 ～ 44	11	1	0	10	17	6	2	9
45 ～ 49	33	10	4	19	37	16	8	13
50 ～ 54	48	11	3	34	86	31	22	33
55 ～ 59	56	8	2	46	74	21	16	37
60 ～ 64	55	11	3	41	73	27	17	29
65 ～ 69	30	10	1	19	37	18	4	15
70 ～ 74	36	19	3	14	23	17	1	5
75 ～ 79	43	26	3	14	30	22	3	5
80 ～ 84	36	21	2	13	16	10	1	5
85 ～ 89	10	3	1	6	9	6	1	2
90 歳 以上	6	3	2	1	3	0	1	2
男	145	40	7	98	193	68	33	92
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	6	0	0	6	11	3	1	7
45 ～ 49	17	6	2	9	23	10	3	10
50 ～ 54	21	5	1	15	46	16	13	17
55 ～ 59	31	2	0	29	36	6	6	24
60 ～ 64	20	5	0	15	29	9	6	14
65 ～ 69	13	3	0	10	18	6	2	10
70 ～ 74	9	2	2	5	7	3	1	3
75 ～ 79	15	9	1	5	14	10	1	3
80 ～ 84	11	7	1	3	4	2	0	2
85 ～ 89	1	0	0	1	4	3	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	220	84	17	119	213	106	44	63
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	1	0
40 ～ 44	5	1	0	4	6	3	1	2
45 ～ 49	16	4	2	10	14	6	5	3
50 ～ 54	27	6	2	19	40	15	9	16
55 ～ 59	25	6	2	17	38	15	10	13
60 ～ 64	35	6	3	26	44	18	11	15
65 ～ 69	17	7	1	9	19	12	2	5
70 ～ 74	27	17	1	9	16	14	0	2
75 ～ 79	28	17	2	9	16	12	2	2
80 ～ 84	25	14	1	10	12	8	1	3
85 ～ 89	9	3	1	5	5	3	1	1
90 歳 以上	6	3	2	1	2	0	1	1

別表 7 7

口の中の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯の知覚過敏(歯がしみる)				永久歯(全歯)を早期に失った			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	290	102	25	163	136	63	33	40
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	10	2	0	8	3	2	0	1
45 ～ 49	29	7	6	16	1	1	0	0
50 ～ 54	58	20	7	31	18	9	4	5
55 ～ 59	60	13	4	43	16	5	4	7
60 ～ 64	51	14	5	32	13	6	4	3
65 ～ 69	26	11	1	14	19	7	7	5
70 ～ 74	19	14	0	5	16	4	7	5
75 ～ 79	13	9	0	4	16	10	4	2
80 ～ 84	14	7	0	7	19	10	1	8
85 ～ 89	6	3	1	2	11	7	0	4
90 歳 以上	4	2	1	1	4	2	2	0
男	116	29	8	79	68	28	18	22
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	0	0	5	2	1	0	1
45 ～ 49	14	3	2	9	1	1	0	0
50 ～ 54	22	6	3	13	9	4	1	4
55 ～ 59	29	4	2	23	10	3	2	5
60 ～ 64	19	6	1	12	9	4	3	2
65 ～ 69	10	2	0	8	13	3	5	5
70 ～ 74	3	2	0	1	7	1	4	2
75 ～ 79	7	3	0	4	7	4	2	1
80 ～ 84	3	1	0	2	6	4	0	2
85 ～ 89	3	2	0	1	3	3	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	1	0	1	0
女	174	73	17	84	68	35	15	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	2	0	3	1	1	0	0
45 ～ 49	15	4	4	7	0	0	0	0
50 ～ 54	36	14	4	18	9	5	3	1
55 ～ 59	31	9	2	20	6	2	2	2
60 ～ 64	32	8	4	20	4	2	1	1
65 ～ 69	16	9	1	6	6	4	2	0
70 ～ 74	16	12	0	4	9	3	3	3
75 ～ 79	6	6	0	0	9	6	2	1
80 ～ 84	11	6	0	5	13	6	1	6
85 ～ 89	3	1	1	1	8	4	0	4
90 歳 以上	3	2	1	0	3	2	1	0

別表 7 8

口の中の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				病気・症状は特にない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	53	28	8	17	306	306	190	190	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	6	6	4	4	0	0
45 ～ 49	3	1	0	2	26	26	13	13	0	0
50 ～ 54	11	4	2	5	51	51	20	20	0	0
55 ～ 59	9	3	3	3	54	54	22	22	0	0
60 ～ 64	5	4	0	1	39	39	19	19	0	0
65 ～ 69	6	3	0	3	20	20	19	19	0	0
70 ～ 74	3	3	0	0	19	19	21	21	0	0
75 ～ 79	5	4	0	1	22	22	25	25	0	0
80 ～ 84	3	1	2	0	28	28	21	21	0	0
85 ～ 89	4	3	1	0	30	30	19	19	0	0
90 歳 以上	3	2	0	1	11	11	6	6	0	0
男	24	15	3	6	156	156	107	107	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	4	4	2	2	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	14	14	4	4	0	0
50 ～ 54	4	3	0	1	30	30	9	9	0	0
55 ～ 59	3	0	1	2	30	30	11	11	0	0
60 ～ 64	3	3	0	0	23	23	13	13	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	12	12	8	8	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	9	9	17	17	0	0
75 ～ 79	3	2	0	1	4	4	16	16	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	17	17	13	13	0	0
85 ～ 89	3	2	1	0	9	9	10	10	0	0
90 歳 以上	2	2	0	0	4	4	3	3	0	0
女	29	13	5	11	150	150	83	83	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
45 ～ 49	2	0	0	2	12	12	9	9	0	0
50 ～ 54	7	1	2	4	21	21	11	11	0	0
55 ～ 59	6	3	2	1	24	24	11	11	0	0
60 ～ 64	2	1	0	1	16	16	6	6	0	0
65 ～ 69	4	2	0	2	8	8	11	11	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	10	10	4	4	0	0
75 ～ 79	2	2	0	0	18	18	9	9	0	0
80 ～ 84	2	1	1	0	11	11	8	8	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	21	21	9	9	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	7	7	3	3	0	0

別表 7 9

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	メニエール病				めまい			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	114	45	28	41	309	117	33	159
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	7	1	1	5
45 ～ 49	7	3	2	2	20	6	5	9
50 ～ 54	15	1	5	9	39	4	5	30
55 ～ 59	14	5	4	5	46	11	3	32
60 ～ 64	15	3	5	7	40	7	6	27
65 ～ 69	8	1	3	4	30	14	2	14
70 ～ 74	15	9	1	5	26	13	1	12
75 ～ 79	13	10	1	2	34	22	2	10
80 ～ 84	11	7	3	1	32	20	4	8
85 ～ 89	12	6	2	4	29	17	2	10
90歳以上	3	0	2	1	6	2	2	2
男	38	11	8	19	96	30	7	59
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	2	0	0	2
45 ～ 49	2	0	1	1	6	1	2	3
50 ～ 54	3	0	0	3	14	1	1	12
55 ～ 59	5	3	0	2	17	4	1	12
60 ～ 64	8	1	2	5	12	2	1	9
65 ～ 69	4	1	1	2	9	2	0	7
70 ～ 74	3	2	0	1	11	4	0	7
75 ～ 79	3	3	0	0	9	7	0	2
80 ～ 84	5	1	3	1	10	4	2	4
85 ～ 89	3	0	1	2	5	4	0	1
90歳以上	1	0	0	1	1	1	0	0
女	76	34	20	22	213	87	26	100
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	1	1	3
45 ～ 49	5	3	1	1	14	5	3	6
50 ～ 54	12	1	5	6	25	3	4	18
55 ～ 59	9	2	4	3	29	7	2	20
60 ～ 64	7	2	3	2	28	5	5	18
65 ～ 69	4	0	2	2	21	12	2	7
70 ～ 74	12	7	1	4	15	9	1	5
75 ～ 79	10	7	1	2	25	15	2	8
80 ～ 84	6	6	0	0	22	16	2	4
85 ～ 89	9	6	1	2	24	13	2	9
90歳以上	2	0	2	0	5	1	2	2

別表 8 0

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	中耳炎				真珠腫性中耳炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	97	19	56	22	27	10	8	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	1	1	0	0
45 ～ 49	13	3	9	1	2	2	0	0
50 ～ 54	15	2	9	4	3	1	1	1
55 ～ 59	27	3	15	9	7	1	3	3
60 ～ 64	8	0	6	2	3	1	2	0
65 ～ 69	6	0	6	0	1	1	0	0
70 ～ 74	6	1	4	1	4	1	0	3
75 ～ 79	8	2	3	3	3	1	1	1
80 ～ 84	8	5	2	1	1	1	0	0
85 ～ 89	5	3	1	1	2	0	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	48	8	27	13	13	5	4	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	1	1	0	0
45 ～ 49	9	3	5	1	2	2	0	0
50 ～ 54	8	0	5	3	3	1	1	1
55 ～ 59	15	1	8	6	4	0	2	2
60 ～ 64	2	0	1	1	0	0	0	0
65 ～ 69	3	0	3	0	0	0	0	0
70 ～ 74	3	0	2	1	1	0	0	1
75 ～ 79	3	1	1	1	2	1	1	0
80 ～ 84	2	1	1	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	2	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	49	11	29	9	14	5	4	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	0	4	0	0	0	0	0
50 ～ 54	7	2	4	1	0	0	0	0
55 ～ 59	12	2	7	3	3	1	1	1
60 ～ 64	6	0	5	1	3	1	2	0
65 ～ 69	3	0	3	0	1	1	0	0
70 ～ 74	3	1	2	0	3	1	0	2
75 ～ 79	5	1	2	2	1	0	0	1
80 ～ 84	6	4	1	1	1	1	0	0
85 ～ 89	3	1	1	1	2	0	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 1

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	鼻炎を起こしやすい				難聴			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	272	97	14	161	209	58	6	145
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	11	3	0	8	4	1	0	3
45 ～ 49	18	5	4	9	11	4	0	7
50 ～ 54	45	15	3	27	20	4	2	14
55 ～ 59	48	14	1	33	28	3	1	24
60 ～ 64	43	11	2	30	24	3	1	20
65 ～ 69	32	11	2	19	11	3	1	7
70 ～ 74	17	6	0	11	18	4	1	13
75 ～ 79	22	11	1	10	29	12	0	17
80 ～ 84	22	13	1	8	26	10	0	16
85 ～ 89	13	7	0	6	27	11	0	16
90歳以上	1	1	0	0	10	3	0	7
男	123	38	4	81	117	28	0	89
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	6	0	0	6	4	1	0	3
45 ～ 49	7	2	1	4	9	3	0	6
50 ～ 54	22	6	1	15	15	4	0	11
55 ～ 59	23	6	0	17	19	2	0	17
60 ～ 64	23	6	1	16	13	1	0	12
65 ～ 69	10	3	0	7	5	0	0	5
70 ～ 74	4	2	0	2	5	0	0	5
75 ～ 79	13	5	1	7	16	7	0	9
80 ～ 84	10	5	0	5	13	3	0	10
85 ～ 89	5	3	0	2	14	7	0	7
90歳以上	0	0	0	0	3	0	0	3
女	149	59	10	80	92	30	6	56
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	3	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	11	3	3	5	2	1	0	1
50 ～ 54	23	9	2	12	5	0	2	3
55 ～ 59	25	8	1	16	9	1	1	7
60 ～ 64	20	5	1	14	11	2	1	8
65 ～ 69	22	8	2	12	6	3	1	2
70 ～ 74	13	4	0	9	13	4	1	8
75 ～ 79	9	6	0	3	13	5	0	8
80 ～ 84	12	8	1	3	13	7	0	6
85 ～ 89	8	4	0	4	13	4	0	9
90歳以上	1	1	0	0	7	3	0	4

別表 8 2

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	蓄膿症				鼻血がよく出る			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	108	28	28	52	95	22	7	66
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	1	1	0	0
40 ～ 44	4	3	0	1	3	1	0	2
45 ～ 49	5	1	3	1	8	4	0	4
50 ～ 54	12	6	3	3	12	1	1	10
55 ～ 59	26	3	10	13	19	2	2	15
60 ～ 64	17	2	4	11	10	0	0	10
65 ～ 69	12	1	1	10	9	2	0	7
70 ～ 74	8	4	0	4	8	2	0	6
75 ～ 79	5	3	0	2	12	4	0	8
80 ～ 84	13	5	4	4	8	3	2	3
85 ～ 89	4	0	2	2	4	2	1	1
90 歳 以上	1	0	0	1	1	0	1	0
男	58	16	11	31	43	7	0	36
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	1	1	0	0
40 ～ 44	3	2	0	1	2	0	0	2
45 ～ 49	1	1	0	0	6	2	0	4
50 ～ 54	9	5	2	2	6	0	0	6
55 ～ 59	18	2	5	11	10	1	0	9
60 ～ 64	7	1	2	4	6	0	0	6
65 ～ 69	7	0	1	6	3	0	0	3
70 ～ 74	3	1	0	2	4	1	0	3
75 ～ 79	3	2	0	1	3	1	0	2
80 ～ 84	4	2	0	2	2	1	0	1
85 ～ 89	1	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
女	50	12	17	21	52	15	7	30
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	4	0	3	1	2	2	0	0
50 ～ 54	3	1	1	1	6	1	1	4
55 ～ 59	8	1	5	2	9	1	2	6
60 ～ 64	10	1	2	7	4	0	0	4
65 ～ 69	5	1	0	4	6	2	0	4
70 ～ 74	5	3	0	2	4	1	0	3
75 ～ 79	2	1	0	1	9	3	0	6
80 ～ 84	9	3	4	2	6	2	2	2
85 ～ 89	3	0	2	1	4	2	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	1	0

別表 8 3

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	鼻血が止まりにくい				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	16	5	2	9	65	19	8	38
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	4	1	1	2
45 ～ 49	2	1	0	1	3	0	0	3
50 ～ 54	3	0	0	3	15	4	4	7
55 ～ 59	2	0	1	1	9	2	0	7
60 ～ 64	0	0	0	0	12	4	1	7
65 ～ 69	1	0	0	1	8	2	2	4
70 ～ 74	2	1	0	1	1	1	0	0
75 ～ 79	3	2	0	1	4	2	0	2
80 ～ 84	0	0	0	0	4	1	0	3
85 ～ 89	1	0	1	0	3	1	0	2
90歳以上	0	0	0	0	2	1	0	1
男	8	2	0	6	22	8	3	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	1	0	1	0
45 ～ 49	2	1	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	2	0	0	2	6	1	1	4
55 ～ 59	1	0	0	1	3	1	0	2
60 ～ 64	0	0	0	0	5	2	1	2
65 ～ 69	0	0	0	0	2	2	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	4	1	0	3
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	8	3	2	3	43	11	5	27
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	3	1	0	2
45 ～ 49	0	0	0	0	3	0	0	3
50 ～ 54	1	0	0	1	9	3	3	3
55 ～ 59	1	0	1	0	6	1	0	5
60 ～ 64	0	0	0	0	7	2	0	5
65 ～ 69	1	0	0	1	6	0	2	4
70 ～ 74	2	1	0	1	1	1	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	4	2	0	2
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	0	1	0	2	0	0	2
90歳以上	0	0	0	0	2	1	0	1

別表 8 4

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	454	454	216	216	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	12	12	6	6	0	0
45 ～ 49	52	52	16	16	0	0
50 ～ 54	79	79	29	29	0	0
55 ～ 59	79	79	25	25	0	0
60 ～ 64	59	59	26	26	0	0
65 ～ 69	42	42	24	24	0	0
70 ～ 74	32	32	23	23	0	0
75 ～ 79	25	25	28	28	0	0
80 ～ 84	33	33	18	18	0	0
85 ～ 89	26	26	15	15	0	0
90 歳 以上	14	14	6	6	0	0
男	226	226	124	124	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	7	3	3	0	0
45 ～ 49	30	30	6	6	0	0
50 ～ 54	43	43	15	15	0	0
55 ～ 59	44	44	11	11	0	0
60 ～ 64	25	25	21	21	0	0
65 ～ 69	25	25	12	12	0	0
70 ～ 74	18	18	15	15	0	0
75 ～ 79	9	9	18	18	0	0
80 ～ 84	13	13	10	10	0	0
85 ～ 89	8	8	11	11	0	0
90 歳 以上	4	4	2	2	0	0
女	228	228	92	92	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	5	5	3	3	0	0
45 ～ 49	22	22	10	10	0	0
50 ～ 54	36	36	14	14	0	0
55 ～ 59	35	35	14	14	0	0
60 ～ 64	34	34	5	5	0	0
65 ～ 69	17	17	12	12	0	0
70 ～ 74	14	14	8	8	0	0
75 ～ 79	16	16	10	10	0	0
80 ～ 84	20	20	8	8	0	0
85 ～ 89	18	18	4	4	0	0
90 歳 以上	10	10	4	4	0	0

別表 8 5

甲状腺の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	甲状腺腫				慢性甲状腺炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	29	13	8	8	10	6	1	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	1	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	1	1	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	2	0	0	2
60 ～ 64	5	1	1	3	1	0	0	1
65 ～ 69	3	1	1	1	0	0	0	0
70 ～ 74	4	3	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	4	3	1	0	2	2	0	0
80 ～ 84	5	3	1	1	2	2	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	2	1	1	0
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0	0	0
男	6	1	2	3	5	2	0	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	0	2	2	0	0	2
60 ～ 64	1	0	0	1	1	0	0	1
65 ～ 69	1	0	1	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	23	12	6	5	5	4	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	1	1	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	4	1	1	2	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	4	3	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	4	3	1	0	1	1	0	0
80 ～ 84	4	2	1	1	1	1	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	2	1	1	0
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0	0	0

別表 8 6

甲状腺の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	バセドウ病				甲状腺機能低下			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	16	7	6	3	48	34	2	12
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	2	0	0	1	1	0	0
50 ～ 54	2	1	1	0	4	2	1	1
55 ～ 59	3	1	0	2	7	5	0	2
60 ～ 64	5	2	2	1	8	5	0	3
65 ～ 69	1	0	1	0	6	2	1	3
70 ～ 74	2	0	2	0	1	1	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	6	6	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	8	7	0	1
85 ～ 89	1	1	0	0	5	4	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	0	1
男	1	0	0	1	6	1	0	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	1	0	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	1	0	0	1
65 ～ 69	0	0	0	0	1	0	0	1
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	15	7	6	2	42	33	2	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	2	0	0	1	1	0	0
50 ～ 54	2	1	1	0	3	2	1	0
55 ～ 59	2	1	0	1	6	5	0	1
60 ～ 64	5	2	2	1	7	5	0	2
65 ～ 69	1	0	1	0	5	2	1	2
70 ～ 74	2	0	2	0	1	1	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	6	6	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	8	7	0	1
85 ～ 89	1	1	0	0	4	3	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	1	1	0	0

別表 8 7

甲状腺の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	13	4	1	8	948	948	395	395	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	29	29	8	8	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	89	89	27	27	0	0
50 ～ 54	3	0	0	3	169	169	42	42	0	0
55 ～ 59	2	0	0	2	175	175	54	54	0	0
60 ～ 64	1	0	0	1	125	125	50	50	0	0
65 ～ 69	2	2	0	0	84	84	40	40	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	65	65	44	44	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	62	62	55	55	0	0
80 ～ 84	3	1	0	2	62	62	41	41	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	64	64	23	23	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	22	22	9	9	0	0
男	6	1	0	5	465	465	204	204	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	15	15	6	6	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	49	49	13	13	0	0
50 ～ 54	2	0	0	2	88	88	22	22	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	90	90	28	28	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	62	62	30	30	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	45	45	15	15	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	33	33	19	19	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	20	20	35	35	0	0
80 ～ 84	2	0	0	2	30	30	21	21	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	25	25	10	10	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	7	7	3	3	0	0
女	7	3	1	3	483	483	191	191	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	14	14	2	2	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	40	40	14	14	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	81	81	20	20	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	85	85	26	26	0	0
60 ～ 64	1	0	0	1	63	63	20	20	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	39	39	25	25	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	32	32	25	25	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	42	42	20	20	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	32	32	20	20	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	39	39	13	13	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	15	15	6	6	0	0

別表 8 8

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	肺線維症(慢性間質性肺炎)				無気肺			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	12	9	0	3	5	4	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	2	2	0	0
75 ～ 79	2	2	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	2	2	0	0	2	2	0	0
85 ～ 89	2	1	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	6	4	0	2	3	2	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	1	1	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	5	0	1	2	2	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	1	1	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	2	2	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 9

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	肺水腫				肺炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	14	12	1	1	65	20	44	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	7	2	5	0
50 ～ 54	1	1	0	0	7	0	7	0
55 ～ 59	1	0	0	1	9	2	6	1
60 ～ 64	1	0	1	0	8	0	8	0
65 ～ 69	0	0	0	0	1	0	1	0
70 ～ 74	2	2	0	0	6	4	2	0
75 ～ 79	1	1	0	0	9	5	4	0
80 ～ 84	3	3	0	0	6	2	4	0
85 ～ 89	5	5	0	0	6	3	3	0
90 歳 以上	0	0	0	0	5	1	4	0
男	6	5	0	1	31	7	23	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	4	0	4	0
50 ～ 54	1	1	0	0	4	0	4	0
55 ～ 59	1	0	0	1	6	0	5	1
60 ～ 64	0	0	0	0	2	0	2	0
65 ～ 69	0	0	0	0	1	0	1	0
70 ～ 74	1	1	0	0	2	1	1	0
75 ～ 79	0	0	0	0	4	2	2	0
80 ～ 84	0	0	0	0	3	2	1	0
85 ～ 89	3	3	0	0	2	2	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	3	0	3	0
女	8	7	1	0	34	13	21	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	3	2	1	0
50 ～ 54	0	0	0	0	3	0	3	0
55 ～ 59	0	0	0	0	3	2	1	0
60 ～ 64	1	0	1	0	6	0	6	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	4	3	1	0
75 ～ 79	1	1	0	0	5	3	2	0
80 ～ 84	3	3	0	0	3	0	3	0
85 ～ 89	2	2	0	0	4	1	3	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	1	0

別表 9 0

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	慢性気管支炎				嚔声(声がかれる)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	77	54	10	13	111	34	2	75
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	1	0	0	1
45 ～ 49	6	3	1	2	5	2	0	3
50 ～ 54	11	7	2	2	8	1	0	7
55 ～ 59	15	10	2	3	16	3	0	13
60 ～ 64	4	1	3	0	19	2	2	15
65 ～ 69	5	3	0	2	15	3	0	12
70 ～ 74	5	4	1	0	8	2	0	6
75 ～ 79	11	11	0	0	14	8	0	6
80 ～ 84	10	9	0	1	16	10	0	6
85 ～ 89	7	4	1	2	7	3	0	4
90 歳 以上	1	1	0	0	2	0	0	2
男	38	25	5	8	46	15	0	31
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	5	2	1	2	4	2	0	2
50 ～ 54	3	2	0	1	4	1	0	3
55 ～ 59	10	6	1	3	4	1	0	3
60 ～ 64	3	1	2	0	9	2	0	7
65 ～ 69	2	1	0	1	7	0	0	7
70 ～ 74	2	1	1	0	2	1	0	1
75 ～ 79	4	4	0	0	7	2	0	5
80 ～ 84	5	5	0	0	7	5	0	2
85 ～ 89	4	3	0	1	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	39	29	5	5	65	19	2	44
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	1	0	0	1
45 ～ 49	1	1	0	0	1	0	0	1
50 ～ 54	8	5	2	1	4	0	0	4
55 ～ 59	5	4	1	0	12	2	0	10
60 ～ 64	1	0	1	0	10	0	2	8
65 ～ 69	3	2	0	1	8	3	0	5
70 ～ 74	3	3	0	0	6	1	0	5
75 ～ 79	7	7	0	0	7	6	0	1
80 ～ 84	5	4	0	1	9	5	0	4
85 ～ 89	3	1	1	1	6	2	0	4
90 歳 以上	1	1	0	0	1	0	0	1

別表 9 1

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	呼吸困難				COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	51	28	7	16	31	13	1	17
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	3	2	0	1	2	0	1	1
55 ～ 59	6	1	1	4	10	1	0	9
60 ～ 64	6	1	2	3	3	1	0	2
65 ～ 69	3	1	1	1	3	1	0	2
70 ～ 74	7	4	2	1	3	1	0	2
75 ～ 79	6	5	0	1	3	3	0	0
80 ～ 84	11	9	0	2	3	3	0	0
85 ～ 89	6	3	1	2	1	1	0	0
90 歳 以上	2	2	0	0	1	1	0	0
男	18	6	4	8	30	12	1	17
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	2	0	1	1
55 ～ 59	4	0	1	3	10	1	0	9
60 ～ 64	4	1	1	2	3	1	0	2
65 ～ 69	1	0	1	0	3	1	0	2
70 ～ 74	2	1	1	0	3	1	0	2
75 ～ 79	2	2	0	0	3	3	0	0
80 ～ 84	2	1	0	1	3	3	0	0
85 ～ 89	2	1	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	1	0	0
女	33	22	3	8	1	1	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	3	2	0	1	0	0	0	0
55 ～ 59	2	1	0	1	0	0	0	0
60 ～ 64	2	0	1	1	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	5	3	1	1	0	0	0	0
75 ～ 79	4	3	0	1	0	0	0	0
80 ～ 84	9	8	0	1	0	0	0	0
85 ～ 89	4	2	1	1	1	1	0	0
90 歳 以上	2	2	0	0	0	0	0	0

別表 9 2

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	息切れ				風邪を引きやすい			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	245	82	4	159	354	105	62	187
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	2	1	0	1
40 ～ 44	6	2	0	4	12	4	3	5
45 ～ 49	8	2	0	6	23	7	5	11
50 ～ 54	25	6	0	19	50	10	10	30
55 ～ 59	47	8	1	38	62	11	11	40
60 ～ 64	31	4	1	26	36	4	9	23
65 ～ 69	28	8	1	19	36	10	8	18
70 ～ 74	20	10	0	10	31	15	3	13
75 ～ 79	30	15	0	15	39	18	4	17
80 ～ 84	25	16	0	9	38	16	7	15
85 ～ 89	16	8	1	7	19	7	2	10
90 歳 以上	8	3	0	5	6	2	0	4
男	122	32	0	90	143	31	17	95
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	2	1	0	1
40 ～ 44	3	1	0	2	7	1	2	4
45 ～ 49	4	0	0	4	12	3	1	8
50 ～ 54	17	4	0	13	25	5	4	16
55 ～ 59	29	4	0	25	32	2	3	27
60 ～ 64	18	3	0	15	14	0	4	10
65 ～ 69	17	3	0	14	13	3	0	10
70 ～ 74	6	2	0	4	6	2	1	3
75 ～ 79	11	7	0	4	11	5	0	6
80 ～ 84	10	6	0	4	16	6	2	8
85 ～ 89	5	2	0	3	5	3	0	2
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
女	123	50	4	69	211	74	45	92
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	5	3	1	1
45 ～ 49	4	2	0	2	11	4	4	3
50 ～ 54	8	2	0	6	25	5	6	14
55 ～ 59	18	4	1	13	30	9	8	13
60 ～ 64	13	1	1	11	22	4	5	13
65 ～ 69	11	5	1	5	23	7	8	8
70 ～ 74	14	8	0	6	25	13	2	10
75 ～ 79	19	8	0	11	28	13	4	11
80 ～ 84	15	10	0	5	22	10	5	7
85 ～ 89	11	6	1	4	14	4	2	8
90 歳 以上	7	3	0	4	6	2	0	4

別表 9 3

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	風邪が治りにくい				せき			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	238	74	42	122	397	133	34	230
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	1	4	2	7	2	0	5
45 ～ 49	15	4	4	7	24	6	3	15
50 ～ 54	34	8	4	22	54	14	5	35
55 ～ 59	42	8	6	28	72	15	6	51
60 ～ 64	30	3	10	17	47	5	4	38
65 ～ 69	24	6	7	11	41	14	5	22
70 ～ 74	16	7	3	6	35	16	0	19
75 ～ 79	24	13	1	10	45	20	6	19
80 ～ 84	24	15	1	8	42	27	2	13
85 ～ 89	18	8	2	8	23	13	2	8
90 歳 以上	4	1	0	3	7	1	1	5
男	98	23	11	64	170	45	6	119
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	2	2	4	0	0	4
45 ～ 49	7	1	0	6	11	1	0	10
50 ～ 54	14	1	2	11	26	6	1	19
55 ～ 59	25	1	3	21	36	3	2	31
60 ～ 64	10	1	2	7	20	3	1	16
65 ～ 69	7	1	0	6	21	6	1	14
70 ～ 74	2	0	1	1	11	4	0	7
75 ～ 79	10	7	0	3	15	8	0	7
80 ～ 84	11	6	0	5	13	6	0	7
85 ～ 89	8	5	1	2	11	8	0	3
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	1	1
女	140	51	31	58	227	88	28	111
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	2	0	3	2	0	1
45 ～ 49	8	3	4	1	13	5	3	5
50 ～ 54	20	7	2	11	28	8	4	16
55 ～ 59	17	7	3	7	36	12	4	20
60 ～ 64	20	2	8	10	27	2	3	22
65 ～ 69	17	5	7	5	20	8	4	8
70 ～ 74	14	7	2	5	24	12	0	12
75 ～ 79	14	6	1	7	30	12	6	12
80 ～ 84	13	9	1	3	29	21	2	6
85 ～ 89	10	3	1	6	12	5	2	5
90 歳 以上	4	1	0	3	5	1	0	4

別表 9 4

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	たん				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	393	141	24	228	31	19	1	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	5	1	0	4	2	1	0	1
45 ～ 49	23	6	2	15	3	1	1	1
50 ～ 54	61	19	5	37	5	2	0	3
55 ～ 59	76	17	5	54	5	4	0	1
60 ～ 64	47	10	1	36	4	4	0	0
65 ～ 69	42	13	4	25	5	2	0	3
70 ～ 74	29	16	1	12	1	0	0	1
75 ～ 79	44	21	2	21	0	0	0	0
80 ～ 84	38	23	1	14	3	3	0	0
85 ～ 89	22	14	2	6	3	2	0	1
90 歳 以上	5	1	1	3	0	0	0	0
男	181	54	7	120	15	7	1	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	1	0	0	1
45 ～ 49	10	1	0	9	3	1	1	1
50 ～ 54	25	7	1	17	3	1	0	2
55 ～ 59	44	5	2	37	1	0	0	1
60 ～ 64	21	5	0	16	2	2	0	0
65 ～ 69	20	5	1	14	1	0	0	1
70 ～ 74	9	4	1	4	1	0	0	1
75 ～ 79	19	10	1	8	0	0	0	0
80 ～ 84	15	8	0	7	2	2	0	0
85 ～ 89	12	9	0	3	1	1	0	0
90 歳 以上	3	0	1	2	0	0	0	0
女	212	87	17	108	16	12	0	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	1	1	0	0
45 ～ 49	13	5	2	6	0	0	0	0
50 ～ 54	36	12	4	20	2	1	0	1
55 ～ 59	32	12	3	17	4	4	0	0
60 ～ 64	26	5	1	20	2	2	0	0
65 ～ 69	22	8	3	11	4	2	0	2
70 ～ 74	20	12	0	8	0	0	0	0
75 ～ 79	25	11	1	13	0	0	0	0
80 ～ 84	23	15	1	7	1	1	0	0
85 ～ 89	10	5	2	3	2	1	0	1
90 歳 以上	2	1	0	1	0	0	0	0

別表 9 5

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 8、性、年齢（5歳階級）

別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	468	468	211	211	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	13	13	5	5	0	0
45 ～ 49	49	49	19	19	0	0
50 ～ 54	95	95	24	24	0	0
55 ～ 59	79	79	26	26	0	0
60 ～ 64	73	73	23	23	0	0
65 ～ 69	39	39	20	20	0	0
70 ～ 74	24	24	23	23	0	0
75 ～ 79	25	25	33	33	0	0
80 ～ 84	34	34	18	18	0	0
85 ～ 89	27	27	14	14	0	0
90 歳 以上	10	10	6	6	0	0
男	216	216	114	114	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	6	6	3	3	0	0
45 ～ 49	24	24	9	9	0	0
50 ～ 54	46	46	13	13	0	0
55 ～ 59	38	38	13	13	0	0
60 ～ 64	34	34	16	16	0	0
65 ～ 69	21	21	8	8	0	0
70 ～ 74	13	13	13	13	0	0
75 ～ 79	6	6	22	22	0	0
80 ～ 84	18	18	7	7	0	0
85 ～ 89	8	8	7	7	0	0
90 歳 以上	2	2	3	3	0	0
女	252	252	97	97	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	7	2	2	0	0
45 ～ 49	25	25	10	10	0	0
50 ～ 54	49	49	11	11	0	0
55 ～ 59	41	41	13	13	0	0
60 ～ 64	39	39	7	7	0	0
65 ～ 69	18	18	12	12	0	0
70 ～ 74	11	11	10	10	0	0
75 ～ 79	19	19	11	11	0	0
80 ～ 84	16	16	11	11	0	0
85 ～ 89	19	19	7	7	0	0
90 歳 以上	8	8	3	3	0	0

別表 9 6

心臓の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	心筋梗塞				狭心症			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	30	22	2	6	96	74	12	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	2	0	1	1	3	0	0	3
55 ～ 59	4	2	0	2	8	4	2	2
60 ～ 64	3	1	1	1	7	5	1	1
65 ～ 69	2	1	0	1	10	7	2	1
70 ～ 74	2	2	0	0	11	9	2	0
75 ～ 79	5	5	0	0	12	11	1	0
80 ～ 84	6	6	0	0	18	15	2	1
85 ～ 89	5	5	0	0	18	16	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	8	7	1	0
男	14	9	2	3	42	30	7	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	2	0	1	1	3	0	0	3
55 ～ 59	4	2	0	2	4	1	2	1
60 ～ 64	1	0	1	0	4	4	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	5	4	1	0
70 ～ 74	1	1	0	0	5	4	1	0
75 ～ 79	2	2	0	0	6	5	1	0
80 ～ 84	1	1	0	0	8	6	1	1
85 ～ 89	2	2	0	0	5	5	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	1	0
女	16	13	0	3	54	44	5	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	4	3	0	1
60 ～ 64	2	1	0	1	3	1	1	1
65 ～ 69	1	0	0	1	5	3	1	1
70 ～ 74	1	1	0	0	6	5	1	0
75 ～ 79	3	3	0	0	6	6	0	0
80 ～ 84	5	5	0	0	10	9	1	0
85 ～ 89	3	3	0	0	13	11	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	6	6	0	0

別表 9 7

心臓の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	心不全				心肥大			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	40	32	1	7	49	22	6	21
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	1	0	0	1	2	0	0	2
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	4	3	0	1	7	3	1	3
60 ～ 64	2	2	0	0	11	4	2	5
65 ～ 69	1	0	0	1	4	0	1	3
70 ～ 74	4	2	0	2	5	2	0	3
75 ～ 79	4	4	0	0	5	4	0	1
80 ～ 84	8	7	1	0	7	6	1	0
85 ～ 89	13	12	0	1	5	2	1	2
90 歳 以上	3	2	0	1	1	1	0	0
男	13	8	1	4	20	10	3	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	3	2	0	1	5	3	1	1
60 ～ 64	1	1	0	0	6	2	1	3
65 ～ 69	0	0	0	0	2	0	1	1
70 ～ 74	2	1	0	1	1	0	0	1
75 ～ 79	1	1	0	0	3	3	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	2	2	0	0
85 ～ 89	3	2	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	2	1	0	1	0	0	0	0
女	27	24	0	3	29	12	3	14
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	1	0	0	1	2	0	0	2
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	2	0	0	2
60 ～ 64	1	1	0	0	5	2	1	2
65 ～ 69	1	0	0	1	2	0	0	2
70 ～ 74	2	1	0	1	4	2	0	2
75 ～ 79	3	3	0	0	2	1	0	1
80 ～ 84	7	7	0	0	5	4	1	0
85 ～ 89	10	10	0	0	5	2	1	2
90 歳 以上	1	1	0	0	1	1	0	0

別表 9 8

心臓の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5 歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不整脈(脈がとぶ)				頻脈(脈拍が増加している状態)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	192	79	12	101	57	32	3	22
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	9	0	2	7	2	1	0	1
50 ～ 54	18	2	1	15	6	1	0	5
55 ～ 59	29	5	2	22	9	2	2	5
60 ～ 64	26	10	2	14	7	4	0	3
65 ～ 69	21	7	0	14	5	3	0	2
70 ～ 74	17	10	2	5	4	2	1	1
75 ～ 79	21	12	1	8	7	5	0	2
80 ～ 84	25	16	1	8	12	9	0	3
85 ～ 89	19	12	1	6	4	4	0	0
90 歳 以上	4	4	0	0	1	1	0	0
男	91	33	5	53	20	9	1	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	6	0	2	4	0	0	0	0
50 ～ 54	7	0	0	7	6	1	0	5
55 ～ 59	20	4	1	15	5	1	1	3
60 ～ 64	13	6	1	6	3	2	0	1
65 ～ 69	10	3	0	7	1	1	0	0
70 ～ 74	6	4	0	2	0	0	0	0
75 ～ 79	11	5	1	5	1	1	0	0
80 ～ 84	11	6	0	5	3	2	0	1
85 ～ 89	5	4	0	1	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	101	46	7	48	37	23	2	12
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	3	0	0	3	2	1	0	1
50 ～ 54	11	2	1	8	0	0	0	0
55 ～ 59	9	1	1	7	4	1	1	2
60 ～ 64	13	4	1	8	4	2	0	2
65 ～ 69	11	4	0	7	4	2	0	2
70 ～ 74	11	6	2	3	4	2	1	1
75 ～ 79	10	7	0	3	6	4	0	2
80 ～ 84	14	10	1	3	9	7	0	2
85 ～ 89	14	8	1	5	3	3	0	0
90 歳 以上	4	4	0	0	1	1	0	0

別表 9 9

心臓の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	動悸(異常にドキドキする)				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	163	56	4	103	41	18	2	21
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	2	0	0	2
45 ～ 49	9	2	0	7	3	1	0	2
50 ～ 54	19	3	0	16	2	0	0	2
55 ～ 59	30	3	2	25	7	2	0	5
60 ～ 64	20	6	0	14	7	2	0	5
65 ～ 69	16	5	0	11	4	1	0	3
70 ～ 74	14	8	1	5	3	2	1	0
75 ～ 79	19	9	0	10	5	3	1	1
80 ～ 84	17	10	0	7	4	4	0	0
85 ～ 89	12	7	1	4	4	3	0	1
90 歳 以上	5	3	0	2	0	0	0	0
男	47	15	1	31	15	7	0	8
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	2	0	0	2	1	1	0	0
50 ～ 54	5	0	0	5	1	0	0	1
55 ～ 59	12	1	1	10	4	2	0	2
60 ～ 64	7	3	0	4	1	0	0	1
65 ～ 69	8	3	0	5	3	1	0	2
70 ～ 74	3	3	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	5	2	0	3	1	0	0	1
80 ～ 84	3	2	0	1	2	2	0	0
85 ～ 89	2	1	0	1	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	116	41	3	72	26	11	2	13
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	1	0	0	1
45 ～ 49	7	2	0	5	2	0	0	2
50 ～ 54	14	3	0	11	1	0	0	1
55 ～ 59	18	2	1	15	3	0	0	3
60 ～ 64	13	3	0	10	6	2	0	4
65 ～ 69	8	2	0	6	1	0	0	1
70 ～ 74	11	5	1	5	3	2	1	0
75 ～ 79	14	7	0	7	4	3	1	0
80 ～ 84	14	8	0	6	2	2	0	0
85 ～ 89	10	6	1	3	3	2	0	1
90 歳 以上	5	3	0	2	0	0	0	0

別表 1 0 0

心臓の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	737	737	280	280	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	1	1	0	0
40 ～ 44	26	26	6	6	0	0
45 ～ 49	77	77	26	26	0	0
50 ～ 54	146	146	37	37	0	0
55 ～ 59	149	149	30	30	0	0
60 ～ 64	101	101	36	36	0	0
65 ～ 69	67	67	23	23	0	0
70 ～ 74	45	45	32	32	0	0
75 ～ 79	40	40	41	41	0	0
80 ～ 84	39	39	25	25	0	0
85 ～ 89	30	30	17	17	0	0
90 歳 以上	14	14	6	6	0	0
男	359	359	146	146	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	15	15	4	4	0	0
45 ～ 49	42	42	12	12	0	0
50 ～ 54	76	76	18	18	0	0
55 ～ 59	73	73	15	15	0	0
60 ～ 64	48	48	21	21	0	0
65 ～ 69	29	29	12	12	0	0
70 ～ 74	25	25	14	14	0	0
75 ～ 79	12	12	23	23	0	0
80 ～ 84	18	18	14	14	0	0
85 ～ 89	15	15	9	9	0	0
90 歳 以上	4	4	3	3	0	0
女	378	378	134	134	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	11	11	2	2	0	0
45 ～ 49	35	35	14	14	0	0
50 ～ 54	70	70	19	19	0	0
55 ～ 59	76	76	15	15	0	0
60 ～ 64	53	53	15	15	0	0
65 ～ 69	38	38	11	11	0	0
70 ～ 74	20	20	18	18	0	0
75 ～ 79	28	28	18	18	0	0
80 ～ 84	21	21	11	11	0	0
85 ～ 89	15	15	8	8	0	0
90 歳 以上	10	10	3	3	0	0

別表 1 0 1

心臓の病気・症状 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総 数	192	7	151	2	22	20	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	3	0	1	0	1	1	0
50 ～ 54	5	0	3	0	1	1	0
55 ～ 59	12	0	11	0	1	0	0
60 ～ 64	14	1	10	0	3	0	0
65 ～ 69	15	0	11	0	2	3	0
70 ～ 74	23	2	17	1	1	4	0
75 ～ 79	31	1	25	0	2	5	0
80 ～ 84	38	3	30	1	4	4	0
85 ～ 89	37	0	30	0	6	2	0
90 歳 以上	13	0	12	0	1	0	0
男	78	4	57	0	11	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	0	1	0	0
50 ～ 54	1	0	0	0	0	1	0
55 ～ 59	8	0	7	0	1	0	0
60 ～ 64	10	1	7	0	2	0	0
65 ～ 69	9	0	6	0	2	2	0
70 ～ 74	9	1	6	0	0	2	0
75 ～ 79	12	1	8	0	0	4	0
80 ～ 84	15	1	12	0	2	1	0
85 ～ 89	10	0	8	0	3	0	0
90 歳 以上	2	0	2	0	0	0	0
女	114	3	94	2	11	10	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	1	0	0	1	0
50 ～ 54	4	0	3	0	1	0	0
55 ～ 59	4	0	4	0	0	0	0
60 ～ 64	4	0	3	0	1	0	0
65 ～ 69	6	0	5	0	0	1	0
70 ～ 74	14	1	11	1	1	2	0
75 ～ 79	19	0	17	0	2	1	0
80 ～ 84	23	2	18	1	2	3	0
85 ～ 89	27	0	22	0	3	2	0
90 歳 以上	11	0	10	0	1	0	0

別表 1 0 2

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	高血圧				低血圧			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	497	427	11	59	83	22	5	56
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	3	2	0	1
45 ～ 49	12	8	0	4	6	3	0	3
50 ～ 54	44	33	2	9	20	3	0	17
55 ～ 59	62	47	1	14	15	0	1	14
60 ～ 64	68	54	2	12	9	0	1	8
65 ～ 69	49	40	2	7	5	1	0	4
70 ～ 74	50	46	1	3	5	1	0	4
75 ～ 79	74	69	1	4	5	3	1	1
80 ～ 84	57	55	1	1	9	4	1	4
85 ～ 89	58	57	0	1	4	4	0	0
90 歳 以上	20	17	1	2	2	1	1	0
男	231	193	6	32	30	10	0	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	8	5	0	3	1	0	0	1
50 ～ 54	29	21	1	7	3	0	0	3
55 ～ 59	40	30	1	9	8	0	0	8
60 ～ 64	38	30	2	6	2	0	0	2
65 ～ 69	28	25	1	2	2	0	0	2
70 ～ 74	19	18	0	1	3	1	0	2
75 ～ 79	28	27	0	1	2	2	0	0
80 ～ 84	23	22	0	1	5	3	0	2
85 ～ 89	12	12	0	0	4	4	0	0
90 歳 以上	4	3	1	0	0	0	0	0
女	266	234	5	27	53	12	5	36
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	3	2	0	1
45 ～ 49	4	3	0	1	5	3	0	2
50 ～ 54	15	12	1	2	17	3	0	14
55 ～ 59	22	17	0	5	7	0	1	6
60 ～ 64	30	24	0	6	7	0	1	6
65 ～ 69	21	15	1	5	3	1	0	2
70 ～ 74	31	28	1	2	2	0	0	2
75 ～ 79	46	42	1	3	3	1	1	1
80 ～ 84	34	33	1	0	4	1	1	2
85 ～ 89	46	45	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	16	14	0	2	2	1	1	0

別表 1 0 3

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	動脈硬化				動脈瘤			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	46	33	1	12	33	16	5	12
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	7	4	0	3	3	0	0	3
60 ～ 64	6	2	1	3	1	0	0	1
65 ～ 69	5	4	0	1	5	2	1	2
70 ～ 74	5	4	0	1	2	1	1	0
75 ～ 79	8	7	0	1	6	4	1	1
80 ～ 84	6	4	0	2	6	3	1	2
85 ～ 89	8	8	0	0	5	4	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	0	1
男	27	18	1	8	18	10	3	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	1	1	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	4	2	0	2	2	0	0	2
60 ～ 64	6	2	1	3	1	0	0	1
65 ～ 69	3	3	0	0	2	0	0	2
70 ～ 74	2	1	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	5	4	0	1	3	2	1	0
80 ～ 84	3	2	0	1	4	3	1	0
85 ～ 89	4	4	0	0	4	3	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	1	0	0
女	19	15	0	4	15	6	2	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	3	2	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	3	2	1	0
70 ～ 74	3	3	0	0	2	1	1	0
75 ～ 79	3	3	0	0	3	2	0	1
80 ～ 84	3	2	0	1	2	0	0	2
85 ～ 89	4	4	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1

別表104

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	静脈炎				静脈瘤			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	8	1	1	6	42	10	3	29
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	2	0	0	2	4	0	1	3
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	1	0	0	1	11	1	0	10
60 ～ 64	1	0	0	1	5	2	1	2
65 ～ 69	2	0	1	1	5	0	0	5
70 ～ 74	1	0	0	1	7	3	0	4
75 ～ 79	1	1	0	0	1	0	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	4	2	1	1
85 ～ 89	0	0	0	0	3	2	0	1
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	4	1	0	3	12	3	0	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	3	0	0	3
60 ～ 64	1	0	0	1	2	1	0	1
65 ～ 69	1	0	0	1	2	0	0	2
70 ～ 74	0	0	0	0	2	1	0	1
75 ～ 79	1	1	0	0	1	0	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	4	0	1	3	30	7	3	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	0	2	4	0	1	3
50 ～ 54	0	0	0	0	1	0	0	1
55 ～ 59	0	0	0	0	8	1	0	7
60 ～ 64	0	0	0	0	3	1	1	1
65 ～ 69	1	0	1	0	3	0	0	3
70 ～ 74	1	0	0	1	5	2	0	3
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	3	1	1	1
85 ～ 89	0	0	0	0	3	2	0	1
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 105

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	10	4	0	6	554	554	258	258	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	22	22	8	8	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	79	79	23	23	0	0
50 ～ 54	2	1	0	1	124	124	33	33	0	0
55 ～ 59	4	2	0	2	118	118	31	31	0	0
60 ～ 64	1	0	0	1	74	74	33	33	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	45	45	29	29	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	25	25	32	32	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	20	20	25	25	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	24	24	22	22	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	15	15	14	14	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	5	5	7	7	0	0
男	5	2	0	3	275	275	129	129	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	13	13	5	5	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	42	42	11	11	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	65	65	15	15	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	55	55	15	15	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	34	34	15	15	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	16	16	13	13	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	14	14	16	16	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	6	6	17	17	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	14	14	11	11	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	11	11	7	7	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0
女	5	2	0	3	279	279	129	129	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	9	9	3	3	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	37	37	12	12	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	59	59	18	18	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	63	63	16	16	0	0
60 ～ 64	1	0	0	1	40	40	18	18	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	29	29	16	16	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	11	11	16	16	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	14	14	8	8	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	10	10	11	11	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	4	4	7	7	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0

別表 1 0 6

高血圧 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総 数	427	53	393	8	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0
45 ～ 49	8	4	4	0	0	0
50 ～ 54	33	10	26	0	0	0
55 ～ 59	47	4	44	0	0	0
60 ～ 64	54	2	52	1	0	0
65 ～ 69	40	3	38	1	0	0
70 ～ 74	46	8	44	2	0	0
75 ～ 79	69	8	66	0	1	0
80 ～ 84	55	8	51	1	1	0
85 ～ 89	57	5	51	2	1	0
90 歳 以上	17	1	17	0	0	0
男	193	24	176	4	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	5	3	2	0	0	0
50 ～ 54	21	6	16	0	0	0
55 ～ 59	30	3	28	0	0	0
60 ～ 64	30	1	29	1	0	0
65 ～ 69	25	3	24	0	0	0
70 ～ 74	18	2	17	1	0	0
75 ～ 79	27	4	26	0	0	0
80 ～ 84	22	1	21	1	0	0
85 ～ 89	12	1	10	1	0	0
90 歳 以上	3	0	3	0	0	0
女	234	29	217	4	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0
45 ～ 49	3	1	2	0	0	0
50 ～ 54	12	4	10	0	0	0
55 ～ 59	17	1	16	0	0	0
60 ～ 64	24	1	23	0	0	0
65 ～ 69	15	0	14	1	0	0
70 ～ 74	28	6	27	1	0	0
75 ～ 79	42	4	40	0	1	0
80 ～ 84	33	7	30	0	1	0
85 ～ 89	45	4	41	1	1	0
90 歳 以上	14	1	14	0	0	0

別表 1 0 7

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	B型肝炎				C型肝炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	32	13	7	12	24	15	4	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	0	3	1	0	0	1
50 ～ 54	2	0	1	1	5	3	0	2
55 ～ 59	4	1	1	2	2	0	0	2
60 ～ 64	4	0	1	3	4	1	3	0
65 ～ 69	6	3	1	2	3	3	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	2	2	0	0
75 ～ 79	3	2	1	0	4	3	1	0
80 ～ 84	5	5	0	0	2	2	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	13	6	3	4	8	5	2	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	1	0	1	1	0	0
55 ～ 59	2	0	1	1	1	0	0	1
60 ～ 64	1	0	0	1	2	1	1	0
65 ～ 69	4	2	1	1	2	2	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	1	0	1	0
80 ～ 84	3	3	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	19	7	4	8	16	10	2	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	3	1	0	2	1	0	0	1
50 ～ 54	1	0	0	1	4	2	0	2
55 ～ 59	2	1	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	3	0	1	2	2	0	2	0
65 ～ 69	2	1	0	1	1	1	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	2	2	0	0
75 ～ 79	3	2	1	0	3	3	0	0
80 ～ 84	2	2	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 8

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肝機能障害				胆のう炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	84	37	11	36	21	7	11	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	1	1	0	0
45 ～ 49	5	1	1	3	2	1	0	1
50 ～ 54	13	7	1	5	1	1	0	0
55 ～ 59	16	4	1	11	1	0	0	1
60 ～ 64	14	5	3	6	2	0	2	0
65 ～ 69	9	3	1	5	1	0	1	0
70 ～ 74	6	2	1	3	3	0	2	1
75 ～ 79	8	6	1	1	3	2	1	0
80 ～ 84	6	3	2	1	4	0	4	0
85 ～ 89	5	5	0	0	3	2	1	0
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0	0
男	52	22	6	24	12	5	5	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	1	2	1	1	0	0
50 ～ 54	10	6	1	3	1	1	0	0
55 ～ 59	11	2	0	9	1	0	0	1
60 ～ 64	10	4	2	4	0	0	0	0
65 ～ 69	5	1	0	4	0	0	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	3	0	2	1
75 ～ 79	2	1	0	1	2	1	1	0
80 ～ 84	3	2	1	0	2	0	2	0
85 ～ 89	4	4	0	0	2	2	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0	0
女	32	15	5	12	9	2	6	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	0	1
50 ～ 54	3	1	0	2	0	0	0	0
55 ～ 59	5	2	1	2	0	0	0	0
60 ～ 64	4	1	1	2	2	0	2	0
65 ～ 69	4	2	1	1	1	0	1	0
70 ～ 74	5	2	0	3	0	0	0	0
75 ～ 79	6	5	1	0	1	1	0	0
80 ～ 84	3	1	1	1	2	0	2	0
85 ～ 89	1	1	0	0	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 109

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	胆石症				黄疸			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	72	17	25	30	12	3	6	3
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	5	2	2	1	2	0	1	1
50 ～ 54	6	3	1	2	1	0	0	1
55 ～ 59	7	0	3	4	3	0	2	1
60 ～ 64	11	0	6	5	0	0	0	0
65 ～ 69	5	1	1	3	1	0	1	0
70 ～ 74	6	3	2	1	1	1	0	0
75 ～ 79	7	3	1	3	0	0	0	0
80 ～ 84	12	3	4	5	1	1	0	0
85 ～ 89	7	1	5	1	3	1	2	0
90歳以上	3	0	0	3	0	0	0	0
男	30	6	12	12	7	2	4	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	1	1	0	1	0	1	0
50 ～ 54	2	0	1	1	0	0	0	0
55 ～ 59	3	0	1	2	3	0	2	1
60 ～ 64	5	0	3	2	0	0	0	0
65 ～ 69	3	1	1	1	0	0	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	5	2	1	2	0	0	0	0
80 ～ 84	6	2	2	2	1	1	0	0
85 ～ 89	1	0	1	0	2	1	1	0
90歳以上	2	0	0	2	0	0	0	0
女	42	11	13	18	5	1	2	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	3	1	1	1	1	0	0	1
50 ～ 54	4	3	0	1	1	0	0	1
55 ～ 59	4	0	2	2	0	0	0	0
60 ～ 64	6	0	3	3	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	0	2	1	0	1	0
70 ～ 74	5	3	1	1	1	1	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	0	0	0	0
80 ～ 84	6	1	2	3	0	0	0	0
85 ～ 89	6	1	4	1	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0	0

別表 1 1 0

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脾腫(脾臓がはれる)				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	10	4	2	4	32	12	4	16
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	3	1	1	1
50 ～ 54	1	0	0	1	3	1	0	2
55 ～ 59	2	1	0	1	10	3	0	7
60 ～ 64	1	0	1	0	7	1	2	4
65 ～ 69	0	0	0	0	3	2	0	1
70 ～ 74	2	1	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	3	2	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	2	1	1	0	2	1	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	4	3	0	1	15	4	4	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	1	0	1	0
50 ～ 54	0	0	0	0	2	1	0	1
55 ～ 59	2	1	0	1	4	0	0	4
60 ～ 64	0	0	0	0	3	0	2	1
65 ～ 69	0	0	0	0	2	1	0	1
70 ～ 74	1	1	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	1	2	3	17	8	0	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	1	0	0	1	1	0	0	1
55 ～ 59	0	0	0	0	6	3	0	3
60 ～ 64	1	0	1	0	4	1	0	3
65 ～ 69	0	0	0	0	1	1	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	2	1	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	0	1	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 1

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	893	893	329	329	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	1	1	0	0
40 ～ 44	27	27	5	5	0	0
45 ～ 49	79	79	30	30	0	0
50 ～ 54	159	159	37	37	0	0
55 ～ 59	169	169	39	39	0	0
60 ～ 64	109	109	48	48	0	0
65 ～ 69	81	81	30	30	0	0
70 ～ 74	57	57	39	39	0	0
75 ～ 79	60	60	47	47	0	0
80 ～ 84	64	64	28	28	0	0
85 ～ 89	63	63	16	16	0	0
90 歳 以上	22	22	9	9	0	0
男	417	417	158	158	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	16	16	4	4	0	0
45 ～ 49	43	43	13	13	0	0
50 ～ 54	82	82	16	16	0	0
55 ～ 59	83	83	20	20	0	0
60 ～ 64	51	51	26	26	0	0
65 ～ 69	35	35	14	14	0	0
70 ～ 74	30	30	16	16	0	0
75 ～ 79	21	21	26	26	0	0
80 ～ 84	27	27	12	12	0	0
85 ～ 89	22	22	7	7	0	0
90 歳 以上	5	5	3	3	0	0
女	476	476	171	171	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	11	11	1	1	0	0
45 ～ 49	36	36	17	17	0	0
50 ～ 54	77	77	21	21	0	0
55 ～ 59	86	86	19	19	0	0
60 ～ 64	58	58	22	22	0	0
65 ～ 69	46	46	16	16	0	0
70 ～ 74	27	27	23	23	0	0
75 ～ 79	39	39	21	21	0	0
80 ～ 84	37	37	16	16	0	0
85 ～ 89	41	41	9	9	0	0
90 歳 以上	17	17	6	6	0	0

別表 1 1 2

すい臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	すい炎				糖尿病			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	24	7	12	5	152	140	2	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	4	2	0	2
50 ～ 54	3	1	2	0	15	13	0	2
55 ～ 59	9	4	4	1	19	17	0	2
60 ～ 64	1	0	1	0	16	13	0	3
65 ～ 69	4	1	1	2	17	16	0	1
70 ～ 74	1	1	0	0	14	14	0	0
75 ～ 79	3	0	2	1	21	21	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	26	25	1	0
85 ～ 89	1	0	1	0	15	15	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	3	2	1	0
男	7	3	2	2	91	82	1	8
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	2	1	0	1
50 ～ 54	1	1	0	0	12	10	0	2
55 ～ 59	3	1	1	1	14	13	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	9	6	0	3
65 ～ 69	2	1	1	0	12	11	0	1
70 ～ 74	0	0	0	0	9	9	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	11	11	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	13	13	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	6	6	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	1	0
女	17	4	10	3	61	58	1	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	2	0	2	0	3	3	0	0
55 ～ 59	6	3	3	0	5	4	0	1
60 ～ 64	1	0	1	0	7	7	0	0
65 ～ 69	2	0	0	2	5	5	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	5	5	0	0
75 ～ 79	2	0	2	0	10	10	0	0
80 ～ 84	1	0	1	0	13	12	1	0
85 ～ 89	1	0	1	0	9	9	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	1	0	0

別表 1 1 3

すい臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	16	5	3	8	909	909	357	357	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	30	30	7	7	0	0
45 ～ 49	3	0	1	2	89	89	27	27	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	161	161	42	42	0	0
55 ～ 59	3	0	0	3	171	171	42	42	0	0
60 ～ 64	1	0	1	0	127	127	48	48	0	0
65 ～ 69	1	0	0	1	79	79	36	36	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	58	58	42	42	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	58	58	47	47	0	0
80 ～ 84	3	2	0	1	54	54	36	36	0	0
85 ～ 89	2	1	1	0	56	56	21	21	0	0
90歳以上	0	0	0	0	24	24	8	8	0	0
男	7	3	1	3	412	412	179	179	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	16	16	5	5	0	0
45 ～ 49	2	0	1	1	45	45	14	14	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	82	82	18	18	0	0
55 ～ 59	2	0	0	2	84	84	21	21	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	59	59	27	27	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	35	35	15	15	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	26	26	18	18	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	17	17	27	27	0	0
80 ～ 84	2	2	0	0	21	21	20	20	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	20	20	10	10	0	0
90歳以上	0	0	0	0	6	6	3	3	0	0
女	9	2	2	5	497	497	178	178	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	14	14	2	2	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	44	44	13	13	0	0
50 ～ 54	1	0	0	1	79	79	24	24	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	87	87	21	21	0	0
60 ～ 64	1	0	1	0	68	68	21	21	0	0
65 ～ 69	1	0	0	1	44	44	21	21	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	32	32	24	24	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	41	41	20	20	0	0
80 ～ 84	1	0	0	1	33	33	16	16	0	0
85 ～ 89	2	1	1	0	36	36	11	11	0	0
90歳以上	0	0	0	0	18	18	5	5	0	0

別表 1 1 4

糖尿病 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	インスリン	その他	未回答	不詳
総 数	140	42	119	21	3	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	2	1	0	0	0	0
50 ～ 54	13	5	12	1	0	0	0
55 ～ 59	17	6	13	4	1	0	0
60 ～ 64	13	3	11	2	1	0	0
65 ～ 69	16	3	16	3	0	0	0
70 ～ 74	14	5	11	4	0	0	0
75 ～ 79	21	9	19	1	0	2	0
80 ～ 84	25	5	21	5	1	0	0
85 ～ 89	15	2	13	1	0	1	0
90 歳 以上	2	1	1	0	0	0	0
男	82	25	70	16	3	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	10	4	9	1	0	0	0
55 ～ 59	13	4	11	3	1	0	0
60 ～ 64	6	1	5	0	1	0	0
65 ～ 69	11	2	11	3	0	0	0
70 ～ 74	9	3	6	3	0	0	0
75 ～ 79	11	6	10	1	0	1	0
80 ～ 84	13	3	10	5	1	0	0
85 ～ 89	6	1	6	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0	0
女	58	17	49	5	0	2	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	1	1	0	0	0	0
50 ～ 54	3	1	3	0	0	0	0
55 ～ 59	4	2	2	1	0	0	0
60 ～ 64	7	2	6	2	0	0	0
65 ～ 69	5	1	5	0	0	0	0
70 ～ 74	5	2	5	1	0	0	0
75 ～ 79	10	3	9	0	0	1	0
80 ～ 84	12	2	11	0	0	0	0
85 ～ 89	9	1	7	1	0	1	0
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0

別表 1 1 5

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎炎				膀胱炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	51	23	25	3	170	39	108	23
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	2	0	3	1	2	0
45 ～ 49	5	1	4	0	12	2	9	1
50 ～ 54	7	2	5	0	20	2	18	0
55 ～ 59	6	2	2	2	26	2	19	5
60 ～ 64	2	0	2	0	28	3	19	6
65 ～ 69	7	3	3	1	21	4	13	4
70 ～ 74	4	2	2	0	12	4	7	1
75 ～ 79	6	4	2	0	17	7	9	1
80 ～ 84	5	3	2	0	21	9	9	3
85 ～ 89	7	6	1	0	8	5	2	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	1	1
男	13	9	3	1	26	7	14	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	1	0	1	0
50 ～ 54	3	2	1	0	3	0	3	0
55 ～ 59	1	0	0	1	7	1	3	3
60 ～ 64	0	0	0	0	1	0	1	0
65 ～ 69	3	3	0	0	5	1	3	1
70 ～ 74	0	0	0	0	2	2	0	0
75 ～ 79	2	2	0	0	3	2	1	0
80 ～ 84	2	1	1	0	4	1	2	1
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	38	14	22	2	144	32	94	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	2	0	3	1	2	0
45 ～ 49	4	1	3	0	11	2	8	1
50 ～ 54	4	0	4	0	17	2	15	0
55 ～ 59	5	2	2	1	19	1	16	2
60 ～ 64	2	0	2	0	27	3	18	6
65 ～ 69	4	0	3	1	16	3	10	3
70 ～ 74	4	2	2	0	10	2	7	1
75 ～ 79	4	2	2	0	14	5	8	1
80 ～ 84	3	2	1	0	17	8	7	2
85 ～ 89	6	5	1	0	8	5	2	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	1	1

別表 1 1 6

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎結石				尿管結石			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	44	12	17	15	62	12	44	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	8	3	4	1	9	1	8	0
50 ～ 54	6	0	1	5	8	1	6	1
55 ～ 59	6	1	2	3	8	0	5	3
60 ～ 64	5	1	3	1	11	1	10	0
65 ～ 69	4	2	1	1	6	2	4	0
70 ～ 74	3	0	2	1	2	1	0	1
75 ～ 79	5	2	2	1	6	2	4	0
80 ～ 84	4	2	0	2	7	2	4	1
85 ～ 89	1	0	1	0	2	0	2	0
90 歳 以上	2	1	1	0	2	1	1	0
男	30	9	13	8	42	8	30	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	7	3	4	0	8	1	7	0
50 ～ 54	5	0	1	4	6	1	5	0
55 ～ 59	2	0	1	1	7	0	4	3
60 ～ 64	3	1	2	0	7	0	7	0
65 ～ 69	2	2	0	0	2	1	1	0
70 ～ 74	3	0	2	1	1	1	0	0
75 ～ 79	3	2	1	0	5	2	3	0
80 ～ 84	3	1	0	2	4	1	2	1
85 ～ 89	1	0	1	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	0	1	0	2	1	1	0
女	14	3	4	7	20	4	14	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	1	0	1	0
50 ～ 54	1	0	0	1	2	0	1	1
55 ～ 59	4	1	1	2	1	0	1	0
60 ～ 64	2	0	1	1	4	1	3	0
65 ～ 69	2	0	1	1	4	1	3	0
70 ～ 74	0	0	0	0	1	0	0	1
75 ～ 79	2	0	1	1	1	0	1	0
80 ～ 84	1	1	0	0	3	1	2	0
85 ～ 89	0	0	0	0	2	0	2	0
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 7

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	膀胱結石				血尿			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	14	5	6	3	121	34	41	46
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	3	1	2	0
45 ～ 49	3	1	1	1	13	5	4	4
50 ～ 54	1	0	1	0	11	2	4	5
55 ～ 59	2	1	0	1	21	2	8	11
60 ～ 64	1	0	1	0	19	1	9	9
65 ～ 69	2	1	0	1	16	8	3	5
70 ～ 74	1	0	1	0	10	1	5	4
75 ～ 79	1	1	0	0	12	5	2	5
80 ～ 84	1	1	0	0	6	4	1	1
85 ～ 89	2	0	2	0	8	4	2	2
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	1	0
男	9	3	3	3	41	13	16	12
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	0	2	0
45 ～ 49	3	1	1	1	3	1	1	1
50 ～ 54	1	0	1	0	5	2	2	1
55 ～ 59	1	0	0	1	8	0	4	4
60 ～ 64	0	0	0	0	5	1	2	2
65 ～ 69	2	1	0	1	9	4	2	3
70 ～ 74	0	0	0	0	2	0	1	1
75 ～ 79	1	1	0	0	3	2	1	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	0	1	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	1	1	0
女	5	2	3	0	80	21	25	34
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	10	4	3	3
50 ～ 54	0	0	0	0	6	0	2	4
55 ～ 59	1	1	0	0	13	2	4	7
60 ～ 64	1	0	1	0	14	0	7	7
65 ～ 69	0	0	0	0	7	4	1	2
70 ～ 74	1	0	1	0	8	1	4	3
75 ～ 79	0	0	0	0	9	3	1	5
80 ～ 84	1	1	0	0	5	3	1	1
85 ～ 89	1	0	1	0	7	3	2	2
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 8

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	蛋白尿				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	66	21	16	29	49	30	5	14
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	5	2	2	1	0	0	0	0
50 ～ 54	7	0	3	4	6	2	2	2
55 ～ 59	13	2	4	7	9	2	1	6
60 ～ 64	9	1	3	5	6	3	0	3
65 ～ 69	8	4	0	4	3	2	1	0
70 ～ 74	5	1	1	3	1	1	0	0
75 ～ 79	5	3	1	1	2	2	0	0
80 ～ 84	4	2	1	1	11	10	0	1
85 ～ 89	8	6	1	1	7	6	1	0
90 歳 以上	1	0	0	1	4	2	0	2
男	34	9	5	20	25	14	3	8
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	2	1	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	4	0	1	3	5	2	1	2
55 ～ 59	8	1	2	5	6	1	1	4
60 ～ 64	5	0	1	4	2	1	0	1
65 ～ 69	6	3	0	3	3	2	1	0
70 ～ 74	1	0	0	1	1	1	0	0
75 ～ 79	2	2	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	3	1	1	1	4	3	0	1
85 ～ 89	1	1	0	0	2	2	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	1	1	0	0
女	32	12	11	9	24	16	2	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	3	1	2	0	0	0	0	0
50 ～ 54	3	0	2	1	1	0	1	0
55 ～ 59	5	1	2	2	3	1	0	2
60 ～ 64	4	1	2	1	4	2	0	2
65 ～ 69	2	1	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	4	1	1	2	0	0	0	0
75 ～ 79	3	1	1	1	1	1	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	7	7	0	0
85 ～ 89	7	5	1	1	5	4	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	3	1	0	2

別表 1 1 9

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	775	775	296	296	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	3	3	1	1	0	0
40 ～ 44	24	24	6	6	0	0
45 ～ 49	66	66	23	23	0	0
50 ～ 54	141	141	37	37	0	0
55 ～ 59	149	149	35	35	0	0
60 ～ 64	101	101	35	35	0	0
65 ～ 69	72	72	23	23	0	0
70 ～ 74	52	52	35	35	0	0
75 ～ 79	49	49	48	48	0	0
80 ～ 84	50	50	25	25	0	0
85 ～ 89	50	50	19	19	0	0
90 歳 以上	18	18	9	9	0	0
男	376	376	172	172	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	14	14	4	4	0	0
45 ～ 49	35	35	14	14	0	0
50 ～ 54	77	77	17	17	0	0
55 ～ 59	77	77	21	21	0	0
60 ～ 64	53	53	25	25	0	0
65 ～ 69	34	34	13	13	0	0
70 ～ 74	24	24	18	18	0	0
75 ～ 79	14	14	30	30	0	0
80 ～ 84	23	23	15	15	0	0
85 ～ 89	19	19	10	10	0	0
90 歳 以上	4	4	4	4	0	0
女	399	399	124	124	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	10	10	2	2	0	0
45 ～ 49	31	31	9	9	0	0
50 ～ 54	64	64	20	20	0	0
55 ～ 59	72	72	14	14	0	0
60 ～ 64	48	48	10	10	0	0
65 ～ 69	38	38	10	10	0	0
70 ～ 74	28	28	17	17	0	0
75 ～ 79	35	35	18	18	0	0
80 ～ 84	27	27	10	10	0	0
85 ～ 89	31	31	9	9	0	0
90 歳 以上	14	14	5	5	0	0

別表 1 2 0

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	大腸ポリープ				慢性胃炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	138	34	72	32	128	70	16	42
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	6	0	4	2	5	2	1	2
50 ～ 54	6	1	4	1	15	3	5	7
55 ～ 59	22	2	12	8	26	10	4	12
60 ～ 64	20	2	14	4	15	6	2	7
65 ～ 69	26	5	16	5	18	10	3	5
70 ～ 74	10	2	3	5	10	7	0	3
75 ～ 79	23	9	10	4	12	11	0	1
80 ～ 84	18	9	6	3	16	12	1	3
85 ～ 89	5	2	3	0	7	7	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	3	2	0	1
男	77	17	41	19	41	24	6	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	2	0	2	1	1	0
50 ～ 54	4	1	3	0	3	1	1	1
55 ～ 59	13	0	7	6	10	4	1	5
60 ～ 64	16	2	11	3	6	3	1	2
65 ～ 69	11	1	7	3	8	5	2	1
70 ～ 74	3	0	1	2	2	1	0	1
75 ～ 79	12	4	5	3	5	4	0	1
80 ～ 84	12	6	4	2	3	3	0	0
85 ～ 89	3	2	1	0	2	2	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	61	17	31	13	87	46	10	31
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	4	0	2	2	3	1	0	2
50 ～ 54	2	0	1	1	12	2	4	6
55 ～ 59	9	2	5	2	16	6	3	7
60 ～ 64	4	0	3	1	9	3	1	5
65 ～ 69	15	4	9	2	10	5	1	4
70 ～ 74	7	2	2	3	8	6	0	2
75 ～ 79	11	5	5	1	7	7	0	0
80 ～ 84	6	3	2	1	13	9	1	3
85 ～ 89	2	0	2	0	5	5	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	3	2	0	1

別表 1 2 1

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	胃潰瘍				十二指腸潰瘍			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	109	43	58	8	69	19	46	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	4	1	3	0
45 ～ 49	6	2	3	1	8	3	4	1
50 ～ 54	20	8	12	0	17	3	13	1
55 ～ 59	26	6	15	5	11	4	5	2
60 ～ 64	10	1	8	1	7	0	7	0
65 ～ 69	15	5	9	1	7	1	6	0
70 ～ 74	8	5	3	0	5	2	3	0
75 ～ 79	11	8	3	0	4	3	1	0
80 ～ 84	5	3	2	0	2	0	2	0
85 ～ 89	4	3	1	0	4	2	2	0
90 歳 以上	2	1	1	0	0	0	0	0
男	68	24	39	5	46	11	31	4
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	4	1	3	0
45 ～ 49	5	2	3	0	4	1	2	1
50 ～ 54	16	6	10	0	11	2	8	1
55 ～ 59	20	5	11	4	8	3	3	2
60 ～ 64	6	1	4	1	6	0	6	0
65 ～ 69	5	2	3	0	4	0	4	0
70 ～ 74	3	1	2	0	1	0	1	0
75 ～ 79	4	2	2	0	3	2	1	0
80 ～ 84	1	0	1	0	1	0	1	0
85 ～ 89	4	3	1	0	4	2	2	0
90 歳 以上	2	1	1	0	0	0	0	0
女	41	19	19	3	23	8	15	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	4	2	2	0
50 ～ 54	4	2	2	0	6	1	5	0
55 ～ 59	6	1	4	1	3	1	2	0
60 ～ 64	4	0	4	0	1	0	1	0
65 ～ 69	10	3	6	1	3	1	2	0
70 ～ 74	5	4	1	0	4	2	2	0
75 ～ 79	7	6	1	0	1	1	0	0
80 ～ 84	4	3	1	0	1	0	1	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 2

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	下痢				便秘			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	250	71	19	160	385	172	20	193
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	11	2	0	9	12	3	0	9
45 ～ 49	23	5	3	15	22	4	0	18
50 ～ 54	42	4	3	35	50	8	3	39
55 ～ 59	51	12	3	36	54	14	3	37
60 ～ 64	34	4	3	27	41	10	2	29
65 ～ 69	27	10	1	16	34	15	1	18
70 ～ 74	12	8	0	4	34	23	2	9
75 ～ 79	18	9	3	6	47	27	4	16
80 ～ 84	14	9	2	3	38	27	4	7
85 ～ 89	14	7	1	6	40	32	1	7
90 歳 以上	4	1	0	3	13	9	0	4
男	125	31	7	87	115	51	4	60
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	1	0	6	5	1	0	4
45 ～ 49	14	2	3	9	4	1	0	3
50 ～ 54	21	2	0	19	12	2	0	10
55 ～ 59	29	6	0	23	19	6	0	13
60 ～ 64	20	4	2	14	13	2	2	9
65 ～ 69	13	3	0	10	11	4	0	7
70 ～ 74	5	3	0	2	6	6	0	0
75 ～ 79	7	3	1	3	14	8	1	5
80 ～ 84	6	4	1	1	14	8	1	5
85 ～ 89	3	3	0	0	14	11	0	3
90 歳 以上	0	0	0	0	3	2	0	1
女	125	40	12	73	270	121	16	133
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	0	3	7	2	0	5
45 ～ 49	9	3	0	6	18	3	0	15
50 ～ 54	21	2	3	16	38	6	3	29
55 ～ 59	22	6	3	13	35	8	3	24
60 ～ 64	14	0	1	13	28	8	0	20
65 ～ 69	14	7	1	6	23	11	1	11
70 ～ 74	7	5	0	2	28	17	2	9
75 ～ 79	11	6	2	3	33	19	3	11
80 ～ 84	8	5	1	2	24	19	3	2
85 ～ 89	11	4	1	6	26	21	1	4
90 歳 以上	4	1	0	3	10	7	0	3

別表 1 2 3

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腹部膨満感(おなかが張る)				痔疾(ぢ)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	169	55	6	108	233	42	63	128
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	0	4	5	0	2	3
45 ～ 49	14	2	2	10	21	4	1	16
50 ～ 54	20	0	0	20	26	2	9	15
55 ～ 59	35	10	1	24	48	5	9	34
60 ～ 64	25	4	0	21	38	3	11	24
65 ～ 69	16	5	1	10	25	1	8	16
70 ～ 74	11	7	0	4	17	6	6	5
75 ～ 79	15	9	1	5	17	3	9	5
80 ～ 84	16	9	1	6	17	8	2	7
85 ～ 89	10	8	0	2	14	7	4	3
90 歳 以上	3	1	0	2	5	3	2	0
男	61	17	3	41	117	19	35	63
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	2	0	1	1
45 ～ 49	6	1	2	3	9	2	1	6
50 ～ 54	5	0	0	5	16	1	7	8
55 ～ 59	21	6	0	15	28	1	5	22
60 ～ 64	10	3	0	7	17	3	5	9
65 ～ 69	5	1	0	4	13	0	5	8
70 ～ 74	2	2	0	0	7	2	3	2
75 ～ 79	4	2	1	1	9	1	4	4
80 ～ 84	2	0	0	2	7	3	1	3
85 ～ 89	2	2	0	0	6	4	2	0
90 歳 以上	1	0	0	1	3	2	1	0
女	108	38	3	67	116	23	28	65
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	3	0	1	2
45 ～ 49	8	1	0	7	12	2	0	10
50 ～ 54	15	0	0	15	10	1	2	7
55 ～ 59	14	4	1	9	20	4	4	12
60 ～ 64	15	1	0	14	21	0	6	15
65 ～ 69	11	4	1	6	12	1	3	8
70 ～ 74	9	5	0	4	10	4	3	3
75 ～ 79	11	7	0	4	8	2	5	1
80 ～ 84	14	9	1	4	10	5	1	4
85 ～ 89	8	6	0	2	8	3	2	3
90 歳 以上	2	1	0	1	2	1	1	0

別表 1 2 4

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腹痛				逆流性食道炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	145	43	12	90	165	76	21	68
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	7	2	0	5	5	1	1	3
45 ～ 49	11	3	2	6	17	5	4	8
50 ～ 54	25	2	2	21	18	4	3	11
55 ～ 59	31	8	3	20	30	13	5	12
60 ～ 64	24	3	3	18	19	5	1	13
65 ～ 69	11	4	0	7	20	7	3	10
70 ～ 74	8	3	0	5	17	15	0	2
75 ～ 79	9	5	1	3	18	12	2	4
80 ～ 84	10	6	1	3	13	8	1	4
85 ～ 89	6	5	0	1	6	4	1	1
90 歳 以上	3	2	0	1	1	1	0	0
男	58	15	6	37	74	36	4	34
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	3	1	1	1
45 ～ 49	6	1	2	3	8	2	1	5
50 ～ 54	10	2	1	7	9	3	0	6
55 ～ 59	12	3	1	8	15	7	1	7
60 ～ 64	10	1	1	8	10	3	0	7
65 ～ 69	5	1	0	4	6	5	0	1
70 ～ 74	2	1	0	1	6	6	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	7	3	0	4
80 ～ 84	4	2	1	1	8	4	1	3
85 ～ 89	3	3	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
女	87	28	6	53	91	40	17	34
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	2	0	2	2	0	0	2
45 ～ 49	5	2	0	3	9	3	3	3
50 ～ 54	15	0	1	14	9	1	3	5
55 ～ 59	19	5	2	12	15	6	4	5
60 ～ 64	14	2	2	10	9	2	1	6
65 ～ 69	6	3	0	3	14	2	3	9
70 ～ 74	6	2	0	4	11	9	0	2
75 ～ 79	7	4	1	2	11	9	2	0
80 ～ 84	6	4	0	2	5	4	0	1
85 ～ 89	3	2	0	1	5	3	1	1
90 歳 以上	2	2	0	0	1	1	0	0

別表 1 2 5

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	40	22	8	10	404	404	198	198	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	4	1	1	2	11	11	3	3	0	0
45 ～ 49	4	3	0	1	42	42	18	18	0	0
50 ～ 54	4	2	2	0	74	74	24	24	0	0
55 ～ 59	6	2	2	2	66	66	21	21	0	0
60 ～ 64	4	0	2	2	61	61	24	24	0	0
65 ～ 69	3	1	0	2	32	32	18	18	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	27	27	24	24	0	0
75 ～ 79	2	2	0	0	27	27	23	23	0	0
80 ～ 84	6	5	1	0	29	29	21	21	0	0
85 ～ 89	3	3	0	0	24	24	15	15	0	0
90 歳 以上	2	1	0	1	9	9	6	6	0	0
男	10	7	2	1	195	195	111	111	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	7	7	2	2	0	0
45 ～ 49	2	2	0	0	27	27	8	8	0	0
50 ～ 54	2	1	1	0	39	39	13	13	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	32	32	12	12	0	0
60 ～ 64	1	0	1	0	27	27	16	16	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	17	17	7	7	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	12	12	15	15	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	10	10	15	15	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	14	14	11	11	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	7	7	8	8	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0
女	30	15	6	9	209	209	87	87	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	1	1	4	4	1	1	0	0
45 ～ 49	2	1	0	1	15	15	10	10	0	0
50 ～ 54	2	1	1	0	35	35	11	11	0	0
55 ～ 59	6	2	2	2	34	34	9	9	0	0
60 ～ 64	3	0	1	2	34	34	8	8	0	0
65 ～ 69	2	0	0	2	15	15	11	11	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	15	15	9	9	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	17	17	8	8	0	0
80 ～ 84	6	5	1	0	15	15	10	10	0	0
85 ～ 89	2	2	0	0	17	17	7	7	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	7	7	3	3	0	0

別表 1 2 6

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脂質異常症(高脂血症)				貧血			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	270	192	8	70	138	48	27	63
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	10	4	1	5
45 ～ 49	15	9	2	4	21	7	4	10
50 ～ 54	34	19	1	14	21	2	6	13
55 ～ 59	42	21	2	19	22	5	4	13
60 ～ 64	46	29	0	17	12	2	4	6
65 ～ 69	32	25	1	6	14	2	6	6
70 ～ 74	21	17	0	4	7	5	0	2
75 ～ 79	35	31	1	3	9	5	2	2
80 ～ 84	23	23	0	0	7	6	0	1
85 ～ 89	15	12	1	2	14	9	0	5
90 歳 以上	6	6	0	0	1	1	0	0
男	111	77	4	30	36	13	3	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	9	7	1	1	4	3	0	1
50 ～ 54	16	10	1	5	5	0	0	5
55 ～ 59	20	9	1	10	8	1	0	7
60 ～ 64	20	13	0	7	0	0	0	0
65 ～ 69	12	8	1	3	8	2	3	3
70 ～ 74	6	6	0	0	2	2	0	0
75 ～ 79	11	9	0	2	2	1	0	1
80 ～ 84	8	8	0	0	3	2	0	1
85 ～ 89	7	6	0	1	3	2	0	1
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0	0
女	159	115	4	40	102	35	24	43
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	9	4	1	4
45 ～ 49	6	2	1	3	17	4	4	9
50 ～ 54	18	9	0	9	16	2	6	8
55 ～ 59	22	12	1	9	14	4	4	6
60 ～ 64	26	16	0	10	12	2	4	6
65 ～ 69	20	17	0	3	6	0	3	3
70 ～ 74	15	11	0	4	5	3	0	2
75 ～ 79	24	22	1	1	7	4	2	1
80 ～ 84	15	15	0	0	4	4	0	0
85 ～ 89	8	6	1	1	11	7	0	4
90 歳 以上	5	5	0	0	1	1	0	0

別表 1 2 7

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	リンパ節の腫大(リンパの腫れ)				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	20	8	5	7	11	2	3	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	1	1	1	0	1	0
50 ～ 54	2	0	0	2	1	0	1	0
55 ～ 59	3	0	1	2	3	0	1	2
60 ～ 64	5	2	2	1	1	0	0	1
65 ～ 69	2	1	0	1	3	1	0	2
70 ～ 74	2	1	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	2	2	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
男	11	4	3	4	2	1	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	1	1	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	1	1	1	0	1	0
60 ～ 64	3	1	1	1	0	0	0	0
65 ～ 69	1	0	0	1	0	0	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	1	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	4	2	3	9	1	2	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	1	0	1	0
50 ～ 54	2	0	0	2	1	0	1	0
55 ～ 59	1	0	0	1	2	0	0	2
60 ～ 64	2	1	1	0	1	0	0	1
65 ～ 69	1	1	0	0	3	1	0	2
70 ～ 74	1	0	1	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1

別表 1 2 8

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	718	718	326	326	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	21	21	7	7	0	0
45 ～ 49	62	62	25	25	0	0
50 ～ 54	129	129	38	38	0	0
55 ～ 59	139	139	36	36	0	0
60 ～ 64	101	101	35	35	0	0
65 ～ 69	61	61	31	31	0	0
70 ～ 74	44	44	43	43	0	0
75 ～ 79	47	47	42	42	0	0
80 ～ 84	49	49	39	39	0	0
85 ～ 89	46	46	19	19	0	0
90 歳 以上	17	17	10	10	0	0
男	369	369	173	173	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	15	15	5	5	0	0
45 ～ 49	38	38	11	11	0	0
50 ～ 54	75	75	18	18	0	0
55 ～ 59	72	72	21	21	0	0
60 ～ 64	51	51	21	21	0	0
65 ～ 69	33	33	12	12	0	0
70 ～ 74	22	22	22	22	0	0
75 ～ 79	16	16	28	28	0	0
80 ～ 84	22	22	22	22	0	0
85 ～ 89	17	17	9	9	0	0
90 歳 以上	7	7	3	3	0	0
女	349	349	153	153	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	6	6	2	2	0	0
45 ～ 49	24	24	14	14	0	0
50 ～ 54	54	54	20	20	0	0
55 ～ 59	67	67	15	15	0	0
60 ～ 64	50	50	14	14	0	0
65 ～ 69	28	28	19	19	0	0
70 ～ 74	22	22	21	21	0	0
75 ～ 79	31	31	14	14	0	0
80 ～ 84	27	27	17	17	0	0
85 ～ 89	29	29	10	10	0	0
90 歳 以上	10	10	7	7	0	0

別表 1 2 9

脂質異常症（高脂血症） 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総 数	192	35	167	1	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	9	4	5	0	0	0
50 ～ 54	19	2	18	0	1	0
55 ～ 59	21	4	18	1	0	0
60 ～ 64	29	5	26	0	0	0
65 ～ 69	25	7	20	0	0	0
70 ～ 74	17	4	16	0	0	0
75 ～ 79	31	7	26	0	0	0
80 ～ 84	23	2	21	0	1	0
85 ～ 89	12	0	11	0	1	0
90 歳 以上	6	0	6	0	0	0
男	77	19	64	0	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	7	4	3	0	0	0
50 ～ 54	10	1	10	0	0	0
55 ～ 59	9	2	8	0	0	0
60 ～ 64	13	3	11	0	0	0
65 ～ 69	8	4	5	0	0	0
70 ～ 74	6	1	6	0	0	0
75 ～ 79	9	4	7	0	0	0
80 ～ 84	8	0	8	0	0	0
85 ～ 89	6	0	5	0	1	0
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0
女	115	16	103	1	2	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	2	0	2	0	0	0
50 ～ 54	9	1	8	0	1	0
55 ～ 59	12	2	10	1	0	0
60 ～ 64	16	2	15	0	0	0
65 ～ 69	17	3	15	0	0	0
70 ～ 74	11	3	10	0	0	0
75 ～ 79	22	3	19	0	0	0
80 ～ 84	15	2	13	0	1	0
85 ～ 89	6	0	6	0	0	0
90 歳 以上	5	0	5	0	0	0

別表 1 3 0

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 1、性、年
齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	前立腺肥大				男性不妊(子供ができない)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	81	55	9	17	2	1	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	3	2	0	1	0	0	0	0
55 ～ 59	6	4	0	2	1	0	0	1
60 ～ 64	7	2	2	3	0	0	0	0
65 ～ 69	7	4	0	3	0	0	0	0
70 ～ 74	6	5	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	13	9	0	4	1	1	0	0
80 ～ 84	17	12	5	0	0	0	0	0
85 ～ 89	16	13	2	1	0	0	0	0
90 歳 以上	6	4	0	2	0	0	0	0
男	81	55	9	17	2	1	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	3	2	0	1	0	0	0	0
55 ～ 59	6	4	0	2	1	0	0	1
60 ～ 64	7	2	2	3	0	0	0	0
65 ～ 69	7	4	0	3	0	0	0	0
70 ～ 74	6	5	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	13	9	0	4	1	1	0	0
80 ～ 84	17	12	5	0	0	0	0	0
85 ～ 89	16	13	2	1	0	0	0	0
90 歳 以上	6	4	0	2	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 1

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	インポテンツ				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	26	3	0	23	21	14	1	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	4	0	0	4	4	2	0	2
55 ～ 59	7	1	0	6	3	2	0	1
60 ～ 64	3	0	0	3	3	2	0	1
65 ～ 69	7	1	0	6	1	1	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	2	1	1	0
75 ～ 79	3	1	0	2	4	3	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	4	3	0	1
85 ～ 89	1	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	26	3	0	23	21	14	1	6
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	4	0	0	4	4	2	0	2
55 ～ 59	7	1	0	6	3	2	0	1
60 ～ 64	3	0	0	3	3	2	0	1
65 ～ 69	7	1	0	6	1	1	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	2	1	1	0
75 ～ 79	3	1	0	2	4	3	0	1
80 ～ 84	0	0	0	0	4	3	0	1
85 ～ 89	1	0	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 2

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 3、性、年
齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	410	410	165	165	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	2	2	0	0
40 ～ 44	17	17	5	5	0	0
45 ～ 49	50	50	13	13	0	0
50 ～ 54	86	86	17	17	0	0
55 ～ 59	87	87	21	21	0	0
60 ～ 64	59	59	23	23	0	0
65 ～ 69	37	37	12	12	0	0
70 ～ 74	27	27	16	16	0	0
75 ～ 79	12	12	27	27	0	0
80 ～ 84	19	19	17	17	0	0
85 ～ 89	12	12	9	9	0	0
90 歳 以上	3	3	3	3	0	0
男	403	403	165	165	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	2	2	0	0
40 ～ 44	16	16	5	5	0	0
45 ～ 49	50	50	13	13	0	0
50 ～ 54	85	85	17	17	0	0
55 ～ 59	84	84	21	21	0	0
60 ～ 64	59	59	23	23	0	0
65 ～ 69	37	37	12	12	0	0
70 ～ 74	27	27	16	16	0	0
75 ～ 79	12	12	27	27	0	0
80 ～ 84	18	18	17	17	0	0
85 ～ 89	12	12	9	9	0	0
90 歳 以上	2	2	3	3	0	0
女	7	7	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0
55 ～ 59	3	3	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0

別表 1 3 3

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	子宮内膜症				子宮筋腫			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	30	8	19	3	75	21	30	24
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	3	1	0	2
45 ～ 49	5	2	2	1	12	6	1	5
50 ～ 54	4	0	2	2	13	4	4	5
55 ～ 59	5	1	4	0	11	2	4	5
60 ～ 64	5	0	5	0	13	1	8	4
65 ～ 69	1	0	1	0	7	1	5	1
70 ～ 74	1	1	0	0	5	1	3	1
75 ～ 79	4	2	2	0	5	2	3	0
80 ～ 84	2	1	1	0	3	2	1	0
85 ～ 89	2	1	1	0	3	1	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	30	8	19	3	75	21	30	24
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	3	1	0	2
45 ～ 49	5	2	2	1	12	6	1	5
50 ～ 54	4	0	2	2	13	4	4	5
55 ～ 59	5	1	4	0	11	2	4	5
60 ～ 64	5	0	5	0	13	1	8	4
65 ～ 69	1	0	1	0	7	1	5	1
70 ～ 74	1	1	0	0	5	1	3	1
75 ～ 79	4	2	2	0	5	2	3	0
80 ～ 84	2	1	1	0	3	2	1	0
85 ～ 89	2	1	1	0	3	1	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 4

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	卵巣のう腫				月経困難症(生理痛)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	22	3	16	3	32	7	7	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	2	0	3
45 ～ 49	2	0	1	1	9	2	0	7
50 ～ 54	2	0	2	0	7	0	2	5
55 ～ 59	6	1	4	1	1	0	1	0
60 ～ 64	6	0	6	0	2	0	1	1
65 ～ 69	3	0	2	1	3	1	1	1
70 ～ 74	0	0	0	0	2	0	1	1
75 ～ 79	2	2	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	0	1	0
85 ～ 89	1	0	1	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	22	3	16	3	32	7	7	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	2	0	3
45 ～ 49	2	0	1	1	9	2	0	7
50 ～ 54	2	0	2	0	7	0	2	5
55 ～ 59	6	1	4	1	1	0	1	0
60 ～ 64	6	0	6	0	2	0	1	1
65 ～ 69	3	0	2	1	3	1	1	1
70 ～ 74	0	0	0	0	2	0	1	1
75 ～ 79	2	2	0	0	1	1	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	0	1	0
85 ～ 89	1	0	1	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 5

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	不正出血				月経不順			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	36	6	18	12	43	10	15	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	4	2	0	2
45 ～ 49	8	3	2	3	11	3	2	6
50 ～ 54	7	2	1	4	12	2	3	7
55 ～ 59	4	0	3	1	5	0	3	2
60 ～ 64	5	0	5	0	1	0	1	0
65 ～ 69	4	0	3	1	5	2	2	1
70 ～ 74	3	1	1	1	1	0	1	0
75 ～ 79	4	0	2	2	2	0	2	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	0	1	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	36	6	18	12	43	10	15	18
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	4	2	0	2
45 ～ 49	8	3	2	3	11	3	2	6
50 ～ 54	7	2	1	4	12	2	3	7
55 ～ 59	4	0	3	1	5	0	3	2
60 ～ 64	5	0	5	0	1	0	1	0
65 ～ 69	4	0	3	1	5	2	2	1
70 ～ 74	3	1	1	1	1	0	1	0
75 ～ 79	4	0	2	2	2	0	2	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	0	1	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 6

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	過多月経(月経が多い)				過少月経(月経が少ない)			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	26	4	11	11	10	2	1	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	7	2	0	5	4	0	0	4
50 ～ 54	5	0	1	4	2	0	0	2
55 ～ 59	3	0	3	0	1	1	0	0
60 ～ 64	5	0	5	0	1	0	1	0
65 ～ 69	3	0	1	2	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	1	1	0	1	0	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	26	4	11	11	10	2	1	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	7	2	0	5	4	0	0	4
50 ～ 54	5	0	1	4	2	0	0	2
55 ～ 59	3	0	3	0	1	1	0	0
60 ～ 64	5	0	5	0	1	0	1	0
65 ～ 69	3	0	1	2	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	2	1	1	0	1	0	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 7

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	24	11	6	7	436	436	141	141	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0
45 ～ 49	3	0	2	1	26	26	7	7	0	0
50 ～ 54	6	5	0	1	59	59	17	17	0	0
55 ～ 59	2	0	1	1	74	74	17	17	0	0
60 ～ 64	4	2	1	1	55	55	15	15	0	0
65 ～ 69	7	4	1	2	40	40	14	14	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	34	34	20	20	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	41	41	17	17	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	40	40	17	17	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	43	43	9	9	0	0
90歳以上	0	0	0	0	18	18	6	6	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	24	11	6	7	436	436	141	141	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0
45 ～ 49	3	0	2	1	26	26	7	7	0	0
50 ～ 54	6	5	0	1	59	59	17	17	0	0
55 ～ 59	2	0	1	1	74	74	17	17	0	0
60 ～ 64	4	2	1	1	55	55	15	15	0	0
65 ～ 69	7	4	1	2	40	40	14	14	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	34	34	20	20	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	41	41	17	17	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	40	40	17	17	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	43	43	9	9	0	0
90歳以上	0	0	0	0	18	18	6	6	0	0

別表 1 3 8

初経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総 数	756	266	7	483	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	10	0	7	0
45 ～ 49	58	23	1	34	0
50 ～ 54	109	49	0	60	0
55 ～ 59	119	44	0	75	0
60 ～ 64	98	32	1	65	0
65 ～ 69	72	24	1	47	0
70 ～ 74	63	20	1	42	0
75 ～ 79	73	29	1	43	0
80 ～ 84	63	16	0	47	0
85 ～ 89	59	14	0	45	0
90 歳 以上	24	4	2	18	0
男	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0
女	756	266	7	483	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0
40 ～ 44	17	10	0	7	0
45 ～ 49	58	23	1	34	0
50 ～ 54	109	49	0	60	0
55 ～ 59	119	44	0	75	0
60 ～ 64	98	32	1	65	0
65 ～ 69	72	24	1	47	0
70 ～ 74	63	20	1	42	0
75 ～ 79	73	29	1	43	0
80 ～ 84	63	16	0	47	0
85 ～ 89	59	14	0	45	0
90 歳 以上	24	4	2	18	0

別表 1 3 9

閉経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総 数	756	242	47	467	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	1	6	10	0
45 ～ 49	58	6	19	33	0
50 ～ 54	109	40	15	54	0
55 ～ 59	119	48	0	71	0
60 ～ 64	98	35	1	62	0
65 ～ 69	72	24	2	46	0
70 ～ 74	63	20	1	42	0
75 ～ 79	73	31	1	41	0
80 ～ 84	63	17	0	46	0
85 ～ 89	59	14	0	45	0
90 歳 以上	24	6	1	17	0
男	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0
女	756	242	47	467	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	1	6	10	0
45 ～ 49	58	6	19	33	0
50 ～ 54	109	40	15	54	0
55 ～ 59	119	48	0	71	0
60 ～ 64	98	35	1	62	0
65 ～ 69	72	24	2	46	0
70 ～ 74	63	20	1	42	0
75 ～ 79	73	31	1	41	0
80 ～ 84	63	17	0	46	0
85 ～ 89	59	14	0	45	0
90 歳 以上	24	6	1	17	0

別表 1 4 0

不妊症、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総 数	756	8	175	573	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	6	11	0
45 ～ 49	58	2	18	38	0
50 ～ 54	109	2	30	77	0
55 ～ 59	119	1	32	86	0
60 ～ 64	98	2	21	75	0
65 ～ 69	72	0	15	57	0
70 ～ 74	63	0	10	53	0
75 ～ 79	73	0	16	57	0
80 ～ 84	63	0	13	50	0
85 ～ 89	59	1	8	50	0
90 歳 以上	24	0	5	19	0
男	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0
女	756	8	175	573	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	1	0	0
40 ～ 44	17	0	6	11	0
45 ～ 49	58	2	18	38	0
50 ～ 54	109	2	30	77	0
55 ～ 59	119	1	32	86	0
60 ～ 64	98	2	21	75	0
65 ～ 69	72	0	15	57	0
70 ～ 74	63	0	10	53	0
75 ～ 79	73	0	16	57	0
80 ～ 84	63	0	13	50	0
85 ～ 89	59	1	8	50	0
90 歳 以上	24	0	5	19	0

別表 1 4 1

妊娠回数 1、性、年齢（5 歳階級）別

(単位: 人)

性 年齢階層	総数	0	1	2	3	4	5	6
総 数	756	23	22	87	68	34	17	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	2	2	4	0	1	1	0
45 ～ 49	58	3	1	6	8	1	1	0
50 ～ 54	109	5	7	15	12	6	0	0
55 ～ 59	119	2	5	17	13	4	1	0
60 ～ 64	98	4	2	13	8	3	1	1
65 ～ 69	72	4	2	7	6	3	3	0
70 ～ 74	63	1	0	5	6	3	2	1
75 ～ 79	73	0	3	11	7	3	4	3
80 ～ 84	63	0	0	8	6	4	0	1
85 ～ 89	59	1	0	1	2	3	2	3
90 歳 以上	24	0	0	0	0	3	2	2
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	756	23	22	87	68	34	17	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	10	2	2	4	0	1	1	0
45 ～ 49	20	3	1	6	8	1	1	0
50 ～ 54	45	5	7	15	12	6	0	0
55 ～ 59	43	2	5	17	13	4	1	0
60 ～ 64	32	4	2	13	8	3	1	1
65 ～ 69	25	4	2	7	6	3	3	0
70 ～ 74	18	1	0	5	6	3	2	1
75 ～ 79	32	0	3	11	7	3	4	3
80 ～ 84	20	0	0	8	6	4	0	1
85 ～ 89	13	1	0	1	2	3	2	3
90 歳 以上	7	0	0	0	0	3	2	2

別表 1 4 2

妊娠回数 2、性、年齢（5 歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	7	8	9	10	10回以上	未回答	不詳
総 数	756	2	2	0	0	1	489	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	17	0	0	0	0	0	7	0
45 ～ 49	58	0	0	0	0	0	38	0
50 ～ 54	109	0	0	0	0	0	64	0
55 ～ 59	119	0	1	0	0	0	76	0
60 ～ 64	98	0	0	0	0	0	66	0
65 ～ 69	72	0	0	0	0	0	47	0
70 ～ 74	63	0	0	0	0	0	45	0
75 ～ 79	73	1	0	0	0	0	41	0
80 ～ 84	63	0	1	0	0	0	43	0
85 ～ 89	59	1	0	0	0	1	45	0
90 歳 以上	24	0	0	0	0	0	17	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	756	2	2	0	0	1	489	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	0	0	0	1	0
40 ～ 44	10	0	0	0	0	0	2	0
45 ～ 49	20	0	0	0	0	0	3	0
50 ～ 54	45	0	0	0	0	0	5	0
55 ～ 59	43	0	1	0	0	0	2	0
60 ～ 64	32	0	0	0	0	0	4	0
65 ～ 69	25	0	0	0	0	0	4	0
70 ～ 74	18	0	0	0	0	0	1	0
75 ～ 79	32	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	20	0	1	0	0	0	0	0
85 ～ 89	13	1	0	0	0	0	1	0
90 歳 以上	7	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 3

妊娠中の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	とくになし	切迫流産	切迫早産	妊娠中毒 症	その他	未回答	不詳
総 数	728	363	37	8	29	23	277	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	5	4	0	2	0	8	0
45 ～ 49	43	15	5	4	5	2	16	0
50 ～ 54	101	61	4	3	5	1	30	0
55 ～ 59	108	69	3	1	3	3	29	0
60 ～ 64	75	42	7	0	1	2	23	0
65 ～ 69	66	18	7	0	5	10	28	0
70 ～ 74	66	18	3	0	5	0	40	0
75 ～ 79	95	38	3	0	2	3	49	0
80 ～ 84	71	40	1	0	0	1	29	0
85 ～ 89	59	41	0	0	1	0	17	0
90 歳 以上	25	16	0	0	0	1	8	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	363	37	8	29	23	277	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	5	4	0	2	0	8	0
45 ～ 49	43	15	5	4	5	2	16	0
50 ～ 54	101	61	4	3	5	1	30	0
55 ～ 59	108	69	3	1	3	3	29	0
60 ～ 64	75	42	7	0	1	2	23	0
65 ～ 69	66	18	7	0	5	10	28	0
70 ～ 74	66	18	3	0	5	0	40	0
75 ～ 79	95	38	3	0	2	3	49	0
80 ～ 84	71	40	1	0	0	1	29	0
85 ～ 89	59	41	0	0	1	0	17	0
90 歳 以上	25	16	0	0	0	1	8	0

別表 1 4 4

出産について、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	正常分娩	帝王切開	早産	死産	自然流産	人工流産	その他	未回答	不詳
総 数	737	381	35	10	14	38	55	6	202	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	6	2	0	0	4	1	0	6	0
45 ～ 49	43	19	4	0	2	2	5	0	11	0
50 ～ 54	101	60	12	2	1	6	2	2	16	0
55 ～ 59	108	64	7	2	2	5	9	1	18	0
60 ～ 64	76	51	0	0	1	2	4	2	17	0
65 ～ 69	66	23	4	2	0	2	13	1	22	0
70 ～ 74	67	29	3	0	1	9	4	0	21	0
75 ～ 79	97	41	3	2	3	3	9	0	37	0
80 ～ 84	72	36	0	2	2	3	3	0	27	0
85 ～ 89	62	44	0	0	2	2	2	0	12	0
90 歳 以上	26	8	0	0	0	0	3	0	15	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	737	381	35	10	14	38	55	6	202	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	6	2	0	0	4	1	0	6	0
45 ～ 49	43	19	4	0	2	2	5	0	11	0
50 ～ 54	101	60	12	2	1	6	2	2	16	0
55 ～ 59	108	64	7	2	2	5	9	1	18	0
60 ～ 64	76	51	0	0	1	2	4	2	17	0
65 ～ 69	66	23	4	2	0	2	13	1	22	0
70 ～ 74	67	29	3	0	1	9	4	0	21	0
75 ～ 79	97	41	3	2	3	3	9	0	37	0
80 ～ 84	72	36	0	2	2	3	3	0	27	0
85 ～ 89	62	44	0	0	2	2	2	0	12	0
90 歳 以上	26	8	0	0	0	0	3	0	15	0

別表 1 4 5

出産時の出血量、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	小	中	多	未回答	不詳
総 数	737	65	154	36	482	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	1	3	2	13	0
45 ～ 49	43	5	8	10	20	0
50 ～ 54	101	18	37	7	39	0
55 ～ 59	108	12	23	1	72	0
60 ～ 64	76	7	19	4	46	0
65 ～ 69	66	5	17	1	43	0
70 ～ 74	67	6	10	7	44	0
75 ～ 79	97	2	15	1	79	0
80 ～ 84	72	3	14	3	52	0
85 ～ 89	62	1	5	0	56	0
90 歳 以上	26	5	3	0	18	0
男	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0
女	737	65	154	36	482	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	19	1	3	2	13	0
45 ～ 49	43	5	8	10	20	0
50 ～ 54	101	18	37	7	39	0
55 ～ 59	108	12	23	1	72	0
60 ～ 64	76	7	19	4	46	0
65 ～ 69	66	5	17	1	43	0
70 ～ 74	67	6	10	7	44	0
75 ～ 79	97	2	15	1	79	0
80 ～ 84	72	3	14	3	52	0
85 ～ 89	62	1	5	0	56	0
90 歳 以上	26	5	3	0	18	0

別表 1 4 6

新生児の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	とくになし	低出生体 重児	先天異常	奇形	その他	未回答	不詳
総 数	638	396	10	7	3	34	191	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	9	0	0	0	1	5	0
45 ～ 49	37	22	1	1	0	4	9	0
50 ～ 54	83	58	1	3	0	8	13	0
55 ～ 59	91	67	2	0	0	3	19	0
60 ～ 64	61	46	0	3	0	2	11	0
65 ～ 69	60	19	2	0	1	5	33	0
70 ～ 74	60	36	0	0	0	1	23	0
75 ～ 79	83	45	0	0	0	1	37	0
80 ～ 84	65	30	4	0	0	7	26	0
85 ～ 89	58	48	0	0	2	1	7	0
90 歳 以上	25	16	0	0	0	1	8	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	638	396	10	7	3	34	191	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	15	9	0	0	0	1	5	0
45 ～ 49	37	22	1	1	0	4	9	0
50 ～ 54	83	58	1	3	0	8	13	0
55 ～ 59	91	67	2	0	0	3	19	0
60 ～ 64	61	46	0	3	0	2	11	0
65 ～ 69	60	19	2	0	1	5	33	0
70 ～ 74	60	36	0	0	0	1	23	0
75 ～ 79	83	45	0	0	0	1	37	0
80 ～ 84	65	30	4	0	0	7	26	0
85 ～ 89	58	48	0	0	2	1	7	0
90 歳 以上	25	16	0	0	0	1	8	0

別表 1 4 7

骨・関節の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	骨折				椎間板ヘルニア			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	167	46	116	5	102	39	27	36
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	2	0	2	1	0	1
45 ～ 49	10	2	7	1	8	2	2	4
50 ～ 54	21	4	17	0	18	9	3	6
55 ～ 59	26	4	21	1	14	4	3	7
60 ～ 64	19	1	18	0	13	2	7	4
65 ～ 69	16	3	13	0	11	3	2	6
70 ～ 74	13	3	10	0	9	6	2	1
75 ～ 79	20	9	10	1	9	5	2	2
80 ～ 84	20	11	8	1	10	3	2	5
85 ～ 89	12	6	6	0	7	4	3	0
90 歳 以上	8	3	4	1	1	0	1	0
男	66	14	49	3	60	20	14	26
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	2	0	2	1	0	1
45 ～ 49	6	1	5	0	5	1	1	3
50 ～ 54	13	2	11	0	13	8	1	4
55 ～ 59	10	1	8	1	9	1	2	6
60 ～ 64	9	1	8	0	8	0	4	4
65 ～ 69	4	1	3	0	6	2	1	3
70 ～ 74	6	1	5	0	4	3	1	0
75 ～ 79	7	3	3	1	5	1	2	2
80 ～ 84	5	2	2	1	5	1	1	3
85 ～ 89	4	2	2	0	3	2	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	101	32	67	2	42	19	13	10
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	2	1	3	1	1	1
50 ～ 54	8	2	6	0	5	1	2	2
55 ～ 59	16	3	13	0	5	3	1	1
60 ～ 64	10	0	10	0	5	2	3	0
65 ～ 69	12	2	10	0	5	1	1	3
70 ～ 74	7	2	5	0	5	3	1	1
75 ～ 79	13	6	7	0	4	4	0	0
80 ～ 84	15	9	6	0	5	2	1	2
85 ～ 89	8	4	4	0	4	2	2	0
90 歳 以上	8	3	4	1	1	0	1	0

別表 1 4 8

骨・関節の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	骨粗しょう症				骨の変形			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	176	125	2	49	148	64	6	78
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	2	0	0	2	5	1	0	4
50 ～ 54	5	2	0	3	12	5	0	7
55 ～ 59	11	6	0	5	15	2	0	13
60 ～ 64	19	10	0	9	20	8	2	10
65 ～ 69	21	13	0	8	18	7	1	10
70 ～ 74	24	20	0	4	11	7	0	4
75 ～ 79	35	28	1	6	25	15	0	10
80 ～ 84	26	23	0	3	16	8	1	7
85 ～ 89	24	19	1	4	18	8	2	8
90 歳 以上	8	3	0	5	7	3	0	4
男	19	10	0	9	32	13	0	19
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	1	0	0	1	2	1	0	1
50 ～ 54	0	0	0	0	4	2	0	2
55 ～ 59	1	0	0	1	4	1	0	3
60 ～ 64	4	1	0	3	4	2	0	2
65 ～ 69	3	2	0	1	4	1	0	3
70 ～ 74	0	0	0	0	1	1	0	0
75 ～ 79	5	3	0	2	5	3	0	2
80 ～ 84	5	4	0	1	4	0	0	4
85 ～ 89	0	0	0	0	3	2	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	157	115	2	40	116	51	6	59
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	3	0	0	3
50 ～ 54	5	2	0	3	8	3	0	5
55 ～ 59	10	6	0	4	11	1	0	10
60 ～ 64	15	9	0	6	16	6	2	8
65 ～ 69	18	11	0	7	14	6	1	7
70 ～ 74	24	20	0	4	10	6	0	4
75 ～ 79	30	25	1	4	20	12	0	8
80 ～ 84	21	19	0	2	12	8	1	3
85 ～ 89	24	19	1	4	15	6	2	7
90 歳 以上	8	3	0	5	7	3	0	4

別表 1 4 9

骨・関節の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	痛風				関節痛			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	71	47	9	15	370	178	11	181
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	10	2	0	8
45 ～ 49	7	4	2	1	18	7	0	11
50 ～ 54	12	8	3	1	44	14	3	27
55 ～ 59	12	7	3	2	56	10	1	45
60 ～ 64	12	8	1	3	44	15	0	29
65 ～ 69	6	3	0	3	34	15	0	19
70 ～ 74	4	4	0	0	41	28	0	13
75 ～ 79	7	4	0	3	47	32	2	13
80 ～ 84	7	5	0	2	32	21	2	9
85 ～ 89	4	4	0	0	33	27	3	3
90 歳 以上	0	0	0	0	11	7	0	4
男	58	40	9	9	138	52	3	83
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	4	1	0	3
45 ～ 49	5	3	2	0	9	3	0	6
50 ～ 54	12	8	3	1	17	5	1	11
55 ～ 59	11	7	3	1	24	2	1	21
60 ～ 64	10	7	1	2	17	2	0	15
65 ～ 69	5	3	0	2	16	6	0	10
70 ～ 74	3	3	0	0	13	7	0	6
75 ～ 79	6	4	0	2	15	9	1	5
80 ～ 84	5	4	0	1	13	8	0	5
85 ～ 89	1	1	0	0	8	7	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	0	0
女	13	7	0	6	232	126	8	98
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	6	1	0	5
45 ～ 49	2	1	0	1	9	4	0	5
50 ～ 54	0	0	0	0	27	9	2	16
55 ～ 59	1	0	0	1	32	8	0	24
60 ～ 64	2	1	0	1	27	13	0	14
65 ～ 69	1	0	0	1	18	9	0	9
70 ～ 74	1	1	0	0	28	21	0	7
75 ～ 79	1	0	0	1	32	23	1	8
80 ～ 84	2	1	0	1	19	13	2	4
85 ～ 89	3	3	0	0	25	20	3	2
90 歳 以上	0	0	0	0	9	5	0	4

別表 1 5 0

骨・関節の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	ガングリオン				骨痛骨がうずくような痛み			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	93	12	38	43	92	46	2	44
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	6	1	2	3	2	0	0	2
50 ～ 54	14	1	9	4	16	7	0	9
55 ～ 59	18	1	6	11	12	3	0	9
60 ～ 64	17	0	6	11	10	4	1	5
65 ～ 69	12	0	7	5	14	6	0	8
70 ～ 74	8	1	2	5	7	4	0	3
75 ～ 79	5	1	2	2	11	9	0	2
80 ～ 84	7	4	2	1	15	10	1	4
85 ～ 89	5	2	2	1	4	3	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	29	5	10	14	27	11	0	16
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	2	0	0	2	0	0	0	0
50 ～ 54	6	1	3	2	6	2	0	4
55 ～ 59	9	0	2	7	4	0	0	4
60 ～ 64	3	0	1	2	2	1	0	1
65 ～ 69	2	0	2	0	3	1	0	2
70 ～ 74	1	1	0	0	1	0	0	1
75 ～ 79	1	1	0	0	4	3	0	1
80 ～ 84	2	1	1	0	5	3	0	2
85 ～ 89	3	1	1	1	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	64	7	28	29	65	35	2	28
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	4	1	2	1	2	0	0	2
50 ～ 54	8	0	6	2	10	5	0	5
55 ～ 59	9	1	4	4	8	3	0	5
60 ～ 64	14	0	5	9	8	3	1	4
65 ～ 69	10	0	5	5	11	5	0	6
70 ～ 74	7	0	2	5	6	4	0	2
75 ～ 79	4	0	2	2	7	6	0	1
80 ～ 84	5	3	1	1	10	7	1	2
85 ～ 89	2	1	1	0	3	2	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 1

骨・関節の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肩こり				腰痛			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	601	214	6	381	730	298	27	405
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	3	2	0	1
40 ～ 44	19	6	0	13	18	5	1	12
45 ～ 49	48	13	0	35	64	20	2	42
50 ～ 54	104	24	0	80	113	32	6	75
55 ～ 59	108	17	1	90	124	23	5	96
60 ～ 64	82	16	3	63	89	20	4	65
65 ～ 69	56	20	2	34	62	22	3	37
70 ～ 74	46	31	0	15	62	44	1	17
75 ～ 79	59	35	0	24	68	45	1	22
80 ～ 84	41	25	0	16	66	45	1	20
85 ～ 89	29	21	0	8	46	30	3	13
90 歳 以上	8	6	0	2	15	10	0	5
男	226	72	1	153	331	122	14	195
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	0	0
40 ～ 44	10	3	0	7	9	3	0	6
45 ～ 49	18	3	0	15	33	9	2	22
50 ～ 54	43	9	0	34	57	17	3	37
55 ～ 59	44	6	0	38	61	6	5	50
60 ～ 64	31	6	0	25	41	10	1	30
65 ～ 69	22	8	1	13	29	11	1	17
70 ～ 74	13	9	0	4	23	15	1	7
75 ～ 79	18	11	0	7	24	14	0	10
80 ～ 84	16	8	0	8	31	20	0	11
85 ～ 89	8	7	0	1	18	13	1	4
90 歳 以上	3	2	0	1	3	2	0	1
女	375	142	5	228	399	176	13	210
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	1	0	0	1
40 ～ 44	9	3	0	6	9	2	1	6
45 ～ 49	30	10	0	20	31	11	0	20
50 ～ 54	61	15	0	46	56	15	3	38
55 ～ 59	64	11	1	52	63	17	0	46
60 ～ 64	51	10	3	38	48	10	3	35
65 ～ 69	34	12	1	21	33	11	2	20
70 ～ 74	33	22	0	11	39	29	0	10
75 ～ 79	41	24	0	17	44	31	1	12
80 ～ 84	25	17	0	8	35	25	1	9
85 ～ 89	21	14	0	7	28	17	2	9
90 歳 以上	5	4	0	1	12	8	0	4

別表 1 5 2

骨・関節の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	39	19	4	16	198	198	192	192	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	4	1	1	2	4	4	5	5	0	0
45 ～ 49	4	2	0	2	24	24	19	19	0	0
50 ～ 54	6	3	1	2	45	45	20	20	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	39	39	27	27	0	0
60 ～ 64	6	2	0	4	24	24	25	25	0	0
65 ～ 69	4	3	1	0	18	18	19	19	0	0
70 ～ 74	4	3	0	1	8	8	19	19	0	0
75 ～ 79	5	1	1	3	8	8	20	20	0	0
80 ～ 84	2	1	0	1	11	11	15	15	0	0
85 ～ 89	2	2	0	0	13	13	13	13	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	4	4	9	9	0	0
男	16	10	1	5	112	112	123	123	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	2	2	3	3	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	14	14	11	11	0	0
50 ～ 54	2	1	0	1	28	28	9	9	0	0
55 ～ 59	1	1	0	0	20	20	20	20	0	0
60 ～ 64	2	1	0	1	12	12	21	21	0	0
65 ～ 69	2	2	0	0	13	13	9	9	0	0
70 ～ 74	2	2	0	0	5	5	13	13	0	0
75 ～ 79	4	1	1	2	3	3	18	18	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	8	8	6	6	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	5	5	8	8	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0
女	23	9	3	11	86	86	69	69	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	1	1	2	2	2	2	0	0
45 ～ 49	3	1	0	2	10	10	8	8	0	0
50 ～ 54	4	2	1	1	17	17	11	11	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	19	19	7	7	0	0
60 ～ 64	4	1	0	3	12	12	4	4	0	0
65 ～ 69	2	1	1	0	5	5	10	10	0	0
70 ～ 74	2	1	0	1	3	3	6	6	0	0
75 ～ 79	1	0	0	1	5	5	2	2	0	0
80 ～ 84	2	1	0	1	3	3	9	9	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	8	8	5	5	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	2	2	5	5	0	0

別表 1 5 3

骨粗しょう症 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総 数	125	17	107	14	1	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	2	1	2	0	0	0	0
55 ～ 59	6	1	5	0	0	0	0
60 ～ 64	10	2	8	0	0	0	0
65 ～ 69	13	0	11	2	1	1	0
70 ～ 74	20	4	17	3	0	0	0
75 ～ 79	28	2	26	3	0	0	0
80 ～ 84	23	4	19	4	0	0	0
85 ～ 89	19	2	16	2	0	0	0
90 歳 以上	3	0	3	0	0	0	0
男	10	2	7	1	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	1	1	0	0	0	0	0
65 ～ 69	2	0	2	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	3	0	2	1	0	0	0
80 ～ 84	4	1	3	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0
女	115	15	100	13	1	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	2	1	2	0	0	0	0
55 ～ 59	6	1	5	0	0	0	0
60 ～ 64	9	1	8	0	0	0	0
65 ～ 69	11	0	9	2	1	1	0
70 ～ 74	20	4	17	3	0	0	0
75 ～ 79	25	2	24	2	0	0	0
80 ～ 84	19	3	16	4	0	0	0
85 ～ 89	19	2	16	2	0	0	0
90 歳 以上	3	0	3	0	0	0	0

別表 1 5 4

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	ざ瘡にきび				毛孔の開大・面疱毛穴が広がる、黒にきび			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	166	35	29	102	135	30	9	96
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	13	3	1	9	6	3	0	3
50 ～ 54	30	8	3	19	20	6	0	14
55 ～ 59	33	1	6	26	26	1	1	24
60 ～ 64	25	2	5	18	24	0	2	22
65 ～ 69	18	2	7	9	20	2	4	14
70 ～ 74	14	3	2	9	9	4	0	5
75 ～ 79	16	9	2	5	15	8	0	7
80 ～ 84	11	5	1	5	10	5	1	4
85 ～ 89	4	2	2	0	3	1	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	0	2
男	82	15	10	57	52	10	4	38
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	6	1	1	4	1	1	0	0
50 ～ 54	14	3	1	10	6	2	0	4
55 ～ 59	21	1	2	18	15	0	0	15
60 ～ 64	12	1	1	10	11	0	1	10
65 ～ 69	7	1	3	3	7	1	2	4
70 ～ 74	4	0	0	4	1	1	0	0
75 ～ 79	9	4	1	4	6	3	0	3
80 ～ 84	8	4	1	3	4	2	1	1
85 ～ 89	0	0	0	0	1	0	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	84	20	19	45	83	20	5	58
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	7	2	0	5	5	2	0	3
50 ～ 54	16	5	2	9	14	4	0	10
55 ～ 59	12	0	4	8	11	1	1	9
60 ～ 64	13	1	4	8	13	0	1	12
65 ～ 69	11	1	4	6	13	1	2	10
70 ～ 74	10	3	2	5	8	3	0	5
75 ～ 79	7	5	1	1	9	5	0	4
80 ～ 84	3	1	0	2	6	3	0	3
85 ～ 89	4	2	2	0	2	1	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	0	2

別表 1 5 5

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	色素沈着肌が黒くなる				爪の変形			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	179	41	9	129	370	83	13	274
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	6	1	0	5	8	1	0	7
45 ～ 49	11	3	0	8	19	5	0	14
50 ～ 54	32	5	2	25	46	7	0	39
55 ～ 59	29	3	1	25	56	3	1	52
60 ～ 64	28	2	1	25	49	2	4	43
65 ～ 69	15	1	3	11	41	8	3	30
70 ～ 74	12	4	0	8	36	13	0	23
75 ～ 79	21	11	0	10	45	21	1	23
80 ～ 84	12	6	1	5	38	13	2	23
85 ～ 89	10	5	1	4	21	7	2	12
90 歳 以上	3	0	0	3	11	3	0	8
男	81	17	6	58	173	30	5	138
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	5	0	0	5
45 ～ 49	6	1	0	5	12	2	0	10
50 ～ 54	11	1	1	9	26	3	0	23
55 ～ 59	17	1	1	15	36	1	0	35
60 ～ 64	13	2	1	10	22	1	2	19
65 ～ 69	7	0	1	6	15	2	1	12
70 ～ 74	6	3	0	3	14	4	0	10
75 ～ 79	9	4	0	5	16	8	0	8
80 ～ 84	6	3	1	2	17	6	1	10
85 ～ 89	3	1	1	1	8	3	1	4
90 歳 以上	0	0	0	0	2	0	0	2
女	98	24	3	71	197	53	8	136
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	3	1	0	2
45 ～ 49	5	2	0	3	7	3	0	4
50 ～ 54	21	4	1	16	20	4	0	16
55 ～ 59	12	2	0	10	20	2	1	17
60 ～ 64	15	0	0	15	27	1	2	24
65 ～ 69	8	1	2	5	26	6	2	18
70 ～ 74	6	1	0	5	22	9	0	13
75 ～ 79	12	7	0	5	29	13	1	15
80 ～ 84	6	3	0	3	21	7	1	13
85 ～ 89	7	4	0	3	13	4	1	8
90 歳 以上	3	0	0	3	9	3	0	6

別表 1 5 6

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	粉瘤皮膚のふくろ				粘液囊腫関節のふくろ			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	145	28	24	93	19	8	2	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	6	2	3	1	0	0	0	0
50 ～ 54	21	3	3	15	2	0	1	1
55 ～ 59	17	1	3	13	1	0	0	1
60 ～ 64	28	0	5	23	3	1	0	2
65 ～ 69	19	2	2	15	3	1	0	2
70 ～ 74	12	1	1	10	4	1	0	3
75 ～ 79	23	10	6	7	1	1	0	0
80 ～ 84	10	6	0	4	3	2	1	0
85 ～ 89	5	2	1	2	2	2	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
男	71	11	13	47	3	1	1	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	3	0	2	1	0	0	0	0
50 ～ 54	12	0	2	10	1	0	1	0
55 ～ 59	9	1	1	7	0	0	0	0
60 ～ 64	13	0	3	10	0	0	0	0
65 ～ 69	8	0	2	6	1	0	0	1
70 ～ 74	3	0	0	3	0	0	0	0
75 ～ 79	11	3	3	5	0	0	0	0
80 ～ 84	9	6	0	3	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	74	17	11	46	16	7	1	8
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	3	2	1	0	0	0	0	0
50 ～ 54	9	3	1	5	1	0	0	1
55 ～ 59	8	0	2	6	1	0	0	1
60 ～ 64	15	0	2	13	3	1	0	2
65 ～ 69	11	2	0	9	2	1	0	1
70 ～ 74	9	1	1	7	4	1	0	3
75 ～ 79	12	7	3	2	1	1	0	0
80 ～ 84	1	0	0	1	3	2	1	0
85 ～ 89	5	2	1	2	1	1	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0

別表 1 5 7

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	掌蹠膿疱症				湿疹がしやすい			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	28	9	8	11	354	165	12	177
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	1	0	0	1	12	4	0	8
45 ～ 49	0	0	0	0	28	12	0	16
50 ～ 54	6	2	3	1	50	25	1	24
55 ～ 59	3	1	1	1	60	15	3	42
60 ～ 64	3	1	0	2	45	13	1	31
65 ～ 69	4	1	1	2	37	19	1	17
70 ～ 74	3	1	0	2	31	18	1	12
75 ～ 79	4	1	1	2	35	22	2	11
80 ～ 84	3	1	2	0	31	19	0	12
85 ～ 89	1	1	0	0	20	16	2	2
90 歳 以上	0	0	0	0	4	2	1	1
男	14	5	2	7	149	66	3	80
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	1	0	0	1	7	1	0	6
45 ～ 49	0	0	0	0	16	6	0	10
50 ～ 54	3	2	1	0	23	11	0	12
55 ～ 59	2	0	1	1	28	8	1	19
60 ～ 64	1	0	0	1	18	6	0	12
65 ～ 69	3	1	0	2	9	6	0	3
70 ～ 74	0	0	0	0	13	4	1	8
75 ～ 79	3	1	0	2	15	13	0	2
80 ～ 84	1	1	0	0	13	7	0	6
85 ～ 89	0	0	0	0	6	4	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	14	4	6	4	205	99	9	97
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	5	3	0	2
45 ～ 49	0	0	0	0	12	6	0	6
50 ～ 54	3	0	2	1	27	14	1	12
55 ～ 59	1	1	0	0	32	7	2	23
60 ～ 64	2	1	0	1	27	7	1	19
65 ～ 69	1	0	1	0	28	13	1	14
70 ～ 74	3	1	0	2	18	14	0	4
75 ～ 79	1	0	1	0	20	9	2	9
80 ～ 84	2	0	2	0	18	12	0	6
85 ～ 89	1	1	0	0	14	12	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	4	2	1	1

別表 1 5 8

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	皮膚の掻痒かゆみ				乾燥肌さめ肌			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	524	181	19	324	291	77	6	208
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	1	0	0	1
40 ～ 44	13	0	0	13	12	1	0	11
45 ～ 49	28	10	0	18	17	4	0	13
50 ～ 54	76	17	2	57	52	6	0	46
55 ～ 59	84	13	4	67	50	5	1	44
60 ～ 64	69	16	3	50	41	6	0	35
65 ～ 69	54	20	3	31	23	11	1	11
70 ～ 74	51	27	0	24	22	10	1	11
75 ～ 79	59	30	5	24	26	12	2	12
80 ～ 84	49	24	0	25	22	9	0	13
85 ～ 89	28	18	2	8	18	8	1	9
90 歳 以上	12	6	0	6	7	5	0	2
男	234	83	7	144	124	37	3	84
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0	0
40 ～ 44	7	0	0	7	5	0	0	5
45 ～ 49	12	5	0	7	9	1	0	8
50 ～ 54	35	9	0	26	23	4	0	19
55 ～ 59	45	5	3	37	24	3	1	20
60 ～ 64	33	10	1	22	19	6	0	13
65 ～ 69	26	12	1	13	12	7	0	5
70 ～ 74	17	8	0	9	5	2	1	2
75 ～ 79	23	14	2	7	10	6	1	3
80 ～ 84	21	12	0	9	10	5	0	5
85 ～ 89	11	6	0	5	6	2	0	4
90 歳 以上	3	2	0	1	1	1	0	0
女	290	98	12	180	167	40	3	124
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	0	0	1
40 ～ 44	6	0	0	6	7	1	0	6
45 ～ 49	16	5	0	11	8	3	0	5
50 ～ 54	41	8	2	31	29	2	0	27
55 ～ 59	39	8	1	30	26	2	0	24
60 ～ 64	36	6	2	28	22	0	0	22
65 ～ 69	28	8	2	18	11	4	1	6
70 ～ 74	34	19	0	15	17	8	0	9
75 ～ 79	36	16	3	17	16	6	1	9
80 ～ 84	28	12	0	16	12	4	0	8
85 ～ 89	17	12	2	3	12	6	1	5
90 歳 以上	9	4	0	5	6	4	0	2

別表 1 5 9

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脱毛				白斑			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	106	20	6	80	31	7	1	23
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	5	2	0	3	1	1	0	0
50 ～ 54	18	3	0	15	5	1	1	3
55 ～ 59	22	2	2	18	2	1	0	1
60 ～ 64	19	1	2	16	8	0	0	8
65 ～ 69	15	1	2	12	1	0	0	1
70 ～ 74	7	2	0	5	5	0	0	5
75 ～ 79	3	2	0	1	5	2	0	3
80 ～ 84	8	5	0	3	2	1	0	1
85 ～ 89	6	2	0	4	2	1	0	1
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
男	56	8	3	45	12	2	1	9
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	3	0	0	3	1	1	0	0
50 ～ 54	11	1	0	10	2	0	1	1
55 ～ 59	14	0	1	13	1	1	0	0
60 ～ 64	10	0	2	8	1	0	0	1
65 ～ 69	7	0	0	7	0	0	0	0
70 ～ 74	3	2	0	1	3	0	0	3
75 ～ 79	1	1	0	0	2	0	0	2
80 ～ 84	4	3	0	1	1	0	0	1
85 ～ 89	3	1	0	2	1	0	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	50	12	3	35	19	5	0	14
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	2	2	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	7	2	0	5	3	1	0	2
55 ～ 59	8	2	1	5	1	0	0	1
60 ～ 64	9	1	0	8	7	0	0	7
65 ～ 69	8	1	2	5	1	0	0	1
70 ～ 74	4	0	0	4	2	0	0	2
75 ～ 79	2	1	0	1	3	2	0	1
80 ～ 84	4	2	0	2	1	1	0	0
85 ～ 89	3	1	0	2	1	1	0	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0

別表 1 6 0

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	紫斑内出血				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	113	31	1	81	51	26	5	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	3	2	0	1
45 ～ 49	4	1	0	3	7	4	0	3
50 ～ 54	8	2	0	6	9	3	2	4
55 ～ 59	19	2	0	17	4	0	1	3
60 ～ 64	10	0	0	10	9	4	1	4
65 ～ 69	15	2	1	12	6	3	0	3
70 ～ 74	15	3	0	12	2	2	0	0
75 ～ 79	12	7	0	5	2	1	0	1
80 ～ 84	12	7	0	5	7	5	1	1
85 ～ 89	14	5	0	9	1	1	0	0
90 歳 以上	4	2	0	2	1	1	0	0
男	35	10	0	25	20	12	3	5
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	1	0	0
45 ～ 49	1	0	0	1	3	2	0	1
50 ～ 54	4	1	0	3	4	1	2	1
55 ～ 59	4	1	0	3	2	0	1	1
60 ～ 64	1	0	0	1	4	2	0	2
65 ～ 69	4	0	0	4	2	2	0	0
70 ～ 74	5	0	0	5	1	1	0	0
75 ～ 79	6	3	0	3	1	1	0	0
80 ～ 84	5	3	0	2	2	2	0	0
85 ～ 89	5	2	0	3	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	78	21	1	56	31	14	2	15
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	1	0	1
45 ～ 49	3	1	0	2	4	2	0	2
50 ～ 54	4	1	0	3	5	2	0	3
55 ～ 59	15	1	0	14	2	0	0	2
60 ～ 64	9	0	0	9	5	2	1	2
65 ～ 69	11	2	1	8	4	1	0	3
70 ～ 74	10	3	0	7	1	1	0	0
75 ～ 79	6	4	0	2	1	0	0	1
80 ～ 84	7	4	0	3	5	3	1	1
85 ～ 89	9	3	0	6	1	1	0	0
90 歳 以上	4	2	0	2	1	1	0	0

別表 1 6 1

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 8、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	314	314	206	206	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	11	11	3	3	0	0
45 ～ 49	34	34	15	15	0	0
50 ～ 54	64	64	27	27	0	0
55 ～ 59	59	59	27	27	0	0
60 ～ 64	43	43	26	26	0	0
65 ～ 69	21	21	20	20	0	0
70 ～ 74	13	13	19	19	0	0
75 ～ 79	11	11	25	25	0	0
80 ～ 84	23	23	20	20	0	0
85 ～ 89	24	24	16	16	0	0
90 歳 以上	10	10	7	7	0	0
男	145	145	122	122	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	8	8	1	1	0	0
45 ～ 49	15	15	8	8	0	0
50 ～ 54	33	33	14	14	0	0
55 ～ 59	30	30	16	16	0	0
60 ～ 64	19	19	20	20	0	0
65 ～ 69	13	13	9	9	0	0
70 ～ 74	6	6	12	12	0	0
75 ～ 79	0	0	20	20	0	0
80 ～ 84	10	10	10	10	0	0
85 ～ 89	6	6	8	8	0	0
90 歳 以上	4	4	3	3	0	0
女	169	169	84	84	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	3	2	2	0	0
45 ～ 49	19	19	7	7	0	0
50 ～ 54	31	31	13	13	0	0
55 ～ 59	29	29	11	11	0	0
60 ～ 64	24	24	6	6	0	0
65 ～ 69	8	8	11	11	0	0
70 ～ 74	7	7	7	7	0	0
75 ～ 79	11	11	5	5	0	0
80 ～ 84	13	13	10	10	0	0
85 ～ 89	18	18	8	8	0	0
90 歳 以上	6	6	4	4	0	0

別表 1 6 3

湿疹が特にしやすい場所、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	関節の裏 (ひじ、ひざ)	顔面	体躯(胸、 背中、腹、 腰)	その他	未回答	不詳
総 数	354	53	96	232	74	14	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0
40 ～ 44	12	2	1	6	1	3	0
45 ～ 49	28	2	5	19	6	2	0
50 ～ 54	50	8	12	28	16	2	0
55 ～ 59	60	8	21	40	12	1	0
60 ～ 64	45	4	12	29	12	2	0
65 ～ 69	37	9	12	25	7	1	0
70 ～ 74	31	6	8	19	6	0	0
75 ～ 79	35	2	5	27	5	1	0
80 ～ 84	31	7	13	25	3	2	0
85 ～ 89	20	5	7	9	5	0	0
90 歳 以上	4	0	0	4	1	0	0
男	149	19	26	107	29	6	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	0	0	0
40 ～ 44	7	0	0	5	0	2	0
45 ～ 49	18	1	2	10	3	2	0
50 ～ 54	27	3	2	15	7	0	0
55 ～ 59	39	5	7	21	6	0	0
60 ～ 64	25	2	4	14	5	0	0
65 ～ 69	11	2	1	7	1	0	0
70 ～ 74	16	2	2	8	4	0	0
75 ～ 79	18	1	4	12	1	0	0
80 ～ 84	19	2	4	10	1	2	0
85 ～ 89	6	1	0	4	1	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0
女	205	34	70	125	45	8	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	6	2	1	1	1	1	0
45 ～ 49	16	1	3	9	3	0	0
50 ～ 54	39	5	10	13	9	2	0
55 ～ 59	43	3	14	19	6	1	0
60 ～ 64	34	2	8	15	7	2	0
65 ～ 69	43	7	11	18	6	1	0
70 ～ 74	23	4	6	11	2	0	0
75 ～ 79	22	1	1	15	4	1	0
80 ～ 84	31	5	9	15	2	0	0
85 ～ 89	20	4	7	5	4	0	0
90 歳 以上	5	0	0	4	1	0	0

別表 1 6 4

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	アトピー性皮膚炎				アレルギー性鼻炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	44	17	11	16	215	88	20	107
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	4	1	2	1	7	2	0	5
45 ～ 49	2	1	0	1	14	5	2	7
50 ～ 54	6	2	2	2	43	19	4	20
55 ～ 59	12	4	2	6	45	19	2	24
60 ～ 64	5	2	1	2	34	10	6	18
65 ～ 69	5	1	2	2	20	8	4	8
70 ～ 74	5	2	1	2	15	6	0	9
75 ～ 79	1	0	1	0	12	7	0	5
80 ～ 84	2	2	0	0	16	9	2	5
85 ～ 89	1	1	0	0	8	3	0	5
90 歳 以上	1	1	0	0	1	0	0	1
男	24	9	8	7	76	32	2	42
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	2	0	4	0	0	4
45 ～ 49	1	0	0	1	3	1	0	2
50 ～ 54	2	1	1	0	17	9	1	7
55 ～ 59	7	2	2	3	18	7	0	11
60 ～ 64	3	1	1	1	10	5	0	5
65 ～ 69	2	1	1	0	7	3	1	3
70 ～ 74	3	1	0	2	4	1	0	3
75 ～ 79	1	0	1	0	3	2	0	1
80 ～ 84	2	2	0	0	6	3	0	3
85 ～ 89	1	1	0	0	3	1	0	2
90 歳 以上	0	0	0	0	1	0	0	1
女	20	8	3	9	139	56	18	65
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	3	2	0	1
45 ～ 49	1	1	0	0	11	4	2	5
50 ～ 54	4	1	1	2	26	10	3	13
55 ～ 59	5	2	0	3	27	12	2	13
60 ～ 64	2	1	0	1	24	5	6	13
65 ～ 69	3	0	1	2	13	5	3	5
70 ～ 74	2	1	1	0	11	5	0	6
75 ～ 79	0	0	0	0	9	5	0	4
80 ～ 84	0	0	0	0	10	6	2	2
85 ～ 89	0	0	0	0	5	2	0	3
90 歳 以上	1	1	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 5

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	花粉症				喘息			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	299	131	18	150	102	58	18	26
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	10	6	0	4	3	1	1	1
45 ～ 49	24	13	0	11	8	5	1	2
50 ～ 54	67	35	5	27	15	7	4	4
55 ～ 59	59	21	2	36	22	8	6	8
60 ～ 64	43	12	5	26	9	4	2	3
65 ～ 69	27	11	4	12	10	4	3	3
70 ～ 74	26	12	1	13	11	9	0	2
75 ～ 79	18	11	0	7	9	8	0	1
80 ～ 84	17	9	1	7	7	6	0	1
85 ～ 89	6	0	0	6	8	6	1	1
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0
男	123	51	4	68	38	19	8	11
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	3	0	2	0	0	0	0
45 ～ 49	9	4	0	5	5	3	1	1
50 ～ 54	29	15	1	13	4	0	1	3
55 ～ 59	27	8	0	19	11	4	4	3
60 ～ 64	18	5	1	12	4	1	2	1
65 ～ 69	9	4	2	3	3	2	0	1
70 ～ 74	10	4	0	6	3	3	0	0
75 ～ 79	5	4	0	1	3	2	0	1
80 ～ 84	7	3	0	4	1	1	0	0
85 ～ 89	3	0	0	3	4	3	0	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	176	80	14	82	64	39	10	15
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	5	3	0	2	3	1	1	1
45 ～ 49	15	9	0	6	3	2	0	1
50 ～ 54	38	20	4	14	11	7	3	1
55 ～ 59	32	13	2	17	11	4	2	5
60 ～ 64	25	7	4	14	5	3	0	2
65 ～ 69	18	7	2	9	7	2	3	2
70 ～ 74	16	8	1	7	8	6	0	2
75 ～ 79	13	7	0	6	6	6	0	0
80 ～ 84	10	6	1	3	6	5	0	1
85 ～ 89	3	0	0	3	4	3	1	0
90 歳 以上	1	0	0	1	0	0	0	0

別表 1 6 6

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	蕁麻疹				食物アレルギー			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	126	33	47	46	63	10	14	39
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	14	2	7	5	6	1	1	4
50 ～ 54	21	7	6	8	8	1	2	5
55 ～ 59	23	6	8	9	9	1	0	8
60 ～ 64	14	0	6	8	6	0	2	4
65 ～ 69	19	5	9	5	12	1	5	6
70 ～ 74	10	3	3	4	3	1	0	2
75 ～ 79	12	5	4	3	7	3	1	3
80 ～ 84	9	4	3	2	4	1	0	3
85 ～ 89	1	0	0	1	8	1	3	4
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	48	7	18	23	26	2	5	19
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	1	1	0	0	0	0
45 ～ 49	9	0	5	4	2	0	0	2
50 ～ 54	5	1	1	3	4	0	1	3
55 ～ 59	9	0	5	4	5	1	0	4
60 ～ 64	5	0	1	4	2	0	0	2
65 ～ 69	10	3	3	4	6	0	3	3
70 ～ 74	3	0	1	2	1	0	0	1
75 ～ 79	4	2	1	1	1	1	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	1	0	0	1
85 ～ 89	0	0	0	0	4	0	1	3
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	78	26	29	23	37	8	9	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	5	2	2	1	4	1	1	2
50 ～ 54	16	6	5	5	4	1	1	2
55 ～ 59	14	6	3	5	4	0	0	4
60 ～ 64	9	0	5	4	4	0	2	2
65 ～ 69	9	2	6	1	6	1	2	3
70 ～ 74	7	3	2	2	2	1	0	1
75 ～ 79	8	3	3	2	6	2	1	3
80 ～ 84	9	4	3	2	3	1	0	2
85 ～ 89	1	0	0	1	4	1	2	1
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 7

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	薬物アレルギー				その他			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	83	19	21	43	30	12	3	15
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	1	0	0	1
45 ～ 49	11	1	1	9	2	1	0	1
50 ～ 54	10	1	3	6	5	4	0	1
55 ～ 59	13	3	3	7	10	2	1	7
60 ～ 64	13	1	5	7	5	1	1	3
65 ～ 69	10	2	3	5	3	1	0	2
70 ～ 74	5	1	3	1	1	1	0	0
75 ～ 79	6	4	1	1	1	0	1	0
80 ～ 84	6	3	1	2	1	1	0	0
85 ～ 89	4	2	1	1	1	1	0	0
90 歳 以上	2	0	0	2	0	0	0	0
男	31	5	8	18	10	3	0	7
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	0	0	2	1	0	0	1
45 ～ 49	6	0	0	6	1	0	0	1
50 ～ 54	2	0	1	1	2	1	0	1
55 ～ 59	10	2	2	6	4	1	0	3
60 ～ 64	2	1	1	0	1	1	0	0
65 ～ 69	4	0	2	2	1	0	0	1
70 ～ 74	3	0	2	1	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	52	14	13	25	20	9	3	8
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	5	1	1	3	1	1	0	0
50 ～ 54	8	1	2	5	3	3	0	0
55 ～ 59	3	1	1	1	6	1	1	4
60 ～ 64	11	0	4	7	4	0	1	3
65 ～ 69	6	2	1	3	2	1	0	1
70 ～ 74	2	1	1	0	1	1	0	0
75 ～ 79	5	3	1	1	1	0	1	0
80 ～ 84	6	3	1	2	1	1	0	0
85 ～ 89	3	1	1	1	1	1	0	0
90 歳 以上	2	0	0	2	0	0	0	0

別表 1 6 8

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	589	589	279	279	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	12	12	7	7	0	0
45 ～ 49	47	47	23	23	0	0
50 ～ 54	80	80	31	31	0	0
55 ～ 59	96	96	31	31	0	0
60 ～ 64	78	78	38	38	0	0
65 ～ 69	61	61	20	20	0	0
70 ～ 74	42	42	26	26	0	0
75 ～ 79	46	46	45	45	0	0
80 ～ 84	51	51	32	32	0	0
85 ～ 89	51	51	17	17	0	0
90 歳 以上	23	23	8	8	0	0
男	301	301	148	148	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	7	7	4	4	0	0
45 ～ 49	30	30	12	12	0	0
50 ～ 54	50	50	16	16	0	0
55 ～ 59	52	52	19	19	0	0
60 ～ 64	39	39	24	24	0	0
65 ～ 69	34	34	7	7	0	0
70 ～ 74	23	23	10	10	0	0
75 ～ 79	16	16	29	29	0	0
80 ～ 84	27	27	15	15	0	0
85 ～ 89	15	15	8	8	0	0
90 歳 以上	7	7	3	3	0	0
女	288	288	131	131	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	5	5	3	3	0	0
45 ～ 49	17	17	11	11	0	0
50 ～ 54	30	30	15	15	0	0
55 ～ 59	44	44	12	12	0	0
60 ～ 64	39	39	14	14	0	0
65 ～ 69	27	27	13	13	0	0
70 ～ 74	19	19	16	16	0	0
75 ～ 79	30	30	16	16	0	0
80 ～ 84	24	24	17	17	0	0
85 ～ 89	36	36	9	9	0	0
90 歳 以上	16	16	5	5	0	0

別表 1 6 9

膠原病（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	関節リウマチ				全身性エリテマトーデスSLE			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	35	25	3	7	3	1	1	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	4	3	0	1	1	0	1	0
55 ～ 59	6	3	1	2	2	1	0	1
60 ～ 64	5	5	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	5	2	1	2	0	0	0	0
70 ～ 74	4	3	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	6	5	1	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	3	2	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	7	4	2	1	1	0	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	1	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	2	0	1	1	1	0	0	1
60 ～ 64	1	1	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	1	1	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	0	1	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	28	21	1	6	2	1	1	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	1	1	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	3	2	0	1	1	0	1	0
55 ～ 59	4	3	0	1	1	1	0	0
60 ～ 64	4	4	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	4	1	1	2	0	0	0	0
70 ～ 74	3	2	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	5	5	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	3	2	0	1	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 0

膠原病（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	強皮症				皮膚筋炎			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	4	1	1	2	4	1	1	2
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	1	0	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	1	0	0	1
70 ～ 74	0	0	0	0	1	1	0	0
75 ～ 79	1	0	1	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	1	0	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	1	0	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	1	1	1	3	1	1	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	0	0	0	0	0	0	0	0
60 ～ 64	1	0	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	1	0	0	1
70 ～ 74	0	0	0	0	1	1	0	0
75 ～ 79	1	0	1	0	0	0	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 1

膠原病（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	シェーグレン症候群				ベーチェット病			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	4	2	0	2	3	2	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	2	1	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	2	1	0	1
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	2	1	0	1
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	2	0	1	1	1	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	1	1	0	0
55 ～ 59	2	1	0	1	0	0	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	0	0	0	0
65 ～ 69	0	0	0	0	0	0	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ～ 79	1	1	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 2

膠原病（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				病気・症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	17	7	0	10	963	963	423	423	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	27	27	10	10	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	90	90	30	30	0	0
50 ～ 54	2	2	0	0	168	168	47	47	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	178	178	51	51	0	0
60 ～ 64	2	0	0	2	125	125	60	60	0	0
65 ～ 69	3	1	0	2	89	89	37	37	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	64	64	45	45	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	63	63	57	57	0	0
80 ～ 84	2	0	0	2	64	64	51	51	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	68	68	23	23	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	24	24	11	11	0	0
男	5	1	0	4	462	462	214	214	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	15	15	6	6	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	48	48	15	15	0	0
50 ～ 54	0	0	0	0	89	89	23	23	0	0
55 ～ 59	1	0	0	1	90	90	28	28	0	0
60 ～ 64	0	0	0	0	59	59	34	34	0	0
65 ～ 69	2	1	0	1	45	45	15	15	0	0
70 ～ 74	1	0	0	1	32	32	18	18	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	21	21	34	34	0	0
80 ～ 84	1	0	0	1	28	28	26	26	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	25	25	11	11	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	8	8	3	3	0	0
女	12	6	0	6	501	501	209	209	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	1	1	0	0	12	12	4	4	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	42	42	15	15	0	0
50 ～ 54	2	2	0	0	79	79	24	24	0	0
55 ～ 59	2	1	0	1	88	88	23	23	0	0
60 ～ 64	2	0	0	2	66	66	26	26	0	0
65 ～ 69	1	0	0	1	44	44	22	22	0	0
70 ～ 74	0	0	0	0	32	32	27	27	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	42	42	23	23	0	0
80 ～ 84	1	0	0	1	36	36	25	25	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	43	43	12	12	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	16	16	8	8	0	0

別表 1 7 3

膠原病（複数回答） 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総 数	37	3	28	3	4	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	6	1	4	0	1	0	0
55 ～ 59	6	0	5	0	1	0	0
60 ～ 64	5	0	4	1	1	0	0
65 ～ 69	3	1	2	1	0	0	0
70 ～ 74	4	1	4	0	0	0	0
75 ～ 79	6	0	4	0	1	1	0
80 ～ 84	2	0	1	0	0	1	0
85 ～ 89	3	0	2	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0
男	6	1	5	0	0	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	0	0	0
50 ～ 54	1	0	1	0	0	0	0
55 ～ 59	1	0	1	0	0	0	0
60 ～ 64	1	0	1	0	0	0	0
65 ～ 69	2	1	1	0	0	0	0
70 ～ 74	1	0	1	0	0	0	0
75 ～ 79	0	0	0	0	0	0	0
80 ～ 84	0	0	0	0	0	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	0	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0
女	31	2	23	3	4	3	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	1	0	1	0	0	0	0
50 ～ 54	5	1	3	0	1	0	0
55 ～ 59	5	0	4	0	1	0	0
60 ～ 64	4	0	3	1	1	0	0
65 ～ 69	1	0	1	1	0	0	0
70 ～ 74	3	1	3	0	0	0	0
75 ～ 79	6	0	4	0	1	1	0
80 ～ 84	2	0	1	0	0	1	0
85 ～ 89	3	0	2	1	0	1	0
90 歳 以上	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 4

その他の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	全身倦怠感（体がだるい）				手足のしびれ			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	524	129	7	388	522	179	14	329
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	1	0	0	1
40 ～ 44	13	3	0	10	15	4	1	10
45 ～ 49	35	10	1	24	30	8	0	22
50 ～ 54	88	11	0	77	67	20	1	46
55 ～ 59	101	14	0	87	78	15	0	63
60 ～ 64	63	7	1	55	82	14	2	66
65 ～ 69	53	7	2	44	53	14	5	34
70 ～ 74	42	16	0	26	42	22	0	20
75 ～ 79	51	19	1	31	59	31	1	27
80 ～ 84	39	20	1	18	51	26	2	23
85 ～ 89	29	16	1	12	36	20	1	15
90 歳 以上	9	6	0	3	8	5	1	2
男	223	43	2	178	241	73	4	164
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	1	0	0	1	1	0	0	1
40 ～ 44	6	0	0	6	8	1	1	6
45 ～ 49	19	4	0	15	14	4	0	10
50 ～ 54	36	2	0	34	36	11	0	25
55 ～ 59	50	5	0	45	44	7	0	37
60 ～ 64	29	2	0	27	38	6	0	32
65 ～ 69	24	3	2	19	29	8	2	19
70 ～ 74	15	5	0	10	21	10	0	11
75 ～ 79	18	10	0	8	18	10	0	8
80 ～ 84	14	7	0	7	20	11	0	9
85 ～ 89	8	4	0	4	10	4	0	6
90 歳 以上	3	1	0	2	2	1	1	0
女	301	86	5	210	281	106	10	165
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	7	3	0	4	7	3	0	4
45 ～ 49	16	6	1	9	16	4	0	12
50 ～ 54	52	9	0	43	31	9	1	21
55 ～ 59	51	9	0	42	34	8	0	26
60 ～ 64	34	5	1	28	44	8	2	34
65 ～ 69	29	4	0	25	24	6	3	15
70 ～ 74	27	11	0	16	21	12	0	9
75 ～ 79	33	9	1	23	41	21	1	19
80 ～ 84	25	13	1	11	31	15	2	14
85 ～ 89	21	12	1	8	26	16	1	9
90 歳 以上	6	5	0	1	6	4	0	2

別表 1 7 5

その他の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	体がつる				のどがつる			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	343	85	9	249	42	9	1	32
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	2	0	0	0	0
40 ～ 44	7	0	0	7	2	0	0	2
45 ～ 49	20	2	1	17	3	0	0	3
50 ～ 54	49	10	0	39	3	0	0	3
55 ～ 59	51	7	0	44	4	0	0	4
60 ～ 64	53	8	1	44	5	0	1	4
65 ～ 69	31	3	2	26	4	1	0	3
70 ～ 74	42	13	0	29	2	0	0	2
75 ～ 79	36	13	2	21	7	3	0	4
80 ～ 84	31	16	1	14	6	2	0	4
85 ～ 89	17	11	1	5	6	3	0	3
90 歳 以上	4	2	1	1	0	0	0	0
男	158	38	3	117	13	1	0	12
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	2	0	0	2	0	0	0	0
40 ～ 44	4	0	0	4	2	0	0	2
45 ～ 49	13	1	1	11	1	0	0	1
50 ～ 54	26	7	0	19	0	0	0	0
55 ～ 59	29	5	0	24	1	0	0	1
60 ～ 64	23	3	0	20	3	0	0	3
65 ～ 69	12	1	1	10	0	0	0	0
70 ～ 74	17	6	0	11	1	0	0	1
75 ～ 79	11	4	0	7	3	1	0	2
80 ～ 84	15	8	0	7	1	0	0	1
85 ～ 89	5	3	0	2	1	0	0	1
90 歳 以上	1	0	1	0	0	0	0	0
女	185	47	6	132	29	8	1	20
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	0	0	3	0	0	0	0
45 ～ 49	7	1	0	6	2	0	0	2
50 ～ 54	23	3	0	20	3	0	0	3
55 ～ 59	22	2	0	20	3	0	0	3
60 ～ 64	30	5	1	24	2	0	1	1
65 ～ 69	19	2	1	16	4	1	0	3
70 ～ 74	25	7	0	18	1	0	0	1
75 ～ 79	25	9	2	14	4	2	0	2
80 ～ 84	16	8	1	7	5	2	0	3
85 ～ 89	12	8	1	3	5	3	0	2
90 歳 以上	3	2	0	1	0	0	0	0

別表 1 7 6

その他の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	筋肉の痛み				体がむくむ			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	274	119	4	151	254	84	4	166
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	4	2	0	2
45 ～ 49	11	5	0	6	18	3	0	15
50 ～ 54	34	9	1	24	35	9	0	26
55 ～ 59	38	9	0	29	35	3	0	32
60 ～ 64	34	8	1	25	31	8	0	23
65 ～ 69	29	9	1	19	22	7	0	15
70 ～ 74	36	20	0	16	21	11	0	10
75 ～ 79	30	17	0	13	26	11	0	15
80 ～ 84	33	20	1	12	36	18	2	16
85 ～ 89	22	17	0	5	17	9	2	6
90 歳 以上	5	4	0	1	9	3	0	6
男	105	38	2	65	81	26	0	55
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	1	0	0	1
45 ～ 49	5	2	0	3	7	0	0	7
50 ～ 54	16	3	1	12	7	2	0	5
55 ～ 59	20	5	0	15	17	2	0	15
60 ～ 64	11	1	0	10	8	3	0	5
65 ～ 69	15	4	1	10	10	3	0	7
70 ～ 74	11	6	0	5	8	3	0	5
75 ～ 79	11	7	0	4	8	5	0	3
80 ～ 84	9	6	0	3	12	6	0	6
85 ～ 89	6	3	0	3	2	1	0	1
90 歳 以上	1	1	0	0	1	1	0	0
女	169	81	2	86	173	58	4	111
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	3	2	0	1
45 ～ 49	6	3	0	3	11	3	0	8
50 ～ 54	18	6	0	12	28	7	0	21
55 ～ 59	18	4	0	14	18	1	0	17
60 ～ 64	23	7	1	15	23	5	0	18
65 ～ 69	14	5	0	9	12	4	0	8
70 ～ 74	25	14	0	11	13	8	0	5
75 ～ 79	19	10	0	9	18	6	0	12
80 ～ 84	24	14	1	9	24	12	2	10
85 ～ 89	16	14	0	2	15	8	2	5
90 歳 以上	4	3	0	1	8	2	0	6

別表 1 7 7

その他の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする				指が腫れる			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	118	30	3	85	178	54	3	121
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	4	1	0	3
45 ～ 49	4	1	1	2	5	1	0	4
50 ～ 54	18	3	0	15	19	3	0	16
55 ～ 59	37	7	0	30	30	4	0	26
60 ～ 64	15	0	2	13	33	6	1	26
65 ～ 69	10	3	0	7	22	3	0	19
70 ～ 74	10	5	0	5	17	8	0	9
75 ～ 79	7	1	0	6	16	5	0	11
80 ～ 84	11	6	0	5	19	12	1	6
85 ～ 89	3	3	0	0	10	8	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	3	3	0	0
男	29	4	0	25	47	12	0	35
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	0	0	0	0
45 ～ 49	0	0	0	0	2	0	0	2
50 ～ 54	4	0	0	4	4	0	0	4
55 ～ 59	13	2	0	11	13	2	0	11
60 ～ 64	5	0	0	5	9	1	0	8
65 ～ 69	2	0	0	2	5	0	0	5
70 ～ 74	1	0	0	1	5	3	0	2
75 ～ 79	0	0	0	0	3	0	0	3
80 ～ 84	3	2	0	1	3	3	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	2	2	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	1	1	0	0
女	89	26	3	60	131	42	3	86
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	4	1	0	3
45 ～ 49	4	1	1	2	3	1	0	2
50 ～ 54	14	3	0	11	15	3	0	12
55 ～ 59	24	5	0	19	17	2	0	15
60 ～ 64	10	0	2	8	24	5	1	18
65 ～ 69	8	3	0	5	17	3	0	14
70 ～ 74	9	5	0	4	12	5	0	7
75 ～ 79	7	1	0	6	13	5	0	8
80 ～ 84	8	4	0	4	16	9	1	6
85 ～ 89	3	3	0	0	8	6	1	1
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	0	0

別表 1 7 8

その他の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	全身に痛みがある				手足に痛みがある			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	119	56	3	60	406	172	6	228
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	3	1	0	2	9	2	0	7
45 ～ 49	3	1	0	2	16	6	0	10
50 ～ 54	19	6	1	12	47	15	1	31
55 ～ 59	14	5	0	9	56	11	0	45
60 ～ 64	9	1	1	7	47	10	0	37
65 ～ 69	12	4	0	8	42	16	1	25
70 ～ 74	10	4	0	6	44	23	0	21
75 ～ 79	16	10	0	6	54	31	0	23
80 ～ 84	17	10	1	6	45	28	2	15
85 ～ 89	12	11	0	1	36	27	2	7
90 歳 以上	4	3	0	1	10	3	0	7
男	33	16	2	15	150	57	1	92
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	1	0	0	1	3	1	0	2
45 ～ 49	0	0	0	0	8	2	0	6
50 ～ 54	7	2	1	4	20	7	1	12
55 ～ 59	6	3	0	3	27	5	0	22
60 ～ 64	4	0	1	3	16	3	0	13
65 ～ 69	3	2	0	1	19	7	0	12
70 ～ 74	1	0	0	1	15	7	0	8
75 ～ 79	5	3	0	2	17	10	0	7
80 ～ 84	2	2	0	0	15	10	0	5
85 ～ 89	3	3	0	0	8	5	0	3
90 歳 以上	1	1	0	0	2	0	0	2
女	86	40	1	45	256	115	5	136
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ～ 44	2	1	0	1	6	1	0	5
45 ～ 49	3	1	0	2	8	4	0	4
50 ～ 54	12	4	0	8	27	8	0	19
55 ～ 59	8	2	0	6	29	6	0	23
60 ～ 64	5	1	0	4	31	7	0	24
65 ～ 69	9	2	0	7	23	9	1	13
70 ～ 74	9	4	0	5	29	16	0	13
75 ～ 79	11	7	0	4	37	21	0	16
80 ～ 84	15	8	1	6	30	18	2	10
85 ～ 89	9	8	0	1	28	22	2	4
90 歳 以上	3	2	0	1	8	3	0	5

別表 1 7 9

その他の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位:人)

性 年齢階層	その他				症状はとくにない		未回答			
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない	総数	はい	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	症状はあ るが治療 していない
総 数	42	12	1	29	291	291	194	194	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	10	10	5	5	0	0
45 ～ 49	4	1	0	3	36	36	20	20	0	0
50 ～ 54	6	2	1	3	61	61	22	22	0	0
55 ～ 59	6	1	0	5	56	56	24	24	0	0
60 ～ 64	6	1	0	5	35	35	19	19	0	0
65 ～ 69	8	2	0	6	18	18	19	19	0	0
70 ～ 74	3	1	0	2	14	14	15	15	0	0
75 ～ 79	5	2	0	3	12	12	27	27	0	0
80 ～ 84	3	1	0	2	22	22	19	19	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	19	19	17	17	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	7	7	6	6	0	0
男	23	8	1	14	157	157	123	123	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	8	8	2	2	0	0
45 ～ 49	2	1	0	1	20	20	11	11	0	0
50 ～ 54	4	1	1	2	35	35	13	13	0	0
55 ～ 59	3	1	0	2	29	29	16	16	0	0
60 ～ 64	3	1	0	2	17	17	16	16	0	0
65 ～ 69	5	1	0	4	10	10	9	9	0	0
70 ～ 74	1	1	0	0	8	8	10	10	0	0
75 ～ 79	2	1	0	1	6	6	21	21	0	0
80 ～ 84	2	0	0	2	12	12	10	10	0	0
85 ～ 89	1	1	0	0	10	10	11	11	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0
女	19	4	0	15	134	134	71	71	0	0
30 ～ 34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ～ 39	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40 ～ 44	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0
45 ～ 49	2	0	0	2	16	16	9	9	0	0
50 ～ 54	2	1	0	1	26	26	9	9	0	0
55 ～ 59	3	0	0	3	27	27	8	8	0	0
60 ～ 64	3	0	0	3	18	18	3	3	0	0
65 ～ 69	3	1	0	2	8	8	10	10	0	0
70 ～ 74	2	0	0	2	6	6	5	5	0	0
75 ～ 79	3	1	0	2	6	6	6	6	0	0
80 ～ 84	1	1	0	0	10	10	9	9	0	0
85 ～ 89	0	0	0	0	9	9	6	6	0	0
90 歳 以上	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0