

# 死亡時の負債（負債群/非負債群）

	負債群(11事例)	非負債群(21事例)
職業	自営業45.5%、被雇用者54.5%、 無職0.0%	自営業9.5%、被雇用者61.9%、 無職28.6%
離婚	45.5%	0.0%
睡眠のための 物質使用	アルコール36.4%、睡眠薬0.0%、 両者の併用9.1%	アルコール9.5%、睡眠薬38.1%、 両者の併用14.3%
援助希求行動	27.3%	71.4%
精神科受診	20.0%	68.2%
平均年収	579万円(SD=416)	526万円(SD=446)
負債額と 負債の理由	負債額:2千万円未満55.6%、2 千万~4千万円未満22.2%、4千 万円以上6千万円未満11.1%、6 千万円以上11.1% 負債の理由:事業の悪化27.3%、 遊興費27.3%、ギャンブル 18.2%、事業資金18.2%等	

# 死亡1年前のアルコール関連問題 (AL問題群/非AL問題群)

	AL問題群(10事例)	非AL問題群(33事例)
年齢	40～50代が最も多い	30代が最も多い
職業	有職者100.0% 無職者0.0%	有職者67.6% 無職者32.4%
自殺時の物質使用	アルコールのみ40.0%、向精神薬のみ0.0%、両者の併用10.0%、使用なし50.0%	アルコールのみ0.0%、向精神薬のみ30.3%、両者の併用3.0%、使用なし66.7%
平均飲酒日数	27.1日(SD=6.8)	7.5日(SD=11.8)
一回の平均飲酒量	8.9杯(SD=4.7)	2.2杯(SD=1.8)
精神疾患への罹患	100.0%(物質関連障害80.0%)	81.8%(物質関連障害6.1%)

赤澤正人, 他: 死亡1年前にアルコール関連問題を呈した自殺既遂者の心理社会的特徴: 心理学的剖検による検討(投稿中)

# 死亡前の精神科治療

	受診群(20事例)	非受診群(23事例)
平均年齢	39.3歳(SD=13.1)	51.0歳(SD=16.5)
婚姻	既婚者が多い	未婚者が多い
精神疾患への罹患	95.0% (統合失調症が有意に多い)	78.3%
自殺時の物質使用	向精神薬50.0% アルコール20.0%	向精神薬4.7% アルコール13.0%
精神科の最終受診から自殺までの期間	~3日以内50.0% ~1ヶ月以内35.0% ~3ヶ月以内10.0% 不明5.0%	—
精神科への通院期間	死亡直前に初診のみ10.0% 1年未満25.0% 1年以上5年未満30.0% 5年以上35.0%	—

廣川聖子, 他: 死亡前に精神科治療を受けていた自殺既遂者の心理社会的特徴: 心理学的剖検による調査(投稿中)