

第117回医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

C 問題 第 60 問

次の文を読み、60~62 の問い合わせよ。

76歳の男性。食欲不振と倦怠感を主訴に来院した。

現病歴： 1週間前から倦怠感と水様便（1日2回～4回）が出現した。食欲がなく、おかゆを無理に食べている。恶心はあるが嘔吐、腹痛、黒色便および血便はない。体重が3kg減少した。37℃台の微熱があるが悪寒戦慄はない。

既往歴： 高血圧症でカルシウム拮抗薬を内服している。アレルギーなし。

生活歴： 妻と2人暮らし。喫煙は20歳から40本/日。飲酒歴はない。

家族歴： 兄が60歳台で大腸癌。

現 症： 意識は清明だがややぐったりしている。身長166cm、体重69kg。体温37.5℃。脈拍104/分、整。血圧86/50mmHg。呼吸数20/分。SpO₂96%（room air）。皮膚は乾燥し、色素沈着を認めない。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。口腔内は乾燥しており咽頭発赤はない。頸静脈の怒張を認めない。甲状腺腫と頸部リンパ節を触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、圧痛はなく、肝・脾を触知しない。四肢末梢は冷たいがチアノーゼや浮腫を認めない。ばち指を認める。

検査所見： 尿所見：蛋白（-）、糖（-）、潜血（-）。血液所見：赤血球437万、Hb 12.3g/dL、Ht 34%、白血球5,400（好中球45%、好酸球21%、好塩基球1%、単球9%、リンパ球24%）、血小板23万。血液生化学所見：総蛋白6.3g/dL、アルブミン3.7g/dL、総ビリルビン0.5mg/dL、直接ビリルビン0.2mg/dL、AST 43U/L、ALT 78U/L、LD 169U/L（基準120～245）、ALP 200U/L（基準38～113）、γ-GT 96U/L（基準8～50）、CK 100U/L（基準30～140）、尿素窒素11mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、尿酸3.7mg/dL、血糖92mg/dL、Na 118mEq/L、K 4.6mEq/L、Cl 89mEq/L、Ca 8.4mg/dL。血清浸透圧240mOsm/L（基準275～288）、尿浸透圧572mOsm/L（基準50～1,300）、尿中Na 84mEq/L。胸部エックス線写真（別冊No. 9A）と胸腹部造影CT（別冊No. 9B、C）を別に示す。

60 この患者の電解質異常の鑑別に有用な検査はどれか。2つ選べ。

別冊
No. 9 A、B、C

- a プロラクチン
- b ACTHとコルチゾール
- c 副甲状腺ホルモン（PTH）
- d レニン・アルドステロン比
- e TSHと遊離サイロキシン（FT₄）

（採点上の取り扱い）

採点対象から除外する。

（理由）

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。