

注意事項



- 試験問題の数は120問で解答時間は正味3時間30分である。
- 解答方法は次のとおりである。
 - (例1)、(例2)及び(例3)の問題では1から4までの4つの選択肢、もしくは1から5までの5つの選択肢があるので、そのうち質問に適した選択肢を(例1)、(例2)では1つ、(例3)では2つ選び答案用紙に記入すること。
 なお、(例1)、(例2)の質問には2つ以上解答した場合は誤りとする。(例3)の質問には、1つ又は3つ以上解答した場合は誤りとする。

(例1)

201 近代看護の基礎を築いたのは誰か。

- キュリー, M.
Curie, M.
- アダムズ, J.
Addams, J.
- ナイチンゲール, F.
Nightingale, F.
- アインシュタイン, A.
Einstein, A.

正解は「3」であるから答案用紙の③をマークすればよい。



れい
(例 2)

202 看護師国家試験の受験資格が規定されているのはどれか。

1. 医療法
2. 学校教育法
3. 労働基準法
4. 保健師助産師看護師法
5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律

正解は「4」であるから答案用紙の④をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

202	①	②	③	④	⑤
			↓		
202	①	②	③	●	⑤

答案用紙②の場合、

202	202
①	①
②	②
③	→ ③
④	●
⑤	⑤

れい
(例 3)

203 看護師籍に登録されるのはどれか。2つ選べ。

1. 生年月日
2. 受験年月日
3. 卒業年月日
4. 就業年月日
5. 登録年月日

正解は「1」と「5」であるから答案用紙の①と⑤をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

203	①	②	③	④	⑤
			↓		
203	●	②	③	④	●

答案用紙②の場合、

203	203
①	●
②	②
③	→ ③
④	④
⑤	●

(2) 計算問題については、に囲まれた丸数字に入る適切な数値をそれぞれ1つ選び答案用紙に記入すること。なお、(例4)の質問には丸数字1つにつき2つ以上解答した場合は誤りとする。

(例4)

204 50床の病棟で入院患者は45人である。

この病棟の病床利用率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答： ① ② %

- | | |
|---|---|
| ① | ② |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

正解は「90」であるから①は答案用紙の⑨を②は①をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

①	0	1	2	3	4	5	6	7	8	●
204	●	1	2	3	4	5	6	7	8	9

答案用紙②の場合、

204	①	②
	0	●
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	●	9

1 日本にほんの平成22年へいせい ねん(2010年)における総人口そうじんこうに最も近いもっと ちかのはどれか。

1. 1億人おくにん
2. 1億3千万人おく ぜんまんにん
3. 1億6千万人おく ぜんまんにん
4. 1億9千万人おく ぜんまんにん

2 飲酒いんしゅに起因きいんする健康障害けんこうしょうがいはどれか。

1. 肝硬変かんこうへん
cirrhosis
2. 膠原病こうげんびょう
collagen disease
3. Ménière<メニエール>病びょう
Ménière's disease
4. Parkinson<パーキンソン>病びょう
Parkinson's disease

3 日本にほんにおいて国民皆保険制度こくみんかいほけんせいどが適用てきようされているのはどれか。

1. 医療保険いりょうほけん
2. 介護保険かいごほけん
3. 火災保険かさいほけん
4. 生命保険せいめいほけん

4 ヘルシンキ宣言せんげんで提唱ていしょうされたのはどれか。

1. リビングウイル
2. ヘルスプロモーション
3. ノーマライゼーション
4. インフォームド・コンセント

5 新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。

1. 医療法
いりょうほう
2. 学校教育法
がっこうきょういくほう
3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
かんごしとう じんざいかくほ そくしん かん ほうりつ
4. 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
ほけんしじょさんしかんごしがっこうようせいじょしていきそく

6 Down(ダウン)症候群を生じるのはどれか。
Down's syndrome

1. 13トリソミー
2. 18トリソミー
3. 21トリソミー
4. 性染色体異常
せいせんしよくたいいじょう

7 乳歯がすべて生えそろったときの本数はどれか。
にゅうし は ほんすう

1. 16本
ほん
2. 20本
ほん
3. 24本
ほん
4. 28本
ほん

8 日本における平成21年(2009年)の5～9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。

1. 肺炎
はい えん pneumonia しんしつかん
2. 心疾患
heart disease
3. 不慮の事故
ふりよじこ accidents あくせいしんせいぶつ
4. 悪性新生物
malignant neoplasm

9 成人期において基礎代謝量が最も多い時期はどれか。

1. 青年期
2. 壮年前期
3. 壮年後期
4. 向老期

10 医療法において、病院とは 人以上の患者を入院させるための施設を有する
ものと規定されている。

に入るのはどれか。

1. 10
2. 20
3. 50
4. 100

11 分娩第2期はどれか。

1. 陣痛開始から子宮口全開大まで
2. 排臨から発露まで
3. 子宮口全開大から胎児娩出まで
4. 胎児娩出から胎盤娩出まで

12 チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。

1. 青
2. 赤
3. 黄
4. 白

13 サークアディアンリズムの周期しゅうきはどれか。

1. 約 8時間やく じかん
2. 約 12時間やく じかん
3. 約 24時間やく じかん
4. 約 48時間やく じかん

14 前立腺癌ぜんりつせんがんに特徴的な腫瘍しゅようマーカーはどれか。
prostate cancer

1. AFP
2. CA19-9
3. CEA
4. PSA


15 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌きゅうきん〈MRSA〉に有効な薬ゆうこう くすりはどれか。

1. バンコマイシン塩酸塩えんさんえん
2. セファゾリンナトリウム
3. ストレプトマイシン硫酸塩りゅうさんえん
4. ベンジルペニシリンカリウム

16 成人女性せいじんじょせいに一時的な導尿いちじてき どうにょうを行う際に、カテーテルを挿入する長さおこな さいはどれか。
そうにゅう なが

1. 1～3 cm
2. 5～7 cm
3. 9～11 cm
4. 18～20 cm

- 17 つめ き かた もしきず しめ
爪の切り方の模式図を示す。
つめ てきせつ き かた
爪のケアとして適切な切り方はどれか。



- 18 くう き かんせん ぼう し ぼう ごよう ぐ
空気感染を防止するための防護用具はどれか。

1. ガウン
2. ゴーグル
3. N 95 マスク
4. げ か よう
外科用マスク

- 19 む きんそう さ ひつよう
無菌操作を必要とするのはどれか。

1. びくうきゅういん
鼻腔吸引
2. き かんないきゅういん
気管内吸引
3. こうくうないきゅういん
口腔内吸引
4. い ないようぶつ きゅういん
胃内容物の吸引

20 仰臥位での褥瘡好発部位はどれか。

1. 仙骨部
2. 内顆部
3. 腸骨稜部
4. 大転子部

21 日本の平成22年(2010年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。

1. 20～24歳
2. 25～29歳
3. 30～34歳
4. 35～39歳
5. 40～44歳

22 低血糖の症状または所見はどれか。

1. 口 渇
2. 徐 脈
3. 多 尿
4. 発 汗
5. 発 熱

23 ワルファリンと拮抗作用きっこうさようがあるのはどれか。

1. ビタミン A
2. ビタミン C
3. ビタミン D
4. ビタミン E
5. ビタミン K

24 体位たいいの写真しゃしん(別冊べっさつNo. 1 ①～⑤)を別に示す。

Fowler<ファウラー>位いはどれか。

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④
5. ⑤

別冊 No. 1 ①～⑤

25 肘正中皮静脈からの採血における駆血部位の写真(別冊No. 2 ①～⑤)を別に示す。

正しいのはどれか。

ただし、×は刺入部である。

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④
5. ⑤



26 中耳にあるのはどれか。

1. 前庭
2. 蝸牛
3. 半規管
4. 耳小骨

27 脂肪を乳化するのはどれか。

1. 胆汁酸塩
2. トリプシン
3. ビリルビン
4. リパーゼ

28 高血圧性脳出血で最も頻度の高い出血部位はどれか。
hypertensive cerebral hemorrhage

1. 被 殻
2. 視 床
3. 小 脳
4. 橋

29 酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 代謝性アルカローシス ———— 下 痢
2. 代謝性アシドーシス ———— 嘔 吐
3. 代謝性アシドーシス ———— 慢性腎不全
chronic renal failure
4. 呼吸性アシドーシス ———— 過換気症候群
hyperventilation syndrome

30 母乳が主な感染経路となるのはどれか。

1. 成人 T 細胞白血病〈ATL〉ウイルス
2. 単純ヘルペスウイルス〈HSV〉
3. サイトメガロウイルス
4. 風疹ウイルス

31 日本の平成 21 年(2009 年)における人口の動向について正しいのはどれか。

1. 年少人口の構成割合は 20 % 台である。
2. 老年人口の構成割合は 20 % 台である。
3. 従属人口指数は 70 台である。
4. 老年化指数は 180 台である。

32 おな もんだい なや かかひとひと たす あ かつどう
同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動はどれか。

1. ケースワーク
2. ピアサポート
3. コミュニティワーク
4. コンサルテーション

33 しゃかい ほけん こんきょ ほうりつ くみあわ ただ
社会保険と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。

1. いりょう ほけん けんこう ほけんほう
医療保険 ————— 健康保険法
2. ねんきん ほけん ろうじんふくし ほう
年金保険 ————— 老人福祉法
3. こよう ほけん こよう ぶん や だんじょ きんとう き かい およ たい
雇用保険 ————— 雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等に関する法律
4. ろうどうしゃさいがい ほしょう ほけん ろうどう きじゅんほう
労働者災害補償保険 ————— 労働基準法

34 ほうりつ いりょうひ こうひ ふたん ひと しっかん
法律によって医療費の公費負担が認められる疾患はどれか。

1. Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病
Creutzfeldt-Jakob disease
2. サルコイドーシス
sarcoidosis
3. 劇症肝炎
fulminant hepatitis
4. 肺結核
pulmonary tuberculosis

35 けんこうにっぽん たいさく と く もくひょう
健康日本 21 でたばこ対策として取り組んでいる目標はどれか。

1. きんえんがいらいじゅしんしゃ ぞう か
禁煙外来受診者の増加
2. こうきょう ば ぶんえん てつてい
公共の場での分煙の徹底
3. いくじちゅう ははおや きつえん げんしょう
育児中の母親の喫煙の減少
4. きつえん およ しゃかいてきえいきょう ちしき ふきゅう
喫煙が及ぼす社会的影響についての知識の普及

36 看護計画における看護上の問題について適切なものはどれか。

1. 医師と共有しない。
2. 原因は1つに絞る。
3. 退院するまで変更しない。
4. 原因が不明な事象も問題とする。

37 看護記録の内容で適切でないのはどれか。

1. 患者の訴えたこと
2. 実施したケアの内容
3. ケア後の患者の変化
4. ケア後の看護師の感想

38 医療法施行規則で規定されているのはどれか。

1. 病室の室温
2. 病室の照度
3. ベッドの高さ
4. 1床あたりの床面積

39 Aさん(50歳、男性)は、心筋梗塞で病院に緊急搬送されたが、2時間後に死亡した。Aさんの家族は突然の出来事で混乱している。

Aさんの家族への対応で最も適切なものはどれか。

1. 死後の処置への家族の同席を断る。
2. Aさんと家族だけの時間をつくる。
3. Aさんの死についての話題は避ける。
4. 心筋梗塞による死亡は多いと慰める。

40 入院中の患者における中心静脈栄養法<IVH>の管理で適切なのはどれか。

1. 刺入部は毎日消毒する。
2. 定期的に血糖値を確認する。
3. カテーテルの刺入部は見えないように覆う。
4. 輸液セットはカテーテルを抜去するまで交換しない。


41 水封式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。

1. ドレーンの回路は開放式である。
2. 水封室の水面は呼吸に伴って上下に動く。
3. 吸引圧は $-50 \sim -100 \text{ cmH}_2\text{O}$ に調整する。
4. ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。


42 7時から翌朝7時までの24時間尿を採取する方法として正しいのはどれか。

1. 7時に排尿した尿から蓄尿を始める。
2. 排便時に出た尿は蓄尿しない。
3. 翌朝7時に出た尿は蓄尿しない。
4. 24時間の全尿の一部を採取する。

43 けんじょうひと どうこうず しめ
 健常な人の瞳孔を図に示す。



みぎめ ひかりあ せいじょうたいこうはんしゃ
 右眼に光を当てたときの正常な対光反射はどれか。



44 せいじん がくしゅうとくちょう ただ
 成人の学習の特徴として正しいのはどれか。

1. がくしゅうしゃ けいけん しげん
 学習者のこれまでの経験が資源となる。
2. がいてきどうき がくしゅう そくしん
 外的動機づけによって学習が促進される。
3. じ こひょうか たしや ひょうか じゅうよう
 自己評価よりも他者による評価が重要である。
4. か だいちゅうしん がくしゅう こうぎけいしき がくしゅう ほう こうか たか
 課題中心の学習よりも講義形式による学習の方が効果が高い。

45 じゅうぜん けんさち そうしゅうち ゆ ちえんいんし
 術前の検査値で創傷治癒の遅延因子となるのはどれか。

1. けっせい ていち
 血清アルブミン低値
2. けっせいそう ていち
 血清総ビリルビン低値
3. しきゅうたいろかち こうち
 糸球体濾過値(GFR)高値
4. どうみやくけつさん そふんあつ こうち
 動脈血酸素分圧(PaO₂)高値

46 乳癌に対する乳房温存手術後の放射線治療を受ける患者への説明で正しいのはどれか。

1. 放射線肺炎のリスクがある。
2. 対側の乳癌の予防が目的である。
3. 治療期間中はブラジャーの使用を避ける。
4. 治療期間中はマーキングした部位を洗わない。

47 緩和ケアについて正しいのはどれか。

1. 患者の家族は対象に含まない。
2. ケア計画は多職種が話し合って立案する。
3. 疼痛コントロールの第一選択はモルヒネである。
4. 根治的な治療法がないと医師が説明したときから始める。

48 気管支喘息に対する副腎皮質ステロイドの吸入療法について正しいのはどれか。

1. 副作用は内服より少ない。
2. 吸入後に含嗽はしない。
3. 食後の吸入が食前より効果的である。
4. 吸い込むタイミングで効果に差はない。

49 甲状腺癌のために甲状腺全摘術と頸部リンパ節郭清術とを受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。

1. 甲状腺クリーゼの観察をする。
2. 嘔声のある間は経口摂取を禁止する。
3. ドレーンからの乳び漏の有無を観察する。
4. テタニーが生じた場合は副甲状腺ホルモンを補充する。

50 肝硬変で皮下出血、腹水貯留および手指の振戦がある患者に対する食事で適切な

のはどれか。

1. 高蛋白食
2. 高脂肪食
3. 低残渣食
4. 塩分制限食

51 右乳癌のために胸筋温存乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術とを受けた患者。呼吸循環機能は安定しており、右腋窩部と乳房皮下とにドレーンが挿入されている。

術後1日の看護で適切なのはどれか。

1. 右側臥位を勧める。
2. 右肘関節の回内・回外運動を勧める。
3. 右上肢の中樞から末梢に向かってマッサージをする。
4. 右上肢の前方挙上は術後10日間行わないよう指導する。

52 Aさんは、特定の相手に対して「とても尊敬しています」と過度に好意を示すこともあれば「あなたは最低だ。嫌い」と嫌悪感を同時に訴えることもある。

Aさんに現れている現象はどれか。

1. 否認
2. 逆転移
3. アンビバレンス〈両価性〉
4. エディプスコンプレックス

53 Asperger〈アスペルガー〉症候群^{しょうこうぐん}について正しいのはどれか。
Asperger syndrome^{じょせい おお}

1. 女性に多い。
2. 出生時に診断される。^{しゅっせい じ しんだん}
3. 自我障害が特徴である。^{じ がしょうがい とくちょう}
4. 知的能力の発達は保たれる。^{ち てきのうりよく はったつ たも}

54 精神疾患^{せいしんしつかん}の患者^{かんじゃ}に対する心理教育^{たい しん りきょういく}について正しいのはどれか。^{ただ}

1. 精神分析を実施する。^{せいしんぶんせき じっし}
2. 家族関係が疾患の原因であることを説明する。^{か ぞくかんけい しつかん げんいん せつめい}
3. 症状が悪化するときのサインに気づけるよう指導する。^{しょうじょう あっか き しどう}
4. 状態に合わせて服薬量を自分で増減する方法を説明する。^{じょうたい あ ふくやくりょう じぶん ぞうげん ほうほう せつめい}

55 電気けいれん療法^{でんき りょうほう}の適応^{てきおう}となるのはどれか。

1. 失見当識^{しつけんとうしき}
2. 重症うつ病^{じゅうじょう びょう}
3. 悪性症候群<sup>depression
あくせいしょうこうぐん</sup>
malignant syndrome
4. Parkinson〈パーキンソン〉病^{びょう}
Parkinson's disease

56 Aさん(42歳、男性)、会社員。うつ病^{びょう}で自殺企図^{じざつぎと}のために入院した。外傷^{がいしょう}はない。入院時に看護師が「大変でしたね」と声をかけたが、Aさんは一言も話そうとせず、硬い表情^{かた ひょうじょう}をしている。

この時点でのAさんへの対応で適切なのはどれか。

1. 「気分転換にお散歩に行きませんか」^{きふんてんかん さんぽ い}
2. 「今夜は多床室で休んでいただきます」^{こんや たしょうしつ やす}
3. 「仕事が合わないのではありませんか」^{しごと あ}
4. 「持ち物を一緒に確認させていただけますか」^{も もの いっしょ かくにん}

57 訪問看護の利用者の特徴として正しいのはどれか。

1. 年齢は65～69歳が最も多い。
2. 要介護度は要支援2が最も多い。
3. 脳血管疾患を含む循環器系疾患が最も多い。
cerebrovascular disease circulatory disease
4. 介護保険よりも医療保険によるサービス受給者が多い。
じゆきゆうしゃ おお

58 退院調整部署と連携しながら、ある患者の退院支援を進めることになった。

病棟看護師が行う支援として最も適切なものはどれか。

1. 経済問題への対応
2. 患者の希望の聴取
3. 介護保険制度の説明
4. 在宅のケアプラン立案

59 要介護認定者が訪問看護を受ける際、医療保険から給付される疾病または状態はどれか。

1. 関節リウマチ
rheumatoid arthritis
2. 在宅酸素療法を受けている状態
3. 人工呼吸器を使用している状態
4. 全身性エリテマトーデス〈SLE〉
systemic lupus erythematosus

60 Aさんは在宅療養ざいたくりようようをしており、皮下埋め込み式ひ か う こ し きポートから高カロリー輸液こう ゆ え き かんけつを間欠的に注入てき ちゅうにゅうしている。

訪問看護師ほうもんかん こ しがAさんに行う日常生活おこな にちじょうせいかつの指導内容し どうないようとして適切なてきせつのはどれか。

1. 穿刺針せん し しんの固定こていは不要ふようである。
2. 抜針ぼつしんした当日とうじつの入浴にゅうよくはできない。
3. 穿刺針せん し しんは一般廃棄物いっぱんはい き ぶつとして処理しよりする。
4. 刺入部しにゅうぶの発赤ほっせきを認めた場合みとは訪問看護師ばあい ほうもんかん こ しに連絡れんらくする。

61 ハヴィガースト, R. J. の老年期ろうねん きにおける発達課題はったつ か だいとして正しいただのはどれか。
Havighurst, R. J.

1. 子どもを独立どくりつさせる。
2. 満足まんぞくできる収入しゅうにゅうを得る。え
3. 配偶者はいぐうしゃの死しに適応てきおうする。
4. 異世代い せ だいの人ひとと親密しんみつな関係かんけいを結ぶ。むす

62 加齢か れいに伴う呼吸循環機能どもな こきゅうじゆんかん き のうの変化へん かについて正しいただのはどれか。

1. 残気量ざん き りょうは変化へん かしない。
2. 肺はいの弾性だんせいは低下てい かする。
3. 左心室壁さ しんしつへきは薄うすくなる。
4. 安静時あんせい じの心拍出量しんはくしゅつりょうは増加ぞう かする。

63 96歳さいの女性じよせい。要支援2よう し えんの認定にんていを受け、介護予防通所介護かい ご よぼうつうしょかい ご りょうを利用りようしている。
援助えんじよとして適切なてきせつのはどれか。

1. 入浴にゅうよくは特殊浴槽とくしゅよくぞうを使用しよする。
2. 排泄時はいせつ じには援助者えんじよしゃが下着した ぎ ぬを脱ぬがせる。
3. 椅子い すに座すわるときには安全ベルトあんぜんを使用しよする。
4. 運動うんどうを取り入れたレクリエーションと いへの参加さん かを促うながす。

64 高齢者に多い弛緩性便秘の原因で正しいのはどれか。

1. 長期臥床
2. 便意の我慢
3. 腸管内の炎症
4. 下行結腸の蠕動亢進

65 介護保険施設においてノロウイルス感染症が発生した。
感染を拡大させないための対応として適切なものはどれか。

1. 感染者の居室はアルコールで拭く。
2. 感染者の吐物は乾燥してから処理する。
3. 感染者が使用したリネンは60℃の加熱処理を行う。
4. 感染者が使用した食器は次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

66 大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術の術後1週以内における看護で適切なものはどれか。

1. 手術当日に全身清拭は行わない。
2. 術後初めての食事は全介助で行う。
3. 患肢の他動運動は術後3日から行う。
4. 臥床時は患肢を外転中間位に保持する。

67 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について正しいのはどれか。

1. 20人の生活単位を基本とする。
2. 看護職員の配置が義務づけられている。
3. 介護保険制度における地域密着型サービスである。
4. 連続して利用できる期間は原則3か月以内である。

68 出生前診断のための羊水検査について適切なのはどれか。

1. 検査がもたらす母児への影響を事前に説明する。
2. 胎児に染色体異常が発見された場合は結果を知らせない。
3. 夫婦の意見が対立した場合は夫の意見を優先する。
4. 妊婦の母親から問い合わせがあった場合は検査結果を伝える。

69 性感染症〈STD〉について正しいのはどれか。

1. 経口避妊薬の内服が予防に有効である。
2. 患者のパートナーは治療の対象ではない。
3. 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。
4. 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

70 正常新生児に対して出生後2時間以内に実施するのはどれか。

1. 聴力検査
2. 抗菌薬の点眼
3. 心拍モニタリング
4. 先天性代謝異常検査

71 Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠39週2日で前期破水と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 入浴を勧める。
2. 歩行を禁止する。
3. 3～4時間ごとに導尿をする。
4. 3～4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

72 A君(10歳、男児)は、既往歴はなく健康である。A君の弟のB君(5歳)は、白血病のため入院しており、治療の一環として骨髄移植を必要としている。A君がドナー候補に挙がっており、両親はA君をドナーとした骨髄移植を希望している。骨髄移植に関するA君への看護師の説明で適切なのはどれか。

1. 骨髄採取後は腰の痛みを伴う。
2. A君は何も心配しなくてよい。
3. A君が頑張ればお母さんが喜ぶ。
4. B君の病気を治すためにはA君がドナーになるしかない。

73 子どもの遊びについて正しいのはどれか。

1. 象徴遊びは3～4歳で最も盛んになる。
2. 感覚運動遊びは5歳ころまでみられる。
3. 並行遊びは6歳以降に増える。
4. 構成遊びは8歳ころに現れる。

74 離乳食の進め方で正しいのはどれか。

1. 開始前からスプーンに慣れさせる。
2. 開始時は炭水化物より蛋白質の割合を多くする。
3. 開始時から人工乳はフォローアップミルクにする。
4. 開始から2か月ころは舌でつぶせる固さの食物にする。

75 体幹部の写真(別冊No. 3)を別に示す。

最も疑われるウイルス感染症はどれか。

1. 伝染性軟属腫
molluscum contagiosum
2. 伝染性紅斑
erythema infectiosum
3. 水痘
varicella
4. 風疹
rubella



76 細胞内におけるエネルギー産生や呼吸に関する細胞内小器官はどれか。

1. ミトコンドリア
2. リボソーム
3. ゴルジ体
4. 小胞体
5. 核

77 ナトリウムイオンが再吸収される主な部位はどれか。

1. 近位尿細管
2. Henle(ヘンレ)のループ(係蹄)下行脚
3. Henle(ヘンレ)のループ(係蹄)上行脚
4. 遠位尿細管
5. 集合管

78 人体の右側じんたい うそくのみにあるのはどれか。

1. 総頸動脈そうけいどうみやく
2. 腕頭動脈わんとうどうみやく
3. 腋窩動脈えきかどうみやく
4. 内頸動脈ないけいどうみやく
5. 鎖骨下動脈さこつかどうみやく

79 ペニシリン投与とうよによって呼吸困難こきゅうこんなんとなった患者かんじゃへの第一選択薬だいいちせんたくやくはどれか。

1. ジギタリス
2. テオフィリン
3. アドレナリン
4. 抗ヒスタミン薬こうひすたみんやく
5. 副腎皮質ステロイドふくじんひしつ

80 下肢の閉塞性動脈硬化症か し へいそくせいどうみやくこう かしょう〈ASO〉の症状しょうじょうはどれか。
arteriosclerosis obliterans

1. 間欠性跛行かんけつせい はこう
2. 線維束性収縮せんいそくせいしゅうしゆく
3. 近位筋優位の萎縮きんい きんゆうい いしゆく
4. 足背動脈の拍動の亢進そくはいどうみやく はくどう こうしん
5. 登攀性起立 (Gowers〈ガワーズ〉徴候)とうはんせい きりつ ちようこう


81 透析導入患者の原疾患として最も多いのはどれか。

1. 慢性糸球体腎炎
chronic glomerulonephritis
2. 多発性嚢胞腎
polycystic kidney
3. ループス腎炎
lupus nephritis
4. 糖尿病腎症
diabetic nephropathy
5. 腎硬化症
nephrosclerosis

82 心音の聴取部位を図に示す。

肺動脈弁領域の聴診部位はどれか。

ただし、点線は心臓を示す。



83 収縮期血圧の上昇をきたす要因はどれか。

1. 副交感神経の興奮
2. 循環血液量の減少
3. 末梢血管抵抗の増大
4. 血液の粘稠度の低下
5. 動脈血酸素分圧 (PaO₂) の上昇

84 所見と病態の組合せで正しいのはどれか。

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|--------------------|---------------|
| 1. Raynaud〈レイノー〉現象 | げんしょう | ——— | し し ま っ た ん きょけつ | 四肢末端の虚血 |
| 2. 頸静脈の怒張 | けいじょうみやく どちよう | ——— | さ しんけい じゆんかんしょうがい | 左心系の循環障害 |
| 3. 全身性浮腫 | ぜんしんせい ふしゆ | ——— | かん かんりゅうしょうがい | リンパ管の還流障害 |
| 4. チアノーゼ | | ——— | かんげん げんしょう | 還元ヘモグロビンの減少 |
| 5. 上室性期外収縮 | じやうしつせい き がいしゆうしゆく | ——— | しんしつ はっせい いしせいこうふん | 心室から発生する異所性興奮 |

85 生後4日の新生児の状態です。正常を逸脱しているのはどれか。

1. 臍帯が乾燥している。
2. 体重減少が7%である。
3. 黒緑色の便が排泄されている。
4. 排気とともに少量の母乳を吐く。
5. 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

86 疾病とその特徴的な所見の組合せで正しいのはどれか。

- | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|-----|--------------|----------|
| 1. 急性虫垂炎 | きゅうせいちゆうすいえん | acute appendicitis | ——— | けつ べん | 血 便 |
| 2. ネフローゼ症候群 | しょうこうぐん | nephrotic syndrome | ——— | こうけつあつ | 高血圧 |
| 3. 重症筋無力症 | じゆうじゆうきん むりよくしゆう | myasthenia gravis | ——— | けいれん | けいれん |
| 4. クループ症候群 | しょうこうぐん | croup syndrome | ——— | きゅうき せいぜんめい | 吸気性喘鳴 |
| 5. Cushing〈クッシング〉症候群 | しょうこうぐん | Cushing syndrome | ——— | けい ぶ せつしゆちゆう | 頸部リンパ節腫脹 |

87 アポクリン汗腺かんせん おお ぶん ぶが多く分布する部位ぶ いはどれか。2つ選べ。ふた えら

1. 顔面が ん め ん
2. 腋窩え き か
3. 手掌し ゅ し ょ う
4. 足底そ く て い
5. 外陰部が い い ん ぶ

88 原発緑内障げんばつりょくないしやうについて正しいのはどれか。2つ選べ。ふた えら

- primary glaucoma
がんきりやう とつしゆつ
1. 眼球が突出する。
 2. 眼圧が上昇する。が ん あ つ し ょ う し ょ う
 3. 瞳孔が縮小する。どうこう しゆくしやう
 4. 視神経が萎縮する。し しんけい い しゆく
 5. 眼底に出血がみられる。が ん て い しゆくけつ

89 入所者にゅうしよしやまたは居住者きよじゆうしやが公的保険こうてきほけんによる訪問看護サービスほうもんかんごを受けられるのはどれか。2つ選べ。ふた えら

1. 乳児院にゅうじいん
2. 介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ
3. 高齢者専用賃貸住宅こうれいしやせんようちんたいじゆうたく
4. 介護療養型医療施設かいごりやうがたいりやうしせつ
5. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にんちしやうたいおうがたきやうどうせいかつかいご

- 90 にんしんこうけつあつしやうこうぐん 妊娠高血圧症候群について正しいのはどれか。 ただ 2つ ふた えら 選べ。
- pregnancy-induced hypertension
ゆうざん そ うんどう けいかい
1. 有酸素運動で軽快する。
 2. こうたんぱくしつしよく けいかい 高蛋白質食で軽快する。
 3. ひ まんにん お しょう 肥満妊婦に生じやすい。
 4. びやうけい ひと し かん 病型の1つとして子癇がある。
 5. たい じ けんこうじやうたい eclampsia えいきやう 胎児の健康状態への影響はない。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 91～93 の問いに答えよ。

A さん(58 歳、男性)、建築作業員。趣味はジョギングで毎日 5 km を走っている。
55 歳のときに肺気腫を指摘されている。1 か月前から咳嗽が続いて止まらないため、
自宅近くの病院を受診した。胸部エックス線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の
結果、右下葉に肺癌が見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20 歳から喫
煙歴があり、肺気腫を指摘されるまで 1 日 40 本程度吸っていた。

91 手術は無事終了し、胸腔ドレーンが挿入されたが、水封ドレナージのみで持続吸
引は行われていない。術直後、胸腔ドレーンの先端から呼気時にエアリークが認め
られた。ドレーン挿入部と接続部とを確認したが異常はなかった。医師は、「再手
術は経過を見て判断する」と言っている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

1. 水平仰臥位にする。
2. 肩関節の運動を促す。
3. ドレーンをクランプする。
4. 皮下気腫の出現に注意する。

92 術後 2 日。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、A さんは咳嗽時や体動時に苦痛
表情をしている。

看護師の対応として適切なのはどれか。

1. 体動を少なくするように指導する。
2. 創部のガーゼの上から温罨法を行う。
3. 鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。
4. 胸腔ドレーンの吸引圧について医師と検討する。

93 エアリークは自然に消失し、経過は良好であるため退院予定となった。体動時の痛みは持続しているが、ADLに支障はない。

Aさんへの退院時の生活指導として適切なのはどれか。

1. 「傷の痛みはすぐによくなりますので心配ありません」
2. 「リハビリテーションはジョギングから始めましょう」
3. 「外出時はマスクを使用してください」
4. 「退院後2、3日から入院前と同じ仕事をしても大丈夫です」

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 94～96 の問いに答えよ。

A さん(40 歳、男性)。入院時体重 65 kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は 450 ml で輸血はされなかった。術後 1 日、体温 37.5℃、呼吸数 24/分、脈拍 120/分、血圧 162/90 mmHg。Hb 14.8 g/dl。経皮的動脈血酸素飽和度<SpO₂>92%(酸素吸入 3 l/分)。尿量 50 ml/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。

94 術後 1 日の A さんのアセスメントで適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 体温の上昇は感染による。
2. 脈拍の増加は貧血による。
3. 血圧の上昇は麻酔の影響による。
4. 酸素飽和度の低下は創痛による。
5. 尿量の減少は循環血液量の減少による。

95 術後 1 週から食事が開始されたが、毎食後に下腹部痛を伴う下痢があり、A さんは「食事をするのが怖い」と訴えた。

看護師が確認する必要があるのはどれか。

1. 食後の体位
2. 1 日の歩行量
3. 術前の食事の嗜好
4. 食事摂取の所要時間

96 下痢の回数は減り、摂食も良好で、術後3週で退院が決定した。

Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 炭水化物を中心にした食事を勧める。
2. 下痢は1か月程度でおさまると説明する。
3. 食事は分割して少量ずつ摂取するよう勧める。
4. 食後に冷汗が出たら水分を摂るよう説明する。
5. ビタミンB₁₂が吸収されにくくなると説明する。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 97～99 の問いに答えよ。

A さん(52 歳、男性)、自営業。既往歴に特記すべきことはない。屋根を補修する
ためにはしごを登っていたところ、足を滑らせて転落し、頭部を打撲した。救急
車で病院に搬送され、頭部 CT で、右前頭葉と側頭葉の脳挫傷と右側頭葉の
のうざしやう みぎそくとうよう
cerebral contusion
のうないけっしゅ みと
intracerebral hematoma
脳内血腫を認めた。

97 入院時、A さんは痛み刺激に対しても開眼することはなく、払いのけるような動
さ
作をするのみで、左上下肢の動きが右上下肢に比べて弱かった。

ジャパン・コーマ・スケール(JCS)による評価はどれか。

1. II-20
2. II-30
3. III-100
4. III-200
5. III-300

98 緊急で開頭血腫除去術が行われ、硬膜外にドレーンが挿入された。術後は ICU
に入室した。ICU 入室 6 時間後の A さんの状態は、血圧 138/76 mmHg、脈拍
82/分、体温 37.4℃。呼びかけに対して容易に開眼し、簡単な指示に応じることが
できるようになった。しかし、その後 2 時間で意識レベルが術前のレベルまで進行
せいで低下した。血圧 156/68 mmHg、脈拍 67/分、体温 37.8℃、経皮的動脈血酸素
飽和度(SpO₂)96%(酸素吸入 3 l/分)。

この状況から考えられる A さんの病態として適切なものはどれか。

1. 術後感染
じゅつご かんせん
2. 脳血管攣縮
のうけっかんれんしゆく
cerebrovascular spasm
3. 低酸素血症
ていさんそけっしゆく
hypoxemia
4. 術後頭蓋内出血
じゅつごとうがいないしゅけつ
intracranial hemorrhage

99 このときのAさんへの看護で適切なのはどれか。

1. 後頭部を氷枕で冷やす。
2. 上半身を30度程度挙上する。
3. 左上下肢の関節屈曲運動を行う。
4. 右上肢を抑制して硬膜外ドレーン抜去を予防する。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 100～102 の問いに答えよ。

A さん(50 歳、男性)は、双極性障害で、これまでにうつ状態と躁状態で入院歴がある。会社員の兄と 2 人で暮らしている。3 か月前から服薬を中断するようになり、気分が沈みはじめ、1 週間前から朝起きられなくなった。2 日前から 1 日中ベッドの中にいるようになったため、兄に付き添われて入院した。入院時は亜昏迷状態で、発語はほとんどなく、自力での歩行が困難なほど脱力が強かった。入院後、三環系抗うつ薬が開始された。

100 入院当日の看護として適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 発語を促す。
2. 入浴を促す。
3. 食物形態を工夫する。
4. 個室への入室を勧める。
5. レクリエーションへの参加を勧める。

101 A さんの排泄に関する看護として適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 便秘を予防する。
2. 水分摂取を制限する。
3. 排尿の有無を観察する。
4. 排泄回数を記載するよう説明する。
5. 自分でポータブルトイレを使用するよう説明する。

102 Aさんの^{せいしんじょうたい}精神状態の^{けい か かんさつ}経過観察において最も^{もっと}注意^{ちゅう い}すべき^{しょうじょう}症状はどれか。

1. ^{さく らん}錯乱
2. ^{きょうはくこう い}強迫行為
3. ^{しつけんとうしき}失見当識
4. ^{き ぶんこうよう}気分高揚

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 103～105 の問いに答えよ。

A さん(40 歳、女性)は統合失調症schizophreniaで入院歴があり、退院後は共同生活援助(グループホーム)を利用してりよういた。1 週前から同じグループホームに住む女性と口論したり、夜中にグループホームから飛び出したりするようになったため、職員に付き添われて精神科病院を受診した。診察時は、A さんは意味不明の言葉を発し、時々興奮したように大声で叫んだ。また、診察室から飛び出したり、衣服を脱いだりする行為も観察された。

103 入院を開始するために必要な情報で優先度が高いのはどれか。

1. 保護者の有無
2. 前回の入院形態
3. 自立支援給付の受給状況
4. 精神障害者保健福祉手帳の取得状況

104 診察の結果、A さんは入院することになり、外来看護師に付き添われて閉鎖病棟きさに来た。

病棟の入り口でドアを開けた看護師が優先的に行うのはどれか。

1. 持参した薬を確認する。
2. 病棟のホールに誘導する。
3. 他の病棟スタッフに協力を要請する。
4. 入院のオリエンテーションを実施する。

105 入院後2週、症状が安定して、意思の疎通も良好となり、興奮もみられなくなつた。入院後1か月にはADLもほぼ自立していた。

入院後1か月のAさんへの看護で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 長期間の入院が必要であると説明する。
2. 退院して家族と同居することを検討する。
3. 入居していたグループホームと連絡を取る。
4. 警察にAさんの退院予定日を知らせておく。
5. 服薬の自己管理を開始するためのアセスメントを行う。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 106～108 の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)は、重症筋無力症を5年前に発症し、初期から副腎皮質ステロイドの内服治療を受けて自宅で生活している。現在は、眼瞼下垂、複視および上下肢の筋力低下がある。日中は、時間をかければ身の回りのことはできている。月1回の外来受診は強い疲労を伴う。夫とは離婚し、高校生の長女と2人で暮らしている。また、訪問サービスは訪問看護のみを利用している。

106 Aさんは「最近、口の中が痛いし、食事もおいしくない」と言う。口角に発赤があり、舌、上口蓋および頬粘膜に白色のものが付着して、その一部に出血がみられる。

Aさんの症状の原因として最も可能性が高いのはどれか。

1. う蝕
dental caries
2. 歯周病
periodontal disease
3. 口腔乾燥症
xerostomia
4. 鵝口瘡〈口腔カンジダ症〉
thrush oral candidiasis

107 Aさんがセルフケア能力を維持して、口腔内の清潔を保つための訪問看護師の対応で適切なものはどれか。2つ選べ。

1. 歯磨きの自助具を紹介する。
2. 含嗽はしないよう指導する。
3. 筋力低下の日内差について尋ねる。
4. 長女が口腔ケアを行うよう助言する。
5. 歯磨きは食事の前後に行うよう指導する。

108 Aさんは「娘むすめとの生活せいかつを続けるつづるために私わたしも頑張がんばらなくては行いけないと思おもっている」と言いう。

訪問看護師ほうもんかんごしのAさんへの対応たいおうで適切てきせつなのはどれか。

1. 「Aさんの頑張がんばり次第しだいです」
2. 「将来しょうらいは娘むすめさんに介護かいごしてもらいましょう」
3. 「将来しょうらいは施設しせつに入所にゅうしょすることを考かんがえましょう」
4. 「ホームヘルパーの支援しえんを受うけることも考かんがえましょう」

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 109～111 の問いに答えよ。

A さん (87 歳、女性) は、6 年前に Alzheimer (アルツハイマー) 型認知症を発症した。在宅で療養していたが、夫が介護に疲れたために施設に入所した。現在、長谷川式簡易知的機能評価スケール (HDS-R) 10 点、障害高齢者の日常生活自立度判定基準 B-1 である。下肢筋力や立位バランスの低下がある。自宅では自分で車椅子に移乗してトイレに行き排泄していた。尿失禁はなかった。入所直後、A さんは表情が険しく落ち着きがなく、看護師が声をかけても応じない。自発的にトイレに行きたいという発言はなく、着衣を尿で汚染することが多いためトイレ誘導を行うことにした。

109 看護師の対応で最も適切なものはどれか。

1. 大きな声で尿意を尋ねる。
2. 就寝中も起こしてトイレに誘導する。
3. 施設で決められた時刻にトイレに誘導する。
4. 声をかけても応じない場合は様子を見て再度トイレに誘導する。

110 入所後 2 週。A さんの表情は穏やかになり行動も落ち着くようになった。自発的に車椅子に乗り廊下を移動している。尿意はあるが、尿失禁が続いている。尿失禁の状態を把握するために行う看護師の対応で適切なものはどれか。

1. 排泄動作を全介助する。
2. 夜間は下着をオムツに変更する。
3. 尿失禁の不快感について質問する。
4. 廊下を移動中、トイレに行きたいのかを確認する。

- 111 入所後3週。排尿行動の自立を目標とする看護計画を立案した。
看護計画として最も適切なものはどれか。
1. 昼夜ともにオムツは使用しない。
 2. トイレの標示を目立つよう工夫する。
 3. 尿で汚染した着衣を自分で片づけるよう指導する。
 4. 尿意を感じた際にはナースコールで呼ぶよう説明する。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 112～114 の問いに答えよ。

A さん(24 歳、初産婦)、事務職。妊娠 8 週である。現在、両親と妹との 4 人で暮らしている。パートナーは 24 歳の大学院 2 年生で就職が内定しており、A さんと結婚する予定である。

112 A さんは「気持ちが悪いのであまり食べられません。ご飯が炊き上がるにおいで吐き気がします」と話している。妊娠経過は順調である。

A さんへの食事指導で最も適切なのはどれか。

1. 水分は糖分を含んだ飲料にする。
2. 栄養のバランスを崩さずに摂取する。
3. 1 回量を少なくして食べる回数を増やす。
4. 積極的にカロリーの高い食物を摂取する。

113 A さんは「妊娠することは考えていなかったのですが、自分の体にどんなことが起こるのか想像もつきません」と話した。看護師は、次の妊婦健康診査までに生じやすい変化について説明することにした。

A さんに説明する内容で適切なのはどれか。2 つ選べ。

1. 痔
2. 便秘
3. 静脈瘤
4. 帯下の増加
5. 皮膚の掻痒感

114 妊娠 16 週の妊婦健康診査で、A さんは「母親になる実感はまだありません。妊娠するといろいろなことが起こって驚くばかりです」と話した。妊娠経過は順調である。既にパートナーと結婚し、新居に引っ越している。

A さんへの指導で最も優先度が高いのはどれか。

1. 保育所の選択
2. 育児用品の準備
3. バースプランの立案
4. 出産準備教室への参加

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 115～117 の問いに答えよ。

くん さい だんじ こうえん じてんしゃ きたくとちゆう てんとう き うで みぎひじ きょうだ
A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打
した。とう つう しゅ ちゆう じゅ しん たん じゅん せん さつ えい けつ か
疼痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、
みぎじょうわんこつ かじょうこっせつ しんだん ちりょう にゅういん
右上腕骨顆上骨折と診断され、治療のために入院した。
supracondylar fracture of the humerus

115 くん じょうわん しゅかんせつ こてい おこな
A君の上腕から手関節までシーネ固定を行った。

かんし かんさつこうもく もつと ゆうせん ど たか
患肢の観察項目で最も優先度が高いのはどれか。

1. ち かく
知覚
2. かゆみ
3. しゅつけつりょう
出血量
4. かんせつこうしゅく
関節拘縮

116 にゅういん ごふつ か ぜんしんますいか こつせつこうじゅつ し こう ふたた じょうわん しゅかんせつ
入院後2日。全身麻酔下で骨接合術が施行され、再び上腕から手関節までシーネ

こてい おこな じゅつご ぜんしんじょうたい あんてい ゆうしょく しょくじ かいし
固定を行った。術後の全身状態は安定しており、夕食から食事が開始された。

くん しょくじ せつしゅ ほうほう もつと てきせつ
このときのA君の食事摂取の方法で最も適切なのはどれか。

1. そく が い せつしゅ
側臥位で摂取する。
2. りゅうどうしょく せつしゅ
流動食を摂取する。
3. ひだりて つか せつしゅ
左手を使って摂取する。
4. みぎて つか せつしゅ
右手を使って摂取する。

117 術後8日、上腕から手関節までギプス固定を行った。術後10日に退院し、5週後に外来で抜釘術を行う予定である。

退院指導で適切なのはどれか。

1. 外での遊びに制限はない。
2. ギプスがとれるまで入浴しない。
3. 患肢に痛みがあるときは受診する。
4. 患側の指先に冷感があるときは温める。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 118～120 の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳0か月、女兒)。昨日から下痢と嘔吐とを繰り返し、食事が摂れなくなったため、母親に抱かれて小児科外来を受診した。診察の結果、ウイルス性胃腸炎(viral gastroenteritis)と診断され入院した。入院時、体温 38.2℃、呼吸数 36/分、心拍数 136/分であった。1週前の保育所の身体計測では身長 89 cm、体重 12.0 kg であった。個室隔離とし、点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。

118 Aちゃんの体重を測定したところ 11.6 kg であった。皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる。尿検査のため採尿パックを貼ると黄色の尿が 10 ml 採取された。Aちゃんは、診察と処置が行われている間、ずっと母親に抱かれて泣いており、涙で頬を濡らしていた。

Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。

1. 脱水症状はない。
2. 軽度脱水である。
3. 中等度脱水である。
4. 重度脱水である。

119 入院翌日。Aちゃんは活気がなく臥床している。下痢症状は改善し嘔吐もみられなくなったが、時々顔をしかめており、母親は「まだおなかが痛いみたいです」と看護師に話す。

Aちゃんの痛みへの対応で適切なのはどれか。

1. 食事摂取を促す。
2. 日中も部屋を暗くする。
3. 1人で過ごすようにする。
4. Aちゃんが好きな絵本を読み聞かせる。

120 Aちゃんは、排泄が自立していないため紙オムツを使用している。看護師が殿部を観察すると発赤とびらんとがみられた。

Aちゃんへの看護で適切なのはどれか。

1. 布オムツを使用する。
2. 38～39℃の湯で殿部浴を行う。
3. オムツを外し、殿部を開放しておく。
4. アルコール入りのおしり拭きで殿部の清拭を行う。

