

## 注意事項

- 試験問題の数は120問で解答時間は正味3時間30分である。
- 解答方法は次のとおりである。
  - (例1)、(例2)及び(例3)の問題では1から4までの4つの選択肢、もしくは1から5までの5つの選択肢があるので、そのうち質問に適した選択肢を(例1)、(例2)では1つ、(例3)では2つ選び答案用紙に記入すること。  
 なお、(例1)、(例2)の質問には2つ以上解答した場合は誤りとする。(例3)の質問には、1つ又は3つ以上解答した場合は誤りとする。

## (例1)

201 近代看護の基礎を築いたのは誰か。

- キュリー, M.  
Curie, M.
- アダムズ, J.  
Addams, J.
- ナイチンゲール, F.  
Nightingale, F.
- アインシュタイン, A.  
Einstein, A.

正解は「3」であるから答案用紙の③をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

201	①	②	③	④
201	①	②	●	④

答案用紙②の場合、

201	201
①	①
②	②
③	●
④	④

れい  
(例2)

202 看護師国家試験の受験資格が規定されているのはどれか。

1. 医療法 いりょうほう
2. 学校教育法 がっこうきょういくほう
3. 労働基準法 ろうどう きじゅんほう
4. 保健師助産師看護師法 ほけんしじょさんしかんごしほう
5. 看護師等の人材確保の促進に関する法律 かんごしとうじんざいかくほそくしんかんほうりつ

正解は「4」であるから答案用紙の④をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

202	①	②	③	④	⑤
			↓		
202	①	②	③	●	⑤

答案用紙②の場合、

202	202
①	①
②	②
③	→ ③
④	●
⑤	⑤

れい  
(例3)

203 看護師籍に登録されるのはどれか。2つ選べ。

1. 生年月日 せいねんがっぴ
2. 受験年月日 じゅけんねんがっぴ
3. 卒業年月日 そつぎょうねんがっぴ
4. 就業年月日 しゅうぎょうねんがっぴ
5. 登録年月日 とうろくねんがっぴ

正解は「1」と「5」であるから答案用紙の①と⑤をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

203	①	②	③	④	⑤
			↓		
203	●	②	③	④	●

答案用紙②の場合、

203	203
①	●
②	②
③	→ ③
④	④
⑤	●

(2) 計算問題については、 に囲まれた丸数字に入る適切な数値をそれぞれ1つ選び答案用紙に記入すること。なお、(例4)の質問には丸数字1つにつき2つ以上解答した場合は誤りとする。

(例4)

204 50床の病棟で入院患者は45人である。

この病棟の病床利用率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答： ① ② %

- |   |   |
|---|---|
| ① | ② |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

正解は「90」であるから①は答案用紙の(9)を②は(0)をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

①	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(●)
204	(●)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

答案用紙②の場合、

204

①	②
(0)	(●)
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)
(4)	(4)
(5)	(5)
(6)	(6)
(7)	(7)
(8)	(8)
(●)	(9)







1 日本にほんの将来推計人口しょうらいすいけいじんこうで2020年ねんの65歳さい以上人口いじょうじんこうが総人口そうじんこうに占める割合しに最も近いわりあい もっと ちかのはどれか。

1. 15 %
2. 30 %
3. 45 %
4. 60 %

2 日本にほんの平成22年へいせい ねん(2010年ねん)における傷病別しょうびょうべつにみた通院者率つういんしゃりつが男女だんじょともに最も高いもっと たかのはどれか。

1. 腰痛症ようつうしょう
2. 高血圧症こうけつあつしょう  
hypertension
3. 歯の病気は びょうき
4. 眼の病気め びょうき

3 国民健康保険こくみんけんこう ほけんの保険者ほけんじやはどれか。

1. 国くに
2. 都道府県とどうふけん
3. 市町村しちょうそん
4. 健康保険組合けんこう ほけんくみあい

4 医療従事者いりょうじゅうじしゃによる十分な説明じゅうぶん せつめいに基づく患者もとの同意かんじやを示すどうい しめのはどれか。

1. エンパワメント
2. コンプライアンス
3. リスクマネジメント
4. インフォームド・コンセント

5 受精じゅせいから着床開始ちやくしやうかいしまでの期間きかんはどれか。

1. 1～2日にち
2. 6～7日にち
3. 13～14日にち
4. 20～21日にち

6 思春期ししゆんきの子どもの親こに対する行動おや たいの特徴こうどう とくちやうで適切なてきせつのはどれか。

1. 親おやからの干渉かんしやうを嫌きらうようになる。
2. 親おやと離はなれると不安ふあんな様子ようすになる。
3. 親おやに秘密ひみつを打ち明あけるようになる。
4. 親おやからの助言じよげんを素直すなおに聞きけるようになる。

7 加齢かれいによって衰えおとろやすい機能きのうはどれか。

1. 記銘力きめいりよく
2. 洞察力どうさつりよく
3. 判断力はんだんりよく
4. 統合力とうごうりよく

8 要介護者ようかいごしやに対し看護たいかんご、医学的管理いがくてきかんりの下もとにおいて必要な医療ひつようや日常生活上いりやうの世話にちじやうせいかつじやうを  
行おこなう施設しせつはどれか。

1. 授産施設じゆさんしせつ
2. 保健センターほけん
3. 介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ
4. 特別養護老人ホームとくべつやうごろうじん

9 機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。

1. 1人の看護師が毎日異なる患者を受け持つ。
2. 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。
3. 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。
4. 患者をいくつかのグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。

10 免疫機能に関与する細胞はどれか。

1. 血小板
2. 白血球
3. 網赤血球
4. 成熟赤血球

11 月経周期が順調な場合、最終月経の初日を0日とすると分娩予定日はどれか。

1. 240日目
2. 280日目
3. 320日目
4. 360日目

12 最も緊急性の高い不整脈はどれか。

1. 心房細動  
atrial fibrillation
2. 心室細動  
ventricular fibrillation
3. I度房室ブロック  
first degree atrioventricular block
4. 完全右脚ブロック  
complete right bundle branch block

13 急性の頭痛を起こす可能性が最も高いのはどれか。

1. 複視
2. 外斜視
3. 緑内障  
glaucoma  
がんげんかすい
4. 眼瞼下垂

14 呼吸困難とはどれか。

1. 脈拍数の増加
2. 息苦しさの自覚
3. 動脈血酸素分圧〈PaO<sub>2</sub>〉の低下
4. 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO<sub>2</sub>〉の低下

15 生活習慣病の一次予防はどれか。

1. 早期治療
2. 検診の受診
3. 適切な食生活
4. 社会復帰を目指したりハビリテーション

16 副作用(有害事象)として低血糖症状を起こす可能性があるのはどれか。

1. ジゴキシン
2. インスリン
3. フェニトイン
4. ワルファリン


17 医薬品に関する禁忌を示すことが定められているのはどれか。

1. 処方箋
2. 診断書
3. 看護記録
4. 添付文書

18 関節可動域〈ROM〉の単位はどれか。

1. 回
2. 度
3. kg
4. cm

- 19 女性患者の床上排泄で洋式便器をあてる位置を図に示す。  
適切なのはどれか。



- 20 シーツ交換時にシーツを引っ張る動作でボディメカニクスを応用した姿勢はどれか。

1. 両足を前後に開き、両膝を伸ばす。
2. 両足を前後に開き、両膝を曲げる。
3. 両足をそろえ、両膝を伸ばす。
4. 両足をそろえ、両膝を曲げる。

21 生理食塩水の塩化ナトリウム濃度はどれか。

1. 0.9 %
2. 5 %
3. 9 %
4. 15 %

22 血中濃度を確認する必要性が最も高い医薬品はどれか。

1. アスピリン
2. フロセミド
3. テオフィリン
4. インドメタシン

23 静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。

1. 10～30 度
2. 35～40 度
3. 55～60 度
4. 75～80 度

24 体位ドレナージの直接の目的はどれか。

1. 痛みの軽減
2. 睡眠の導入
3. 排痰の促進
4. 廃用症候群の予防  
disuse syndrome

25 <sup>しんどう</sup> <sup>げんいん</sup> <sup>しよくぎやうせいしつぺい</sup>  
振動が原因となる職業性疾病はどれか。

1. <sup>ちゆう ひ しゆ</sup>  
中皮腫  
mesothelioma
2. <sup>ねつちゆうしやう</sup>  
熱中症  
heat illness
3. <sup>こうざんびやう</sup>  
高山病  
altitude sickness
4. <sup>はく びやう</sup>  
白ろう病  
white finger disease

26 <sup>きやうかん</sup> <sup>ただ</sup>  
胸管で正しいのはどれか。

1. <sup>べん</sup>  
弁がない。
2. <sup>じやうみやかく</sup> <sup>ごうりゆう</sup>  
静脈角に合流する。
3. <sup>がんさいぼう</sup> <sup>りゆうじゆう</sup>  
癌細胞は流入しない。
4. <sup>おも</sup> <sup>たんぱくしつ</sup> <sup>ゆ</sup> <sup>そう</sup>  
主に蛋白質を輸送する。

27 ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。

1. バソプレシン ————— <sup>りじゆう</sup> <sup>そくしん</sup>  
利尿の促進
2. オキシトシン ————— <sup>じゆうじゆうさんせい</sup> <sup>そくしん</sup>  
乳汁産生の促進
3. テストステロン ————— <sup>こうせい</sup> <sup>そくしん</sup>  
タンパク合成の促進
4. アルドステロン ————— <sup>はいせつ</sup> <sup>そくしん</sup>  
ナトリウムイオン排泄の促進

28 <sup>ていたいおん</sup> <sup>かいふく</sup> <sup>ともな</sup> <sup>せいたい</sup> <sup>はんのう</sup>  
低体温からの回復に伴う生体の反応はどれか。

1. <sup>はい</sup> <sup>よう</sup>  
廃用
2. <sup>はっ</sup> <sup>かん</sup>  
発汗
3. ふるえ
4. <sup>じゆうさん</sup> <sup>ちくせき</sup>  
乳酸の蓄積

29 胸部エックス線写真(別冊 No. 1)を別に示す。

心胸郭比について正しいのはどれか。

1. 小さい。
2. 正常である。
3. 大きい。
4. 測定できない。



30 乳癌について正しいのはどれか。

1. 乳房の内側に多い。
2. 有痛性の腫瘍が特徴である。
3. エストロゲン補充療法を行う。
4. センチネルリンパ節生検により郭清する範囲を決める。

31 日本にほんの平成へいせい24年ねん(2012年ねん)における女性じよせいの年齢階級別労働力率ねんれいかいきゅうべつろうどうりょくりつの推移すいを示すグラフしめの特徴とくちようはどれか。

1. 20歳代さいだいをピークとする山型やまがた
2. 40歳代さいだいをピークとする山型やまがた
3. 20歳代さいだいと40歳代さいだいをピークとするM字型じがた
4. 20歳代さいだいから50歳代さいだいにかけての逆U字型ぎやくじがた

32 生活保護法せいかつほごほうに基づき保護もとほごを決定けつていするのはどれか。

1. 保健センターほけん
2. 福祉事務所ふくしじむしょ
3. 保健所ほけんじよ
4. 病院びやういん

33 環境要因かんきようよういんと健康けんこうへの影響えいきようの組合せくみあわで正しいただのはどれか。

1. 高温こうおん ————— 難聴なんちよう  
deafness
2. ヒ素しそ ————— イタイイタイ病びやう  
Itai-Itai disease
3. オゾンホール ————— 赤外線障害せきがいせんしやうがい
4. 光化学オキシダントこうかがく ————— 粘膜刺激ねんまくしげき

34 大気汚染たいきおせんに関する環境基準かんきようきじゆんが定められている物質ぶつしつはどれか。

1. 二酸化炭素にさんかたんそ
2. 一酸化窒素いっさんかちつそ
3. フッ化水素かすいそ
4. 微小粒子状物質びしやうりゆうしじやうぶつしつ

35 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・  
介護休業法〉で定められているのはどれか。

1. 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
2. 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
3. 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
4. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間  
外労働の制限

36 看護師と患者の信頼関係の構築において最も考慮すべき要素はどれか。

1. 病院の方針
2. 看護師の思い
3. 患者の価値観
4. 家族の経済状況

37 終末期の患者の妻は患者の死期が近いことを受け入れがたい状態である。

妻の気持ちを受容する看護師の言動として最も適切なものはどれか。

1. 「今がつらいときですね」
2. 「死を受け入れるしかないと思いますよ」
3. 「最期にしてあげたいことを考えましょう」
4. 「亡くなった後の準備をすぐに始めましょう」

38 成人の立位の腹部エックス線写真(別冊 No. 2)を別に示す。

この所見から最も考えられる疾患はどれか。

1. 胆石症  
cholelithiasis
2. イレウス  
ileus
3. 潰瘍性大腸炎  
ulcerative colitis
4. 十二指腸潰瘍  
duodenal ulcer



39 血液の付着した注射針を廃棄する容器はどれか。

1. 黄色バイオハザードマーク付きの容器
2. 橙色バイオハザードマーク付きの容器
3. 赤色バイオハザードマーク付きの容器
4. 非感染性廃棄物用の容器

40 臥床している患者に対して看護師が手袋を装着して口腔ケアを実施した。

口腔ケア後の看護師の行動で適切なのはどれか。


1. 手袋を外し、すぐに新しい手袋を装着して別の患者のケアを行う。
2. 使用した手袋を装着したまま患者の寝衣を交換する。
3. 手袋を装着したまま患者の歯ブラシを洗浄する。
4. 使用した手袋は一般廃棄物の容器に捨てる。

- 41 まんせいすいえん かんじゃ しよく じりょうほう せいげん ひつよう  
chronic pancreatitis 慢性膵炎の患者の食事療法で制限が必要なのはどれか。
1. とう しつ 糖 質
  2. し しつ 脂 質
  3. たんぱくしつ 蛋白質
  4. し ようせい 脂溶性ビタミン

- 42 はいけつりゅうりょう もつと げんしょう たい い  
肺血流量が最も減少する体位はどれか。
1. りつ い 立 位
  2. ざ い 座 位
  3. ぎょうが い 仰臥位
  4. Fowler〈ファウラー〉位

- 43 ベンチュリーマスクによるさん そきゅうにゅう ただ酸素吸入で正しいのはどれか。
1. さいてき さん そりゅうりょう ふん 最適な酸素流量は18 L/分である。
  2. さん そりゅうりょう かんけい かしつ き ひつよう 酸素流量に関係なく加湿器が必要である。
  3. 24～50 %のあんてい きゅうにゅうさん そのう ど え安定した吸入酸素濃度が得られる。
  4. マスクにくうき た空気を溜めることのできるバッグがある。

44 成人の心臓マッサージ法の圧迫部位を図に示す。



ただ正しいのはどれか。

1. ①
2. ②
3. ③
4. ④

45 生体検査はどれか。

1. 尿検査
2. 血液検査
3. 心電図検査
4. 脳脊髄液検査

46 にほん さいきん ねん せいじん と ま しゃかいじょうきょう ただ  
日本の最近10年の成人を取り巻く社会状況で正しいのはどれか。

1. せいざんねんれいじんこう し わりあい ぞう か  
生産年齢人口の占める割合の増加
2. たんどく せたい し わりあい ぞう か  
単独世帯の占める割合の増加
3. ひ せい き こようしゃ ひりつ てい か  
非正規雇用者の比率の低下
4. へいきんしよこんねんれい てい か  
平均初婚年齢の低下

47 はいようしょうこうぐん せつめい てきせつ  
disuse syndrome  
廃用症候群の説明で適切なものはどれか。

1. に じてき てい けっしょう はっしょう  
二次的に低カルシウム血症を発症する。
2. か れい しょうじょう しんこう おそ  
加齢とともに症状の進行は遅くなる。
3. に じてき きりつせいていけつあつ はっしょう  
二次的に起立性低血圧を発症する。
4. がんかんじゃ  
癌患者ではみられない。


48 せんこうしよく ていめん すいほう けいせい いた つよ ねっしょうそう かいふく よう きかん  
鮮紅色の底面をした水疱を形成し、痛みが強い熱傷創の回復に要する期間はどれ  
か。

1. 2～3 日
2. 1～2 週
3. 3～4 週
4. 2～3 か月


49 フローボリューム曲線を図に示す。

慢性閉塞性肺疾患の患者の結果はどれか。  
chronic obstructive pulmonary disease


1.




2.



3.



4.



50 Aさん(39歳、男性、会社員)は、最近口渴が強く、飲水量が増えた。毎日5L以上の水のような薄い排尿があり、夜間に何回も排尿に起きるようになったため病院を受診しホルモン分泌異常を指摘された。

原因と考えられるホルモンが分泌される部位はどれか。

1. 視床下部
2. 下垂体後葉
3. 甲状腺
4. 副腎皮質

51 眼底検査の前処置で散瞳薬を点眼する際の看護で適切なのはどれか。

1. 白内障の既往の有無を確認する。
2. 羞明が強くなると説明する。
3. 散瞳薬による症状は30分程度で消失すると説明する。
4. 目を閉じた状態で検査室に誘導する。

52 脊髓造影について正しいのはどれか。

1. 検査前の食事制限はない。
2. 造影剤を硬膜外腔に注入する。
3. 検査中のけいれん発作に注意する。
4. 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。

53 Aさん(52歳、女性)は、子宮頸癌で広汎子宮全摘術後に排尿障害を発症した。退院に向けて自己導尿の練習を開始したが、39.0℃の発熱と右背部の叩打痛が出現した。

Aさんの症状の原因として考えられるのはどれか。

1. 膀胱炎
2. 虫垂炎
3. 腎盂腎炎
4. 骨盤内膿瘍

54 流動性知能はどれか。

1. 新聞を読む。
2. 町内会の役員を務める。
3. 結婚式のマナーを知っている。
4. 携帯電話に電話番号を登録する。

55 Aさん(66歳、男性)は、尿管結石症で入院し、鎮痛薬の投与と点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。日常生活は自立している。輸液開始の1時間後、Aさんの病室で大きな音がしたので看護師が駆けつけると、Aさんはベッドサイドに座り込んでいた。「トイレに行こうとベッドから立ち上がろうとして、点滴のスタンドをつかんだら滑った」と話した。転倒後の診察の結果に異常はなかった。

Aさんが再び転倒しないための対応で最も適切なのはどれか。

1. 床上排泄にする。
2. 誰の過失か明らかにする。
3. 転倒の原因を一緒に考える。
4. 夜間は家族に付き添いを依頼する。

56 Aさん(88歳、女性)は、中等度の認知症である。介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。Aさんに入浴を勧めるとAさんは「風呂なんて嫌だ」と強い口調で言い、理由を聞いても話さない。

このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1. 全身清拭する。
2. 入浴の必要性を説明する。
3. 石けんとタオルを見せる。
4. 気持ちが落ち着いてから再び入浴を勧める。

57 Aさん(75歳、女性)は、自立した生活を送っている。尿失禁があるため、尿失禁用パッドを使用している。大腿内側部と外陰部の搔痒感を訴え、皮膚科を受診し、外陰部搔痒症と診断された。

このときの指導内容で適切なのはどれか。

1. 水分摂取を控える。
2. 間欠的自己導尿を行う。
3. 尿失禁用パッドの交換頻度を増やす。
4. 搔痒感のある部位をアルコール綿で清拭する。

58 手指の巧緻性が低下している高齢者が操作しやすい補聴器の種類はどれか。

1. 骨導補聴器
2. 耳あな型補聴器
3. 耳かけ型補聴器
4. ポケット型補聴器

59 インフルエンザが流行しているが、小規模多機能型居宅介護を行う事業所では罹患患者はいない。

この事業所で看護師が行う罹患予防の対策で最も適切なのはどれか。

1. 宿泊の利用を断る。
2. 湿度を10%以下に保つ。
3. 利用者に手洗いを勧める。
4. 利用者に予防的に抗インフルエンザ薬を与薬する。

60 A君(8歳、男児)は、先天性内反足の手術後、両下腿のギプス固定を行う予定である。手術前にA君に対してギプス固定後の日常生活に関する説明をすることになった。

A君に対する看護師の説明で適切なのはどれか。

1. 「シャワー浴はやめておきましょう」
2. 「ギプスの部分を高くしておきましょう」
3. 「足のゆびを動かさないようにしましょう」
4. 「ギプスを外すまでベッド上で過ごしましょう」

61 肺高血圧が長期に持続し、肺血管抵抗が上昇することにより、短絡血流が主に左右短絡から右左短絡になった状態はどれか。

1. 拡張型心筋症  
dilated cardiomyopathy
2. 総肺静脈還流異常症  
total anomalous pulmonary venous return
3. Fallot〈ファロー〉四徴症  
tetralogy of Fallot
4. Eisenmenger〈アイゼンメンジャー〉症候群  
Eisenmenger syndrome

62 出生前診断について正しいのはどれか。

1. 遺伝相談は勧めない。
2. 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。
3. 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。
4. 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。

63 妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。

1. 飲酒の習慣による巨大児
2. 喫煙による神経管形成障害
3. 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患
4. ビタミン A の過剰摂取による低出生体重児

64 高齢女性に生じやすい疾患と原因の組合せで正しいのはどれか。

1. 膣炎 ————— 膣分泌物の酸性化
2. 外陰炎 ————— プロゲステロンの減少
3. 子宮脱 ————— 骨盤底筋群の筋力低下
4. 子宮体癌 ————— プロラクチンの増加

65 在胎 38 週に正常分娩で出生した児で、体重 2,400 g の児が体重 3,000 g の児に比べて起こしやすい症状はどれか。

1. 高血糖
2. 心雑音
3. 低体温
4. 無呼吸

66 神経伝達物質と精神疾患の組合せで最も関連が強いのはどれか。

1. ドパミン ————— 脳血管性認知症
2. セロトニン ————— うつ病
3. ヒスタミン ————— Alzheimer (アルツハイマー) 病
4. アセチルコリン ————— 統合失調症

67 A さんの母親は過干渉で、A さんが反論すると厳しい口調でいつまでも A さんを批判し続けるため、A さんは母親との関係に悩んできた。その母親と同年代で体格が似ている担当看護師に対し、A さんは常に反抗的な態度をとり、強い拒絶を示している。

A さんにみられるのはどれか。

1. 投影
2. 逆転移
3. 反動形成
4. 陰性転移

68 精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。

1. 保健所
2. 地方裁判所
3. 精神医療審査会
4. 地方精神保健福祉審議会

69 訪問看護師の関わりで最も適切なのはどれか。

1. 看護師の判断で訪問時間を延長する。
2. 療養者のライフスタイルを尊重する。
3. 1人暮らしの療養者では家族のことは考慮しない。
4. 訪問時間以外での療養者との個人的な付き合いを大切にする。

70 A さん(59歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。Parkinson<パーキンソン>病  
Parkinson's diseaseで、Hoehn-Yahr<ホーエン・ヤール>の重症度分類ステージⅢであり、嚥下に困難  
えんげ こんなんがある。要介護2の認定を受けている。

食事の見守りを行う妻への訪問看護師による指導で適切なものはどれか。

1. 「食事はきざみ食にしましょう」
2. 「食事は決まった時間にしましょう」
3. 「食事中はテレビをつけておきましょう」
4. 「食べ物を飲み込んだことを確認しましょう」

71 A さん(52歳、男性)は、妻と2人で暮らしている。妻は末期の肺癌で、今朝自  
つま まっ き はいがん け さ じ lung cancer宅で亡くなった。

主治医が死亡診断を行った後のAさんへの訪問看護師の対応で最も適切なものは  
 どれか。

1. 葬儀を手配するよう勧める。
2. 医療機器は早急に片づけるよう勧める。
3. Aさんの希望に沿って、死後の処置を行う。
4. 本日中に死亡診断書を役所に提出するよう説明する。

72 在宅中心静脈栄養法<HPN>について適切なものはどれか。

1. 輸液ポンプは外出時には使えない。
2. 24時間持続する注入には適さない。
3. 輸液の調剤は薬局の薬剤師に依頼できる。
4. 家族が管理できることが適用の必須条件である。

73 看護サービスの質の評価は、①ストラクチャー(看護サービス提供のための仕組み)、②プロセス(提供される看護サービス)、③アウトカム(看護サービスの成果)に分類される。

アウトカムはどれか。

1. 患者の満足度
2. 退院指導の実施
3. 看護手順の整備の有無
4. 看護師1人当たりの患者数

74 医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

1. 医療安全管理者の配置
2. 厚生労働省へのインシデント報告
3. 患者・家族への医療安全指導の実施
4. 医療安全支援センターへの医療事故報告

75 災害発生後の時期と災害看護活動の組合せで最も適切なものはどれか。

- |                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| 1. 災害発生直後～数時間  | ——— | 食中毒予防               |
| 2. 災害発生後3日～1週  | ——— | 外傷後ストレス障害(PTSD)への対応 |
| 3. 災害発生後1週～1か月 | ——— | 廃用症候群の予防            |
| 4. 災害発生後1か月以降  | ——— | 救命処置                |

76 平成<sup>へいせい</sup>24年<sup>ねん</sup>(2012年<sup>ねん</sup>)の国連<sup>こくれん</sup>エイズ合同<sup>ごうどうけいかく</sup>計画<sup>けいかく</sup>〈UNAIDS〉の報告<sup>ほうこく</sup>において、ヒト免疫<sup>めんえき</sup>不全<sup>ふぜん</sup>ウイルス〈HIV〉陽性<sup>ようせい</sup>者が最も<sup>もっと</sup>多い<sup>おお</sup>地域<sup>ちいき</sup>はどれか。

1. 東<sup>ひがし</sup>アジア
2. 北<sup>きた</sup>アメリカ
3. オセアニア
4. サハラ以南<sup>いなん</sup>のアフリカ

77 タンパク合成<sup>ごうせい</sup>が行<sup>おこな</sup>われる細胞<sup>さいぼう</sup>内<sup>ない</sup>小器官<sup>しょうき かん</sup>はどれか。

1. 核<sup>かく</sup>
2. リボソーム
3. リソソーム
4. ミトコンドリア
5. Golgi〈ゴルジ〉装置<sup>そうち</sup>

78 閉眼<sup>へいがん</sup>に関与<sup>かんよ</sup>する神経<sup>しんけい</sup>はどれか。

1. 動眼<sup>どうがん</sup>神経<sup>しんけい</sup>
2. 滑車<sup>かつしゃ</sup>神経<sup>しんけい</sup>
3. 三叉<sup>さんさ</sup>神経<sup>しんけい</sup>
4. 外転<sup>がいてん</sup>神経<sup>しんけい</sup>
5. 顔面<sup>がんめん</sup>神経<sup>しんけい</sup>

79 血管造影写真(別冊 No. 3)を別に示す。

造影部位で正しいのはどれか。

1. 脳動脈
2. 冠動脈
3. 肺動脈
4. 肝動脈
5. 腎動脈



80 健全な幼児の基本的な生活習慣の獲得で正しいのはどれか。

1. 1歳6か月でうがいができるようになる。
2. 2歳6か月で靴を履けるようになる。
3. 3歳でコップを使って飲めるようになる。
4. 4歳で手を洗って拭くようになる。
5. 5歳で昼寝は1日1回になる。

81 不妊症について正しいのはどれか。

1. 6か月間避妊せずに性交渉があっても妊娠しない状態である。
2. 頻度は妊娠を希望し避妊しないカップル10組に3組である。
3. 体外受精に要する費用の公的な助成制度がある。
4. 女性の年齢と不妊症の治療効果は関係しない。
5. 男性側の原因は7割程度である。

82 介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

1. スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。
2. アセスメントで利用者の疾患を診断する。
3. 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。
4. ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。
5. ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

83 伸張反射の構成要素はどれか。2つ選べ。

1. 骨 膜
2. 筋紡錘
3. 腱紡錘
4. 脊髄側角
5. 運動神経

84 吸息時に収縮する筋はどれか。2つ選べ。

1. 腹直筋
2. 腹横筋
3. 横隔膜
4. 外肋間筋
5. 内肋間筋

85 多発性硬化症<sup>たはつせいこうかしょう</sup>で正しいのはどれか。2つ<sup>ふた えら</sup>選<sup>えら</sup>べ。  
multiple sclerosis

1. 脱髄病変<sup>だつずいびょうへん</sup>が多発<sup>たはつ</sup>する。
2. 髄液中<sup>ずいえきちゅう</sup>のIgGは低下<sup>ていか</sup>する。
3. 視力低下<sup>しりょくていか</sup>は網脈絡膜炎<sup>もうみやくらくまくえん</sup>による。
4. MRIは病変<sup>びょうへん</sup>の検出<sup>けんしゅつ</sup>に有用<sup>ゆうよう</sup>である。
5. 末梢神経<sup>まつしょうしんけい</sup>が障害<sup>しょうがい</sup>されることが多い<sup>おお</sup>。

86 食道癌<sup>しょくどうがん</sup>について正しいのはどれか。2つ<sup>ふた えら</sup>選<sup>えら</sup>べ。  
esophageal cancer

1. 頸部食道<sup>けいぶしょくどう</sup>に好発<sup>こうはつ</sup>する。
2. 放射線感受性<sup>ほうしゃせんかんじゅせい</sup>は低い<sup>ひく</sup>。
3. アルコール飲料<sup>いんりょう</sup>は危険因子<sup>きけんいんし</sup>である。
4. 日本では扁平上皮癌<sup>へんぺいじょうひがん</sup>に比べて腺癌<sup>せんがん</sup>が多い<sup>おお</sup>。
5. ヨードを用いた内視鏡検査<sup>もちないしきょうけんさ</sup>は早期診断<sup>そうきしんだん</sup>に有用<sup>ゆうよう</sup>である。

87 心電図<sup>しんでんず</sup>(別冊<sup>べっさつ</sup> No. 4)を別に示<sup>べつ しめ</sup>す。

所見<sup>しょけん</sup>として正しいのはどれか。2つ<sup>ふた えら</sup>選<sup>えら</sup>べ。

1. R-R 間隔<sup>かんかく</sup>の不整<sup>ふせい</sup>
2. 細動波<sup>さいどうは</sup>の出現<sup>しゅつげん</sup>
3. QRS 波<sup>は</sup>の消失<sup>しょうしつ</sup>
4. ST の上昇<sup>じょうじょう</sup>
5. 陰性<sup>いんせい</sup> T 波<sup>は</sup>

別冊

No. 4

88 喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 誤嚥をしやすい。
2. 咀嚼がしにくい。
3. においが分かりづらい。
4. 高い音が聞こえにくい。
5. 飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。

89 改訂版デンバー式発達スクリーニング検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 4領域について判定を行う。
2. 適応年齢は0～6歳である。
3. 判定結果は数値で示される。
4. 知能指数の判定が可能である。
5. 1領域に10の検査項目がある。

90 精神障害者のリカバリ〈回復〉の考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 患者に役割をもたせない。
2. 薬物療法を主体に展開する。
3. 患者の主体的な選択を支援する。
4. 患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。
5. リカバリ〈回復〉とは病気が治癒したことである。

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み91～93の問いに答えよ。

Aさん(54歳、男性)は、10年前に心筋梗塞を発症し、2年前に慢性心不全と診断され外来受診を続けてきた。1週間前からトイレ歩行時に息苦しさがあり、4日前から夜に咳と痰とがみられ眠れなくなっていた。本日、Aさんは定期受診のため来院し、心不全の増悪と診断され入院した。入院時、体温36.3℃、呼吸数24/分、脈拍96/分、整で、血圧124/72 mmHgであった。心エコー検査で左室の駆出率28%であった。体重は1週間で4kg増加し下肢の浮腫がみられる。

91 このときのAさんのアセスメントで適切なものはどれか。

1. ショック状態の可能性が高い。
2. 左心不全の症状はみられない。
3. NYHA心機能分類のI度に該当する。
4. 浮腫は右心不全の症状によると考えられる。

92 Aさんの咳嗽を軽減する方法で最も適切なものはどれか。

1. 起坐位を保つ。
2. 腹式呼吸を促す。
3. 部屋の湿度を30%に保つ。
4. 超音波ネブライザーを使用する。

93 入院治療により A さんの症状は改善し、2 日後に退院予定である。  
退院後の受診についての説明で最も適切なのはどれか。

1. 「夜間の咳で受診する必要はありません」
2. 「体温が 38.0℃ 以下なら受診の必要はありません」
3. 「今回のように体重が増加したときは受診してください」
4. 「仕事から帰って足に浮腫がみられたら受診してください」

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 94～96 の問いに答えよ。

A さん(52 歳、男性)は、5 年前に健康診断で高血圧を指摘されていたが、そのままにしていた。5 年ぶりに健康診断を受けたところ尿蛋白+で、内科を受診し腎機能障害を指摘された。A さんは、身長 160 cm、体重 56 kg であり、体温 36.1℃、呼吸数 18/分、脈拍 64/分、整で、血圧 166/96 mmHg であった。血液検査データは、Hb 9.3 g/dL、アルブミン 3.6 g/dL、クレアチニン 2.3 mg/dL、HbA1c 5.6 %、K 3.9 mEq/L、推算糸球体濾過量〈eGFR〉25 mL/分/1.73 m<sup>2</sup> であり、特に自覚症状はなく、浮腫はみられない。

94 腎機能の悪化によるものと考えられるデータはどれか。

1. 体重
2. 血清カリウム値
3. ヘモグロビン値
4. 血清アルブミン値

95 A さんは、慢性腎臓病ステージ 4 と診断され、精査目的で入院した。「特に症状がないのに腎臓が悪いと言われて本当に驚いたよ。高血圧が関係していると医師に言われたけれど、どういうことですか」と A さんが看護師に尋ねた。

A さんへの説明で適切なのはどれか。

1. 「高血圧で尿が少なくなり腎臓を悪くします」
2. 「高血圧が続くと腎臓の濾過機能が低下します」
3. 「高血圧では腎臓病の症状が現れにくくなります」
4. 「腎臓の機能がさらに低下すると血圧は低くなります」

96 現時点<sup>げんじてん</sup>で A さん<sup>あさん</sup>に起こる<sup>おこ</sup>危険性<sup>きけんせい</sup>が高い<sup>たか</sup>のはどれか。

1. 低リン血症<sup>ていけっしんけつじょう</sup>
2. 血糖値の上昇<sup>けつとうちじょうじょう</sup>
3. 虚血性心疾患<sup>きょけつせいしんしつかん</sup>  
ischemic heart disease
4. 甲状腺機能亢進症<sup>こうじょうせんきのうこうしんしょう</sup>  
hyperthyroidism

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 97～99 の問いに答えよ。

A さん(72 歳、男性)は、アパートの 1 階に 1 人で暮らしている。家族や親戚はいない。15 年前から心不全のために利尿薬を毎朝内服している。半年前に要支援 2 の認定を受け、介護予防通所介護を週に 2 回利用している。早朝、A さんは玄関の外で座り込んでいるところを近所の人に発見され救急搬送された。来院時、体温 37.4℃、呼吸数 20/分、脈拍 98/分、血圧 100/70 mmHg であった。血液検査と尿検査の結果、脱水症と診断された。

97 A さんは看護師に「頭がふわふわして歩けない。めまいもする。昨日の夜から気持ちが悪くなり、朝までに 2、3 回吐いた。体に力が入らない」と話した。

A さんの脱水症について追加で情報収集すべき内容で最も適切なのはどれか。

1. 昨日の経口摂取量
2. 排尿の自立状況
3. 生活活動強度
4. 睡眠の状況

98 外来で点滴静脈内注射が開始され、入院した。夕方から A さんの表情に落ち着きがない様子や看護師の説明を聞かない様子がみられた。夜間から朝までぶつぶつと独り言を話していた。

A さんの看護で最も適切なのはどれか。

1. 夜間の病室内の照明を消す。
2. 日中に車椅子での散歩を介助する。
3. A さんに点滴を抜かないように説明する。
4. 夜間は睡眠導入薬の処方方を医師に依頼する。

99 入院後5日。Aさんの症状は改善し、明日退院する予定である。床頭台の隅に利尿薬が残っていたため看護師が質問すると、Aさんは「看護師さんから薬をもらうとすぐ飲んでいるよ」と話した。また、自分の病室を間違えることが数回あった。Aさんが在宅療養を継続するために、看護師が介護支援専門員へ伝える情報として優先度が高いのはどれか。

1. 生活リズム
2. 食事の摂取量
3. 服薬管理の状況
4. 脱水症の治療内容

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 100～102 の問いに答えよ。

A さん(90 歳、女性)は、Alzheimer<アルツハイマー>病で、重度の認知機能の低下がある。要介護 4 で、短期入所<ショートステイ>や通所介護を利用している。長年、長男夫婦が自宅で介護している。

100 現在の A さんの Alzheimer<アルツハイマー>病の状態以最も適切なのはどれか。

1. 視線を動かすことができる。
2. 車椅子を操作することができる。
3. 季節に合わせて服を選ぶことができる。
4. Mini-Mental State Examination<MMSE>20 点である。

101 A さんは、誤嚥性肺炎のために入退院を繰り返している。今回の入院で主治医は A さんの家族に胃瘻の造設を含めた今後の方針を説明した。A さんの長男は胃瘻の造設を希望せず、主に介護を行ってきた長男の妻は「私には決められない」と迷っている。

A さんの長男の妻に対する看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1. 「あなたが A さんの立場ならどうしますか」
2. 「介護支援専門員の考えを聞いてみましょう」
3. 「私の経験から胃瘻を造らないことを勧めます」
4. 「A さんはこのような状況になったとき、どうしたいと言っていましたか」

102 その後、Aさんは誤嚥性肺炎の症状が軽快し、胃瘻を造設せずに退院する予定である。家族は自宅での介護を考えていたが、長男の妻が脳出血で入院したため、Aさんの退院先の再検討を行うことになった。


Aさんの退院先として最も適切なのはどれか。

1. 軽費老人ホーム
2. 介護老人福祉施設
3. 回復期リハビリテーション病棟
4. 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 103～105 の問いに答えよ。

A ちゃん(3歳、男児)は、斜視の手術のために母親とともに歩いて入院した。入院期間は3日の予定である。3週前に外来で医師と看護師がAちゃんに手術と入院とについて説明した。入院時、Aちゃんはやや緊張した表情をしているが「眼の手術をしに来たの。病院に2つ泊まるんだよ」と看護師に話した。

103 A ちゃんの眼の状態を図に示す。



A ちゃんの斜視はどれか。

1. 右内斜視  
right convergent strabismus
2. 右外斜視  
right divergent strabismus
3. 左内斜視  
left convergent strabismus
4. 左外斜視  
left divergent strabismus

104 手術当日の朝、Aちゃんは麻酔の前投薬としてミダゾラムとアトロピンを経口で服用した。両親が早朝から面会に来てAちゃんのそばに付き添っている。Aちゃんは少し興奮気味で、両親に「おなかがすいた。のどが渴いた」と話しかけている。30分後に手術室に入室する予定である。

手術室に入室するまでのAちゃんへの対応で適切なのはどれか。

1. 水を飲ませる。
2. 前投薬の追加を医師に相談する。
3. ベッド上で絵本を読み聞かせる。
4. 両親と一緒にプレイルームで遊ばせる。

105 A ちゃんの手術は無事終了した。翌日、A ちゃんは眼のガーゼと眼帯が外され、  
抗菌薬の点眼が始まり、退院が決まった。A ちゃんは眼を触らないように両上肢に  
肘関節抑制帯をつけている。母親は「手術が無事に終わってほっとしました」と話し  
た。

母親に対する退院後の留意点の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 「家でも点眼を続けてください」
2. 「家に帰ったら洗顔してもよいです」
3. 「眼脂が続いたら受診してください」
4. 「物が二重に見えることがあります」
5. 「家に帰ったら肘関節の固定は必要ありません」

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 106～108 の問いに答えよ。

A さん(48 歳、専業主婦)は、夫と 2 人で暮らしている。月経周期が 35～60 日と不規則となり、外来を受診した。診察時、A さんは「一人娘が結婚して遠方に住み、私の体調不良について話しにくく、つらいです。夫とは以前はよく一緒に出かけましたが、今は仕事で忙しく、私は家にいることが多いです」と話した。

106 い し こうねん きしょうがい しんだん しんざつ ご しょうじょう で  
医師は更年期障害と診断した。診察後、A さんは「どうしてこのような症状が出るのかしら」と看護師に尋ねた。

A さんへの説明で適切なのはどれか。

1. 「子宮が固くなったためです」
2. 「卵管が狭くなったためです」
3. 「卵巣の機能が低下したためです」
4. 「視床下部の機能が低下したためです」

107 A さんは「汗をかきやすくイライラする以外に、どのような変化が起こりますか」と看護師に尋ねた。

A さんへの説明で最も適切なのはどれか。

1. 手足が温かくなる。
2. 寝つきが悪くなる。
3. 乏尿になる。
4. 乳房が張る。

108 Aさんは「<sup>わたし</sup>私はこれからどうしたらよいでしょうか。<sup>にちじょうせいかつ</sup>日常生活の<sup>す</sup>過<sup>かた</sup>ごし方を<sup>おし</sup>教えて<sup>ください</sup>」と<sup>かんごし</sup>看護師に<sup>たず</sup>尋ねた。

<sup>かんごし</sup>看護師の<sup>たいおう</sup>対応で<sup>もっと</sup>最も<sup>てきせつ</sup>適切なのはどれか。

1. 「<sup>がいしゅつ</sup>外出は<sup>ひか</sup>控えてください」
2. 「<sup>かじ</sup>家事は<sup>いま</sup>今まで<sup>がんば</sup>どおり頑張りましょう」
3. 「<sup>おっと</sup>夫と<sup>かいわ</sup>会話を<sup>きかい</sup>する機会を<sup>ふ</sup>増やしましょう」
4. 「<sup>むすめ</sup>娘さんに<sup>しゅう</sup>週に1回<sup>かいあそ</sup>遊びに<sup>き</sup>来てもらいましょう」

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 109～111 の問いに答えよ。

A さん(35 歳、初産婦)は、夫と 2 人で暮らしている。妊娠 28 週 2 日、妊婦健康診  
査で胎盤が内子宮口を全部覆っていると指摘された。自覚症状はない。その他の妊娠  
経過に異常は認められていない。A さんは、身長 155 cm、体重 56 kg(非妊時体重  
50 kg)である。

109 A さんの観察項目で最も注意するのはどれか。

1. 破水
2. 激しい腹痛
3. 子宮底の上昇
4. 痛みを伴わない性器出血

110 その後、A さんの妊娠経過は順調で、妊娠 37 週 0 日の午後 1 時から帝王切開術  
が予定された。

手術前日の対応で最も適切なものはどれか。

1. 浣腸を実施する。
2. 夕食を禁食とする。
3. 輸血の準備を確認する。
4. 下肢に間欠的空気圧迫装置を使用する。

111 Aさんは、妊娠37週0日に帝王切開で体重2,800gの児を出産した。術後3日、Aさんは看護師に「どうすることもできなかったのは分かっているのですが、自然なお産をしたかったです。赤ちゃんを産んだ実感がありません」と話した。

看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1. 精神科の受診を勧める。
2. 妊娠期からの振り返りをする。
3. 次の出産で経膈分娩を試みるよう勧める。
4. 数日前に帝王切開術を受けた褥婦に話をしてもらうよう勧める。

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 112～114 の問いに答えよ。

A さん(20 歳、男性、大学生)は、皆が自分を嫌っていると言ひ、昨年から大学を休学し、1 人暮らしのアパートで引きこもるようになった。先週、アパートで夜中に大声で叫ぶ日が続いたため、アパートの管理人から両親へ連絡があった。A さんの両親が A さんの部屋に入ってみると、窓は新聞紙で覆われていた。A さんは「1 日中誰かに見張られている。あなたは親じゃない」と叫び続けるため、精神科病院に入院した。A さんは、統合失調症と診断され非定型抗精神病薬による治療が開始された。

112 A さんは 5 日目ころから日中は臥床して過ごし、夜間は熟睡するようになった。食事の時間に遅れてくることが多く、看護師の声かけにほとんど反応しない。他の患者との交流もない。

この時期の看護師の対応として最も適切なものはどれか。

1. 食事摂取の介助をする。
2. 作業療法への参加を促す。
3. 日中の休息時間を維持する。
4. 食事時間を守るよう注意する。

113 入院後 1 か月。A さんは体重が 3 kg 増加した。バイタルサインに異常はない。血液検査データは空腹時血糖 200 mg/dL、HbA1c 5.2 % である。入院時の空腹時血糖は 80 mg/dL であった。A さんと両親に特記すべき既往歴はない。

A さんにみられる非定型抗精神病薬の副作用(有害事象)で最も考えられるのはどれか。

1. 水中毒  
water intoxication
2. 拘禁反応  
こうきんはんのう
3. 悪性症候群  
あくせいしやうこうぐん  
malignant syndrome
4. 耐糖能の異常  
たいとうのう いじやう

114 入院後2か月。症状も落ち着いてきたため、退院の準備をすることになった。Aさんは看護師に「病気はもう治ったのに、いつまで薬を飲まなければならないのか。薬を飲むと頭がぼんやりする。体力がなくなった気がする」と話した。

Aさんの退院の準備のために行う支援で優先度が高いのはどれか。

1. 回想法
2. 復学準備
3. 服薬心理教育
4. 筋力トレーニング

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 115～117 の問いに答えよ。

A さん(14 歳、男子、中学生)は、両親と弟(7 歳)との 4 人で暮らしている。

Duchenne<デュシェンヌ>型筋ジストロフィーで 2 年前に誤嚥性肺炎を繰り返し、経  
Duchenne muscular dystrophy aspiration pneumonia  
鼻経管栄養法と在宅酸素療法とを開始した。その後、呼吸障害が進行し、非侵襲的陽  
あつかん き こきゅうかんり もくてき にゅういん とくべつ しえんがっこう もど ともだち あ  
圧換気による呼吸管理目的で入院した。A さんは「特別支援学校に戻って友達に会  
たい。夜に使うマスクに早く慣れたい」と訴えた。A さんは自宅に戻って訪問看護を  
りよう よてい しんたいしょうがいしゃ てちゅう したい ふ じゅう きゅう こうふ  
利用する予定である。身体障害者手帳(肢体不自由 1 級)が交付されている。

115 A さんと両親への呼吸管理の説明で最も適切なのはどれか。

1. 鼻根の皮膚トラブルにはマスクを外す。
2. 機器が故障したときは訪問看護師に連絡する。
3. 機器が過剰送気を示したときは回路の点検をする。
4. 息苦しいときは非侵襲的陽圧換気の設定を変更する。

116 退院後 1 週。夜間に落雷による停電が起こった。A さんの父親から「まだ停電は  
つづ じんこう こきゅうき うご わし いま なに  
続いていますが人工呼吸器は動いています。私は今から何をすればいいでしょう  
か」と慌てた様子で訪問看護師に電話があった。

この時点の訪問看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1. 「救急車で病院に行きましょう」
2. 「主治医に連絡をとりましょう」
3. 「用手換気に切り替えましょう」
4. 「主電源を外部バッテリーに切り替えましょう」

117 退院後6か月。Aさんは特別支援学校に通学している。弟の小学校でインフルエンザが例年より早い時期から流行し始めた。弟はインフルエンザの予防接種を受けていた。Aさんの母親は「Aにインフルエンザがうつらないか心配です」と訪問看護師に話した。

母親への訪問看護師の助言として最も適切なのはどれか。

1. 「Aさんを隔離しましょう」
2. 「ショートステイを利用してみましょう」
3. 「予防接種について主治医に相談してみましょう」
4. 「弟さんは予防接種を受けているのでAさんにはうつりませんよ」

つぎ ぶん よ と こた  
次の文を読み 118～120 の問いに答えよ。

さんかんぶ ちいき じかんうりょう 80 mm いじょう こうう どせきりゅう はっせい ちいき じゅうみん  
山間部の地域で、1時間雨量 80 mm 以上の降雨で土石流が発生し、地域の住民は  
しみんたいいくかん ひなん ひなんじよ ちか いりようきかん いし かんごし はけん  
市民体育館に避難した。避難所には近くの医療機関から医師と看護師とが派遣された。

118 はっさいちよくご ひなんじよ たいおう かんごし こうどう もっと てきせつ  
防災直後の避難所で対応する看護師の行動で最も適切なものはどれか。

1. ボランティアを手配する。
2. 災害給付金の説明をする。
3. 心のケアに時間をかける。
4. 重症度に応じて診療の優先順位をつける。

119 どせきりゅう いえ うしな ひさいしゃ しみんたいいくかん かせつじゅうたく いどう かせつじゅうたく  
土石流で家を失った被災者は市民体育館から仮設住宅へ移動した。仮設住宅には

ひとりぐりぐり せたい おお かんごし かせつじゅうたく じゅんかいほうもん おこな  
1人暮らしの世帯が多い。看護師が仮設住宅の巡回訪問を行うことになった。

さいがい まんせい き ふっこう き かんごし じゅんかいほうもん おも もくてき てきせつ  
災害の慢性期(復興期)の看護師の巡回訪問の主な目的として適切でないのはどれ  
か。

1. 感染症を予防する。
2. 救援物資を届ける。
3. 室内の安全性を確認する。
4. 生活習慣病の重症化を予防する。

120 看護師の A さんは、土石流の発生直後から被災地に1か月派遣された。その後、病院に戻り3か月が経過した。A さんは勤務中に表情が乏しく考え込む様子がみられた。

A さんへの看護管理者の対応として最も適切なのはどれか。

1. 忙しい部署に異動させる。
2. 仕事に専念するよう伝える。
3. すぐに忘れるものだと励ます。
4. 体験を語るすることができる場を設ける。









