

◎ 指示があるまで開かないこと。

(令和5年2月12日 9時00分～12時30分)

注意事項

- 試験問題の数は120問で解答時間は正味3時間30分である。
- 解答方法は次のとおりである。
 - (例1)、(例2)及び(例3)の問題では1から4までの4つの選択肢、もしくは1から5までの5つの選択肢があるので、そのうち質問に適した選択肢を(例1)、(例2)では1つ、(例3)では2つ選び答案用紙に記入すること。
 なお、(例1)、(例2)の質問には2つ以上解答した場合は誤りとする。(例3)の質問には、1つ又は3つ以上解答した場合は誤りとする。

(例1)

201 近代看護の基礎を築いた人物はどれか。

1. アダムズ, J.
Addams, J.
2. キュリー, M.
Curie, M.
3. ナイチンゲール, F.
Nightingale, F.
4. アインシュタイン, A.
Einstein, A.

正解は「3」であるから答案用紙の③をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

201	①	②	③	④
			↓	
201	①	②	●	④

答案用紙②の場合、

201	201
①	①
②	②
③	→ ●
④	④

れい
(例 2)

202 保健師助産師看護師法が制定された年はどれか。

1. 明治 32 年(1899 年)
2. 大正 4 年(1915 年)
3. 昭和 23 年(1948 年)
4. 昭和 43 年(1968 年)
5. 平成 13 年(2001 年)

正解は「3」であるから答案用紙の③をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

202	①	②	③	④	⑤
			↓		
202	①	②	●	④	⑤

答案用紙②の場合、

202	202
①	①
②	②
③	→ ●
④	④
⑤	⑤

れい
(例 3)

203 看護師籍に登録されるのはどれか。2つ選べ。

1. 生年月日
2. 受験年月日
3. 卒業年月日
4. 就業年月日
5. 登録年月日

正解は「1」と「5」であるから答案用紙の①と⑤をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

203	①	②	③	④	⑤
			↓		
203	●	②	③	④	●

答案用紙②の場合、

203	203
①	●
②	②
③	→ ③
④	④
⑤	●

(2) 計算問題については、に囲まれた丸数字に入る適切な数値をそれぞれ1つ選び答案用紙に記入すること。なお、(例4)の質問には丸数字1つにつき2つ以上解答した場合は誤りとする。

(例4)

204 50床の病棟で入院患者は45人である。

この病棟の病床利用率を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

解答： ① ② %

- | | |
|---|---|
| ① | ② |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

正解は「90」であるから①は答案用紙の(9)を②は(0)をマークすればよい。

答案用紙①の場合、

204	①	0	1	2	3	4	5	6	7	8	●
	②	●	1	2	3	4	5	6	7	8	9

答案用紙②の場合、

204	①	②
	0	●
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	●	9

1 令和2年(2020年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。

1. 19.4歳
2. 24.4歳
3. 29.4歳
4. 34.4歳

2 令和元年(2019年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。

1. 頭痛
2. 肩こり
3. 体がだるい
4. 目のかすみ

3 喫煙指数(Brinkman〈ブリンクマン〉指数)を算出するために、喫煙年数のほかに必要なのはどれか。

1. 喫煙開始年齢
2. 受動喫煙年数
3. 家庭内の喫煙者数
4. 1日の平均喫煙本数

4 休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。

1. 30時間
2. 35時間
3. 40時間
4. 45時間

5 介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

6 緩和ケアの目標で正しいのはどれか。

1. 疾病の治癒
2. 余命の延長
3. QOL の向上
4. 在院日数の短縮

7 運動機能の発達で3歳以降に獲得するのはどれか。

1. 階段を昇る。
2. ひとりで立つ。
3. ボールを蹴る。
4. けんけん〈片足跳び〉をする。

8 ハヴィガースト, R. J. が提唱する成人期の発達課題はどれか。

- Havighust, R. J.
1. 経済的に自立する。
 2. 身体的衰退を自覚する。
 3. 正、不正の区別がつく。
 4. 読み、書き、計算ができる。

9 令和2年(2020年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。

1. 事業所
2. 市町村
3. 保健所
4. 訪問看護ステーション

10 体性感覚はどれか。

1. 視覚
2. 触覚
3. 聴覚
4. 平衡覚

11 健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。

1. 単球
2. 好酸球
3. 好中球
4. リンパ球

12 体温変化をとらえ、体温調節の指令を出すのはどれか。

1. 橋
2. 小脳
3. 視床下部
4. 大脳皮質

13 下血げけつがみられる疾患しっかんはどれか。

1. 肝嚢胞かんのうほう
liver cyst
2. 大腸癌だいちょうがん
colon cancer
3. 子宮体癌しきゅうたいがん
uterine corpus cancer
4. 腎細胞癌じんさいぼうがん
renal cell carcinoma

14 糖尿病とうりょうびょうの急性合併症きゅうせいがつぺいししょうはどれか。
diabetes mellitus

1. 足壊疽あしえそ
foot gangrene
2. 脳血管疾患のうけっかんしっかん
cerebrovascular disease
3. 糖尿病網膜症とうりょうびょうもうまくししょう
diabetic retinopathy
4. ケトアシドーシス昏睡こんすい

15 メタボリックシンドロームmetabolic syndromeの診断基準しんだん きじゅんにおいて男性だんせいの腹囲ふく い〈ウエスト周囲径しゅう い けい〉で正しいのはどれか。ただ

1. 80 cm 以上い じょう
2. 85 cm 以上い じょう
3. 90 cm 以上い じょう
4. 95 cm 以上い じょう

16 炎症えんしやうマーカーはどれか。

1. CA19-9
2. 抗核抗体こうかくこうたい
3. C 反応性蛋白質ほんのうせいたんぱくしつ〈CRP〉
4. リウマトイド因子いん し〈RF〉

17 やくぶつどうたい かんぞう かんよ
薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。

1. 吸 収
2. 分 布
3. 代 謝
4. 蓄 積

18 い しょくどう ぎゃくりゅう ふせ せいじん しょくご ぶん じ かんていど
胃から食道への逆流を防ぐために、成人が食後30分から1時間程度とるとよい
体位はどれか。

1. 座 位
2. 仰臥位
3. 右側臥位
4. 半側臥位

19 ぜんしんせいしきじ ひ ふ ふ おんど てきせつ
全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度で適切なものはどれか。

1. 20～22℃
2. 30～32℃
3. 40～42℃
4. 50～52℃

20 こじんぼう ごぐ だつ い てじゅん さいしょ はず
個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

1. 手 袋
2. ガウン
3. サージカルマスク
4. フェイスシールド

21 オートクレーブによる滅菌法はどれか。

1. 酸化エチレンガス滅菌
2. 高压蒸気滅菌
3. 放射線滅菌
4. 乾熱滅菌

22 薬物の吸収速度が最も速いのはどれか。

1. 経口投与
2. 筋肉内注射
3. 静脈内注射
4. 直腸内投与

23 室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。

1. 動脈血酸素分圧〈PaO₂〉 60 Torr 以上
2. 動脈血酸素分圧〈PaO₂〉 60 Torr 未満
3. 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO₂〉 60 Torr 以上
4. 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO₂〉 60 Torr 未満

24 CO₂ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。

1. 咳 嗽
2. 徐 脈
3. 浮 腫
4. 意識障害

25 母乳栄養の児に不足しやすいのはどれか。

1. ビタミン A
2. ビタミン B
3. ビタミン C
4. ビタミン E
5. ビタミン K

26 骨格筋の細胞膜には()に対する受容体がある。自己抗体がこの受容体の働きを阻害すると骨格筋は収縮できなくなる。

()に入る神経伝達物質として正しいのはどれか。

1. アセチルコリン
2. アドレナリン
3. ドパミン
4. ノルアドレナリン

27 健常な女子(15歳)が野外のコンサートで興奮し、頻呼吸を起こして倒れた。

このときの女子の体内の状態です。正しいのはどれか。

1. アルカローシスである。
2. ヘマトクリットは基準値よりも高い。
3. 動脈血酸素飽和度(SaO₂)は100%を超えている。
4. 動脈血二酸化炭素分圧(PaCO₂)は基準値よりも高い。

28 やくぶつ ぶんかい はいせつ はや しひょう
薬物の分解、排泄の速さの指標となるのはどれか。

1. 最高血中濃度
さいこうけつちゅうのう ど
2. 生物学的半減期
せいぶつがくてきはんげん き
3. 濃度曲線下面積
のう ど きょくせん か めんせき
4. 最高血中濃度到達時間
さいこうけつちゅうのう ど とうたつ じ かん

29 たはつせいこつざいしゅ しゅよう か
multiple myeloma
多発性骨髄腫で腫瘍化しているのはどれか。

1. B細胞
さいぼう
2. T細胞
さいぼう
3. 形質細胞
けいしつさいぼう
4. 造血幹細胞
ぞうけつかんさいぼう

30 まく か しゅけつ せいじん もっと おお
subarachnoid hemorrhage
くも膜下出血の成因で最も多いのはどれか。

1. 外傷
がい しゅう
2. 脳腫瘍
のうしゅよう
brain tumor
のうどうみやくりゅう
3. 脳動脈瘤
cerebral aneurysm
のうどうじょうみやく き けい
4. 脳動静脈奇形
cerebral arteriovenous malformation

31 しゃかい ほけんせい ど こんきょほうれい くみあわ ただ
社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

1. 医療保険 ————— 健康保険法
いりょう ほけん けんこう ほけんほう
2. 介護保険 ————— 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>
かい ご ほけん こうれいしゃぎゃくたい ぼうし こうれいしゃ ようごしゃ たい し えんとう かん
ほうりつ こうれいしゃぎゃくたいぼうし ほう
3. 雇用保険 ————— 社会福祉法
こよう ほけん しゃかいふくし ほう
4. 年金保険 ————— 生活困窮者自立支援法
ねんきん ほけん せいかつこんきゅうしゃ じりつ し えんほう

32 老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。

1. 介護医療院
2. 介護老人保健施設
3. 老人福祉センター
4. 老人デイサービスセンター

33 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症について正しいのはどれか。

1. 令和2年(2020年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。
2. 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。
3. 早期に発見して治療を開始すれば完治する。
4. 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。

34 医療計画について正しいのはどれか。

1. 基準病床数を定める。
2. 5年ごとに見直しを行う。
3. 特定機能病院の基準を定める。
4. 一次、二次および三次医療圏を設定する。

35 ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。

この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。

1. 70%エタノール
2. ポビドンヨード
3. 塩化ベンザルコニウム
4. 次亜塩素酸ナトリウム

36 りん し き しんたいてきへん か
臨死期の身体的変化はどれか。

1. にょうりょう ぞう か
尿量が増加する。
2. ぜんしん きんにく こうちよく
全身の筋肉が硬直する。
3. ふ きそく こきゅう しつげん
不規則な呼吸が出現する。
4. けいどうみやく ふ あと どうこつどうみやく ふ
頸動脈が触れなくなった後、橈骨動脈が触れなくなる。

37 せいじんじょせい たい じょう はいせつえんじょ もくてき くみあわ てきせつ
成人女性に対するベッド上での排泄援助とその目的の組合せで適切なのはどれか。

1. まど あ 窓を開ける。 ————— かんれい しげき はいにょうそくしん 寒冷刺激による排尿促進
2. じょうはんしん きょじょう 上半身を挙上する。 ————— ふくあつ はいせつそくしん 腹圧のかけやすさによる排泄促進
3. がいん ぶ あ 外陰部にトイレットペーパーを当てる。 ————— にょうしゅう ぼう し 尿臭の防止
4. べん き そこ し 便器の底にトイレットペーパーを敷く。 ————— しんぐ おせんぼう し 寝具の汚染防止

38 せいじん すいみん とくちょう
成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。

1. たいおん じょうじょう
体温が上昇する。
2. きゅうそく がんきゅううんどう
急速な眼球運動がある。
3. かれい ともな じかん なが
加齢に伴い時間が長くなる。
4. すいみんしゅう き ぜんはん
睡眠周期の前半にみられる。

39 せんし せんし ぶ い くみあわ てきせつ
穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

1. きょうくうせん し きょうこつへい
胸腔穿刺 ————— 胸骨柄
2. こつずいせん し だい ようついかん
骨髄穿刺 ————— 第3・4腰椎間
3. ふくくうせん し ふくちよくきんがいそく そくふく ぶ
腹腔穿刺 ————— 腹直筋外側の側腹部
4. ようついせん し じょうぜんちょうこつきよく
腰椎穿刺 ————— 上前腸骨棘

- 40 毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
1. 薬剤師法
 2. 毒物及び劇物取締法
 3. 麻薬及び向精神薬取締法
 4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉

- 41 輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。
1. 血小板成分製剤 ————— 2～6℃
 2. 赤血球成分製剤 ————— 2～6℃
 3. 血漿成分製剤 ————— 20～24℃
 4. 全血製剤 ————— 20～24℃

- 42 真空採血管とホルダーを用いて静脈血採血を実施するときに、駆血を解除するタイミングで適切なものはどれか。
1. 採血針を皮膚に穿刺した直後
 2. 真空採血管内への血液の流入が始まったとき
 3. 真空採血管内への血液の流入が終わったとき
 4. ホルダーから真空採血管を抜去した後

- 43 MRI 検査室に持ち込んでよいのはどれか。
1. 耳栓
 2. 携帯電話
 3. 使い捨てカイロ
 4. キャッシュカード

44 ムーア, F. D. が提唱した外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。

1. 傷害期では尿量が増加する。
2. 転換期では循環血液量が増加する。
3. 筋力回復期では蛋白の分解が進む。
4. 脂肪蓄積期では活動性が低下する。


45 関節拘縮の予防を目的とした関節可動域<ROM>訓練で正しいのはどれか。

1. 関節を速く動かす。
2. 運動麻痺がある場合は患側から行う。
3. 他動運動は痛みが生じないように行う。
4. 徒手筋力テストの結果が1以下の場合は自動運動を促す。

46 放射線治療で人体の吸収線量を表す単位はどれか。

1. Bq
2. eV
3. Gy
4. Sv

47 Aさん(62歳、男性)は呼吸困難と咳嗽が増強したため外来を受診した。胸部エックス線写真と胸部CTによって特発性肺線維症による間質性肺炎と診断され、呼吸機能検査を受けた。換気障害の分類を図に示す。



Aさんの換気障害の分類で当てはまるのはどれか。

1. A
2. B
3. C
4. D

48 右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。

1. 散瞳
2. 構音障害
3. 閉眼困難
4. 上肢の疼痛

49 いせつじょじゆつご 胃切除術後のしょうこうぐん ダンピング症候群をよぼう 予防するためのしょくじ しどう 食事指導でできせつ 適切なのはどれか。
dumping syndrome

1. ふん い ない た 15分以内に食べる。
2. とうしつ おお しょくじ と 糖質の多い食事を摂る。
3. かい せつしゆりよう すく 1回の摂取量を少なくする。
4. にち しょくじ かいすう すく 1日の食事回数を少なくする。

50 じゅうど かんこうへん きじゆんち 重度の肝硬変でひく あたい しめ 基準値よりも低い値を示すけつえきけん さ こうもく 血液検査項目はどれか。
cirrhosis

1. けつせい 血清アルブミン〈Alb〉
2. けつせい 血清ビリルビン〈Bil〉
3. けつちゆう 血中アンモニア〈NH₃〉
4. じかん プロトロンビン時間〈PT〉

51 せいじん ゆび ただ 成人のばね指で正しいのはどれか。
snapping finger

1. だんせい おお 男性に多い。
2. げんいん けん えんしゆう 原因は腱の炎症である。
3. こうはつ ぶ い じし 好発部位は示指である。
4. せつきよくてき おこな 積極的にストレッチを行う。

52 こうはん しきゅうぜんてきしゆつじゆつ う かんじゃ たいいん ご せいかつ かん せつめい ただ 広汎子宮全摘出術を受けた患者への退院後の生活に関する説明で正しいのはどれか。

1. じゆつ ご しゆう せいこう か のう 「術後2週から性交は可能です」
2. てい き てき はいよう ころ 「定期的に排尿を試みてください」
3. ちようり てぶくろ 「調理のときは手袋をしてください」
4. たいいんとうじつ よくそう ゆ つ 「退院当日から浴槽の湯に浸かることができます」

53 老化に伴う血液・造血器系の変化で適切なのはどれか。

1. エリスロポエチンが増加する。
2. 黄色骨髄が減少する。
3. 顆粒球数が増加する。
4. 赤血球数が減少する。

54 高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。

1. 身体拘束の実施は担当看護師が決定する。
2. ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。
3. 本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。
4. 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。

55 65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。

1. 介護予防教室
2. 介護老人保健施設
3. 夜間対応型訪問介護
4. 通所介護〈デイサービス〉


56 入院中の高齢者への看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 入院当日から複数の看護師が関わる。
2. 1回の訪室で多くの情報を聴取する。
3. 1日のスケジュールは口頭で説明する。
4. 退院後の生活を予測して情報収集する。


57 1歳6か月の身体発育曲線(体重)を示す。

異常が疑われるのはどれか。


1.




2.



3.



4.



58 ようじき しんりしゃかいてきとくちよう
幼児期の心理社会的特徴はどれか。

1. 自己中心性
2. 心理的離乳
3. ギャングエイジ
4. ボディイメージの変容

59 せいじよう ようじき きほんてきせいかつしゅうかん さい げつ しゅうとく
正常な幼児期の基本的生活習慣で、2歳0か月ころまでに習得するのはどれか。

1. 鼻をかむ。
2. スプーンを使う。
3. 夜間のおむつがとれる。
4. 洋服のボタンをとめる。

60 ぼし ほけんほう きてい
母子保健法に規定されているのはどれか。

1. 母子健康包括支援センター
2. 乳児家庭全戸訪問事業
3. 助産施設
4. 特定妊婦

61 はいらん せいじよう げっけいしゅうき ただ
排卵のある正常な月経周期で正しいのはどれか。

1. 黄体は形成後1週間で萎縮する。
2. エストロゲンの作用で子宮内膜が分泌期になる。
3. 発育した卵胞の顆粒膜細胞からプロゲステロンが分泌される。
4. エストロゲンのポジティブフィードバックによって黄体形成ホルモンの分泌が増加する。

62 ふにんしょう 不妊症 ただ について正しいのはどれか。
infertility

1. 約 6 割は原因不明である。
2. けんさ 検査に き 基礎体温測定 そたいおんそくてい がある。
3. ちりょう 治療の 1 つに ひと 不妊手術 ふにんしゅじゅつ がある。
4. じょせい 女性の年齢 ねんれい は ちりょうこう 治療効果 か に えいきょう 影響 えいきょう しない。

63 せいじょう 正常な分娩経過 ぶんべんけい はどれか。

1. こつばんにゅうこう 骨盤入口部 ぶ に じとう 児頭 しんにゅう が さい 進入 じ する際、じ 児の おんがいぶ 頤部 きょうへき が ちか 胸壁 ちか に近づく。
2. こつばんしゅっこう 骨盤出口部 ぶ に たつ 達した じてん 時点で、じとう 児頭の しじょうほうこう 矢状縫合 ぼたい は こつばん 母体の おんがい 骨盤 いっち の いっち 横径 いっち に一致 いっち する。
る。
3. じとうべんしゅつ 児頭娩出後、たい 胎児 かた は ちようじく 肩の こつばんしゅっこう 長軸 ぶ が おんがい 骨盤出口部 いっち の いっち 横径 いっち に一致 いっち するよう かいせん 回旋 かいせん する。
4. じとう 児頭 はつろ が たいばん 発露 はくり した たいばん ところに はくり 胎盤 はくり が はくり 剝離 はくり する。

64 しんせい 新生児 こきゅうきゅうはくしゅうこうぐん の呼吸窮迫症候群 respiratory distress syndrome (RDS) ただ で正しいのはどれか。

1. こきゅうすう 呼吸数 げんしょう が げんしょう 減少 げんしょう する。
2. かきさん 過期産児 はっしょう に はっしょう 発症 はっしょう しやすい。
3. せい 生後 じかん 24 時間 はっしょう ころから はっしょう 発症 はっしょう する。
4. はい 肺 けつぼう サーファクタント げんいん の しょう 欠乏 しょう が しょう 原因 しょう で しょう 生 しょう じる。

65 しょうに 小児期 せいねん から はっしょう 青年期 うんどうせい に おんせい 発症 およ し、おげん 運動性 らんよう チック ともな 及び ともな 汚言 ともな の ともな 乱用 ともな を伴 ともな うの ともな は ともな どれか。

1. Down しょうこうぐん (ダウン) 症候群 Down's syndrome
2. Tourette しょうがい (トゥレット) 障害 Tourette's disorder
3. ちゅうい 注意 けつじよ 欠如 た ・ どうせい 多動性 しょうがい 障害 attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
4. Lennox-Gastaut しょうこうぐん (レノックス・ガストー) 症候群 Lennox-Gastaut syndrome

66 患者の権利や力を尊重し、自己制御している感覚を持たせ、患者が社会生活に必要な技能や能力を獲得する支援を意味するのはどれか。

1. リカバリ
2. ストレングス
3. レジリエンス
4. エンパワメント

67 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。

1. 障害基礎年金
2. 一定割合の雇用義務
3. 精神障害者保健福祉手帳
4. 自立支援医療(精神通院医療)

68 Aさん(85歳、男性)は1人暮らしで判断能力が不十分である。4親等以内の親族はいない。

訪問看護事業所におけるAさんの情報管理で適切なのはどれか。

1. 成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。
2. 地域の民生委員にAさんの経済状況を知らせる。
3. Aさんの訪問記録を電子メールに添付して援助者間で共有する。
4. 新たなサービスの利用を検討する他の利用者にAさんのケアプランを見せる。

69 Aさん(80歳、女性)は1人暮らしで、在宅酸素療法(HOT)を受けている。訪問看護師はAさんに停電時を想定した避難行動の指導を行うことにした。

Aさんの停電時の避難行動で優先度が高いのはどれか。

1. 電気のブレーカーを落とす。
2. 玄関の扉を開けて出口を確保する。
3. 訪問看護ステーションに連絡をする。
4. 酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替える。

70 介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。

1. 福祉用具貸与
2. 小規模多機能型居宅介護
3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
4. 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

71 Aさん(70歳、男性、要介護1)は脳梗塞の後遺症で左不全麻痺がある。家屋内は杖を使用して移動が可能である。Aさんから「入浴が不安なので安全な方法を教えてほしい」と訪問看護師に相談があった。

Aさんへの助言で適切なものはどれか。

1. 手すりは左手で持つ。
2. 左足から浴槽に入る。
3. 浴室内を杖で移動する。
4. 浴槽から出るときは入浴台〈バスボード〉を使う。

72 看護マネジメントのプロセスの「統制」はどれか。

1. 看護職員の仕事への動機付けを行う。
2. 病棟の目標をもとに看護活動の年間計画を立案する。
3. 褥瘡ケアの改善に取り組むための担当チームを構成する。
4. 病棟の1年間の業務評価に基づき看護活動の計画を修正する。

73 職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。

1. 1年以内ごとに1回、定期的に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
2. 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。
3. 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。
4. 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。

74 国際協力として5歳未満児死亡率の高い地域に1年間派遣されることになった看護師が、派遣される地域の住民に対して行う活動でプライマリヘルスケアの原則に基づいた活動はどれか。

1. 高度な治療を目的とした活動
2. 医学的研究の遂行を優先した活動
3. 派遣先で入手できる資源を利用した活動
4. 派遣される専門家チームを中心とする活動

75 おと かん ち き
音を感知するラセン器<Corti<コルチ>器>があるのはどれか。

1. か ぎゅう かん
蝸牛管
2. はん き かん
半規管
3. こ しつ
鼓室
4. こ まく
鼓膜
5. ぜん てい
前庭

76 せいじょう しきゅうたい ろ か き ぶっしつ
正常な糸球体で濾過される物質はどれか。

1. フィブリノゲン
2. ミオグロビン
3. アルブミン
4. けっしょうばん
血小板
5. せつけっきゅう
赤血球

77 つめ かわ と こ きゅうげき たいおん てい か げんいん ただ
冷たい川に飛び込んだときに急激に体温が低下する原因で正しいのはどれか。

1. たいりゅう たいねつ ほうさん
対流による体熱の放散
2. ほうしゃ たいねつ ほうさん
放射による体熱の放散
3. ねつでんどう たいねつ ほうさん
熱伝導による体熱の放散
4. たいしゃ ねつ さんせい てい か
代謝による熱エネルギー産生の低下
5. こつかくきん ねつ さんせい てい か
骨格筋における熱エネルギー産生の低下

78 インスリンを過剰に投与したときに現れる症候で正しいのはどれか。

1. 発熱
2. 浮腫
3. 口渴感
4. 顔面紅潮
5. 手足のふるえ

79 僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。

1. 弁口面積が拡大する。
2. 左心房内圧が上昇する。
3. 狭心痛を合併することが多い。
4. 弁尖の先天的な3尖化が原因となる。
5. 胸骨右縁第2肋間で心雑音を聴取する。

80 検査の画像(別冊No. 1)を別に示す。

狭心症の手術に最も重要な検査はどれか。

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

別冊

No. 1

81 へんけいせいしつかんせつしやう 変形性膝関節症 ただ について正しいのはどれか。
osteoarthritis of the knee

1. だんせい おお 男性に多い。
2. だいちせんたく しゆじゆつりやうほう 第一選択は手術療法である。
3. へんけいせいしつかんせつしやう なか ばん め おお 変形性関節症の中で2番目に多い。
4. osteoarthritis に じせい いち じせい おお 二次性のものが一次性のものより多い。
5. けい じ てき しんこう ねん はんすう あつ か 経時的に進行して10年で半数が悪化する。

82 がっこう ほけんあんぜんほう しゆっせきていし 学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、がっこうかんせんしやう 第二種に分類されているの
だい に しゆ ぶんるい はどれか。

1. インフルエンザ
influenza
2. さいきんせいせきり 細菌性赤痢
shigellosis
3. ジフテリア
diphtheria
4. ちやう 腸チフス
typhoid fever
5. りやうこうせいかくけつまくえん 流行性角結膜炎
epidemic keratoconjunctivitis

83 せいじん 成人におけるバイタルサインで緊急に対応が必要なものはどれか。
きんきやう たいやう ひつやう

1. みやくはく ふん 脈拍 70/分
2. たいおん 体温 34.4℃
3. こきやうすう ふん 呼吸数 14/分
4. けつあつ 血圧 130/80 mmHg
5. てん グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉15点

84 老化による尿の生成と排尿機能の変化はどれか。

1. 排尿回数の減少
2. 膀胱容量の増加
3. 夜間尿量の減少
4. 残尿量の増加
5. 尿比重の上昇

85 定期予防接種について正しいのはどれか。

1. BCG 接種前にツベルクリン反応を実施する。
2. ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。
3. ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。
4. 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。
5. ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。

86 緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 眼球が突出する。
2. 視神経が萎縮する。
3. 硝子体が混濁する。
4. 眼底に出血がみられる。
5. 眼圧の上昇が原因となる。

87 高齢者に脱水が起りやすくなる要因はどれか。2つ選べ。

1. 骨量の減少
2. 筋肉量の減少
3. 細胞内液量の減少
4. 渴中枢の感受性の亢進
5. 抗利尿ホルモンの反応性の亢進

88 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 応急入院は72時間以内に限られている。
2. 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
3. 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
4. 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
5. 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。

89 クリニカルパスについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 在宅療養には適用できない。
2. 医療者と患者が治療計画を共有できる。
3. バリエーション発生の判断は退院日に行う。
4. 多職種間のコミュニケーションが不要になる。
5. 一定の質を保った治療と看護ケアの提供につながる。

90 看護のアウトカムを評価するために収集する情報はどれか。2つ選べ。

1. 褥瘡発生率
2. 患者の満足度
3. 研修会の開催回数
4. 新人看護師の離職率
5. 退院指導の実施回数

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 91～93 の問いに答えよ。

A さん(47 歳、男性、会社員)は妻と 2 人暮らしで、自宅の室内で犬を飼っている。
15 年前に慢性糸球体腎炎と診断され、徐々に腎機能低下が認められたので、2 年前
から慢性腎不全のため血液透析療法を週 3 回受けている。今回、弟から腎臓の提供の
申し出があり、生体腎移植の目的で入院した。入院 3 日、A さんの生体腎移植手術
は予定通り終了した。

91 A さんの手術直後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

1. 尿量
2. 血糖値
3. 白血球数
4. シヤント音

92 A さんは術前からタクロリムスなど複数の免疫抑制薬を服用している。A さんは「移植したら免疫抑制薬を飲む必要があることは分かっているのですが、退院後は何に気を付ければよいですか」と看護師に質問した。

A さんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

1. 「犬は今まで通り室内で飼育できます」
2. 「グレープフルーツは摂取しないでください」
3. 「感染予防のため風疹のワクチン接種をしてください」
4. 「薬を飲み忘れたときは 2 回分をまとめて服用してください」

93 Aさんは順調に回復し、移植後の拒絶反応もなく退院することになった。Aさんは「腎臓が悪くなってから気を付けないといけないことが多かったのですが、移植してこれまでの制約がなくなりますね」と話した。

Aさんの退院後の生活で継続が必要なのはどれか。

1. 蛋白質の摂取制限
2. 週3回の通院
3. 水分の制限
4. 体重の管理

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 94～96 の問いに答えよ。

A さん(28 歳、女性、美容師)はゴルフが趣味である。同居しているパートナーと 1 週前にゴルフに行った後から、顔面の紅斑、微熱、全身倦怠感および手指の関節痛が現れた。病院を受診したところ、全身性エリテマトーデス<SLE>と診断され入院した。A さんは看護師に「これまで病気をしたことがなかったので、驚いています」と話した。

バイタルサイン：体温 37.4℃、呼吸数 18/分、脈拍 64/分、整、血圧 110/60 mmHg。
血液所見：赤血球 260 万/ μ L、Hb 9.0 g/dL、白血球 7,600/ μ L、血小板 18 万/ μ L、尿素窒素 16 mg/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL、CRP 0.7 mg/dL、直接 Coombs<クームス>試験陽性。

尿所見：尿蛋白(－)、尿潜血(－)。

神経学的検査：異常所見なし。

12 誘導心電図：異常所見なし。

胸部エックス線写真：異常所見なし。

94 A さんに生じている可能性が高いのはどれか。

1. 心膜炎
pericarditis
2. 溶血性貧血
hemolytic anemia
3. ループス腎炎
lupus nephritis
4. 中枢神経ループス
central nervous system lupus

95 Aさんはステロイドパルス療法りょうほう あと ふくじん ひしつの後、副腎皮質ステロイド薬やく ないふくちりょう かいしの内服治療が開始された。入院3週にゅういん しゅうころから満月様顔貌まんげつようがんぼうがみられたため、外見がいけんの変化へんかに気持ちきもちが落ち込こむようになった。

Aさんへの対応たいおう てきせつで適切なてきせつのはどれか。

1. 気きにする必要ひつようはないと励はげます。
2. パートナーの面会めんかいを制限せいげんする。
3. 外見がいけんよりも病気びょうきの治療ちりょうを優先ゆうせんすると説明せつめいする。
4. 薬くすりの量りょうが減へれば満月様顔貌まんげつようがんぼうは軽減けいげんすると説明せつめいする。

96 Aさんは外来がいらいで副腎皮質ステロイド薬ふくじん ひしつ やく ないふくちりょうの内服治療けいぞくを継続することになった。Aさんは「病気びょうきを悪化あつかさせないために退院後たいいんごはどのような生活せいかつがよいでしょうか」と看護師かんに質問ごしした。

Aさんへの退院指導たいいんしどう てきせつで適切なてきせつのはどれか。

1. 「すぐふくしょくに復職ふくしょくできます」
2. 「避妊ひにんは必要ひつようありません」
3. 「身体からだを冷やさないでください」
4. 「くもりなら屋外おくがいでゴルフができます」

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 97～99 の問いに答えよ。

A さん(81 歳、女性)は夫(86 歳)と 2 人で暮らしている。高血圧症で内服治療をし
ているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、
老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作
(ADL)はほぼ自立している。1 年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下
して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するとき小さな段差
につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。A さんは自
宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10 日間程度の入
院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。

97 入院当日、病棟の看護師が A さんに対してパンフレットを用いて手術前オリエン
テーションを行うことになった。

A さんへのオリエンテーションの方法で適切なものはどれか。

1. 耳元で大きな声で説明する。
2. A さんの身体に触れてから話しかける。
3. 窓際の明るい場所でパンフレットを見せる。
4. 手術後の注意点はパンフレットに赤色の太い文字で書く。

98 A さんの手術は局所麻酔下で行われ、10 分程度で終了した。手術中および手術
直後のバイタルサインに問題はなく、病室に戻ってきた。A さんは眼痛や頭痛、
気分不快などの症状はなく、「無事に終わって良かった」と話している。

手術後の A さんへの説明で適切なものはどれか。

1. 手術直後から点眼する。
2. 洗顔は手術の翌日から行う。
3. 手術後 24 時間はベッド上で安静にする。
4. 医師の許可があるまでは頭を振る動作をしない。

99 手術後2日、Aさんは日中はベッドに横になって過ごしている時間が多い。夜間にAさんから看護師に「手術後はゆっくり眠れていません。どうしたらよいでしょうか」という訴えがあった。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 寝る前に温かい緑茶を飲むことを勧める。
2. 日中はベッドから離れて過ごすことを促す。
3. 眠れなくてもベッドに横になっていることを勧める。
4. 夜はよく眠っているので様子をみましょうと伝える。

つぎ ぶん よ
次の文を読み 100～102 の問いに答えよ。

A さん (75 歳、男 性) は 妻 (75 歳) と 2 人 暮 ら し で、15 年 前 に Parkinson (パーキンソン) 病 と 診 断 さ れ た。7 年 前 より レボドパ (L-dopa) を 1 日 3 回 内 服 し て い る。Hoehn & Yahr (ホーエン・ヤール) 重 症 度 分 類 の ス テ ー ジ IV で、要 介 護 2 で あ る。妻 は 腰 痛 の た め 毎 日 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 目 的 で 通 院 中 で あ る。妻 の 介 護 負 担 を 軽 減 す る た め、A さん は 毎 月 10 日 間、介 護 老 人 保 健 施 設 の 短 期 入 所 (シ ョ ー ト ス テ イ) を 利 用 し て い る。今 回 は 妻 の 腰 痛 が 増 強 し た た め、A さん は 予 定 を 早 め て 入 所 し た。A さん は 握 力 が 低 下 し て い る が、スプーン を 使 用 し 自 力 で 食 事 を 摂 取 し て い る。食 事 中 に 姿 勢 が 崩 れ る こ と が 多 く、む せ や 食 べ こ ぼ し が あ る。

100 看 護 師 の A さん へ の 食 事 援 助 で 正 し い の は ど れ か。

1. 頸 部 を 後 屈 し た 体 位 に す る。
2. 座 位 時 の 体 幹 を 安 定 さ せ る。
3. 食 後 に 嚥 下 体 操 を 実 施 す る。
4. こ ぼ さ ず に 摂 取 で き る よ う 全 介 助 す る。

101 A さん は 社 交 的 で 短 期 入 所 中 は い つ も 介 護 老 人 保 健 施 設 の 利 用 者 や 職 員 と 笑 顔 で 会 話 し て い た が、今 回 は、会 話 中 に 急 に 表 情 が な く な り 声 が 聞 き と れ な い ほ ど 小 さ く な っ た り、手 足 の 震 え が 出 現 す る こ と が あ っ た。食 後 に 薬 を 内 服 す る と 症 状 は 改 善 す る が、内 服 し て 2 時 間 後 に は 同 じ よ う な 症 状 が 現 れ る こ と が あ っ た。

A さん の 症 状 は ど れ か。

1. オン オ フ 現 象
2. ジ ス キ ネ ジ ア
3. ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 反 応
4. ウ ェ ア リ ン グ オ フ 現 象

102 つま ようつう かいぜん じたく もど つま ふ
妻の腰痛が改善したため、Aさんは自宅に戻るようになった。Aさんは「妻に負
たん じぶん うご じたく うんどう ちゅうい
担をかけないように自分で動けるようになりたい。自宅でできる運動や注意するこ
とを教えてください」と看護師に話した。

Aさんへの指導で適切なのはどれか。

1. 「毎日30分間の階段昇降を行いましょう」
2. 「歩行時に腕を大きく振りましょう」
3. 「小刻みに歩くようにしましょう」
4. 「毎日1km歩きましょう」

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 103～105 の問いに答えよ。

A ちゃん(2歳、男児)は両親、兄(5歳)の4人家族である。3日前から発熱が続くため、母親と一緒に外来を受診した。診察の結果、川崎病と診断され、個室に入院となり左手背に点滴静脈内留置針が挿入された。入院中は母親が希望し、A ちゃんに付き添っている。A ちゃんにγグロブリン療法とアスピリンの内服が開始されることになった。看護師がγグロブリン療法の開始のために訪室すると、A ちゃんは不機嫌にぐずって泣いている。

103 γグロブリン療法開始に伴う看護師の対応で適切なものはどれか。2つ選べ。

1. γグロブリン製剤の投与中も A ちゃんと売店に行けると母親に伝える。
2. 留置針の自己抜去防止のために右肘関節に抑制帯を使用する。
3. 心負荷の軽減のために A ちゃんの経口水分摂取を制限する。
4. 心電図モニターの装着を確認する。
5. 留置針の刺入部を観察する。

104 A ちゃんの入院中、母親は一度も自宅に帰らずに付き添いを続けている。入院3日の朝に看護師が訪室したところ、母親が「夫から電話があって、A の入院後、兄がほとんど寝ずに大泣きしているらしく、私は心配です」と話している。

母親への看護師の対応で適切なものはどれか。

1. 病室内で A ちゃんと兄を面会させてよいと伝える。
2. A ちゃんのこと集中すべきであると伝える。
3. 兄と関わる時間を持てるよう母親に帰宅を促す。
4. 退院の可否を医師と相談すると伝える。

105 入院4日、Aちゃんは解熱し活気が出てきた。翌日、看護師がAちゃんを観察すると、手指の先端から皮膚が膜のように薄くむけていた。

この所見に対する看護師のアセスメントで適切なものはどれか。

1. γ-グロブリン療法の副作用(有害事象)である。
2. 皮膚のツルゴールが低下している。
3. 川崎病の回復期の症状である。
4. 皮膚科の受診が必要である。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 106～108 の問いに答えよ。

A さん(33 歳、初産婦、会社員)は夫と 2 人で暮らしている。妊娠 28 週 5 日、夕方から下腹部に生理痛のような痛みを感じ、少量の性器出血があったため来院した。来院時、子宮口 2 cm 開大、未破水、8 分おきに 20 秒持続する子宮収縮があり、切迫早産と診断された。子宮収縮抑制薬(リトドリン塩酸塩)の点滴静脈内注射と安静による治療が開始された。

106 てんてき かいし ぶん こ かん ご し ほうしつ
点滴を開始して 30 分後に看護師が訪室すると、A さんは Fowler〈ファウラー〉位で休んでいた。

このときの A さんの状態で看護師が注意して観察すべき項目はどれか。

1. 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO₂〉
2. 血 圧
3. 呼吸数
4. 脈 拍

107 せつぱくそうざん しょうじょう
切迫早産の症状がなくなり、A さんは妊娠 35 週 0 日で退院した。妊娠 36 週 0 日に妊婦健康診査のために来院した。ノンストレステスト〈NST〉を実施中に、「気分が悪い」とナースコールがあり看護師が訪れると、A さんは仰臥位になっていた。

A さんへの対応で看護師が最初に行うのはどれか。

1. 医師に報告する。
2. 血圧測定を行う。
3. 左側臥位にする。
4. 酸素吸入を行う。

108 Aさんは妊娠36週5日、8時に分娩が開始した。16時30分に子宮口全開大、16時35分に自然破水、18時30分に男児を出産した。分娩時出血量は350 mL、児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。

Aさんの分娩のアセスメントで適切なものはどれか。

1. 早期産である。
2. 異常出血である。
3. 前期破水である。
4. 新生児仮死である。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 109～111 の問いに答えよ。

A さん(34 歳、初産婦)は妊娠 39 週 6 日に 3,000 g の女児を出産した。分娩後の母
児の経過は順調である。

しゅっせい こ じ かん かん こ し じ かんざつ おこな じ かつき
出生後 12 時間、看護師が A さんの児の観察を行った。児は活気がありバイタルサ
インは安定しており、排便が認められた。直接授乳を開始している。出生後の排尿回
すう かい はいべんかいすう かい
数は 4 回、排便回数は 3 回である。

109 べん しゃしん べっさつ べつ しめ
便の写真(別冊No. 2)を別に示す。

このときの A さんの児の便はどれか。

1. A
2. B
3. C
4. D



110 にちれい じ たいがいせいかつ てきおう じゅんちよう けい か ほ にゅうかいすう
日齢 2。A さんの児の胎外生活への適応は順調に経過している。哺乳回数は 1
にち かい ぼ にゅういく じ き ぼう じ にゅうとう す いた はな
日 8 回。A さんは母乳育児を希望しているが、児に乳頭を吸われると痛いと話
ており、左右の乳頭に軽度の発赤が認められる。

このとき看護師が観察する項目で優先度が高いのはどれか。

1. 児の体重減少率
2. 乳汁の分泌状態
3. 乳房の緊満状態
4. ラッチオンの状態

111 日齢4。看護師がAさんの児を観察したところ、バイタルサインは、体温(直腸温) 37.3℃、呼吸数 55/分、心拍数 134/分。経皮ビリルビン 20.0 mg/dLであった。

Aさんの児の状態^{じ じょうたい}で医師に報告^{い し ほうこく}が必要^{ひつよう}なのはどれか。

1. 経皮ビリルビン値^{けい ひ ち}
2. 呼吸数^{こきゅうすう}
3. 心拍数^{しんぱくすう}
4. 体温^{たい おん}

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 112～114 の問いに答えよ。

A さん(20 歳、女性)は境界性人格<パーソナリティ>障害の診断を受け、精神科外
borderline personality disorder
来に通院中である。ある日、人間関係のトラブルから処方されていた睡眠薬を過量服
ひ にんげんかんけい しょほう すいみんやく かりょうふく
薬して自殺企図をしたところを家族に発見され、救命救急センターに搬送された。
やく じさつき と かぞく はっけん きゅうめいきゅうきゅう はんそう

112 A さんは救急外来で治療を受け会話が出来るまでに回復した。
きゅうきゅうがいらい ちりょう う かいわ かいふく

A さんへの看護師の最初の対応で適切なのはどれか。
かん ごし さいしょ たいおう てきせつ

1. 過量服薬した場面の振り返りを促す。
かりょうふくやく ばめん ふ かえ うなが
2. 現在の希死念慮の有無について確認する。
げんざい き しねんりょ う む かくにん
3. 大量の睡眠薬を飲まずに残していた理由を追及する。
たいりょう すいみんやく の のこ りゆう ついきゅう
4. A さんと看護師の間で二度と過量服薬しないと約束する。
かん ごし あいだ に ど かりょうふくやく やくそく

113 A さんは身体的な治療を受けた後、精神科病棟に入院することになった。入院
しんたいてき ちりょう う あと せいしん かびょうどう にゅういん にゅういん
3 日の 22 時、A さんがハサミを貸してほしいとナースステーションに来た。日勤
みっか じ 22 じ A さんがハサミを貸してほしいとナースステーションに来た。日勤
の看護師がいる時間帯のみ付き添いでハサミの貸出が可能という主治医からの指示
かん ごし じかんたい つきそ かしだし か のう しゅじ い しじ
を伝えると「看護師 B は貸してくれたのに。こんなひどい対応をする看護師はあな
つた かん ごし か たいおう かん ごし
ただけだ」と話し、その場を動かない。
はな ば うご

このときの A さんへの対応で適切なのはどれか。
たいおう てきせつ

1. ハサミの使用目的を聞く。
しようもくてき き
2. 看護師付き添いのもとハサミを貸し出す。
かん ごし つ そ か だ
3. 看護師 B が誤った対応をしたと説明する。
かん ごし あやま たいおう せつめい
4. A さんの行動が心配なので貸し出せないと伝える。
こうどう しんぱい か だ つた

114 入院1週、Aさんは看護師ごとに言動や態度を変えることが多く、病棟ではAさんに対して共感を示す看護師と、拒否的な態度を示す看護師に分かれてしまった。そのため、病棟の看護師はチームでの対応についてカンファレンスを行った。

Aさんへの看護師のチームとしての対応で適切なのはどれか。

1. Aさんと看護師が関わる頻度を減らす。
2. Aさんに共感を示す看護師に担当を固定する。
3. Aさんに対する感情を看護師同士で表出しないように統一する。
4. Aさんの行動が患者－看護師関係にもたらす影響について評価する。

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 115～117 の問いに答えよ。

A ちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne(デュシェンヌ)型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で、訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。A ちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。

- 115 入学時に担任が A ちゃんの意味を確認する方法で最も適切なのはどれか。
1. 五十音の文字盤を用いて A ちゃんが指でさした文字を1文字ずつ読み取る。
 2. 視線で入力できる意思伝達装置を用いて A ちゃんに文字を入力してもらう。
 3. 閉じた質問(closed question)をして A ちゃんのまばたきの回数を確認する。
 4. 感情を絵で表現したカードを見せて A ちゃんが指でさしたカードを確認する。

116 Aちゃんが小学校に入学して6か月が経過した。小学校への送迎は母親が行っており、学内での喀痰吸引や経管栄養の注入は小学校に配置されている看護師が行っている。Aちゃんは体調も安定しており、小学校での生活にも慣れてきた。Aちゃんの母親は「夫は朝早く出勤し、長女もまだ小さく、Aを小学校に連れて行くまで忙しくて大変です」と訪問看護師に話した。訪問看護師は保健所の保健師に相談し、Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんを利用できる支援サービスを検討することにした。

Aちゃんと家族に利用を勧める支援サービスで適切なものはどれか。

1. 児童発達支援
2. 重度訪問介護
3. 放課後等デイサービス
4. 短期入所〈ショートステイ〉

117 Aちゃんは入学して1度も入院することなく2年生になった。Aちゃんの母親はケアに必要な物品を学校の看護師に渡す際に「Aは学校に通うようになり、お友達が増えて本当によかったと思います。それに比べて私は仕事をしていないし、Aに友達ができた喜びや日々の苦労を理解してもらえる友達がいません。Aの同級生の親には年齢が近くて話しやすい人がいません」と話した。

Aちゃんの母親への提案で最も適切なものはどれか。

1. 「学校の行事に参加してみませんか」
2. 「短時間でも仕事を始めてはいかがですか」
3. 「お姉ちゃんのお友達の親に話しかけてみませんか」
4. 「障害のある子どもを持つ家族の会に参加してみませんか」

つぎ ぶん よ と こた
次の文を読み 118～120 の問いに答えよ。

A さん(57 歳、男性、無職)は妻(55 歳、会社員)と 2 人で暮らしている。A さんは、飲酒が原因で仕事での遅刻や無断欠勤が続いたため 1 年前に職場を解雇された。その後も朝から自宅で飲酒する生活が続き、体調が悪化したため受診し、アルコール性肝硬変とアルコール依存症と診断された。医師から断酒を指導されていたが実行できず通院していなかった。

A さんは最近、倦怠感が強く食欲がなく、1 週間前から飲酒もできなくなった。妻に付き添われて受診した際、外来のトイレで吐血し倒れ食道静脈瘤破裂と診断され入院した。

身体所見：呼びかけに応じるが反応が遅い。腹水や浮腫はない。手指の振戦はない。

体温 37.0℃、呼吸数 22/分、脈拍 98/分、整、血圧 92/50 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO₂〉98 % (room air)。

118 入院時、A さんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1. 上半身を挙上する。
2. 身体を側臥位にする。
3. 頭部の冷罨法を行う。
4. 酸素療法の準備をする。

119 入院当日、Aさんは緊急に内視鏡的治療を受けた。入院7日、Aさんは食道静脈瘤の治療のため、食道静脈瘤硬化療法を受けることになった。治療前のバイタルサインは、体温36.7℃、呼吸数16/分、脈拍72/分、整、血圧126/70 mmHgである。検査所見は、血小板15万/ μ L、プロトロンビン時間<PT>10秒85%である。入院後は吐血していない。

Aさんが食道静脈瘤硬化療法を受けた直後に注意すべき症状はどれか。

1. 下血
2. 胸部痛
3. 皮下出血
4. 手指の振戦

120 Aさんは食道静脈瘤硬化療法を終えて、アルコール依存症の治療を受けるために精神科病院に転院した。

転院して2か月、病棟ではAさんの退院に向けた話し合いが進められている。

Aさんは「退院した後にお酒をやめられるか自信がない。体力が落ちており、何もしていないとお酒を飲んでしまいそうです」と悩みを打ち明けた。

Aさんへの看護師の声かけで適切なのはどれか。

1. 「断酒をする意思を強く持ちましょう」
2. 「肝硬変があるので、今は安静が必要です」
3. 「入院中も飲酒をやめられているので大丈夫です」
4. 「アルコールの問題で悩んでいる人たちとの話し合いに参加してみましょう」

