

イカ塩辛等からの1日当たりのカドミウム摂取量の試算(詳細)

マガキからの1日当たりのカドミウム摂取量

	カドミウム含有量(ppm) ^{注1)}			摂取回数 ^{注2)}						毎日	
	平均値	最小値	最大値	1回	2回	3回	4回	5回	6回		
	0.3	0.1	0.7	/週	/週	/週	/週	/週	/週		
カキ(貝・生)の摂取量(g) ^{注3)}											
全体平均	2.0	0.6	0.2	1.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
摂取者平均	36.9	11.1	3.7	25.1	1.6	3.2	4.7	6.3	7.9	9.5	11.1
カキ(貝・水煮缶詰)の摂取量(g) ^{注3)}											
全体平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
摂取者平均	33.4	10.0	3.3	22.7	1.4	2.9	4.3	5.7	7.1	8.6	10.0

(単位: μg)

イカ塩辛からの1日当たりのカドミウム摂取量

	カドミウム含有量(ppm) ^{注1)}			摂取回数 ^{注2)}						毎日	
	平均値	最小値	最大値	1回	2回	3回	4回	5回	6回		
	2.6	0.1	9.9	/週	/週	/週	/週	/週	/週		
イカ(塩辛)の摂取量(g) ^{注3)}											
全体平均	0.2	0.5	0.0	2.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
摂取者平均	18.8	49.4	1.7	186.1	7.1	14.1	21.2	28.3	35.3	42.4	49.4

(単位: μg)

注1) 水産庁が実施した水産物に含まれるカドミウムの実態調査結果

注2) カドミウム含有量が平均的なものの摂取回数

注3) 平成10~12年の国民栄養調査の結果