

平成19年11月6日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 吉倉 廣 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成19年10月17日厚生労働省発食安第1017004号をもって諮詢された、
食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくクロマフェノ
ジドに係る食品規格（食品中の農薬及び動物用医薬品の残留基準）の設定について、当
部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

クロマフェノジド


1. 品目名：クロマフェノジド (chromafenozide)

2. 用途：殺虫剤

本剤は、脱皮ホルモンアゴニストとして作用し、過度の形態変化を誘導し、鱗翅目害虫に対して殺虫効果を示す。

3. 化学名：2 - *tert*-ブチル - 5 - メチル - 2 - (3, 5 - キシロイル) クロマン - 6 - カルボヒドラジド

4. 構造式及び物性



分子式 C₂₄H₃₀N₂O₃

分子量 394.51

水溶解度 1.12 mg/L (20 °C)

分配係数 log₁₀Pow = 2.7 (22 °C)

(メーカー提出資料より)

5. 適用病害虫の範囲及び使用方法

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。

作物名のように記載しているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。

(1) 5%クロマフェノジドフロアブル剤

作物名	適用害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む農薬の総使用回数			
りんご	ケムシ類 ヨモギ エダ シャク	2000 倍	200 ~ 700 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内			
	ハマキムシ類	1000 ~ 2000 倍		収穫前日まで	3 回以内		3 回以内			
なし	ケムシ類	2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 14 日前まで	散布	4 回以内				
	ハマキムシ類	1000 ~ 2000 倍		収穫前日まで			4 回以内			
とうとう	モモハモグリガ	1000 倍	2000 倍	収穫前日まで	散布	3 回以内				
もも	モモハモグリガ	1000 倍		収穫 7 日前まで			4 回以内			
メロン、 きゅうり	ウリノメイガ	1000 ~ 2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
はくさい	ヨトウムシ			収穫 7 日前まで						
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000 倍	2000 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内			
だいこん	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	収穫 21 日前まで								
レタス	オオタバコガ	1000 ~ 2000 倍	800m L/10a	収穫前日まで	無人ヘリコプターによる散布	散布	3 回以内			
	ハスモンヨトウ	2000 倍								
ねぎ、わ けぎ、あ さつき	シロチモジ ヨトウ	1000 ~ 2000 倍	100 ~ 200 L/10a	収穫 7 日前まで	無人ヘリコ プターによ る散布	散布	3 回以内			
だいず	ハスモンヨトウ	2000 ~ 3000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫前日まで						
		8 ~ 16 倍	800m L/10a							

(1) 5%クロマフェノジドフロアブル剤(つづき)

作物名	適用害虫名	希釗倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む農薬の総使用回数			
稲	コブノメイガ	1000 倍	100 ~ 200 L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内			
		16 倍	800m L/10a			無人ヘリコプターによる散布				
なす	ハスモンヨトウ	2000 倍	100 ~ 300 L/10a 2000 倍	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
トト	オオタバコガ	1000 ~ 2000 倍		収穫 7 日前まで						
ミニトト				収穫前日まで	3 回以内					
ピーマン				収穫前日まで						
ししどう	ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫 7 日前まで	4 回以内		4 回以内			
いちご				収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内			
キャベツ	ハスモンヨトウ ハイダラノメイガ	2000 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内			
非結球あぶらな科葉菜類	ヨトウムシ類			収穫前日まで	3 回以内		3 回以内			
オクラ	ハスモンヨトウ			収穫前日まで	3 回以内		3 回以内			
はすいも(葉柄)	2000 ~ 3000 倍			収穫 14 日前まで	4 回以内		4 回以内			
実えんどう				収穫前日まで	2 回以内		2 回以内			
えだまめ				収穫前日まで	3 回以内		3 回以内			
てんさい	ヨトウムシ	1000 ~ 2000 倍	100 ~ 150 L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内			
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ		200 ~ 400 L/10a	摘採 7 日前まで	2 回以内		2 回以内			
	チャハマキ ヨモギ エダ シャク	1000 倍								
うめ	モンクロシャチホコ	2000 倍	200 ~ 700 L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内		3 回以内			

(1) 5%クロマフェノジドフロアブル剤(つづき)

作物名	適用害虫名	希釀倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	アワノメイガ	2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
さといもかんしょ	ハスモンヨトウ			収穫 7 日前まで			
しょうが	ハスモンヨトウ	1000 ~ 2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
きく		2000 倍	100 ~ 300 L/10a	発生初期			
トルコギキョウ	シロイチモジヨトウ		-	5 回以内		5 回以内	
さくら	アメリカヒトリ						

(2) 0.3%クロマフェノジド粉剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む農薬の総使用回数
稻	ニカメイチュウ	3 ~ 4 kg/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	コブノメイガ イネトムシ タオビコヤガ	4 kg/10a				
だいすえだまめ	ハスモンヨトウ		収穫前日まで	3 回以内		3 回以内

(3) 0.2%クロマフェノジド粉剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む農薬の総使用回数
稻	ウシカ類 ツマグロヨコバイ カムシ類 コブノメイガ	4 kg/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
だいす	カムシ類		収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内
えだまめ	ハスモントウ					

6 . 農薬の作物残留試験結果

(1) 分析の概要

分析対象の化合物

クロマフェノジド (2 - *tert* - ブチル - 5 - メチル - 2 - (3 , 5 - キシロイル) クロマン - 6 - カルボヒドラジド)

分析法の概要

クロマフェノジドはアセトニトリル又は含水アセトニトリルで抽出した後、シリカゲルカラム、中性アルミナカラム等のカラムクロマトグラフィーで精製し、高速液体クロマトグラフにより定量する。

定量限界 0.005 ~ 0.1 ppm (作物により異なる)

(2) 作物残留試験結果

水稻

水稻(玄米)を用いた作物残留試験(2例)において、0.3%粉剤を1~2回散布(4kg/10a)したところ、散布後14~29日のクロマフェノジドの最大残留量は0.008ppm、<0.005ppmであった。

水稻(玄米)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を2回散布(150L/10a)したところ、散布後6~21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.042ppm、0.02ppmであった。

水稻(玄米)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の16倍希釈液を2回散布(800mL/10a)したところ、散布後7~14日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.02ppm、<0.02ppmであった。

水稻（稻わら）を用いた作物残留試験（2例）において、0.3%粉剤を1～2回散布（4kg/10a）したところ、散布後14～29日のクロマフェノジドの最大残留量は2.39ppm、0.52ppmであった。

水稻（稻わら）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釀液を2回散布（150L/10a）したところ、散布後6～21日のクロマフェノジドの最大残留量は2.32ppm、1.10ppmであった。

水稻（稻わら）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の16倍希釀液を2回散布（800mL/10a）したところ、散布後7～14日のクロマフェノジドの最大残留量は1.11ppm、0.81ppmであった。

とうもろこし

とうもろこし（未成熟）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釀液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～15日において<0.01ppm、0.01ppmであった。

だいす

だいす（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の500倍希釀液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～14日において0.13ppm、0.18ppmであった。

だいす（乾燥子実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の16倍希釀液を3回散布（0.8～0.91L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～15日において<0.02ppmであった。

だいす（乾燥子実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の16倍希釀液を3回散布（0.8L/10a）したところ、散布後1～14日のクロマフェノジドの最大残留量は0.02ppmであった。

だいす（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の8倍希釀液を3回散布（0.8L/10a）したところ、散布後1～14日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.01ppm、0.01ppmであった。

さといも

さといも（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釀液を3回散布（150L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～14日において<0.01ppm、<0.01ppmであった。

かんしょ

かんしょ（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釀液を3回散布（150L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7～14日におい

て<0.01ppm、<0.01ppm であった。

てんさい

てんさい（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を2~4回散布（150L/10a）したところ、散布後14~21日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.01ppm、<0.01ppm であった。

だいこん

だいこん（葉）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~14日において0.24ppm、1.26ppm であった。

だいこん

だいこん（根部）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~14日において<0.01ppm、<0.01ppm であった。

はくさい

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を4回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~21日において0.08ppm であった。

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を4回散布（201L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~21日において0.24ppm であった。

キャベツ

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を4回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~21日において0.24ppm であった。

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を4回散布（100~150L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後7~21日において0.60ppm であった。

ブロッコリー

ブロッコリー（花蕾）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブ

ル剤の1,000倍希釈液を3回散布(208L/10a)したところ、散布後1~14日のクロマフェノジドの最大残留量は0.96ppmであった。

プロッコリー(花蕾)を用いた作物残留試験(1例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(200L/10a)したところ、散布後1~14日のクロマフェノジドの最大残留量は0.46ppmであった。

レタス

レタス(茎葉)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(200L/10a)したところ、散布後7~21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.64ppm、0.45ppmであった。

サラダ菜

サラダ菜(茎葉)を用いた作物残留試験(1例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(100~150L/10a)したところ、散布後21日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.05ppmであった。

サラダ菜(茎葉)を用いた作物残留試験(1例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(300L/10a)したところ、散布後21日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.05ppmであった。

リーフレタス

リーフレタス(茎葉)を用いた作物残留試験(1例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(50~160L/10a)したところ、散布後21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.40ppmであった。

リーフレタス(茎葉)を用いた作物残留試験(1例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(150L/10a)したところ、散布後21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.68ppmであった。

ねぎ

葉ねぎ(茎葉)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を1~3回散布(150L/10a)したところ、散布後7~21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.22ppm、0.30ppmであった。

ねぎ

根深ねぎ(茎葉)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を1~3回散布(200L/10a)したところ、散布後7~21日のクロマフェノジドの最大残留量は0.30ppm、0.06ppmであった。

わけぎ

わけぎ(茎葉)を用いた作物残留試験(2例)において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布(150L/10a)したところ、散布後7~14日のクロマフェノジドの最大残留量は0.38ppm、0.42ppmであった。

トマト

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.20ppmであった。

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200～230L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.16ppmであった。

ミニトマト

ミニトマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後7～14日のクロマフェノジドの最大残留量は0.14ppm、0.12ppmであった。

ピーマン

ピーマン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（300L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.50ppmであった。

ピーマン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.45ppmであった。

21 なす

なす（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.10ppmであった。

なす（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（150～180L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.20ppmであった。

22 しとう

しとう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の2,000倍希釈液を3回散布（350L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～7日において0.33ppmであった。

しとう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の2,000倍希釈液を3回散布（202～252.5L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.24ppmであった。

23 きゅうり

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～7日におい

て 0.08ppm、0.10ppm であった。

²⁴ メロン

メロン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（300L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～14日において<0.01ppmであった。

メロン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（250L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～14日において<0.01ppmであった。

²⁵ おくら

おくら（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の2,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.24ppmであった。

おくら（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の2,000倍希釈液を3回散布（250L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は0.20ppmであった。

²⁶ しょうが

しょうが（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の1,000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～14日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.01ppm、<0.01ppmであった。

²⁷ 実えんどう

実えんどう（子実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤の2,000倍希釈液を3回散布（300L/10a）したところ、散布後1～7日のクロマフェノジドの最大残留量は<0.1ppm、<0.1ppmであった。

²⁸ えだまめ

えだまめ（さや）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の500倍希釈液を3回散布（200L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～7日において1.57ppmであった。

えだまめ（さや）を用いた作物残留試験（1例）において、5%フロアブル剤の500倍希釈液を3回散布（238L/10a）した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後1～7日において2.90ppmであった。

²⁹ はすいも

はすいも（葉柄）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブル剤

の 2,000 倍希釈液を 2 回散布 (300L/10a) したところ、散布後 1~7 日のクロマフェノジドの最大残留量は <0.01ppm、<0.01ppm であった。

³⁰りんご

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 1 回又は 2 回散布 (700L/10a) したところ、散布後 14~28 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.179ppm、0.202ppm であった。

³¹なし

なし（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (300L/10a) したところ、散布後 1~14 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.49ppm であった。

なし（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (450L/10a) したところ、散布後 1~14 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.19ppm であった。

³²もも

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2 例）において、5% フロアブル剤の 500 倍希釈液を 3 回散布 (400L/10a) した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後 1~14 日において 0.02ppm、0.02ppm であった。

³³うめ

うめ（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (250L/10a) した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後 3~14 日において 0.46ppm であった。

うめ（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (312L/10a) した。この試験は適用の範囲内で行われていないが、試験を行った範囲内で最も大きな残留量は散布後 3~14 日において 1.20ppm であった。

³⁴おうとう

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (500L/10a) したところ、散布後 14 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.34ppm であった。

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（1 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (700L/10a) したところ、散布後 14 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.36ppm であった。

³⁵いちご

いちご（果実）を用いた作物残留試験（2 例）において、5% フロアブル剤の

2,000 倍希釈液を 1~3 回散布 (150L/10a) したところ、散布後 1~7 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.10ppm、0.15ppm であった。

36 茶

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 1~2 回散布 (200L/10a) したところ、散布後 6~21 日のクロマフェノジドの最大残留量は 13.4ppm、6.72ppm であった。

37 あさつき

あさつき（茎葉）を用いた作物残留試験（2 例）において、5% フロアブル剤の 1,000 倍希釈液を 3 回散布 (150L/10a) したところ、散布後 7~14 日のクロマフェノジドの最大残留量は 0.13ppm、0.96ppm であった。

なお、これらの試験結果の概要については、別紙 1 を参照。

注 1) 最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験(いわゆる最大使用条件下の作物残留試験)を実施し、それぞれの試験から得られた残留量。

(参考：平成 10 年 8 月 7 日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」)

7 . 乳牛における残留試験

乳牛 2 頭に対し、クロマフェノジドを 10mg 相当量 / 頭 / 日、7 日間連続して経口投与した。

投与開始前、投与開始後 1、3 及び 7 日目、最終投与後 1、3 及び 5 日目に、各日に 2 回搾乳し、同一日の試料を混合し、分析試料としてクロマフェノジド含量を測定したところ、いずれの試料においても <0.005ppm であった。

8 . 魚介類への推定残留量

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省から魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の水産動植物被害予測濃度^{注1)} 及び生物濃縮係数 (B C F : Bioconcentration Factor) から以下の通り推定残留量を算出した。

水産動植物被害予測濃度については、本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田 P E C tier 2^{注2)} 及び非水田 P E C tier1^{注3)} について算出したところ、水田 P E C tier2 は 0.27ppb、非水田 P E C tier1 は 0.0055ppb となったことから、水田 P E C tier2 の 0.27ppb を採用した。

また、B C F については実測値がないため、オクタノール / 水分配係数 (Log₁₀Pow : 2.7) から、相関式 (Log₁₀BCF=0.80Log₁₀Pow-0.52) を用いて算出した。

水産動植物被害予測濃度 : 0.27ppb 、 B C F : 44

$$\text{推定残留量} = 0.27\text{ppb} \times (44 \times 5) = 59.4\text{ppb} = 0.0594\text{ppm}$$

注1) 農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準設定における規定に準拠

注2) 水田中や河川中での農薬の分解や土壤・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したもの。

注3) 規定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。

(参考: 平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設定法」報告書)

9. A D I の評価

食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第1号の規定に基づき、平成19年4月9日付け厚生労働省発食安第0409001号により、また同法第24条第2項の規定に基づき、平成19年3月5日付け厚生労働省発食安第0305013号により、食品安全委員会にて意見を求めたクロマフェノジドに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。

無毒性量 : 27.2 mg/kg 体重/day
(動物種) イヌ
(投与方法) 混餌投与
(試験の種類) 慢性毒性試験
(期間) 1年間

安全係数 : 100

A D I : 0.27 mg/kg 体重/day

10. 諸外国の状況

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。

米国、カナダ、欧州連合(EU)、オーストラリア及びニュージーランドについて調査した結果、全ての国又は地域において、残留基準は設定されていない。

11. 基準値案

(1) 残留の規制対象

クロマフェノジド本体

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対象物質としてクロマフェノジドを設定している。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

(3) 暴露評価

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される量のクロマフェノジドが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大摂取量（TMDI））のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3を参照。

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全くないと仮定の下におこなった。

	TMDI / ADI (%) ^{注)}
国民平均	2.3
幼小児（1～6歳）	4.0
妊婦	1.9
高齢者（65歳以上）	2.6

TMDI 試算：基準値案 × 摂取量

(4) 本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の成分規格7に食品に残留する量の限度(暫定基準)が定められているが、今般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。

クロマフェノジド作物残留試験一覧表

農作物	試験 圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
水稻 (玄米)	2	0.3% 粉剤	4kg/10a 散布	1,2回	14, 21, 28日	圃場A:0.008 (1回、14日) 圃場B:<0.005
水稻 (玄米)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	2回	6, 7, 14, 21日	圃場A:0.042 (6日) 圃場B:0.02
水稻 (玄米)	2	5% フロアブル剤	16倍希釀 散布 0.8L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:<0.02 圃場B:<0.02
水稻 (稻わら)	2	0.3% 粉剤	4kg/10a 散布	1,2回	14, 21, 28日	圃場A:2.39 圃場B:0.52 (2回、29日)
水稻 (稻わら)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	2回	6, 7, 14, 21日	圃場A:2.32 (6日) 圃場B:1.10
水稻 (稻わら)	2	5% フロアブル剤	16倍希釀 散布 0.8L/10a	2回	7, 14, 21日	圃場A:1.11 圃場B:0.81 (14日)
とうもろこし (未成熟)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 7, 8, 14, 15日	圃場A:<0.01 (#) 圃場B:0.01 (#)
だいす (乾燥子実)	2	5% フロアブル剤	500倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:0.13 (#) 圃場B:0.18 (#) (7日)
だいす (乾燥子実)	2	5% フロアブル剤	16倍希釀 散布 0.8~0.91L/10a	3回	1, 7, 14, 15日	圃場A:<0.02 (#) 圃場B:0.02
だいす (乾燥子実)	2	5% フロアブル剤	8倍希釀 散布 0.8L/10a	3回	1, 7, 8, 14日	圃場A:<0.01 圃場B:0.01
さといも (塊茎)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	3回	7, 14日	圃場A:<0.01 (#) 圃場B:<0.01 (#)
かんしょ (塊茎)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	3回	7, 14日	圃場A:<0.01 (#) 圃場B:<0.01 (#)
てんさい (根部)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	2, 4回	14, 21日	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01
だいこん (根部)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:<0.01 (#) 圃場B:<0.01 (#)
だいこん (葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:0.24 (#) 圃場B:1.26 (#)

クロマフェノジド作物残留試験一覧表

農作物	試験 圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
はくさい (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a, 201L/10a	4回	7, 14, 21日	圃場A:0.08(#) 圃場B:0.24(#)
キャベツ (葉球)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a, 100~150L/10a	4回	7, 14, 21日	圃場A:0.24(#) 圃場B:0.60(#)
プロッコリー (花蕾)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 208L/10a, 200L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:0.96 圃場B:0.46
レタス (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	7, 14, 21日	圃場A:0.64 圃場B:0.45
サラダ菜 (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 100~150L/10a, 300L/10a	3回	1, 7, 14, 21日	圃場A:<0.05 圃場B:<0.05
リーフレタス (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 50~160L/10a, 150L/10a	3回	1, 7, 14, 21日	圃場A:0.40 圃場B:0.68
ねぎ (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	1~3回	7, 14, 21日	圃場A:0.22 (2回、7日) 圃場B:0.30 (2回、7日)
ねぎ (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	1~3回	7, 14, 21日	圃場A:0.30 圃場B:0.06
わけぎ (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 150L/10a	3回	3, 7, 14日	圃場A:0.38 圃場B:0.42
トマト (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a, 200~230L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.20 (3日) 圃場B:0.16 (3日)
ミニトマト (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:0.14 圃場B:0.12
ピーマン (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 300L/10a, 200L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.50 圃場B:0.45
なす (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a, 150~180L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.10 圃場B:0.20
ししとう (果実)	2	5% フロアブル剤	2,000倍希釀 散布 300L/10a, 202~252.5L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A:0.33(#) 圃場B:0.24
きゅうり (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釀 散布 200L/10a	3回	1, 3, 7日	圃場A:0.08(#) 圃場B:0.10(#)

クロマフェノジド作物残留試験一覧表

農作物	試験 圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm)
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
メロン (果肉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 300L/10a, 250L/10a	3回	1,7,14日	圃場A:<0.01(#) 圃場B:<0.01(#)
オクラ (果実)	2	5% フロアブル剤	2,000倍希釈 散布 200L/10a, 250L/10a	3回	1,3,7日	圃場A:0.24 圃場B:0.20
しょうが (塊茎)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 200L/10a	3回	1,7,14日	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01
実えんどう (子実)	2	5% フロアブル剤	2,000倍希釈 散布 300L/10a	3回	1,3,7日	圃場A:<0.1 圃場B:<0.1
えだまめ (さや)	2	5% フロアブル剤	500倍希釈 散布 200L/10a, 238L/10a	3回	1,3,7日	圃場A:1.57 圃場B:2.90
はすいも (葉柄)	2	5% フロアブル剤	2,000倍希釈 散布 300L/10a	2回	1,3,7日	圃場A:<0.01 圃場B:<0.01
りんご (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 700L/10a	1,2回	14,21,28日	圃場A:0.179 圃場B:0.202
なし (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 300L/10a, 450L/10a	3回	1,7,14日	圃場A:0.49 圃場B:0.19
もも (果肉)	2	5% フロアブル剤	500倍希釈 散布 400L/10a	3回	1,7,14日	圃場A:0.02(#) 圃場B:<0.02(#)
うめ (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 250L/10a, 312L/10a	3回	3,7,14日	圃場A:0.46(#) 圃場B:1.20(#)
おうとう (果実)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 500L/10a, 700L/10a	3回	1,7,14日	圃場A:0.34 圃場B:0.36
いちご (果実)	2	5% フロアブル剤	2,000倍希釈 散布 150L/10a	1,3回	1,3,7日	圃場A:0.10 圃場B:0.15
茶 (荒茶)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 200L/10a	1,2回	6,7,14,21日	圃場A:13.4 圃場B:6.72 (2回、6日)(#)
あさつき (茎葉)	2	5% フロアブル剤	1,000倍希釈 散布 150L/10a	3回	3,7,14日	圃場A:0.13 圃場B:0.96

これらの作物残留試験は申請の範囲内で試験が行われていない。

印で示した作物については、申請の範囲内で最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「クロマフェノジド」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
米(玄米をいう)	0.2	0.2				0.008, <0.005 / 0.042, 0.02 / <0.02, <0.02
とうもろこし	0.05		申			<0.01(#), <0.01(#)
大豆	0.5	0.5				0.13(#), 0.18(#)/ <0.02(#), 0.02 / <0.01, 0.01
さといも類(やつがしらを含む) かんしょ	0.05 0.05		申 申			<0.01(#), <0.01(#) <0.01(#), <0.01(#)
てんさい	0.05	0.1				<0.01, <0.01
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 西洋わさび クレソン はくさい キャベツ 芽キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜	0.05 3 5 0.1 5 0.1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5	0.1 5 0.1 5 0.1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5				<0.01(#), <0.01(#) 0.24(#), 1.26(#,\$)
ごぼう サルシフィー アーティチョーク チコリ エンダイブ しゅんぎく レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) その他のきく科野菜		0.1 0.1 5 5 5 5 2 5				0.08(#), 0.24(#,\$) 0.24(#), 0.60(#,\$)
ねぎ(リーキを含む) にら アスパラガス わけぎ その他のゆり科野菜	0.7 1	5 5 5 5				0.64, 0.45 / <0.058, <0.05 (サラダ菜) / 0.40, 0.68 (リーフレタス)
にんじん パースニップ パセリ セロリ みつば その他のせり科野菜		0.1 0.1 5 5 5 5				0.22, 0.30(\$) / 0.30, 0.06 0.38, 0.42
トマト ピーマン なす その他のなす科野菜	0.5 1 0.5 1	1 2 1 2				0.20, 0.16(トマト) / 0.14, 0.12 (ミニトマト) 0.50, 0.45 0.10, 0.20 0.33(#,\$), 0.24 (しじとう)
きゅうり(ガーキンを含む) かぼちゃ(スカッシュを含む) しろうり	0.3	1 1 1				0.08(#), 0.10(#)

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
すいか メロン類果実 まくわうり その他のうり科野菜	0.05	0.1 0.1 0.1 1				<0.01(#), <0.01(#)
ほうれんそう たけのこ オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ		5 0.1 2 0.1 5 5 5				0.24, 0.20 <0.01, <0.01 <0.1, <0.1 1.57, 2.90
その他の野菜	0.05	5				<0.01, <0.01 (はすいも)
りんご 日本なし 西洋なし マルメロ びわ	0.7 1 1 1 0.1	1 1 1 1 0.1				0.179, 0.202 0.49, 0.19
もも ネクタリン あんず(アプリコットを含む) すもも(ブルーンを含む) うめ おうとう(チェリーを含む)	0.1 1 1 1 3 1	0.1 1 1 1 1 1				0.02(#), 0.02(#) 0.46(#), 1.20(#,\$) 0.34, 0.36
いちご ラズベリー ブラックベリー ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実	0.5	1 1 1 1 1 1 1				0.10, 0.15
ぶどう かき		1 1				
バナナ キウイ パパイヤ アボカド パイナップル グアバ マンゴー ¹ パッションフルーツ なつめやし		1 0.1 1 1 1 1 1 1 1				
その他の果実		1				
茶 その他のスパイス その他のハーブ	20 0.05 5	20 5 5				13.4, 6.72(#) その他の野菜を参照 0.13, 0.96 (あさつき)/ だいこん類の葉を参考(£)
魚介類	0.06					

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。

注1) (#)で示した作物残留試験は、申請の範囲内で行われていない。

注2) (\$)で示しただいこん類の葉、はくさい、キャベツ、ねぎ、その他のなす科野菜(しとう)及びうめの作物残留試験成績は、作物残留試験成績のはらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。

注3) (£)で示したケール等の非結球あぶらな科葉菜類は、平成14年の農薬取締法の改正に当たり緊急的に農薬登録されたものである。これらについては、個別の作物残留試験成績がないため、残留基準の設定に当たっては、登録保留基準の設定に準拠し、だいこん類の葉の作物残留試験成績(3回、14日前)を参考に種差を考慮して、基準値案を設定した。

クロマフェノジド推定摂取量 (単位: μg / 人 / day)

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
米(玄米)	0.2	37.0	19.5	27.9	37.8
とうもろこし	0.05	0.1	0.2	0.1	0.0
大豆	0.5	28.1	16.9	22.8	29.4
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.6	0.3	0.4	0.9
かんしょ	0.05	0.8	0.9	0.7	0.8
てんさい	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.05	2.3	0.9	1.4	2.9
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	3	6.6	1.5	2.7	10.2
はくさい	0.7	20.6	7.2	15.3	22.2
キャベツ	2	45.6	19.6	45.8	39.8
ケール	5	0.5	0.5	0.5	0.5
こまつな	5	21.5	10.0	8.0	29.5
きょうな	5	1.5	0.5	0.5	1.5
チンゲンサイ	5	7.0	1.5	5.0	9.5
ブロッコリー	2	9.0	5.6	9.4	8.2
その他のあぶらな科野菜	5	10.5	1.5	1.0	15.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	2	12.2	5.0	12.8	8.4
ねぎ(リーキを含む)	0.7	7.9	3.2	5.7	9.5
わけぎ	1	0.2	0.1	0.1	0.3
トマト	0.5	12.2	8.5	12.3	9.5
ピーマン	1	4.4	2.0	1.9	3.7
なす	0.5	2.0	0.5	1.7	2.9
その他のなす科野菜	1	0.2	0.1	0.1	0.3
きゅうり(ガーキンを含む)	0.3	4.9	2.5	3.0	5.0
メロン類果実	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
オクラ	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2
しようが	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
えだまめ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他の野菜	0.05	0.6	0.5	0.5	0.6
りんご	0.7	24.7	25.3	21.0	24.9
日本なし	1	5.1	4.4	5.3	5.1
西洋なし	1	0.1	0.1	0.1	0.1
もも	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0
うめ	3	3.3	0.9	4.2	4.8
おうとう(チェリーを含む)	1	0.1	0.1	0.1	0.1
いちご	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
茶	20	60.0	28.0	70.0	86.0
その他のスパイス	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のハーブ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
魚介類	0.06	5.6	2.6	5.6	5.6
計		336.8	171.8	287.8	377.0
ADI比(%)		2.3	4.0	1.9	2.6

TMDI: 理論最大一日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

妊婦及び高齢者については水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。

(参考)

これまでの経緯

- 平成11年12月27日 初回農薬登録
平成17年11月29日 残留基準値の告示
平成19年 3月 5日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成19年 3月 8日 食品安全委員会（要請事項説明）
平成19年 4月 2日 農薬登録申請（稻、大豆、さといも等に係る適用拡大申請）
平成19年 4月 9日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成19年 4月12日 食品安全委員会（要請事項説明）
平成19年 6月 4日 第5回農薬専門調査会確認評価第二部会
平成19年 6月22日 農林水産省より厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）
平成19年 8月24日 第25回農薬専門調査会幹事会
平成19年 9月13日 食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表
平成19年10月17日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会へ諮問
平成19年10月18日 食品安全委員会（報告）
平成19年10月18日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
平成19年10月23日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

青木 宙	東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授
井上 松久	北里大学副学長
○ 大野 泰雄	国立医薬品食品衛生研究所副所長
尾崎 博	東京大学大学院農学生命科学研究科教授
加藤 保博	財団法人残留農薬研究所理事
斎藤 貢一	星薬科大学薬品分析化学教室准教授
佐々木 久美子	国立医薬品食品衛生研究所客員研究員
志賀 正和	元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長
豊田 正武	実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授
米谷 民雄	国立医薬品食品衛生研究所食品部長
山内 明子	日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長
山添 康	東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授
吉池 信男	独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹
鰐渕 英機	大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授

(○ : 部会長)