

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成15年10月27日～平成16年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
解熱鎮痛薬	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g,エテンザミド1g,アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g,無水カフェイン0.2g,カンゾウ末0.3g	中毒性皮疹	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg,アリルイソプロピルアセチル尿素60mg,無水カフェイン80mg	アナフィラキシー様ショック	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg,無水カフェイン80mg,アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	蕁麻疹	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン144mg,エテンザミド84mg,プロムワレリル尿素200mg,無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg,エテンザミド250mg,カフェイン50mg	急性心筋梗塞	1
解熱鎮痛薬	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg,エテンザミド250mg,カフェイン50mg	肝機能異常	1
解熱鎮痛薬	6錠中加工ブシ末750mg,コンドロイチン硫酸ナトリウム225mg,シヤクヤク末120mg,カンゾウエキス末60mg(カンゾウ420mg)	薬剤性皮膚炎	1
解熱鎮痛薬	6錠中加工ブシ末750mg,コンドロイチン硫酸ナトリウム225mg,シヤクヤク末120mg,カンゾウエキス末60mg(カンゾウ420mg)	円形脱毛症	1
解熱鎮痛薬	4錠中アセトアミノフェン600mg,エテンザミド1g,アリルイソプロピルアセチル尿素120mg,無水カフェイン200mg,ベンフォチアミン10mg	ステーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg,ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg,ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシー反応	2
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg,ヒドロタルサイト100mg	ステーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg,ヒドロタルサイト100mg	肝機能異常	1
解熱鎮痛薬	1錠中エテンザミド200mg,アセトアミノフェン80mg,アリルイソプロピルアセチル尿素30mg,無水カフェイン40mg	薬剤性皮膚炎	1
解熱鎮痛薬	1カプセル中イブプロフェン150mg	全身性浮腫	1
眠気防止薬	1錠中無水カフェイン93mg	傾眠	1
かぜ薬	9錠中塩化リゾチーム60mg(力価),トラネキサム酸420mg,アセトアミノフェン900mg,ヒベンズ酸チペジジン75mg,dI 塩酸メチルエフェドリン60mg,d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg,無水カフェイン75mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,アセトアミノフェン300mg,マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg,無水カフェイン25mg,カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	ステーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg,塩酸プロムヘキシシン4mg,リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,塩化リゾチーム30mg(力価),マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,無水カフェイン25mg,硝酸チアミン8mg,リボ	ステーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,グアイフェネシン41.67mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	ステーブンス・ジョンソン症候群	2
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	横紋筋融解	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	血尿	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	上部消化管出血	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	無顆粒球症	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	薬剤性皮膚炎	2
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	貪食細胞性組織球症	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	横紋筋融解	1
かぜ薬	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg,塩化リゾチーム20mg(力価),リン酸ジヒドロコデイン8mg,ノスカピン16mg,dI 塩酸メチルエフェドリン20mg,マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,アセトアミノフェン300mg,無水カフェイン25mg,ビスイブチアミン8mg,リボフラビン4mg	薬剤性皮膚炎	1
かぜ薬	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg,dI 塩酸メチルエフェドリン30mg,無水カフェイン75mg,カンゾウ末200mg,ケイヒ末200mg,シウキョウ末100mg	肝酵素上昇	1
かぜ薬	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg,dI 塩酸メチルエフェドリン30mg,無水カフェイン75mg,カンゾウ末200mg,ケイヒ末200mg,シウキョウ末100mg	倦怠感	1
かぜ薬	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg,dI 塩酸メチルエフェドリン30mg,無水カフェイン75mg,カンゾウ末200mg,ケイヒ末200mg,シウキョウ末100mg	食欲不振	1
かぜ薬	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg,dI 塩酸メチルエフェドリン30mg,無水カフェイン75mg,カンゾウ末200mg,ケイヒ末200mg,シウキョウ末100mg	心不全	1
かぜ薬	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg,dI 塩酸メチルエフェドリン30mg,無水カフェイン75mg,カンゾウ末200mg,ケイヒ末200mg,シウキョウ末100mg	肺水腫	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	膿疱性皮疹	1
かぜ薬	6錠中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セラペプターゼ15mg, 無水カフェイン75mg, 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物270mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	喘息	1
かぜ薬	9錠中アセトアミノフェン900mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, セラペプターゼ15mg, 無水カフェイン75mg, 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物270mg	横紋筋融解	1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	ショック	1
かぜ薬	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン	アナフィラキシーショック スティーブンス・ジョンソン症候群 薬剤性皮膚炎	1 1 1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	白血球破碎性血管炎	1
かぜ薬	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アンモニア増加 スティーブンス・ジョンソン症候群 横紋筋融解 発疹 薬剤性皮膚炎	1 2 1 1 1
かぜ薬	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	黄疸 肝機能異常 血小板減少症 低プロトロンビン血症 薬剤性皮膚炎	1 1 1 1 1
かぜ薬	9錠中葛根湯加桔梗エキス3g(カクコン・マオウ・ケイヒ・シャクヤク・タイソウ・ショウキョウ・カンゾウ・キキョウ), アセトアミノフェン540mg, サリチルアミド600mg, リン酸ジヒドロコデイン15mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg	肝障害	1
かぜ薬	9錠中アセトアミノフェン900mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, ビタミンB1硝酸塩24mg, ビタミンB2 12mg, ビタミンCカルシウム塩(アスコルビン酸カルシウム)500mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	横紋筋融解 呼吸困難 蕁麻疹	1 1 1
かぜ薬	3錠中アセトアミノフェン150mg, マレイン酸クロルフェニラミン1.2mg, リン酸ジヒドロコデイン4mg, dl 塩酸メチルエフェドリン10mg, グアヤコールスルホン酸カリウム40mg, 無水カフェイン12.5mg	ヘンッホ・シェンライン紫斑病	1
かぜ薬	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシベリン16mg	間質性肺疾患	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
		中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬	9錠中イブプロフェン450mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, 硝酸チアミン25mg	アナフィラキシーショック 結膜充血 全身性そう痒症	1 1 1
かぜ薬	9錠中アセトアミノフェン900mg, d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	アナフィラキシー反応	1
かぜ薬	6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	紅斑	1
かぜ薬	6カプセル中アセトアミノフェン660mg, エテンザミド400mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン9mg, ヘスペリジン40mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ6,000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(葛根湯5.0054g), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ6000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(原生薬換算量5005.4mg), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	血尿	1
かぜ薬	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl 塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	肝機能異常	1
かぜ薬	6カプセル中フマル酸クレマスチン1.34mg, セミアルカリプロティナーゼ15mg(30,000単位), リン酸ジメモルファン30mg, アセトアミノフェン900mg, dl 塩酸メチルエフェドリン60mg, アスコルビン酸250mg, 無水カフェイン75mg	呼吸困難 紅斑 発疹	1 1 1
かぜ薬	2カプセル中イブプロフェン150mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, dl 塩酸メチルエフェドリン20mg, 無水カフェイン25mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬	6カプセル中アセトアミノフェン650mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン150mg, 麻黄湯エキス360mg(マオウ・キョウニン各1.1077g, ケイヒ830.8mg, カンゾウ553.8mg)	アナフィラキシー反応	1
一般点眼薬	1mL中ブロナプロフェン0.5mg	咽頭浮腫 眼瞼浮腫	1 1
一般点眼薬	コンドロイチン硫酸ナトリウム0.2%, メチル硫酸ネオスチグミン0.005%, 酢酸d トコフェロール0.025%, フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム0.02%, グリチルリチン酸二カリウム0.25%, マレイン酸クロルフェニラミン0.03%	眼痛	1
鼻炎用内服薬	1包(1g)中ベラドリン20 0.67mg, グリチルリチン酸46.7mg, d マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 塩酸プソイドエフェドリン60mg, 無水カフェイン25mg	薬剤性皮膚炎	1
鼻炎用内服薬	6錠中d マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸プソイドエフェドリン150mg, ベラドンナ総アルカロイド0.6mg, 無水カフェイン90mg	頻脈	1
鼻炎用内服薬	2錠中塩酸プソイドエフェドリン60mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg, ベラドンナ総アルカロイド0.2mg, 無水カフェイン50mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
鼻炎用内服薬	1カプセル中d マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), ベラドンナ総アルカロイド0.133mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン25mg, カフェイン40mg	視床出血	1
鼻炎用内服薬	2カプセル中マレイン酸カルビノキサミン12mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン80mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), 無水カフェイン120mg	急性肝炎 脳出血	1 2

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮咳去痰薬	3包(3.6g)中マオウエキス1.88g,カンゾウエキス369.6mg,無水カフェイン120mg,ジプロフィリン150mg,マレイン酸クロルフェニラミン8.2mg	情動障害 薬物依存	1 1
鎮咳去痰薬	1包(1.8g)中リン酸ジヒドロコデイン10mg,ノスカピン20mg,dl塩酸メチルエフェドリン25mg,マレイン酸カルビノキサミン4mg,塩化リゾチーム20mg(力価),キキョウ乾燥エキス末192mg(キキョウ960mg),カンゾウエキス末C 64mg(カンゾウ320mg)	アナフィラキシーショック	1
鎮咳去痰薬	12錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg,dl塩酸メチルエフェドリン50mg,マレイン酸クロルフェニラミン8mg,無水カフェイン90mg	横紋筋融解 間質性肺疾患	1 1
鎮咳去痰薬	6錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg,塩酸フェニルプロパノールアミン90mg,グアイフェネシン300mg,シャゼンソウ乾燥エキス100mg,塩酸ジフェニルピラリン4mg,無水カフェイン64mg	肝障害 薬剤性皮膚炎	1 1
鎮咳去痰薬	2カプセル中塩酸プロムヘキシシン4mg,リン酸ジヒドロコデイン10mg,ノスカピン20mg,dl塩酸メチルエフェドリン25mg,マレイン酸カルビノキサミン4mg,無水カフェイン50mg	意識消失	1
口内炎用薬	6錠中トラネキサム酸750mg,カンゾウ乾燥エキス198mg(カンゾウ990mg),塩酸ピリドキシン50mg,リボフラビン12mg,Lアスコルビン酸ナトリウム500mg	肝障害	1
止瀉薬	12錠中塩化ベルベリン300mg,ロートエキス60mg,タンニン酸アルブミン2g,ウルソデオキシコール酸30mg	アナフィラキシーショック	1
制酸薬	1包(1.43g)中スクラルファート500mg,ケイ酸アルミン酸マグネシウム375mg,ロートエキス10mg,アズレンスルホン酸ナトリウム2mg,Lグルタミン133mg,ヒドロタルサイト90mg	アナフィラキシーショック	1
ヒスタミンH ₂ 受容体拮抗剤含有薬	1錠中ファモチジン10mg	黄疸 下痢 肝機能異常 劇症肝炎 出血性十二指腸潰瘍 心筋梗塞 蕁麻疹	1 1 1 1 1 1 1
瀉下薬	3包(6g)中プラントゴ・オバタ種皮2.25g,センノシド83.53mg(センノシドA・B 48mg)	息詰まり	1
瀉下薬	1錠中ピサコジル5mg	薬剤性皮膚炎	1
瀉下薬	3錠中センノシドカルシウム40mg(センノシドA・B 16mg),ピサコジル15mg,ゲンチアナ末50mg	脱水	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	1包(1.2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg,エンゴサク・ボレイ各150mg,ウイキョウ75mg,シュクシャ・カンゾウ各50mg,リョウキョウ25mg),芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	多形紅斑	1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	1錠中マンデル酸ヘキサミン250mg	アナフィラキシーショック	1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g,ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g,ケイヒ・ホウブシ各1g)	眼瞼浮腫 血尿 体重増加 排尿困難	1 1 1 1
避妊薬	1個中メンフェゴール60mg	膣炎	1
外用痔疾用薬	1個(1.75g)中酢酸ブレドニゾロン1mg,リドカイン60mg,アラントイン20mg,酢酸トコフェロール50mg	腹痛	1
殺菌消毒薬	75mL中塩酸ジブカイン75mg,塩酸ナファゾリン75mg,マレイン酸クロルフェニラミン150mg,塩化ベンゼトニウム75mg	接触性皮膚炎 創部分泌	1 1
殺菌消毒薬	0.3m ² (約9.5g)中アクリノール20mg	接触性皮膚炎	1
鼻炎用点鼻薬	100mL中塩酸ナファゾリン50mg,マレイン酸クロルフェニラミン300mg,リドカイン100mg	重症筋無力症	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	1g中ブフェキサマク25mg,グリチルレチン酸5mg	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100mL中サリメント2.5g,lメントール3g,マレイン酸クロルフェニラミン100mg,ニコチン酸ベンジル10mg,ノニル酸ワニルアミド12mg	胃炎	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中サリチル酸グリコール1.25g, l メントール1g, 酢酸トコフェロール1g, dl カンフル0.3g(1枚10×14cm ² , 伸縮性)	褥瘡性潰瘍	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g中サリチル酸メチル6.29g, l メントール5.71g, 酢酸トコフェロール2g, dl カンフル1.24g(1枚6.5×4.2cm ²)	皮膚色素脱失	1
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬	100g(1,077cm ²)中インドメタシン350mg	接触性皮膚炎	1
毛髪用薬	100mL中ミノキシジル1g	狭心症 胸部不快感 血圧上昇 心筋梗塞 心室性期外収縮 肺胞出血 不眠症 濾胞性甲状腺癌 蕁麻疹	1 1 2 1 1 1 1 1 1
毛髪用薬	100mL中塩化カルプロニウム水和物1.09g(塩化カルプロニウム1g), パントテニールエチルエーテル1g, l メントール0.3g, 塩酸ジフェンヒドラミン0.1g, サリチル酸0.2g	円形脱毛症 接触性皮膚炎	1 1
かぜ薬(外用)	100g(1,429cm ²)中オウバク軟エキス1g(オウバク3.3g), dl カンフル0.5g, テレピン油0.4g, ユーカリ油0.2g, l メントール	眼の充血 顔面浮腫 全身性蕁麻疹 息詰まり感	1 1 1 1
ビタミンB ₁ 主薬製剤	2包(2.4g)中コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg, ビスベンチアミン30mg(塩酸チアミンとして26.2mg)	中毒性皮疹	1
ビタミンB ₁ 主薬製剤	6錠中フルスルチアミン100mg(塩酸フルスルチアミン109.16mg), 塩酸ピリドキシン20mg, シアノコバラミン60μg, コンドロイチン硫酸ナトリウム800mg	胸部X線異常 腎障害 貧血 浮腫	1 1 1 1
ビタミンB ₁ 主薬製剤	1本(50mL)中硝酸チアミン10mg, リン酸リボフラビンナトリウム5mg, 塩酸ピリドキシン20mg, ニコチン酸アミド30mg, 酢酸dトコフェロール50mg, パンテノール15mg, ガンマオリザノール5mg, 加工大蒜50mg, コンドロイチン硫酸ナトリウム180mg	アナフィラキシーショック	1
ビタミンE主薬製剤	3錠中メコバラミン1500μg, 葉酸5mg, 酢酸dトコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	アナフィラキシー様反応	1
ビタミン含有保健薬	1本(50mL)中ムイラブアマエキスA 15mg(ムイラブアマ300mg), ジオウエキスA 150mg(ジオウ300mg), クコシ流エキスA 0.3mL(クコシ300mg), トウキ流エキス0.05mL(トウキ50mg), ニンジンエキスM 90mg(ニンジン600mg), オウギ流エキス0.3mL(オウギ300mg), オウセイ流エキス0.3mL(オウセイ300mg), カンゾウエキス37.5mg(カンゾウ150mg), ロクジョウチンキ1.08mL(ロクジョウ300mg), イカリソウエキス100mg(インヨウカク1g), ハンピチンキ1.25mL(ハンピ250mg), ケイヒ流エキス0.15mL(ケイヒ150mg), プクリョウエキスA 9.6mg(プクリョウ300mg), アミノエチルスルホン酸500mg, リン酸リボフラビンナトリウム5mg, 塩酸ピリドキシン5mg, 無水カフェイン50mg	低カリウム血症	1
ビタミン含有保健薬	1本(50mL)中アミノエチルスルホン酸1.5g, ローヤルゼリー200mg, ニンジン乾燥エキス42mg(ニンジン600mg), ロクジョウチンキ0.05mL(ロクジョウ13.9mg), ゴオウ抽出液100mg(ゴオウ1mg), 硝酸チアミン5mg, リン酸リボフラビンナトリウム2.5mg, 塩酸ピリドキシン5mg, ニコチン酸アミド20mg, イノシトール100mg, 無水カフェイン40mg	発疹	1
その他の精神神経用薬	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	アナフィラキシー様反応 蕁麻疹	1 1
その他の精神神経用薬	3包(4.5g)中痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g, キョウニン・カンゾウ各0.5g, ヨクイニン1.3g, ボウイ2g, 動物胆0.1g), マオウ0.6g, ヨクイニン末1.4g, カンゾウ末0.4g, ボウイ末1.6g	胃炎 血小板減少症 高血圧	1 1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鼻炎用内服薬	48mL中マレイン酸クロルフェニラミン8mg,塩酸フェニルプロパノールアミン60mg,無水カフェイン50mg	薬剤性皮膚炎	1
鼻炎用内服薬	2錠中d-マレイン酸クロルフェニラミン2mg,ペラドンナ総アルカロイド0.2mg,グリチルリチン酸12mg	顔面腫脹 紅斑	1 1
漢方製剤	2包(3.75g)中乾燥エキス2.25g(ハンゲ2.5g,オウゴン・カンゾウ・タイソウ・ニンジン・カンキョウ各1.25g,オウレン0.5g)	間質性肺疾患	1
漢方製剤	3包(6g)中葛根湯エキス粉末3.6g(カッコン6g,マオウ・タイソウ各3g,ケイヒ・シャクヤク各2.25g,カンゾウ1.5g,ショウキョウ0.75g)	急性肝炎	1
漢方製剤	3包(6g)中葛根湯エキス末5.2g(カッコン8g,マオウ・タイソウ各4g,ケイヒ・シャクヤク各3g,カンゾウ2g,ショウキョウ1g)	眼瞼浮腫	1
漢方製剤	2包(3.75g)中乾燥エキス2.25g(オウゴン・カンゾウ・キキョウ・セッコウ・ビャクジュツ各1g,ダイオウ0.75g,ケイガイ・サンシシ・シャクヤク・センキュウ・トウキ・ハッカ・ポウフウ・マオウ・レンギョウ各0.6g,ショウキョウ0.15g,カッセキ1.5g,乾燥ポウシヨウ0.35g)	肝障害	1
漢方製剤	3本(90mL)中葛根湯軟エキス8.3g(カッコン8g,マオウ・タイソウ各4g,ケイヒ・シャクヤク各3g,カンゾウ2g,ショウキョウ1g)	劇症肝炎	1
漢方製剤	3瓶(90mL)中葛根湯抽出液A 60mL(カッコン8g,マオウ・タイソウ各4g,ケイヒ・シャクヤク各3g,カンゾウ2g,ショウキョウ1g)	肺炎 紅斑	1 1
漢方製剤	24丸中生薬乾燥エキス2.7g(サンシュユ・サンヤク各3.02g,ジオウ6.06g,タクシャ・ブクリョウ・ボタンビ各2.25g,キクカクコシ各1.51g)	溶血性貧血	1
生薬製剤	1袋中イチイ8g,タラ根皮4g,ポウイ1g,レンセンソウ0.5g,カンゾウ2g	肝機能異常	1