

nicorette[®]
2mg nicotine
gum

スターターキット

48個

禁煙補助剤

ニコレット[®]

nicorette[®]
2mg nicotine
gum

スターターキット

初めてご使用の方のために
●わかりやすいカセットテープ
●ご使用の手引書

禁煙補助剤

ニコレット[®]

ニコチンガム製剤

医薬品

helps beat
each urge to
smoke one
step at a time

48個

禁煙補助剤

ニコレット[®]

48個

スターターキット



箱

使用期限

2005.1

成形シート：PVC、金属 製造番号


DA581



袋：PE、金属

カセットテープ
外装フィルム：PP、PE


nicorette[®]
2mg nicotine
gum
スターターキット
禁煙補助剤
ニコレット[®]
48個



4 9871231 42151

IP4153-1 MC

nicorette[®] 2mg nicotine
 スターターキット
 禁煙補助剤
 ニコレット[®] 48^錠
 gum



① 外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください

禁煙補助剤
ニコレット[®] ニコチンガム製剤


タバコを吸わない人や現在タバコをやめている人は使用しないでください。

【効能】 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
【成分】 1個中、次の成分を含有する。
 ニコチン 2mg
 添加物として、ジフチルヒドロキシトルエンパロリン、香料を含有する。
【用法・用量】 タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個をゆっくりと噛みながら、30～60分間かけてかむ。1日の使用個数は表を目安とし、通常、1日4～12個から始めて適宜増減するか、1日の総使用個数は24個を超えないこと。芽煙になれてきたら1ヵ月前後、1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし、1日の使用個数が1～2個となった段階で使用をやめる。なお、使用期間は3ヵ月をものとす。

- 【注意】**
1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 非喫煙者1タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人
 - (2) すでに他のニコチン製剤を使用している人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 重い心臓病を有する人
 - (5) 3ヵ月以内、心筋梗塞の発作を起こした人
 - (6) 重い狭心症と医師に診断された人
 - (7) 重い不整脈と医師に診断された人
 - (8) 急性期脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）と医師に診断された人
 - (9) 本剤の成分による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、手指等）を起こしたことのある人
 - (10) あごの関節に障害がある人
 2. 授乳期間中の人は本剤を使用しないこと（本剤を使用する場合は授乳をしないこと）
 3. 使用に際しては、説明文書をよく読むこと
 4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
 5. 小児の手の届かない所に保管すること

1日あたりの使用個数			
1日量	1日量+使用回数	1日量+1錠、15分おき	1日量+使用回数
1個	24錠	20時～1時	1～6錠
		21～30時	6～9錠
		31時以上	9～12錠

総代理店 **ファルマシア株式会社** 販売 **武田薬品工業株式会社**
 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 大阪市中央区道徳町四丁目1番1号
 ニコレット禁煙支援センター 電話 03-5365-8314

一 般 名	フェルビナク
構 造 式	
医 療 用 製 剤	<p>ナパゲルン軟膏 ナパゲルンローション ナパゲルンクリーム 他 (以上、フェルビナク 3%含有) セルタッチ 他 <10cm×14cm 貼付剤> (1枚 (膏体 14g) 中フェルビナク 70mg (フェルビナク 0.5%) 含有) スミルテープ <7cm×10cm 貼付剤> (1枚 (膏体 1g) 中フェルビナク 35mg (フェルビナク 3.5%) 含有)</p>
医 療 用 承 認 年 月 日	<p>ナパゲルン軟膏 : 昭和 61 年 9 月 25 日 ナパゲルンローション : 平成 2 年 3 月 30 日 ナパゲルンクリーム : 平成 11 年 2 月 2 日 セルタッチ : 平成 5 年 7 月 2 日 スミルテープ : 平成 14 年 3 月 14 日</p>
医 療 用 効 能 ・ 効 果	<p>軟膏剤、液剤 : 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、筋・筋膜性腰痛症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎 (テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛 貼付剤 : 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎 (テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛</p>
医 療 用 用 法 ・ 用 量	<p>軟膏剤 : 症状により、適量を 1 日数回患部に塗擦する。 液剤 : 症状により、適量を 1 日数回患部に塗布する。 貼付剤 : 1 日 2 回患部に貼付する。</p>
一 般 用 製 剤	<p>アペイン軟膏、アペインローション プロジェシクゲル、プロジェシクローション 他 アペインクール <エアゾール剤> (以上、フェルビナク 3%含有) パスタタイム FX、フェイス <7cm×10cm 貼付剤> (1枚 (膏体 1g) 中フェルビナク 5mg (フェルビナク 0.5%) 含有)</p>
一 般 用 承 認 年 月 日	<p>アペイン軟膏、アペインローション : 平成 7 年 4 月 14 日 プロジェシクゲル、プロジェシクローション : 平成 8 年 3 月 4 日 アペインクール : 平成 11 年 10 月 13 日 パスタタイム FX、フェイス : 平成 14 年 10 月 9 日</p>
一 般 用 効 能 ・ 効 果	<p>関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎 (手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み (テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み</p>

<p>一般用用法・用量</p>	<p>軟膏剤 : 1日2~4回、適量を患部に塗擦してください。</p> <p>液剤 : 1日2~4回、適量を患部に塗布してください。</p> <p>エアゾール剤 : 適量を患部に1日2~4回塗布してください(手にとって塗布あるいは患部に直接噴射後塗布)。</p> <p>貼付剤 : 表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。</p>
<p>一般用医薬品市販後調査結果等</p>	<p>軟膏剤、液剤の市販後調査結果(平成7年4月14日~平成10年4月13日)</p> <p>副作用(軟膏剤、液剤合計)</p> <p>(1) 特別調査: 1,833例中8例(13件)(副作用発現率0.44%)</p> <p>発赤4件、刺激感3件、かぶれ2件、皮膚の変色1件、非塗布部位のしびれ感1件、発疹1件、気分不良1件</p> <p>(2) 一般調査: 6例(12件)</p> <p>発赤4件、かぶれ3件、痒み1件、水疱1件、発疹1件、びらん1件、小水疱1件</p> <p>(参考)</p> <p>貼付剤の市販後調査(平成14年10月9日~平成15年10月8日)</p> <p>副作用</p> <p>(1) 特別調査: 267例中8例15件(副作用発現率3.00%)</p> <p>そう痒症5件、紅斑4件、接触性皮膚炎3件、皮膚疼痛1件、発疹1件、皮膚腫脹1件</p> <p>(2) 一般調査: 11例19件</p> <p>紅斑7件、そう痒症5件、皮膚腫脹2件、接触性皮膚炎1件、皮膚疼痛1件、発疹1件、熱感1件、疼痛増悪1件</p>
<p>対応案</p>	<p>フェルピナク0.5%以下(7cm×10cm1枚(膏体1g)中5mg以下)を含有する貼付剤を指定医薬品から解除する。</p> <p>(フェルピナク3%以下を含有する軟膏剤、液剤については平成11年7月に、フェルピナク3%以下を含有するエアゾール剤については平成12年7月に指定医薬品から解除されている。)</p>