



sato

HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



胃腸鎮痛鎮痙薬

ブチスコミン®

胃痛・腹痛・さしこみに

ブチスコミンは…

- 鎮痛・鎮痙作用にすぐれた臭化ブチルスコポラミンを配合しています。
- 急な胃痛、つらい腹痛・さしこみにすぐれた効果をあらわします。
- 服用しやすい白色の糖衣錠で、1回1錠でよく効きます。



使用上の注意



してはいけないこと


(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。



- (7) 次の診断を受けた人。
排尿困難
心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

口のかわき、便秘



〔効能〕

胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛、癩)、胃酸過多、胸やけ

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	3回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成分・分量と働き〕 3錠中

成分	分量	働き
臭化ブチルスコポラミン	30mg	副交感神経に働き、胃や腸のけいれんをやわらげ、胃痛、腹痛、さしこみの痛みを鎮めます。また、胃酸の分泌を抑えますので胃酸過多や胸やけにもすぐれた効きめをあらわします。

◎保管及び取扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 医薬情報部「お客様相談課」

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

製造発売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号