

参考文献

- 1) 厚生省医薬安全局：血液製剤の使用指針。血液製剤の使用にあたって。pp2-22, 1999
- 2) 厚生省医薬安全局：輸血療法の実施に関する指針。血液製剤の使用にあたって。pp33-46, 1999
- 3) Rebulla P, Finazzi G, Marangoni F, Avvisati G, Gulgliotta L, Tognoni G, Barbui T, Mandelli F, Sirchia G: The threshold for prophylactic platelet transfusion in adults with acute myeloid leukemia. N Engl J Med 337: pp1870-5, 1997
- 4) Heckman KD, Weiner GJ, Davis CS, Strauss RG, Jones MP, Burns CP: Randomized study of prophylactic platelet transfusion threshold during induction therapy for adult acute leukemia: 10,000/ μ L versus 20,000/ μ L. J Clin Oncol 15: pp1143-1149, 1997
- 5) Contreras M: Final statement from the consensus conference on platelet transfusion. Transfusion 38: pp796-797, 1998
- 6) 厚生省医薬安全局：血小板製剤の使用基準。血液製剤の使用にあたって。pp23-32, 1999
- 7) 清水勝：厚生科学特別研究「採血基準の改定と血液製剤の適正使用に関する研究」平成13年度報告書、2002
- 8) 倉田義之：血液疾患における輸血と輸血副作用。臨床血液、第43巻、2号、pp76-79、2002