

表5. 急性白血病の寛解導入療法
決まった頻度・量の血小板輸血を行う

| | | | 累積 | |
|-----|-----|-------|------|--------|
| | 度数 | パーセント | 累積度数 | パーセント |
| はい | 16 | 8.12 | 16 | 8.12 |
| いいえ | 181 | 91.88 | 197 | 100.00 |

その場合の週の回数

| 回数 | | | 累積 | |
|----|----|-------|------|--------|
| | 度数 | パーセント | 累積度数 | パーセント |
| 2 | 7 | 43.75 | 7 | 43.75 |
| 3 | 8 | 50.00 | 15 | 93.75 |
| 4 | 1 | 6.25 | 16 | 100.00 |

その場合の1回の使用量・単位

| 使用量 | | | 累積 | |
|-----|----|-------|------|--------|
| | 度数 | パーセント | 累積度数 | パーセント |
| 10 | 13 | 81.25 | 13 | 81.25 |
| 15 | 1 | 6.25 | 14 | 87.50 |
| 20 | 2 | 12.50 | 16 | 100.00 |

検査成績・臨床症状を見ながら血小板輸血を行う

その場合の血小板輸血の条件

| | 条件 | 累積 | | | |
|-----|--------------------|-----|-------|------|--------|
| | | 度数 | パーセント | 累積度数 | パーセント |
| Plt | 5万/ μ L未満 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
| Plt | 2万/ μ L未満 | 118 | 65.19 | 119 | 65.75 |
| Plt | 1万/ μ L未満 | 13 | 7.18 | 132 | 72.93 |
| Plt | 5万/ μ L未満+出血傾向 | 3 | 1.66 | 135 | 74.59 |
| Plt | 2万/ μ L未満+出血傾向 | 30 | 16.57 | 165 | 91.16 |
| Plt | 1万/ μ L未満+出血傾向 | 6 | 3.31 | 171 | 94.48 |
| | その他 | 10 | 5.52 | 181 | 100.00 |